

*image  
not  
available*







MO

SERENIS. SABAVDIAE  
DVCI ETC.MICHAEL COLVMBVS CENTALLENSIS,  
Medicus, & Philosophus.

INTER præclara, Dux Inuictissime, maximorum,  
Heroum facinora illud laude minimè vulgari di-  
gnum semper extitit, quòd imbelles placidasq; mus-  
sas in castra etiam adducerent, & in medio armos-  
rum strepitu aliquam dubij otij partem illis imper-  
tirent. Hanc magnus Alexander, hanc C. Caesar

hanc Octavius Augustus, aliq; complures prisca virtutis proceres,  
laudem tulere, qui vel paludati & canente classico, litterarum studia  
nunquam intermiserunt, sed veluti musis suauiter fausteq; occinenti-  
bus, alacri intrepidq; animo manus cum hoste conseruerunt. Eoste  
cum eximio paterna virtutis exemplo, tum verò immortali tua cum  
gloria studiosè amulantem dum intuerer, facile mihi persuasi, quæ sup-  
plices offerimus musarum munuscula aliquem apud te dura Marius  
munia ingentibus ausis obeuntem, vel in ipso armorum fulgore, gra-  
tia locum habitura. Sunt hæc Ioannis Valuerdi de humani corporis  
anatomie monumenta Hispanico primùm, deinde Italico idiomate unà  
cum elegantissimis iconibus iampridem edita, quæ cum Iunta primarij  
apud Venetos Typographi è re sua, & communi fore ducerent, ut in ex-  
terarum potissimum gentium gratiam latinè redderentur, hanc mihi  
prouinciam, dum Patavij duobus ferè ab hinc annis agerem, detule-  
runt, quam etsi detrectare, tenuitatis meæ conscius, omnino decreue-  
ram, multorum tamen, præsertimq; Mercurialis medicorum hæc no-  
stra ætate facile principis, suasionè atque impulsu suscipere sum coactus.  
Susceptam paucis sanè mensibus absolui, de pigmentis nimirum elo-  
quentiæ, deq; calamistrato sermonis cultu minimè sollicitus, sed unum  
hoc agens, ut integra in primis fide omnia transferrem, mutas artes

agitantibus satis superq, id futurum arbitratus . Hoc vero quantu-  
luncunque est laboris industriaq, nostra monumentum nomini tuo di-  
candum duximus, eo quidem consilio, ut quem ipse omnium maxime &  
suspicio, & pietate prosequor singulari, eius mihi benevolentiam leui  
hoc saltem (dum grauiore liceat) officij genere, hacq, animi significa-  
tione promerer, ratus muneris tenuitatem ab incomparabili humani-  
tatis tue magnitudine subleuatum, & aliqua etiam ex parte acceptum  
iri. Accipe igitur, Heros inclyte, exiguum hoc maxime in te mea ob-  
seruantia ac pietatis argumentum ea frontis animiq, serenitate, qua  
omnium tibi animos arctissime deuincis. Nos Deum Opt. Max. obni-  
xe precabimur ut vota tua felicissimis auspicijs religiosè nuncupata  
benignus audiat, faxitq, ut diu sospes & incolumis impurissimos, ac  
scelestissimos vera religionis, & catholici nominis hostes armipotentia  
dextera conterere, ac debellare penitus queas; quo sane nihil ista tua  
hereditaria ex maioribus animi magnitudine dignius, nihil Christia-  
na reipublica utilius, nihil denique ad posteritatis memoriam illu-  
strius, aut dici, aut excogitari unquam poterit.

# CAPITVM TOTIVS OPERIS

I N D E X.

Primus liber continet Capita 39.



OPERIS præfatio.

Proœmium primi libri.

De ofibus.

De ofibus capitis.

De aurium oficulis.

De ofibus maxilla superioris.

De ofe iugali.

De ofibus maxilla inferioris.

De dentibus.

De capitis, & maxilla superioris foraminibus.

Cap. 8. 11

De ofe hyoide.

De dorfo.

De cervicis vertebris.

De vertebris thoracis.

De vertebris lumborum.

De ofe sacro.

De ofe coccygis.

De ofibus thoracis.

De ofibus, siue cartilaginibus cordis.

De scapulis.

De claviculis.

De ofe humeri.

De vlnæ, & radio.

De ofibus brachialis.

De postbrachiali.

De ofibus digitorum.

De ofibus sesaminis.

De ofibus ilium, & cotendicis.

De ofe femoris.

De tibia, & fibula.

De patella genu.

De pedis ofibus.

De ofe calcis, & nauiformi.

De tarso.

De pectine, seu planta pedis.

De ofibus digitorum pedis.

De unguib.

De cartilagine palpebrarum.

De cartilagine aurium.

De cartilagine narium.

De laryngis cartilagine.

Secundus liber habet Cap. 42.



De ligamentis.

De cute, cuticula, membrana carnea, & uniuerso corpori obducta, & adipe inter ipsam,

Anat. Val.

Cap. 1. 69

& cutem interposito.

De musculis, & primū quid sit musculus. C. 3. 72

De muscutorum differentijs.

De musculus frontis.

De musculus palpebrarum.

De musculus oculorum.

De musculus nasi.

De musculus genarum.

De musculus labiorum.

De musculus maxilla inferioris.

De musculus osis hyoidis.

De musculus linguam mouentibus.

De musculus laringem mouentibus.

De musculus brachium mouentibus.

De ligamentis humeri os colligantibus. C. 16. 85

De musculus scapulas mouentibus.

De musculus caput mouentibus.

De capitis, & priorum duarum cervicis verte-

brarum ligamentis.

De musculus abdominis.

De musculus testium.

De musculus thoracem mouentibus.

De ofium thoracis ligamentis.

De musculus dorsum mouentibus.

De dorso vertebrarum ligamentis.

De musculus cubitum flectentibus, & extenden-

tibus.

De musculo vole manus membranam efforman-

te.

De carnea interna manus regionis substantia.

Cap. 28. 101

De musculus manus digitos mouentibus. C. 29.

fol. 101

De musculus manum superbrachiale mouenti-

bus.

De musculus radium sursum, deorsumq. agentibus.

De vlnæ radij q. ac manus ligamentis.

De musculus genitalis.

De musculus ceruicis vesicæ.

De ani musculus.

De musculus crus mouentibus.

De musculus femur mouentibus.

De musculus pedem mouentibus.

De musculus pedis digitos mouentibus. C. 39. 119

De coxendicis, & genus articularum, de q. reli-

quis omnibus tum cruris, tum pedis ligamen-

tis.

De musculatorum numero.

Cap. 40. 121

Cap. 41. 123

a ij

De

# Index Capitulorum.

De membrana, quæ ossa inuestit perioſtion di-  
ſta. Cap. 42. 123

Tertio libro continentur Cap. 18.

**D**E membrana, quæ omnia hæc inuoluit  
organa Peritonæum vocatur. Cap. 179  
De ſtomacho. Cap. 2. 180  
De ventriculo. Cap. 3. 181  
De inteſtinis. Cap. 4. 182  
De meſenterio. Cap. 5. 184  
De omento. Cap. 6. 184  
De icore. Cap. 7. 185  
De cyſti fellis. Cap. 8. 186  
De liene. Cap. 7. 186  
De renibus. Cap. 10. 187  
De veſica. Cap. 11. 188  
De virilibus organis generationi deſeruieni-  
bus. Cap. 12. 189  
De genitali. Cap. 13. 191  
De vtero, cæteriſq; omnibus mulieribus organis  
generationi deſeruientibus. Cap. 14. 192  
De muliebribus teſtibus. Cap. 15. 195  
De ſæm. & ſecundinis. Cap. 16. 196  
De fœtus in vtero conſiſtentis nutrimento. Ca-  
pit. 17. 198  
De mammis. Cap. 18. 199

Quartus liber continet Cap. 9.

**V**ANAM in corporis parte vitales  
ſpiritus procreantur. Cap. 1. 223  
De membrana coſtas ſuccingente, quæ  
Pleura ideo dicitur. Cap. 2. 223  
De mediſtino. Cap. 3. 224  
De aſpera arteria. Cap. 4. 225  
De faucium glandulis quas tonſillas Chirur-  
gi appellant. Cap. 5. 227  
De columella. Cap. 6. 227  
De pulmonibus. Cap. 7. 227  
De cordis inuolucro. Cap. 8. 228  
De corde. Cap. 9. 229

Quintus liber continet Cap. 11.

**D**E membranæ organa hæc inueſtienti-  
bus. Cap. 1. 239  
De cerebro, & cerebello. Cap. 2. 240  
De calloſo vocato corpore, ac ventriculorum ſe-  
pio. Cap. 3. 241  
De cerebri ventriculis. Cap. 4. 242  
De cerebri corpore teſtudinæ referente. Cap. 5. 243  
De cerebri glandula pineæ nuci ſimili. Cap. 6. 244  
De cerebri teſtibus, ac natibus. Cap. 7. 244  
De vermicularibus cerebri proceſſibus. Cap. 8.  
fol. 244  
De pelui, & glandula cerebri pituitam expur-

gantibus.

De ſenſibus exterioribus.

De oculis.

Cap. 9. 244

Cap. 10. 245

Cap. 11. 246

Sextus liber habet Cap. 14.

**E**na quid. Cap. 1. 263  
**A**rteria quid, quis ipſius uſus, & ſub-  
ſtantia. Cap. 2. 264  
De venarum, artieriarumq; numero. Cap. 3. 264  
De glandulis, venarum, artieriarumq; ducti-  
bus appoſitis. Cap. 4. 272  
De vena portæ exortu, ac diſtributione. Cap. 5. 266  
De vena caua, & primum ubi vena portæ ra-  
mis in icore committatur. Cap. 6. 268  
De vena caua ſupra icur diſtributione. Cap. 7.  
fol. 268  
De axillaris, & humeralis venæ in brachium  
propagatione. Cap. 8. 272  
De venæ caua infra icur diſtributione. Cap. 9.  
fol. 274  
De venæ caua in crus propagatione. Cap. 10. 277  
De magna arteria exortu, & propagatione ſu-  
pra cor. Cap. 11. 280  
De magna arteria infra icur diſtributione.  
Cap. 12. 282  
De venis, & artierijs intra caluariam conſiſten-  
tibus. Cap. 13. 285  
De vena artieriali, & arteria venali. Cap. 14. 288

Septimus liber continet Cap. 15.

**N**ervus quid, quæ ipſorum differentie,  
& quis exortus. Cap. 1. 309  
Quot nervorum paria ex cerebro pro-  
deant, & ex dorſali medulla priuſquam e cra-  
nio excedat. Cap. 2. 310  
De primo, & ſecundo cerebri nervorum pari.  
Cap. 3. 311  
De 3. & 4. cerebri nervorum pari. Cap. 4. 311  
De quinto cerebri nervorum pari. Cap. 5. 312  
De ſexto cerebri nervorum pari. Cap. 6. 313  
De ſeptimo cerebri nervorum pari. Cap. 7. 314  
De dorſali medulla, & nervis ab ea prodeuntibus.  
Cap. 8. 314  
De nervis à cervice prodeuntibus. Cap. 9. 315  
De nervis à thoracis vertebriſ. excidentibus.  
Cap. 10. 317  
De nervis à lumborum vertebriſ prodeuntibus.  
Cap. 11. 318  
De nervis ab oſſe ſacro manantibus. Cap. 12. 318  
De nervis in brachia diſtributis. Cap. 13. 319  
De nervis in crus propagatis. Cap. 14. 321  
De olfactus, guſtus, ac tactus organis. Cap. 15.  
fol. 323

# INDEX RERVM OMNIVM

## PRÆSENTI OPERE CONTENTARVM

### COPIOSISSIMVS.



<b>A</b> D DOMINI muscoli octo, eorumq; historia. fol. 90. 91	Appendices processus vertebrarum cervicis. 15
Adeps inter cutem, & membranam carnosam quibus animantibus co- piosior obtigerit, & adeps in alijs corporis partibus, ipsiusque usus. 71	Appendicis maioris lateris scapularum. 23
Adeps in iuvenibus albus, in senibus flauus, & cur. 71	Appendices vertebrarum dorsi. 14
Adeps interdum in ventriculi fundo consistens. 182	Appendices superiores inferioresque pectinis ma- nus quomodo iuncent, & cum alijs ossibus com- mittantur, ipsarum sinus, & usus. 32
Adeps inter cartilagine laryngis, & tertiam tu- nicam. 226	Appendices ossium postbrachialis statim ossibus suis iununtur. 32
Adeps durus ad cordis basim. 229	Appendices ossium postbrachialis cur ossibus gran- diores. 33
Adipis inter cutem, & membranam carnosam ge- neratio. 71	Appendices ossis femoris ubi et quomodo proximis ossibus committantur. 38
Ad quid deferuant. 197	Appendices tibiae fibulaeque superiores, & inferio- res, ac earum discrimen. 39
Aer quomodo incus extraq; mittatur & quibus in- strumentis. 94	Appendices inferiores tibiae, ac fibulae singulae pro- cessum habent, & inter illos sinum. 40
Aer quomodo in cor ingrediatur. 223	Appendix ossium accessus. 24
Aer intro & extra missus quid praestet. 226	Appendix processus spinae scapulae, quae in pueris pluribus extruitur ossiculis. 24
Aer quomodo vocem efformet. 226	Appendix capituli claviculae, ipsiusque cartila- gines. 25
Ala cordis dextra flexilior quam sinistra. 230	Appendix humeri magna, & ipsius caput. 26
Alas nasi quas, & quare ita vocent Anatomes pe- riti. 46	Appendix inferior humeri ex qua caput exterius, & interius extruitur, utque committatur. 27
Ala sine auricula cordis, & ipsarum munus. 230	Appendix capituli vlnae, & processus. 28
Alia utrosq; hanc primum fetus involucrium graecis di- ctum. 197	Appendix postremi vlnae processus interdum vtero dura, & quomodo committantur. 28
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 197	Appendix radii, ipsius signis, & usus. 32
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Appendix ossium pectinis manus. 32
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Appendix ossis ilium ipsius descriptio, & usus. 36
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Appendix superior vlnae quam formam vsumq; ha- beant sede anteriori. 40
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Appendix tibiae posteriori sede descripta, & ipsius sinus. 40
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Appendix fibulae. 40
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Appendix ossium Tarsi. 44
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Aqua in cordis capsula contenta & usus. 229
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Aqua cur celeriter adeo & copiosa ex oculis ex- cidat. 242
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Aqua in partu erumpentes quid sint. 197
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Aranea prima oculi tunica aranearum telis fini- lis. 246
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Ardores rigentem ut persentiant qui gonorrhoea tenentur. 192
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Arteria est vena pulsus edens, aspera arteria est pul- sionis. 225
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Arteria Hippocr. Riat. & Aristot. temporibus de aspera arteria solum dicebatur; caetera vero arteriae quomodo in venarum numero habe- entur. 264
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Arteria magna quomodo ex editore sinistri cor- dis ventriculi regione oriatur, & ipsius distri- butio. 280
Alia ut secundum fatum involuens membrana graecis dicta. 246	Arteria

# Index.

<i>Arteria magna iuxta cor in duas partes diremptus, &amp; illius quæ supra cor repit hystoria, ac distributio.</i>	280
<i>Arteria magna infra cor propagatio.</i>	282
<i>Arteria magna iuxta os sacrum diremptus.</i>	284
<i>Arteria primam petens costam, tum diuisa quatuor priorum costarum interualis dorsali medulla, muscularis, &amp; capiti exporrecta.</i>	280
<i>Arteria editissimam ossis pectoris sedem petens, deinde ad costarum cartilagines, &amp; rectos abdominis musculos descendens.</i>	280
<i>Arteria thoracis muscularis, axillarum glandulis, &amp; thoracis lateribus exporrecta.</i>	281
<i>Arteria posteriores cervicis musculos petens.</i>	280
<i>Arteria in axillam iter habens, &amp; in scapula muscularis, &amp; in humeri summum digesta.</i>	280. 281
<i>Arteria sinistram petens brachium, et qui ad digitos usque digeratur.</i>	281
<i>Quæ dextrum petit.</i>	282
<i>Arteria cuius pulsus contrectatur.</i>	281
<i>Arteria temporis sinistri, &amp; ponè aures pulsam edentes sensibilem.</i>	281. 282
<i>Arteria in caput repens, &amp; eius hystoria.</i>	281
<i>Arteria genas petens.</i>	128
<i>Arteria dextrum accedens brachium.</i>	281
<i>Arteria mesenterium adiens 183. mesenterium, &amp; intestinum.</i>	284
<i>Arteria feminalis exortus.</i>	284
<i>Arteria pubis ossis foramen traiciens, &amp; in conterminos musculos dirempta.</i>	284
<i>Arteria inguina perreptans, &amp; ramos muscularis femur momentibus, &amp; posteriora ipsius occupantibus porrigenis.</i>	284. 285
<i>Arteria sub malleolo, cuius pulsatio persèquitur.</i>	285
<i>Arteria varia in pedem distributio.</i>	285
<i>Arteria prima, &amp; secunda, venaq; prima &amp; secunda caput a dentibus, quæ ingrediuntur.</i>	285. 286
<i>Arteria tertia caput petens quæ ingreditur, quousq; in partes digeratur.</i>	285
<i>Arteria venalis quam obtineat tunica, &amp; cur ita dicta.</i>	288. 289
<i>Arteria venalis exortus, &amp; distributio.</i>	288
<i>Arteria venalis plena sanguine.</i>	289
<i>Arteria venalis, et vena arterialis munus.</i>	288. 289
<i>Arteria quid sint, quidq; contineant.</i>	264
<i>Arteriarum ex corde, nervorum ex cerebro, venarum ex iecore ortus.</i>	263
<i>Arteria originem habent ex corde.</i>	280
<i>Arteria in homine due, ipsarum ortus &amp; distributio.</i>	265
<i>Arteria duplici donantur tunica peculiari, &amp; communi.</i>	264
<i>Arteriarum fibra, ipsarumque munus.</i>	264
<i>Arteria cur transuersas fibras plures quam obli- quas obtineant.</i>	264
<i>Arteriarum &amp; venarum discrimen.</i>	264
<i>Arteria splanchnicæ hystoria harumque hystoria.</i>	282
<i>Arteria splanchnicæ cur ita dicta, &amp; mirum in ipsis Realis experimentum.</i>	283
<i>Arteria in capite propagata.</i>	282
<i>Arteria laryngem, &amp; linguam petentes.</i>	281
<i>Arteria collisionis organa aduentes.</i>	282. 283
<i>Arteria omentum, intestina, ventriculum, cystum fel- lis, gulam, &amp; lienem petentes.</i>	283. 284
<i>Arteria septii transuersi.</i>	282
<i>Arteria costarum musculos, dorsalem medullam, &amp; dorsi musculos petentes.</i>	282
<i>Arteria renes accedentes, ipsarumque varius ex- ortus.</i>	283
<i>Arteria lumbos, peritonæum &amp; ilia petentes.</i>	284
<i>Arteria in vesicam utrumque repentes.</i>	284
<i>Arteria genitalis cucum aduentes.</i>	284
<i>Arteria in crus propagata.</i>	284
<i>Arteria in pedem, &amp; digitos distributa.</i>	285
<i>Arteriarum, venarumque intra cranium varius congressus, atque diremptus.</i>	285
<i>Arteria caput petam quousq;.</i>	286
<i>Arteria secundum similes in ventriculo dextro, &amp; sinistro ex quo fiant.</i>	288
<i>Arteriarum &amp; venarum umbilicalium incessus.</i>	196
<i>Articulus primus quatuor manus digitorum primo pollicis similis est.</i>	34
<i>Articulus secundus, &amp; tertius omnium manus di- gitorum, ut secundus pollicis articulantur.</i>	34
<i>Articulatio coniunctionis species.</i>	2
<i>Articulatio sine coniunctio quid.</i>	2
<i>Arthrodia articuli species.</i>	3
<i>Asperitates, &amp; sinus ossis tali, &amp; ipsorum usus.</i>	42
<i>Aspera arteria, &amp; ipsius hystoria.</i>	225
<i>Aspera arteria unica est, duosque obinet ramos in duos diremptos, sicque deinceps.</i>	225
<i>Asperæ arterie figura, &amp; compositio.</i>	225
<i>Aspera arteria quid varietatis in deglutitione, et re- spiratione subeat.</i>	226
<i>Aspera arterie usus.</i>	226
<i>Astragalus pedis os.</i>	42
<i>Aurem mouebat Marsilia Hispanensis.</i>	72
<i>Aures &amp; ipsarum cartilagines.</i>	45
<i>Aures sine alæ cordis, ipsarumque munus.</i>	219

B

<b>B</b> ovis recens castrati chr prole habuerint.	276
<i>Bilis solum expulsiōni opitulatur.</i>	186
<i>Bilis in cystum ingressus, &amp; egressus quæ fiant.</i>	186
<i>Brachiale os constituitur ossibus, horumque hysto- ria, 34. cur pluribus donetur ossibus 30. ipsius qualitates.</i>	31
<i>Brachium solum movetur muscularis.</i>	38
<i>Brachiale unico osse constitutum videtur, &amp; ipsius structura.</i>	30
<i>Bregma in pueris pars ossis frontis.</i>	6

C

<b>C</b> alx, vide os calcis.	
<i>Calvaria capitis os latius dicta.</i>	4
<i>Cambium liquor est quo membra nutriuntur.</i>	190
<i>Canalis vrinæ ipsiusque descriptio.</i>	192
<i>Canalis exiguus, in manus digitorum ossibus occu- rens,</i>	



<i>vens, ipsiusque vsus.</i>	33	<i>Cartilago pubis os coxendicis colligans, quomodo ipsam aliget, utque crescente homine minus appareat.</i>	37
<i>Caput in osse quid.</i>	3	<i>Cartilagine aurium, ipsarumque munus.</i>	45
<i>Caput quid, figuræ ipsius naturales, &amp; non naturales.</i>	3	<i>Cartilago prima laryngis bipartito disscissa; ipsiusque processus.</i>	46
<i>Caput 14. musculis priuatim mouetur horumque historia.</i>	18. 19. 20	<i>Cartilago prima laryngis in duas dirempta, &amp; ipsius historia 46. Secunda, ipsius processus &amp; sinus 5. Tertia in duas partita 6. Quarta græcis dicta Επικυρσσις.</i>	47
<i>Caput retrorsum 12. agitur musculis secundo pari pro duobus connumerato, in priora duobus tantum.</i>	89	<i>Cartilago secunda laryngis Anularis vesalia dicta quod anulum referat, quo sagittarum Turcæ vinctur.</i>	47
<i>Caput appendicis humeri, partes ipsius &amp; vsus.</i>	26	<i>Cartilagine costarum quo inuicem differant.</i>	20
<i>Capita clauicularum ossis pectoris similibus similia, ipsorumque historia.</i>	25	<i>Cartilagine tibiæ sinus adaugentes, ipsarum coarctatus &amp; historia.</i>	40
<i>Caput clauiculæ summo humero articulatam. ibid.</i>		<i>Cartilaginum palpebrarum structura, &amp; vsus.</i>	45
<i>Caput ossis humeri ad externam trocleam sedem, &amp; ipsius vsus.</i>	27	<i>Cartilaginum laryngis figura.</i>	225
<i>Caput eiusdem in interna sede, &amp; ipsius sinus. ibid.</i>		<i>Cartilagine laryngis tres &amp; ipsarum historia.</i>	46
<i>Caput radij, cur non pro ratione brachialis crassitie augmentum.</i>	29	<i>Cartilagine faucium adusque pulmones C. literam imagine referunt, &amp; cur.</i>	47
<i>Caput primi ossis brachialis 31. septimi.</i>	32	<i>Cavitates ossis frontis.</i>	4
<i>Caput superius ossis femoris coxendicis ossi quomodo iungatur, &amp; ipsius descriptio inferius cruris ossibus.</i>	38	<i>Cavitates ossis frontis aerem cerebrum petentem disponunt, uti pulmones eum qui ad cor deferunt.</i>	6
<i>Caput appendicium ossium pectinis pedis.</i>	44	<i>Cerebri glandula pineæ nuci similis, &amp; ipsius historia.</i>	48
<i>Capita quibus ossa pectinis pedis lateribus iunguntur.</i>	44-45	<i>Cerebri magnitudo, situs &amp; figura.</i>	240
<i>Capitula costarum ubi intexantur.</i>	21	<i>Cerebri processibus tinea similes ipsorum situs, &amp; vsus.</i>	244
<i>Capitulum ceruicis radij.</i>	28	<i>Ceratoides siue cornea, quarta oculi tunica.</i>	246
<i>Capitula ossium postbrachialis.</i>	32	<i>Cerebrum cur in capite positum.</i>	139
<i>Capitulum &amp; ligamenta ad fines digitorum manus, ipsorumque vsus.</i>	33	<i>Cerebrum quæ custodiant.</i>	139
<i>Capitulum primi &amp; secundi ossis pollicis manus.</i>	34	<i>Cerebrum pulsum edit vi cor.</i>	140
<i>Capitulum fibule sedis superioris eiusque vsus.</i>	40	<i>Cerebrum quot in partes diuidatur.</i>	140
<i>Caput quid, quæ ipsius naturalis, &amp; non naturalis figura.</i>	3	<i>Cerebrum quid in sinistram, ac dextram dirimat. 240. &amp; 241.</i>	
<i>Cardinalis cibo sanguinis reiectione peremptus.</i>	267	<i>Cerebri figura.</i>	241
<i>Caro multa capitulis musculis subiecta.</i>	92	<i>Cerebrum impressiones habet canas &amp; anfractuosas intestinorum gyris similes, ipsarumque vsus. ibid.</i>	
<i>Caro ex interiore coxendicis regione nascens, ipsiusque vsus.</i>	116	<i>Cerebri color &amp; substantia.</i>	ibid.
<i>Caro in interna manus regione consistens, quæ ipsius substantia quæ munera.</i>	101	<i>Cerebrum cur non sit medulla ossium capituli, ut quidam aiunt.</i>	ibid.
<i>Carotides venæ soporales dictæ.</i>	282	<i>Cerebrum venis caret manifestis.</i>	ibid.
<i>Cartilago à communibus articulorum ligamentis varia tendini similis in angulo connexus inferioris maxillæ, unde oriatur, &amp; quem præstet vsus.</i>	10	<i>Cerebri pituita quæ expurgetur.</i>	244
<i>Cartilago pectoris ensiformis quem habeat vsus.</i>	22	<i>Cerebrum duos obtinet canales ad pituitæ expurgationem. 244. Canales quatuor idem præstantes.</i>	245
<i>Cartilago maioris scapularum lateris, longè minor homini quam cæteris animalibus obigit.</i>	23	<i>Cerebrum tres duntaxat habet ventriculos, ipsorumque historia.</i>	242
<i>Cartilago sinus scapulae cur luxatum humerum reponi vetet.</i>	23	<i>Cerebri corporis testudine referentis historia.</i>	243
<i>Cartilago sinus ceruicis scapulae cur extrorsum adeo protuberet, ipsius ortus &amp; descriptio.</i>	24	<i>Cerebrum sensus expers, unde etiam dubitat auctor, sine nervorum principium.</i>	309
<i>Cartilago ensiformis.</i>	24	<i>Cervix ab occipiti sine ad humeros pertinet, septem donatur vertebrae, ipsarumque historia.</i>	14
<i>Cartilago quæ à radio educta inter brachiale &amp; vlnam absque ad usum adigitur, &amp; ipsius vsus.</i>	28	<i>Cervix in osse quid.</i>	4
<i>Cartilago appendicis radij, &amp; ipsius progressus.</i>	20. 30	<i>Cervix si apula, ipsius sinus &amp; vsus.</i>	23
<i>Cartilago sinus coxendicis, ipsiusque officium.</i>	37	<i>Cervix radij, capitulum, sinus, &amp; ipsius vsus.</i>	28
		<i>Cervicis &amp; corporis vteri situs.</i>	192

# Index:

<i>ceruicis vteri interior constitutio, ipsius substan-</i>	194	<i>cessus.</i>	8.9
<i>tia.</i>	194	<i>compendium operis.</i>	224
<i>ceruix vteri in puellis intrinsecus levis est &amp; mollis,</i>	194	<i>compendium partium oculi.</i>	247
<i>in ceteris secus.</i>	194	<i>conarion glandula cerebri pineæ nuci similis di-</i>	244
<i>ceruix vteri muliere in libidinem concita, amplia-</i>	194	<i>cta.</i>	244
<i>tur.</i>	194	<i>coniunctio ossium symphybis dicta duas habet spe-</i>	3
<i>Cervix vesicæ musculum habet, ipsius descriptio,</i>	109	<i>cies.</i>	2
<i>differentia &amp; usus.</i>	109	<i>Coniunctio sine articulatione quid.</i>	2
<i>Chylus substantia est alba, in quam cibus in ventri-</i>	189	<i>coniunctionis tres species sunt, quarum tertia nomi-</i>	2
<i>culo conuertitur.</i>	189	<i>ne caret.</i>	2
<i>chylus in hepate in sanguinem commutatur, &amp; ab</i>	190	<i>Coniunctio genu ad latera non mouetur.</i>	38
<i>inutilibus humoribus depuratur.</i>	190	<i>Corde omnia animantia prædita, aut quopiam si-</i>	223
<i>chirurgia pars medicina antiquissima &amp; cur.</i>	20	<i>mili.</i>	223
<i>Chondron idem quod cartilago.</i>	287	<i>Cordis magnitudo, &amp; substantia.</i>	229
<i>choroides sunt plexus quidam cerebri secundimis si-</i>	246	<i>Cordis medium thoracis tenet mucro ad laeuam ver-</i>	ibid.
<i>miles.</i>	246	<i>git.</i>	ibid.
<i>Choroides tertia oculi tunica dicta vnea.</i>	181	<i>Cordis situs, figura &amp; reliqua.</i>	228
<i>Cibus cur confici possit, pyloro etiam haud ita vt</i>	189	<i>Cordis involucria.</i>	230
<i>fertur clauso.</i>	189	<i>Cordis ventriculi historia.</i>	230
<i>Cibus quatuor subit coctiones ante quam in corporis</i>	189	<i>Cor tenui membrana obductum ad ipsius basim mul-</i>	231
<i>substantiam conuertatur.</i>	189	<i>to adipere referta.</i>	ibid.
<i>Cibus antequam totus fuerit confectus nihil è ventri-</i>	189	<i>Cor nervorum principium cur aliquibus visum.</i>	231
<i>culo ex cadere falsum est.</i>	189	<i>Cor in quibusdam animantibus os intus gerit auctori</i>	22
<i>Cibus in ventriculo in albam vertitur substantiam,</i>	189	<i>visum, in veruecibus, Galeno in Elephante.</i>	22
<i>quæ chylus dicitur.</i>	189	<i>Cor nullius nervi origo.</i>	309
<i>Cibus haud simul vniuersus in chylum vertitur.</i>	189. 190.	<i>Cor Arteriarum principium.</i>	280
<i>Cibus in ventriculo quis primum quis postea confi-</i>	190	<i>Cor vitales spiritus gignit.</i>	223
<i>ciatur, &amp; confectus quæ elabatur.</i>	190	<i>Cor vii aerem suscipiat.</i>	223
<i>Cibus esitotus vomitu reijcitur qua ratione corpus</i>	190	<i>Cor cur ita durum effectum.</i>	229
<i>alitur.</i>	190	<i>Cor cur extrinsecus laue.</i>	ibid.
<i>Cibo moderatè, &amp; copiosius sumpto quomodo iecur</i>	190	<i>Cordis alæ, sicut auriculae duæ ipsarumque usus.</i>	ibid.
<i>alatur.</i>	190	<i>Corona vteri.</i>	193
<i>Circulus inter humorem chrySTALLUM, &amp; vitreum</i>	247	<i>Coronon quid.</i>	3
<i>quis.</i>	247	<i>Corones vna processus.</i>	27
<i>Clavicula, &amp; ipsarum historia.</i>	25	<i>corporis callosi cerebri situs &amp; historia.</i>	241
<i>Clavicularum positio, &amp; figura.</i>	25	<i>Corporis callosi usus.</i>	242
<i>Clavicularum substantia.</i>	25	<i>Corpus callosum superiori sede duos rinulos habet</i>	243
<i>Clavicularum lineæ, impressione, asperitates, fora-</i>	26	<i>ipforumque historia.</i>	ibid.
<i>minæ, &amp; usus.</i>	26	<i>Corporis cerebri testudinem referentis historia.</i>	ibid.
<i>Coarticulatio species coniunctionis.</i>	2	<i>Corporis cerebri testiculis, &amp; natibus similis histo-</i>	244
<i>Columella cur ita dicta.</i>	227	<i>ria.</i>	244
<i>Commisura calvariae naturalis tres ferè sunt, ipsa-</i>	4	<i>corpus musculi est vbi fibræ magis distant, plusque</i>	74
<i>rum nomina, &amp; situs.</i>	4	<i>carnium habetur.</i>	74
<i>Commisura coronalis, ipsius termini &amp; positio.</i>	4	<i>Corpora vertebrarum ceruicis præterquam prima, oua</i>	15. 16
<i>Commisura lambdoyis, &amp; sagittalis.</i>	4	<i>ta sunt, ipsorum commissurionis modus, &amp; ratio.</i>	15. 16
<i>Commisura capitum non naturalium.</i>	4	<i>Corpora duo penem confluentia ipsorumque histo-</i>	191
<i>Commisura duæ supra aures squamosæ dictæ.</i>	4	<i>ria.</i>	191
<i>Commisura nomine carens, auctori dicta hyodis.</i>	4	<i>Costæ vtrinque 12. quandoque vero ab altero late-</i>	20
<i>Commisura ossium capitis aliæ alijs conspectiores.</i>	5	<i>rum 13. ipsarum divisio.</i>	20
<i>Commisura capitis ætate ulterius procedente minus</i>	5	<i>Costarum in substantia, longitudine, ac latitudine di-</i>	20
<i>complicata offeruntur.</i>	5	<i>scrimen &amp; conuenientia.</i>	20
<i>Commisura capitis in pueris potentiores sunt &amp; len-</i>	6	<i>Costæ anteriores, vt committantur.</i>	ibid.
<i>ta magis.</i>	6	<i>Costæ vbi tubercula habeant, &amp; asperitates, &amp; quid</i>	ibid.
<i>Commisura ac lineæ, siue harmoniæ capitis quid præ-</i>	5. 6	<i>ea præstent.</i>	ibid.
<i>stent.</i>	5. 6	<i>Costæ ipsarumque cartilagine extrinsecus curvæ</i>	ibid.
<i>Commisurarum capitis vulnera periculosa magis quàm</i>	6	<i>sunt, ac laues non tamen vbiq̃ue,</i>	ibid.
<i>ossium.</i>	6	<i>Costarum à dorsis vertebrae abscedentium ductus</i>	21
<i>Commisura propria superioris maxillæ nouem sunt,</i>	6	<i>rum &amp; cartilaginum.</i>	21
<i>vtrinque quatuor, vna in medio, ipsarumque in-</i>	6	<i>Costæ ad quid effectæ, &amp; curque alibi ossæ alibi car-</i>	21
		<i>tilagineæ.</i>	21

# Index.

*Costa ut thoracis vertebrae articulentur, ipsarumq;* 22  
*capitula.*  
*Costa quae primo & secundo pectoris ossibus com-*  
*mittantur, & quomodo.* ibid.  
*Costae cartilagineae non alligantur, sed in eas abeunt.* 94. 95  
*Coxendix quid.* 35  
*Cranium capituli os.* 4. 5  
*Cubitus siue vlna quid.* 28  
*Cubium duo flectunt muscoli, duo extēdunt.* 98. 99  
*Cutis quid, & ipsius descriptio.* 70  
*Cutis pars spermatica.* ibid.  
*Cutis disrumpitur cur non regeneretur.* 70. 71  
*Cutis quam varie nervos excipiat.* 70. 71  
*Cutis quam varie subieclis habeat partibus.* 70  
*Cutis quam exquisito sensu polleat.* 70  
*Cutis vbi moneatur, quo instrumento, & vbi bisuta*  
*sit.* 71  
*Cutis vbi quae foraminibus peruia est exiguis, qui*  
*poridicuntur, & horum vsus: alia ipsius forami-*  
*na euidētia.* 71  
*Cutis crassitie in partibus variat totaque hominibus*  
*tenuior est, quam brutis.* 71  
*Cutis tota cuticula obtegitur, quae graecis & xidē quae*  
*dicta est, vique disrumpitur regeneretur.* 71  
*Cutis in homine cur intacta membrana carnosā de-*  
*trahatur.* 71  
*Cutis faciei membrana carnosā vbi adhareat.* 77  
*Cutis genarum licet in musculum non conuertatur,*  
*cur moueatur.* 77  
*Cutis equorum, et asinorum carnes fibris referta.* 71. 72  
*Cystis fellis figura, membrana ac fibra.* 186  
*Cystis fellis officium.* 186  
*Cystis fellis meatus in finem duodeni inferitur.* 186  
*Cystis fellis sinus, & historia.* 186  
*Cystis fellis duos obtinet truncos, quorum alter egres-*  
*sus, alter ingressum bili largiuntur.* 186  
*Cystis fellis alterum quandoque ex suis truncis ad*  
*ventriculum mittit, quidque hinc contingat.* 186

## D

**D**ENS siue dentalis, processus secundae cervicis  
*vertebrae.* 15  
*Dentes sunt partes corporis spermaticae, et vbi semel*  
*excidierint non regenerantur.* 10  
*Dentes sentiunt augenturque.* 10  
*Dentes quo ab ossibus differant.* 10  
*Dētes numero 32. 16. viri usque maxilla, et unusquisque*  
*appendicem obtinet, quae in pueris excidit.* 10  
*Dentes erumpente pube nascentes.* 10  
*Dentes etsi conspicui non sūt, cum illis tamen nasci-*  
*mur.* 10  
*Dentium nomina, & radices.* 10  
*Dentium cordalium ortus.* 10  
*Dentes maxillares cur numero varii.* 10  
*Diaphragmatis ab alijs musculis differentia, & hi-*  
*storia.* 48. 6. & 94  
*Diaphragma duabus obducitur membranis, duo ha-*  
*bet foramina, ipsorumque vsus.* 94  
*Diaphragma deorsum non agitur cū aetē ducimus.* 94

*Diarthrosis, & synarthrosis coniunctionis species, et*  
*reliquis ipsarum differentiae. 42. nomina earum.* 30  
*Didymoi testes sunt apud graecos.* 190  
*Didymion hoc est exiguus testiculus pars cerebri.*  
*sol.* 244.  
*Discrimen inter ligamenta.* 70  
*Digitus manus singuli tria habent ossa, eorumque hi-*  
*storia.* 33  
*Digitus manus quam varie moueantur, & cur.* 34  
*Digitus manus 28. musculis aguntur, ipsorumque hi-*  
*storia.* 101  
*Digitus pedis pollice excepto mouentur, ut manus di-*  
*giti.* 45  
*Digitus pedis singuli ternis constant ossibus, prater pol-*  
*licem qui duobus extruitur.* 45  
*Diuisio partium corporis nostri.* 1  
*Diuisio ossium.* 2  
*Diuisio ossium capitis.* 3  
*Diuisio dorsi.* 14  
*Diuisio cerebri.* 240  
*Diuisio venarum. 264. Arteriarum.* 265  
*Dorsum in cervicem, scapulas, lumbos, & os sacrum*  
*diuiditur.* 14  
*Dorsum ex quot vertebrae consistit, earumque historia.* 14  
*Dorsum sedecim praeclium musculis horumque enar-*  
*ratio à 95. ad 96.*  
*Dorsi & partium ipsius motus.* 95  
*Duodenum quid.* 183  
*Dura mater prima cerebrum contegens membrana,*  
*& ipsius historia.* 239  
*Dura mater intrinsecus laevis pellucida, & huius*  
*aqueo oblita.* 239. 240  
*Dura mater processum edit instar falcis, qui dextrā*  
*cerebri partem à sinistra dirimit.* 240  
*Dura mater cerebrum à cerebello dirimit.* 240  
*Durae matris officium.* 40  
*Dura mater ut pie committatur.* 240  
*Dura mater quot habeat foramina, quot partes in-*  
*uestiat.* 240  
*Dura mater cur extrinsecus aspera, & inaequalis.* 239  
*Dura mater cur in vulneratis pulsare conspicia-*  
*tur.* 286  
*Durae matris sinus quatuor, ipsorum historia, ipsorum*  
*numus.* 286

## E

**E**CCHYSSIS in intestinis quid. 183  
*Euarthrosis species coniunctionis.* 2  
*Ensisiformis cartilago.* 24  
*Epidermis cuticula est cuti superposita.* 71  
*Epipidima secunda testium unica.* 191  
*Epiglotis quid.* 47  
*Epiphyysis appendix ossium.* 2  
*Epiploon graecis omentum.* 184  
*Epilogus operis.* 324  
*Epilogus partium oculi.* 247  
*Epythosides graecis primū testiculorum inuolutū.* 191  
*Esculapius primus apud graecos medicus dictus.* 3  
*Eunuchi cur infecundi.* 247

<b>F</b> AVCES, ipſarumque cartilagineſ.	47
Fauſcium nomina, & glandulæ.	227
Fœmina in vtero humanam ſuſcipit formam die 40.	196
mas vero 30. die.	196
Fœmina vt plurimum ſiniſtra parte geritur, mas dex- tera.	191
Fœmina quarto menſe, mas tertio mouetur.	196
Femur quotuplici motu agatur.	113
Femur muſculos obinet ad ſummũ 14. ad minimum 18. ipſorumque hiſtoria.	113
Femur quinque muſculorum ope extenditur; tribus colligitur, duobus circumagitur.	114. 115
Fœtus vt ex viri et mulieris ſemine procreetur.	196
Fœtus quando animetur.	196
Fœtus per vmbilicum nutritur.	196
Fœtus quibus de cauſis, & quomodo egreſſum e cor- pore molitur.	195
Fœtus cur nunquam in medio corporis conſiſtat.	193
Fœtus mouetur mas quidẽ, tertio, fœmina vero quar- to menſe.	196
Fœtus quando amictu indutus totus aut brachium, vel crus in lucem prodeat.	197
Fœtus indutus prodians haud felicior chartaque ex amictu parata haud maioris, quam alię virtutis. ſol. 197	
Fœtus hominis formam ſuſcipit mas quidẽ intra 30.	
Fœmina vero intra 40. dies.	196
Fœtus in vtero ſitus.	196
Fœtus inuolutura.	197
Fœtus in vtero quoniam ſudorem, & lotium profun- dat per quam viua.	197
Fœtus in lucem proditurus mēbranas diſrumpit, qui- bus inuoluitur.	197
Fœtus ſecundum medicos, & philoſophos menſtruo ſanguine alitur, ſecus auctor aſerit.	198
Fœtus elaboratiſſimo matris ſanguine alitur.	198
Fœtum pluralitas ex hominis ſemine.	195
Fœtus cur diuerſo tempore editi.	195
Fibula non adeo ſurſum porrigitur vt femori articu- leſtur, & vbi conneſcat.	40
Fibulæ ad tibiam inferiori ſede connexæ.	40
Fibula quam habeat in medio figuram ipſius lineæ, anguli & latera. 41. idem de tibia.	41
Fibræ ventriculorũ cordis, & ipſarũ vſus.	228. 229
Fibra venarũ quo ad muſculorũ fibris diſſerant.	263
Fibula minus cruris os.	39
Figura, quã plura tarſi oſſa ſimul omnia efficiunt.	44
Figura vteri prægnantium, & non prægnantiũ.	193
Figura prima diſſert de figura Veſaliũ.	48
Figura prima quod diſſerat ab ea Veſaliũ. 125. Secun- da 127. Quinta 139. Decima tertia 187. Deci- ma quarta 159. & 169. Tabula 3. ſigu. 1.	
Foramen primum oſium temporalium, & ipſius ca- uitas.	7
Foramen quo ſtrepitu ab ore in aures ferri percipi- mus.	11
Foramen oſis pubis, & ipſius vſus.	37
Foramen quo lamij bones calce ſuſpendunt.	111
Foramina capitũ 38. ſine 39. & ipſorum hiſtoria.	11
Foramina capitũ ad prædictis alia.	12
Foramina oſis frontis duo, ipſorum deſcriptio, & vſus.	11
Foramina dentium re vera foramina non ſunt.	10
Foramina radicum dentium, & ipſorum vſus.	10
Foramina duo inferioris maxillæ, & ipſorũ vſus.	11
Foramina 13. ſuperioris maxillæ, ſex propria, ſeptẽ communia, & ipſorum vſus.	12. 13
Foramina oſium temporalium octo, ipſorum deſcri- ptio, & vſus.	11
Foramina duo temporũ, & occipitis oſi cõmunia. 12.	
Foramina ſeptem occipitiũ ipſorumque hiſtoria.	12
Foramina duo cuneiformi, occipitiũ, & temporũ oſibus communia, ipſorum ſitus, & vſus.	12
Foramina oſis cuneiformis. 17. ipſorum deſcriptio, & vſus.	11
Foramina circũ ſcapulæ cervicẽ ipſorumque; vſus.	24
Foramina circũ vertebrarũ quot, & quam varia.	13
Foramina & tuberculum ſacri oſis vertebrarum ip- ſorum deſcriptio, & vſus.	19
Foramina oſis femoris, ipſorumque vſus.	38
Foramina circũ Fori dicta & ipſorum vſus. 31. alia maniſta foramina.	71
Foramina genu patellæ, ipſorumque vſus.	42
Foramina in aſperitate oſis tali, & eorum vſus.	43
Foramina duo, & depreſſio ſepti tranſuerſi, eorumque vſus.	94
Foramina membrana coſtas ſuccingentiũ.	224
Foramina cordis inuoluturi, & ipſorum vſus.	228
Foramina ventriculorum cordis quorũ, quidque præ- ſent.	230
Foramina dura menyngis quot.	240
Fovea ſuperioris capitũ femoris.	38
Frons duos habet muſculos, ipſorumque hiſtoria.	74
Frons tranſuerſim incidenda non eſt.	75

## G

<b>G</b> ALENVS ſimia inſpecta anatomen deſcripſit. Galenum ſimias duntaxat incidiffe multis ex- emplis demonſtratur.	
Galenĩ ſcripta deprauata eſſe aliquot exemplis com- monſtratur.	
Galenus quam conſuſe egerit initio libri de oſibus.	3
Galenus cuneiforme os inſtat cribri peruium eſſe cen- ſuit.	7
Galenus puluacni quintum adſcribit lobum, in homi- ne minime occurrentem.	228
Gargante Hyſpanis quid.	180
Gargar, Gargareon, & Gurgulio, vna.	227
Genarum muſculi quatuor & ipſorum hiſtoria.	76
Ginglimon ſpecies articulationis.	3
Glandulæ inteſtino herens, quod pyloro cõtinuum eſt, & ipſius vſus.	181
Glandula cerebri pineæ nuci ſimilis, & ipſius hi- ſtoria.	244
Glandulæ cerebri pituitæ excipientis deſcriptio.	244
Glandularum quatuor ſtomachi ſitus, & vſus. 1. 182.	
Glandularum vſus.	227.



<b>L</b> ABRA quatuor habent musculos, ipsorumque historia.	77	Ligamenta dorsi vertebrarum,	98
Labra ex quibus conflentur.	77	Alia ligamenta ipsorumque munus.	98
Lacrymæ curita subito, & confertim erumpant, fol. 242.		Ligamenta humeri os scapula connectentia quot, & eorum historia.	85
Lambdoyis commissuræ species.	4. 5	Ligamenta multiplicia vlnæ, ac radij & manus, ipsorumque historia.	107
Laryngis cartilaginum historia.	46	Ligamenta tendines suis sedibus continentia, omnia transversa, & numerosissima.	107
Laryngis descriptio.	225	Ligamenta articulos amplexantia, & ipsorum differentia. 55, 6, alia multa differentia.	108
Larynx minor mulieri quam viris obtigit.	46	Ligamenta instar membranarum musculos inuicem neſcientia.	108
Larynx decem habet musculos proprios, octo communes, ipsorumque historia. § 1. Duos insuper proprios addit Vesalius.	82	Ligamenta costas thoracis vertebris, & pectoris offi colligantia quæ.	94
Laryngi duæ assident glandule iuxta tertiam ipsius cartilaginem.	82	Ligamentum articuli coxendicis, & genu, & alia cruris, & pedis ipsorumque historia.	121
Larynx peculiare vinculum non habet, sed tenuem membranam connexus cartilaginum amplexantem.	82	Ligamenta cur ad anteriorem genu sedem nulla.	121
Laryngis interior structura.	226	Ligamenta pedij, & digitorum manus ligamentis similia.	122
Larynx cum occluditur scissuram in medio habet instar fistulæ.	226	Ligamenta hepatis, & quibus id partibus deſin- ciatur.	186
Latrones Venerijs ob primum furtum oculorum altero priuantur.	311	Ligamenta penis.	192
Lateralis maioris scapularum descriptio, appendices, & cartilagine.	23	Ligamenta vteri laxa, multoque magis in natu grandioribus.	193
Latus externum ossis coxendicis, & ipsius lineæ.	36	Lingua substantia, quibus ex partibus constat; decem musculorum quos habet historia.	80. 81
Latus anterius, ac superius scapularum, ipsorum differentia, & vsus.	23	Lingua multiplici constat fibrarum genere, ob varios motus.	80. 81
Latus superius scapularum, & ipsius usus.	23	Lingua per medium dissecta secundum longitudinem, tenuissima membrana interuentu.	80. 81
Lienis situs, & historia.	186	Ados dñs cur temporum os græcis dictum.	7
Lien quibus alligetur partibus, & ipsius munus, fol. 187.		Linea corporis callosi, & ipsius vsus.	243
Lienis color quis, quæ substantia, quæ membrana, fol. 187.		Lineæ siue harmoniæ duæ & futura lambodoyde ortæ, earumque incessus.	4
Lienis ad circumiectas partes conformitas.	6. 187	Lineæ aliæ duæ à prædictis ortæ, earumque progressus.	5
Lien hominis quo à cæterorum animantium liene differet.	187	Lineæ siue ramuli duarum prædictarum.	5
Ligamentum tibiæ calci alligans.	40	Lineæ, impressiones, asperitates, & foramina clauicularum, & ipsarum munus.	2. 26
Ligamentum musculus quilibet dici potest.	68	Lineæ tres trianguli vlnæ, ipsarum descriptio, & vsus.	28. 29
Ligamentum coma dictum in homine minime occurrens, & quod sumptum capillis stauitatem conciliare mulieres ferunt.	98	Linea secundum radij longitudinem ducta, ipsius latera, & vsus.	4. 29
Ligamentum processus vertebrarum colli deſin- ciens.	15	Lineæ exterioris coxendicis lateris.	20. 6
Ligamentum ab uno in alterum brachialis processum.	32	Lineæ coxendicis os in pueris dirimentes, ipsarumque ductus.	37
Ligamentum genu crassissimum.	39. 40	Linea ossis pubis, & ipsius vsus.	37
Ligamentum validum quo tibia fibulæque inuicem inferius committuntur.	40	Linea prioris sinus maioris femoris processus, superioris partis.	38
Ligamentum omnium validissimum est quod coxendicem femori copulat.	121	Linea altera ossis femoris.	39
Ligamenta nervi, & ipsa dicuntur.	69	Lineæ in medio fibulæ, earumque vsus.	141
Ligamenta ex quo fiant, & vnde prodeant.	69	Linea prima laryngis cartilaginis, linea secundæ.	46. 47
Ligamenta sex habent munera.	69	Linea priores duos abdominis musculos committens, fol. 90.	
Ligamenta quot modis inuicem differant.	69. 70	Linea lienis vsus.	186
Ligamenta sensu exquisito cur non polleant.	70	Lineæ vteri vsus.	193
Ligamenta alia multa præter communia.	69	Lobus pulmonis pars.	228
Ligamenta capitis, & priorum duarum cervicis vertebrarum, ipsorum descriptio, & munus.	189	Lombi quatuor habent vertebrae.	18
		Luna communis humiditatum parens.	198



<b>M</b> A M M E.	199
Malleolus interior exterior.	40
Mammarium situs, figura & substantia.	109
Mammarum uarietas ætatis, ac temporum ratione.	
fol. 199.	
Mamma atque uterus quibus venis consortium habent.	277
Mamma cur exquisito sensu prædita.	318
Mamma cur sæpius enixis flaccescant.	199
Mamma cur à natura effecta, & ipsarum historia.	
fol. 198.	
Manus super brachiali quatuor agitur musculis, ipsorumque historia.	105. 106
Manus tota ad radij motum agitur.	106
Manus vi plurimum dextra, femina verò sinistra parte geritur.	193
Manus tertio mense, femina quarto mouetur.	197
Manus hominis figuram 30 diebus, femina quadragesimo suscipit.	197
Masseteres oris musculi qui.	78
Materia flaua luti instar fetui in lucem prodemiti adhaerens, quarta coctionis est excrementum.	
fol. 197.	
Maxilla superior est tota facies à supercilijs ad os, & ipsius ossa.	8
Maxilla superior 13. habet foramina 6. propria, 7. communia, ipsorum descriptio, & usus.	12. 13
Maxilla inferior continet mentum mandibulas cum dentibus, duobus extrinuit ossibus, ipsiusque descriptio.	9
Maxilla inferior in homine, ac brutis sola mouetur, in cocodrillo superior, in pisuaco utraque.	10
Maxilla inferior duo habet foramina, & quasdam asperitates ipsarumque usus.	10
Maxilla inferior luxata quomodo reponatur.	10
Maxilla inferior octo habet musculos, & ipsorum historia.	78
Meatus pituitæ cerebri expurgantes iuxta editionem corporis callosi sedem.	241
Meatus duo cerebri pituitæ expurganda dicati.	244. 245.
Meatus quatuor eidem vsui deferuentes.	245
Meatus seminis arterialis exortus.	284
Meatus seminis sinistri, & dextri ortus, & inaccessus in maribus 27. in feminis.	275
Meatus semen ad testem ad penem deferentis historia.	
fol. 275.	
Meatus primi seminis quo à secundo differant.	276
Meatus secundi seminis, quantum contineat seminis.	176
Meatus vtriusque, eorumque historia.	189
Mediastinum idem quod interseptum. 2. 24. vide membram thoracem interseptantes.	
Medica ars quam antiqua.	
Medicina inuentum cur in grecos relatum.	
Medicina cur à Græcis studiose perquisita.	
Medicina in tres partes quando dirempta.	

Medicina contemplatio à praxi.	2.
Serapione se-iuncta.	
Medulla spinalis durior cerebro, vi & nervi ab ea exorti.	310
Medulla spinalis historia.	310
Medulla spinalis quomodo sit pars, siue processus cerebri.	310
Medulla spinalis tribus obiecta membranis.	310
Medulla spinalis cur effecta.	314
Medulla spinalis quo à cæterorum ossium medulla distet.	315
Medulla spinalis quid secum habeat varietatis.	315
Medulla spinalis 58. aut 60. nervos profert, postremaque ipsius pars non est nervus.	314
Membri sensus quomodo deperdi possit motu incolu-mi, & contra.	321
Membra præcipua tria, unde ad nutritionem vitæ, & motum necessaria omnia emanant.	163
Membra spermatica eodem omnia tempore à semine formantur.	163
Membrana oculi, vide Tunica.	
Membrana inter humorem crystallinum, & vitreum quid.	20
Membrana pellucens, quo album oculi integitur.	75
Membrana instar vitri pellucida intra oculum.	7
Membrana ab inferioris maxillæ linea oborta.	10
Membrana spaciata inter tibiam fibulamque op-plens.	41
Membrana carnea ubi adhaereat, quibus medijs, & vi moveatur.	72
Membrana tenuissima linguam per medium secundum longitudinem secans, vice spinæ est.	80. & 81
Membrana connexus laryngis cartilaginum comple-tens.	83
Membrana ex musculis abdominis secundi partis pro-ducta, que haud simplex est ut Vesalius inquit, sed in duas dirempta.	90
Membrana instar chartæ pergamene intestina, & co-ctionis organa contegens.	91
Membrana volæ manus ipsiusque historia.	100
Membrana volæ manus variae productiones, & usus.	110
Membrana flexu cruris musculi, et ipsius munus.	111
Membrana ossa omnia inaccessiens ægrediens grecis dicta, ipsiusque historia.	179
Membrana à peritoneo enata.	179
Membrana orificiorum vetriculi cur crassiores quam in reliquo.	181
Membrana duæ mesenterij glandulis, atque adipere-ferta.	184
Membrana omentum producens duæ dici possunt, quia gemina, & ipsius principium.	184
Membrana iecur alligantes.	185.
Membrana iecur alligantes. 185. quæ ipsum inue-nit.	186
Membrana lienem inuoluens, & ipsius origo.	187
Membrana renum duæ, ac earum descriptio.	187
Membrana muliebribus obducta testiculis, ipsius de-scriptio, & munus.	194
Membrana fetum inuoluens, ac ipsarum historia.	
fol. 197.	

# Index.

<i>Membrana costas succingens, ipsiusque historia.</i>	193
fol. 223.	
<i>Membrana costas succingens, respirationis, &amp; spirituum vitalium organa inuestit.</i>	224
<i>Membrana costas succingens ex duabus tenuibus tunicis constat, ipsiusque substantia.</i>	224
<i>Membrana costas succingens quibus habeat partibus.</i>	224
<i>Membrana costas succingens interna sede adipem habet adnatum praesertim iuxta dorsi vertebrae.</i>	224.
fol. 224.	
<i>Membrana costas succingens septum quoque roborat ipsum adaugens.</i>	224
<i>Membrana costas succingens, quot habeat foramina, quot vasa excipiat.</i>	224
<i>Membrana thoracem intersepientes quomodo iunguntur.</i>	224
<i>Membrana thoracem intersepientes duae, ipsarumque historia.</i>	102. 6. munus.
<i>Membranis thoracem diuidentibus quid interiaceat, quotque cavitates.</i>	224. & 225
<i>Membrana thoracem dirimentes ad cavitatem thoracis adipem obtinent.</i>	225
<i>Membrantarum thoracem diuidentium munus.</i>	225
<i>Membrantarum laryngis, &amp; pulmonis historia.</i>	226
<i>Membranae pulmones involucentis ortus, &amp; figura.</i>	228.
<i>Membrana cor involucentes quinque ad minimum habent foramina, &amp; ipsorum usus.</i>	228
<i>Membranae cor involucentes quem habeant situm, figuram &amp; reliqua, &amp; 228. 229.</i>	
<i>Membrana cordis intrinsecus laevis, extrinsecus aspera.</i>	229
<i>Membrantarum cor involuentium ortus, &amp; substantia.</i>	228. 229.
<i>Membrana cor involucentis munus.</i>	229
<i>Membranae cor involucentes quibus iunguntur partibus.</i>	229
<i>Membranae ad orificia foraminum cordis, ipsarumque historia.</i>	231. 232
<i>Membrantarum cerebri historia.</i>	239
<i>Membrana venarum hepatis cur tenuiores.</i>	263
<i>Menfes muliebres. vide sanguis menstruus.</i>	
<i>Menstrua. vide sanguis menstruus.</i>	
<i>Meri quid.</i>	180
<i>Mesenterium, siue meseraeum.</i>	184
<i>Mesenterij nomina, &amp; historia.</i>	184
<i>Mesenterij usus.</i>	184
<i>Molitor primus inferioris maxillae musculus, ipsiusque historia.</i>	78
<i>Molares dentes maxillares.</i>	10
<i>Mons veneris chiromanticorum à quo musculo efformatus.</i>	103
<i>Monticulos chiromantis appellant carnosam digitorum partem.</i>	
<i>Motus cur deperdatur motu superfluo, &amp; contra.</i>	310. & 147.
<i>Mulier animantium omnium perfectiorum humidissima.</i>	198
<i>Mulier proeterea etatis ligamenta corporis vtericiora habet.</i>	193
<i>Mulieres in quibus non duplicatur omentum, ipsae inter vteri cervicem, &amp; vesicam adest.</i>	193
<i>Mulier quod vasa habeat spermatica, concludi non potest cum semen emittit.</i>	189
<i>Mulier semen emittit.</i>	189
<i>Mulieres testiculos, ut viri habent, ipsarumque historia.</i>	195
<i>Mulier grauida quod semen emittat.</i>	195
<i>Mulier vtero gerens nequit concipere, &amp; cur diverso tempore fetum edat.</i>	195
<i>Mulieres cur menstrua habeant, mulier vero non.</i>	198.
fol. 198.	
<i>Mulieres pleraque absque menstruis filios pepererunt incolomes.</i>	198
<i>Mucronata pectoris cartilago quid.</i>	21
<i>Musculus quid, &amp; ex quibus conficitur.</i>	72
<i>Musculus cur ita latinis dictus, &amp; cur Piscis.</i>	72.
fol. 72.	
<i>Musculus instar septi vitalia organa à coctionis organis dirimens dictus diaphragma.</i>	92
<i>Musculus volens membranam efformans. Alter ipsam movens Vesalio praetermissus.</i>	100
<i>Musculus 23. digitos movens cur lividus appareat.</i>	105.
fol. 105.	
<i>Musculus primus, tertius &amp; quartus radij, in tendinem non desinunt.</i>	107
<i>Musculus cervicis vesica in homine ipsius descriptio, differentia, &amp; usus.</i>	109
<i>Musculus ant tertius non ita brevis est ut quidam existimant.</i>	110
<i>Musculus secundus cruris in seminis macilentis ligamentum nervosum emulatur.</i>	111
<i>Musculus cruris rotundus, piscis cruris dicitur.</i>	112
<i>Musculorum differentia.</i>	72-73. 74
<i>Musculi fere omnes eiusdem coloris existunt, sed excarnes albicant, &amp; cur aliqui plumbei coloris sint.</i>	74
<i>Musculi singuli membrana obteguntur.</i>	72
<i>Musculi omnes fibras habent secundum longitudinem porrectas, praeterquam labiorum, et genarum musculi.</i>	74
<i>Musculi pro fibrarum varietate diversos habent.</i>	74
usus.	74
<i>Musculi faciei quam confusi.</i>	74
<i>Musculi frontis duo ipsorumque usus.</i>	74
<i>Musculi frontis transversim incisii efficiunt, ne oculi diduci possint.</i>	75
<i>Musculi duo palpebrarum, ipsorum historia &amp; usus.</i>	75
<i>Alter musculus tertius.</i>	75
<i>Musculi quinque oculi, &amp; ipsorum historia.</i>	75. usus.
fol. 76.	
<i>Musculi quatuor narium, ipsorum officium, sed ymnime sunt quos describit Vesalius.</i>	76
<i>Musculi quatuor genarum, &amp; ipsorum historia.</i>	76.
<i>prioris duo quatuor constantes lateribus.</i>	76. & 77.
<i>ipsorum munus ex Gal. Ves. &amp; auctore.</i>	77. alij
<i>duo musculi.</i>	77.
<i>Musculi labiorum, &amp; ipsorum historia officium ipsorum.</i>	78

<i>Musculi osso maxilla inferioris, &amp; ipsorum histo-</i>	<i>tenfores sunt, sexdecim flexores, osso ad latera</i>
<i>ria.</i>	<i>motores.</i>
<i>Primus molitor dictus.</i>	<i>Musculi quatuor digitos mouentium postremi non ab</i>
<i>Secundus.</i>	<i>osse, sed a tendinibus oriuntur.</i>
<i>Tertius &amp; ipsorum munus.</i>	<i>Musculorum quatuor manu super brachiale mou-</i>
<i>Quartus in medio nervus.</i>	<i>entium historia, munus.</i>
<i>Musculi 12. ossis hyoidis 8. proprii. 4. communes, ip-</i>	<i>Musculi quatuor radiu mouentes, duo superiori, toti-</i>
<i>soiumque munus.</i>	<i>dem inferiori sedi deferuientes, &amp; ipsorum histo-</i>
<i>Musculi quarti paris ossis hyoidis in medio nervi. 80</i>	<i>ria, vsus.</i>
<i>Musculi 10. lingue, &amp; ipsorum munus.</i>	<i>Musculorum quatuor penis vsus.</i>
<i>Musculi alii quatuor.</i>	<i>Musculorum anitrium historia, munus.</i>
<i>Musculi duo octoque insuper.</i>	<i>Musculi ani haud ab ea sumunt exortum.</i>
<i>Musculi abdominis, &amp; ipsorum historia, &amp; ipsorum</i>	<i>Musculi 10. cruris, ipsorumque historia.</i>
<i>munus.</i>	<i>Primus, &amp; secundus, ipsorumque munus.</i>
<i>Musculi duo virilium testiculorum, &amp; ipsorum mu-</i>	<i>Tertius.</i>
<i>nus 6, ac duo praterea muliebrum.</i>	<i>Quartus, &amp; quintus.</i>
<i>Musculi 89. thoracis connumeratis abdominis mu-</i>	<i>Sextus.</i>
<i>sculis &amp; ipsorum historia 92. ad 93. officium pri-</i>	<i>Septimus, &amp; octauus.</i>
<i>mi, secundi, &amp; tertii paris, quarti quinti, et sexii.</i>	<i>Nonus.</i>
<i>92. 93.</i>	<i>Decimus.</i>
<i>Musculorum intercostalium paria 3 4. ipsorumque hi-</i>	<i>Musculi femoris 14 ad summum: 10. ad minimum,</i>
<i>storia, munus ipsorum.</i>	<i>ipsorumque historia.</i>
<i>Musculorum osso abdominis historia.</i>	<i>Primus.</i>
<i>Musculi abdominis, dorsi &amp; brachiorum quomodo</i>	<i>Secundus.</i>
<i>respirationi conferant.</i>	<i>Tertius.</i>
<i>Musculi primi paris dorsi non sunt plures duobus vt</i>	<i>Quartus.</i>
<i>quidam aiunt.</i>	<i>Quintus, &amp; munus prae dictorum.</i>
<i>Musculi 16. dorsi &amp; ipsorum historia.</i>	<i>Sextus.</i>
<i>Primum par &amp; ipsius munus.</i>	<i>Septimus, &amp; octauus.</i>
<i>Secundum &amp; tertium.</i>	<i>Nonus decimus ipsorum munus.</i>
<i>Quartum.</i>	<i>Musculi duo alij.</i>
<i>Quantum.</i>	<i>Musculus quintus femoris quomodo in duos parti-</i>
<i>Sextum.</i>	<i>tur, &amp; in tres, ipsorumque munus.</i>
<i>Septimum.</i>	<i>Musculi 9. pedis motores, &amp; ipsorum historia.</i>
<i>Octauum.</i>	<i>Primus, &amp; secundus.</i>
<i>Musculi quatuor cubiti motores, ipsorumque historia.</i>	<i>Tertius, &amp; quartus.</i>
<i>98. 99.</i>	<i>Quintus.</i>
<i>Priores duo ipsum flectentes quorum prior piscis</i>	<i>Sextus.</i>
<i>brachij dictus.</i>	<i>Septimus.</i>
<i>Alii duo extensores, quorum priorem nonnulli in</i>	<i>Octauus.</i>
<i>duos partiuntur.</i>	<i>Nonus, &amp; ipsorum munus.</i>
<i>Musculi digitoru manus 28. &amp; ipsoru historia. 101</i>	<i>Musculus quintus pedem mouentium laniorum cul-</i>
<i>Primus &amp; ipsius munus.</i>	<i>tro similis.</i>
<i>Secundus.</i>	<i>Musculi pedis digitos mouentes idem qui &amp; manus</i>
<i>Tertius.</i>	<i>suntque &amp; c. ipsorum historia, &amp; vsus.</i>
<i>Musculi alii tredecim, quorum unicuique articulo</i>	<i>Primus.</i>
<i>primo duo deferuiant, tres vero secundo pollicis.</i>	<i>Secundus.</i>
<i>102. 103.</i>	<i>Tertius, &amp; alij 10. musculi.</i>
<i>Decimus septimus digitos extendentium primus.</i>	<i>Decimusquartus, quintus, &amp; sextus.</i>
<i>fol. 103.</i>	<i>Decimus septimus, &amp; octauus.</i>
<i>Decimus octauus.</i>	<i>Quatuordecim alij musculi.</i>
<i>Decimus nonus.</i>	<i>Musculorum totius corporis numerus.</i>
<i>Vigesi, vigesimus primus, &amp; secundus.</i>	
<i>Vigesimus tertius, sex ad latera digitos mouentiu</i>	
<i>primus, &amp; vigesimus quartus.</i>	
<i>Vigesimus quintus, sextus, septimus, &amp; octa-</i>	
<i>uus.</i>	
<i>Musculi veneris montem chiromanticorum efforman-</i>	
<i>tes.</i>	
<i>Musculorum manus digitos mouentium, quatuor ex-</i>	

N

<i>Nasus &amp; ipsius cartilagines.</i>	<i>46</i>
<i>Nasus quatuor habet. musculos, &amp; ipsorum</i>	
<i>munus.</i>	<i>76</i>
<i>Nates ac testes cerebri.</i>	<i>244</i>
<i>Nauiforme. vide os nauiforme.</i>	
<i>b iij Nervus</i>	

<i>Nervus communiter quotnam habeat significa--</i>		<i>Nervi septem transversam petentes.</i>	316
<i>ta .</i>	309	<i>Nervi ad musculos dorsi motuum opifices tenden--</i>	
<i>Nervus propriè dictus quid.</i>	309	<i>tes.</i>	315. 317. 318
<i>Nervus feminali arteriæ interdum associatus.</i>	318	<i>Nervi cervicis musculos adeuntes.</i>	316. 317
<i>Nervus vena cephalicæ comes.</i>	314. alius maioris	<i>Nervi cervicis omnes, primo excepto, ramos mit--</i>	
<i>brachij vena sub cute.</i>	319	<i>tunt in latum tenuemq; musculum genas mouen--</i>	
<i>Nervus iecorariæ venæ, ac magnæ arteriæ co--</i>		<i>tem.</i>	317
<i>mes.</i>	320	<i>Nervi ad tenuem ac latum musculum genas, &amp; in--</i>	
<i>Nervus venæ atque arteriæ inguen perreptantium</i>		<i>feriorem maxillam mouentem tendentes.</i>	317.
<i>comes.</i>	322		318. 319.
<i>Nervi ex cerebro, arteriæ à corde, venæ à iecore</i>		<i>Nervi musculos, scapularum motores petentes.</i>	318
<i>oriuntur.</i>	263		316. 317. 318.
<i>Nervi ex cerebro non ex corde, aut duxa meninge</i>		<i>Nervi ex thoracis vertebra emergentes, ipsorumque</i>	
<i>oriuntur.</i>	309	<i>historia.</i>	317
<i>Nervi quantū inuicem differant duritiæ &amp; cur.</i>	309.	<i>Primi paris nervi.</i>	ibid.
<i>de ortu ac distributione.</i>	310	<i>Secundi.</i>	ibid.
<i>Nervi interiori parte non sentiunt, sed extima.</i>	309	<i>Aliorum parium nervi.</i>	318
<i>Nervorum alij motui, alij sensui deserviunt, etsi om--</i>		<i>Nervi costarum musculo adeuntes.</i>	317. 318
<i>nes sentiunt.</i>	310	<i>Nervi abdominis musculos petentes.</i>	318
<i>Nervi nequaquam perij sunt, vt quidam prodi--</i>		<i>Nervi mammas accedentes.</i>	ibid.
<i>derunt.</i>	310	<i>Nervi ad musculos femoris motores tendentes.</i>	318. 319.
<i>Nervi cutem adeuntes cur ipsam non moueant, vt</i>		<i>Nervorum ex vertebra lumborum prodeuntium</i>	
<i>qui musculos adeunt.</i>	309. 310	<i>historia.</i>	318
<i>Nervorum paria septem à cerebro prodeunt, secun--</i>		<i>Nervorum ex osse sacro emergentium historia.</i>	ibid.
<i>dum plerosq; licet nouem dici possent.</i>	309	<i>Nervi musculos quibus brachium mouetur adeun--</i>	
<i>Primi paris ortus &amp; historia.</i>	311	<i>tes.</i>	316. 318. 319
<i>Secundi.</i>	311	<i>Nervi in brachium propagati.</i>	317. 320
<i>Tertij duplici radice orti.</i>	311	<i>Nervi brachiorum omnes à quibus alijs fiant ner--</i>	
<i>Quarti.</i>	ibid.	<i>uæ.</i>	317. 319
<i>Quinti multiplici radice.</i>	ibid.	<i>Nervorum in brachium distributorum historia.</i>	319
<i>Nervi visorij deussatim non implicatur, vt quidam</i>		<i>Primi paris nervi.</i>	ibid.
<i>existimant.</i>	311	<i>Secundi.</i>	ibid.
<i>Nervus visorius in medium posterioris oculi sedis</i>		<i>Tertij.</i>	320
<i>inferitur, &amp; ipsius munus.</i>	311	<i>Quarti.</i>	ibid.
<i>Nervos visorios auctor diremptos, vesalius omnino se</i>		<i>Quinti.</i>	321
<i>paratos vidit.</i>	311	<i>Sexti.</i>	ibid.
<i>Nervi recurrentes cur ita dicti.</i>	I	<i>Nervi genitale petentes.</i>	319. Alij ipsam mouen--
<i>Nervorum recurrentium historia.</i>	313	<i>tes.</i>	320
<i>Nervorum recurrentium vsus, &amp; quo experimen--</i>		<i>Nervi vteri cervicem adeuntes.</i>	319
<i>to comprobetur.</i>	311	<i>Nervi vesicæ cervicem petentes.</i>	ibid.
<i>Nervi multas tum faciei, tum oris partes adeuntes,</i>		<i>Nervi ad ani musculos repetentes.</i>	ibid.
<i>rami sunt tertij paris.</i>	311. 312	<i>Nervi ad radij musculos tendentes.</i>	ibid.
<i>Nervi à sexto pari in ventriculū, iecur, omensum,</i>		<i>Nervi vnam &amp; radiū petentes.</i>	319. 320. 321
<i>intestina cystum fellis, renes, mesenterium, vesti--</i>		<i>Nervi cubiti musculos petentes.</i>	319. 320
<i>cam, vterum &amp; lienem tendentes.</i>	314	<i>Nervi pollicem &amp; ceteros manus digitos, ac mu--</i>	
<i>Nervi cor adeuntes.</i>	313	<i>sculos ipsorum motus auctores adeuntes.</i>	319.
<i>Nervi ad linguam, os hyodis &amp; laryngem tenden--</i>			320. 321.
<i>tes.</i>	313	<i>Nervi musculos brachialis motuum opifices adeun--</i>	
<i>Nervi 58. siue 60. ex spinæ medulla prodeunt.</i>	315	<i>tes.</i>	320. 321
<i>Nervorum à cervicē prodeuntium historia.</i>	315	<i>Nervi musculos qui femur mouent petentes.</i>	322
<i>Primi &amp; secundi paris nervi duplici principio</i>		<i>Nervorum in crus &amp; pedem disseminatorum histo--</i>	
<i>donati, vnde prodeant, vtrq; distribuuntur.</i>	315	<i>ria.</i>	321
<i>Tertij paris.</i>	315	<i>Primi paris nervi.</i>	321. 322
<i>Quarti &amp; quinti.</i>	316	<i>Secundi.</i>	322
<i>Sexti.</i>	316	<i>Tertij &amp; quarti.</i>	ibid.
<i>Septimi.</i>	317	<i>Nervi musculos qui crus mouent, petentes.</i>	ibid.
<i>Nervi musculos capitis motores adeuntes.</i>	315.	<i>Nervus omnium totius corporis crassissimus &amp; du--</i>	
	316. 317.	<i>rissimus</i>	
<i>Nervi thoracis musculos petentes.</i>	316. 317. 318. 319		

# Index.

rissimus quartus est crus ademptum.	322
Nervi ferè omnes crus infra genu petentes, quarti pa- ris germina exiliunt.	322
Nervi cruris quarti paris ex multis veluti filamen- tis constant.	322
Nervi musculos qui pedem motu cient accedentes.	322
fol. 322.	
Nervi pollicem, ceterosque pedis digitos, & muscu- los, qui ipsos mouent aduentes.	322. 323
Nervi pedis plantam accedentes.	323
Nervi duosue processus nervis similes, olfactus or- gano inseruientes, ipsorum historia, & munus.	323
Nervi in capitis cutem propagati. 315. In cutem mu- sculo brachiale attollenti obductam 316. In cutem exterioris brachij sedis.	316. 320
In cutem anterioris 4. exterioris.	320
In cutem scapularum.	328
In cutem lumborum.	318
In cutem inguinum.	316. 319. 322
In cutem radij.	319
In cutem ossis humeri.	321
In cutem anteriorem femoris.	322
In cutem interiorem femoris, cruris, & in genu.	322
In cutem posteriorem femoris.	322
In cutem exteriorè cruris, malleoli & pedis.	323
Numerus musculorum cur minimè præfinitus.	123
Numerus musculorum vna collectus.	123
Nux laryngis quid.	46
Nux laryngis æquè in maribus, ac fœminis extor- sum prominet.	46
Nux laryngis cur in viris magis, quàm in mulieri- bus sese prodit.	46
Nymphæ quas poeta à Satyris amari fingeant,	194
quid.	

## O

<b>O</b> CVLVS quinque habet musculos, horumque descriptio.	75 76
Oculi cur in capite positi.	239
Oculus triplici humore constat ad aquæ naturam ac- cedente.	246
Oculi descriptio.	246
Oculus humanus exactè orbicularis.	246
Officium omnium corporis partium.	1
Officium appendicum ossium.	2
Officium commissurarum, ac linearum siue harmoni- capitis.	4
Officium cartilaginis palpebrarum.	45
Officium cartilaginis auris.	45
Officium vnguium.	45
Officium patellæ genu.	41. 42
Officia flex ligamentorum.	69. 70
Officium ligamentorum humeri os scapulæ committen- tium.	87
Officium ligamentorum ossis coxendicis cum femore.	121. 122
Officium ligamentorum genu.	121
Officium priorum duorum musculorum genus mouen- tium, ex Gal. Vesalio, & Autore.	76
Officium septi transversij.	94

Officium carneæ substantiæ in interna manus regione occurrentis.	101
Officium decimi crus mouentium musculi non est id quod ait Gal.	112
Officium membrana ossa vestientis, quæ veteres græcis dicitur.	123
Officium perionæi.	180
Officium tunicarum stomachi.	180
Officium quatuor glandularum in stomacho consi- stentium.	180
Officium ventriculi.	181
Officium mesenterij.	184
Officium omenti.	184
Officium iecoris.	185
Officium lienis.	186
Officium cystis fellis.	184
Officium fibrarum vesicæ.	188
Omentum.	184
Omentum ex duplici simplex euadens quousque por- rigatur.	184
Omentum cassidilis imaginem refert.	184
Omenti munus.	184. 185
Omentum ex duplicata constat membrana, glandu- lis, adipe, venis, & arterijs referta.	184
Omentum intestinis ubi hæreat.	184
Operculum laryngis impedit ne quid in ipsam ingre- diatur.	47
Orificium superius, & inferius ventriculi, ipsorum nomina, situs & vsus.	181
Os ilium quod.	35
Os pelvis.	35
Ossa corporis nostri partes durissima ipsorumque mu- nus.	2
Ossium diuisio.	2
Ossis ilium descriptio.	3
Ossa omnia inuicem committuntur præter os hyoides.	2
Ossa omnia inuicem, aut per articulationem, aut per unionem symphysim græcis dictam committuntur.	2
Ossa grandia appendicem habent & quæ, & ipsius vsus.	2
Ossa processus quosdam habent, quorum alij appendi- cem habent, alij non, & contra multa appendices suos habent processus.	2
Ossa omnia simul commissa scheleton dicuntur.	2
Ossa cranij vt committuntur.	4
Ossa cranij quomodo inuicem dirimantur.	4
Os frontis quomodo ab alijs diuidat, & ipsius forma.	5
Os frontis ipsius varietates, & cavitates.	6
Os frontis duo habet foramina, & ipsorum vsus.	11
Ossa syncipitis quomodo inuicem, & ab alijs diuidan- tur, ipsorum forma.	5
Ossa syncipitis ipsorum qualitates, sulci, siue riuuli.	6
Os capitis octauum ipsiusque termini.	5
Ossa octauæ capitis structura, ac processus.	6
Ossa capitis quomodo differant crassitie, duritie, ac ro- bore &c.	6
Ossa capitis foraminibus 30. aut 39. peruiæ sunt, ho- rumque descriptio.	11
Ossa capitis alia præter prædicta habent foramina, etsi propriè foramina non sunt.	12



# Index.

Os occipitis quomodo ab alijs diuidatur, ipsiusque la- teat.	5	Os cordis quorundam animantium Galeno in elephan- te, auctori in veruecibus antiquis visum.	22
Os occipitis, ipsius qualitates, partium varietates.	6	Ossa scapulae, vide scapula.	
Os occipitis in pueris tripartito dissectum est, trium linearum interuentu, harum ductus, & illius qua- litates.	6	Os humeri, & ipsius historia.	26
Os occipitis septem habet foramina, & ipsorum hi- storia.	12	Ossis humeri asperitates, foramina & ipsorum vsus.	27
Ossa temporum quomodo ab alijs diuidantur, ipso- rumque forma.	6	Os humeri elatori sede descriptum 26. inferiori 26. in reliquis.	27
Ossa temporum in partibus varietas, processus, & foramina.	7	Os humeri, femore, ac tibia exceptis omnium totius cor- poris maximum.	26
Ossa temporum octo habent foramina, ipsorum descri- ptio, & vsus.	11	Os humeri luxatum reponendi ratio.	23
Os cuneiforme & ipsius termini.	5	Ossa brachij, vide vlna & radius.	
Ossis cuneiformis varietates, qualitates &c.	7	Ossa brachialis quare obtegantur ipsorum qualitates sinus horumque vsus.	30
Os cuneiforme 17 habet foramina, ipsorum descriptio, & vsus.	8. 6. & 11	Ossa octo brachialis, ipsorum substantia, foramina & figura 17. 6. cur numero plura.	30
Ossicula tria intra vitranque aurem posita, ipsorum processus, & figura.	8	Ossium brachialis primi ordinis cum vlna & radio connexus.	31
Ossa maxilla superioris vtrinque sena, ipsorumque descriptio.	8	Ossa brachialis primum, secundum & tertium quo- modo inuicem, & cum vlna & radio committan- tur, ipsorum descriptio, capita & sinus.	31
Os secundum maxilla superioris cur in defossis calua- rijs raro conspiciatur.	8	Os quartum brachialis primi ordinis, & ipsius hi- storia.	31
Os decimum tertium maxilla superioris, & ipsius de- scriptio.	8	Os quartum brachialis primi ordinis à veteribus seor- sum numeratum.	31
Ossa maxilla superioris quomodo, & per quas sutu- ras a capitis ossibus, & à se ipsis diuidantur.	8. 9	Os quintum brachialis, ipsius forma, sinus, vsus, & connexus.	31
Os iugale separatum os minimè est, ipsius compositio & vsus.	9	Sextum.	31
Ossa inferioris maxilla duo, ipsorum connexus, & processus.	9	Septimum.	32
Ossa inferioris maxilla difficilius in prouectioribus quam pueris, tum cruda, tum cocta inuicem se- parantur.	9	Octauum.	32
Os hyoides siue hyssiloides cur ita dictum, ipsius si- tus, ossicula, ipsius compositio & illorum descri- ptio.	13	Os brachialis septimum cur facile luxetur.	32
Os hyoides 12 habet musculos, horumque descriptio.	13	Ossa brachialis secundi ordinis, ipsorum forma, sinus, vsus & connexus.	32
Os sacrum cur ita veteribus appellatum, ipsiusque hi- storia.	18	Ossicula sesamina ad externam brachialis faciem, & ipsorum vsus.	32
Os sacrum senis vt plurimum vertebis constat, in- terdum quibus, ipsorumque connexus.	18	Ossium 4. postbrachialis historia.	32
Os primum pectoris, ipsius forma, sinus, vsus.	21	Ossa postbrachialis singula appendice donantur supra infraque.	32
Ossium pectoris descriptio.	20	Ossa postbrachialis quomodo brachiali committantur & ipsorum forma 32. ipsorum depreffiones, linea, impreffiones, & qualitates alie.	33
Os pectoris anterius est.	20	Ossa brachialis in medio minimè contigua & cur.	33
Ossis pectoris situs, & historia.	21	Ossa digitorum manus quomodo connectantur, ipso- rum descriptio, differentiæ, & qualitates.	33
Os pectoris sex, vel septem, interdum verò 11. con- stat ossibus, quaque committantur.	21	Os primum pollicis manus quomodo brachiali com- mittatur.	34
Os pectoris ensis quibusdam dictum.	21	Secundum primo.	34
Os secundum pectoris, ipsius figura sinus, horumque vsus.	21	Tertium secundo.	34
Os tertium pectoris, ipsius figura & situs.	22	Os primum pollicis manus cur minimè cauum.	33
Os tertium pectoris in multis deest, & in his secun- dum bipartitum diuiditur.	22	Os secundum pollicis manus cur magis flexione, & extensione quam motu ad latera agatur.	34
Os pectoris vniuersum Hyppiano pugioni conferri po- test, & ipsius substantia.	22	Os secundum et tertium pollicis manus ad latera non mouentur.	34
Ossis pectoris vsus.	22	Ossicula sesamina in articulo pollicis manus.	34
Os cordis quam habeat originem quidque in semibus occurrat.	22	Ossicula sesamina in quibus occurrant articulis, ip- sorum descriptio. 34. Vingt ad minimum in vtra- que manu 35. In pedibus quot, ipsorum vsus.	35
		Ossicula digitorum ossibus instar capitum siue pro- cessuum herentia, & ipsorum vsus. Alia duo in singulis primis articulorum digitis. Alterum in tertio articulo pollicis manus sensum.	35



# Index.

Officula instar granorum milii in secundis & tertijs manus articulis. 35  
 Offa coxendicis utrinque singula, & ipsorum historia. 35  
 Offa coxendicis quomodo sacro osi committantur, & partium ipsorum figura. 35. impressiones, qualitates, latera. 36  
 Offa coxendicis singula tribus extruuntur ossibus, ipsorum nomina & usus. 35  
 Offa coxendicis cur in feminis, quam maribus latiora. 37  
 Os coxendicis in pueris quomodo tripartito scindatur, cum in grandioribus vnicum videatur. 37  
 Os pubis quomodo coxendici committatur, & quam variè in maribus à feminis foramen, sinus, aliaque ipsius partes & qualitates. 37  
 Offa pubis minimè in partu debescunt, ut quidam existimant, sed inferiori sede in feminis magis, quam maribus inuicem distant. 37  
 Os femoris omnium maximum ipsiusque historia. 38  
 Os femoris duas habet appendices, ac ubi & quomodo proximis hæc committantur paribus. 38  
 Os femoris superna sede duos habet ingentes processus: ipsorum historia. 38. Aspectus & alia. 39  
 Ossis femoris infra coxendicem ductus. 39  
 Offa cruris, vide tibia & fibula. 42  
 Offa pedis ipsorumque nomina. 42  
 Offa pedis vno pauciora ossibus manus. 45  
 Ossis tali nomina, & historia quatuor ipsius latera sedes. 42  
 Ossis tali cum calce comexus. 42  
 Os naviforme & ipsius historia. 43  
 Os calcis maximum pedis ossum, & ipsius historia. 43  
 Os calcis interna sede descriptum, extrema, & anteriori. 43  
 Offa calcis nec sibiinuicem, nec brachialis ossibus similia. 43  
 Offa quatuor tarsi & ipsorum historia. 44  
 Offa tarsi vniuersa figuram constituunt superius orbicularem, inferius cauam. 44  
 Os tarsi quartum tessere simile, ac ipsius latera. 44  
 nomina ipsius varia. 44  
 Offa tarsi alijs, ut committantur, ut in se inuicem. fol. 44.  
 Offa tarsi quo inter se differant. 44  
 Offa pectinis pedis quinque, utque tarsi ossibus committantur. 44  
 Ossibus pectinis pedis spatium interiacet, & ipsius usus. 45  
 Offa pectinis pedis primis digitorum ossibus, ut committantur. 45  
 Os verticis, scapularum, lumborum, & os sacrum, vide vertebra & cervicis. 44  
 Ossiculum sesamo semini simile inter articulum quinti ossis pectinis pedis, & quarti cervicis. 44  
 Ossicula sesamina in primo articulo pedis digitorum, eorumque usus. 45  
 Os paruum pedis digitum sustinens versus tarsum,

processum habet, & ipsius usus. 45  
 Offa cuiusque pedis digitorum tria sunt præterquam pollicis duobus constantis. 45  
 Os à præstigiatoribus in existimatione habitum in pedis pollice. 35  
 Ossium corporis totius numerus. 47

## P

PATER auctoris alterius oculi visum amisit, ob aquei duntaxat humoris exitum. 247  
 Palpebra ipsarumque cartilaginee. 45  
 Palpebra ex quibus consistit. 75  
 Palpebras superiores soli homines mouent immotis inferioribus. 75  
 Pancreas omenti glandula. 265  
 Parientes cur sedere non sinantur, & quomodo melius pariant. 37  
 Partus non est præsumitum tempus. 195  
 Partium corporis nostri alie similes alie dissimilares. 1  
 Partes corporis per se, quæ nam restituantur, sed non integrè, quæ non. 1  
 Partes corporis spermaticæ, cur non restituantur. 1  
 Partium corporis usus. 1  
 Patella genu historia. 41  
 Patella genu femoris & cruris ossibus quomodo committatur. 42  
 Patella genu in puerulis cartilaginea videtur, in grandioribus dura est, eiusque usus. 42  
 Pecten siue palma manus à brachiali ad primos digitorum articulos porrigitur, quatuor habet ossa, horumque historia. 32  
 Pecten pedis inter tarsum, ac pedis digitos quinque habet ossa horumque historia. 44  
 Pecten pedis pectini manus correspondet. 44  
 Peluis cerebri historia. 244, 245  
 Peritonæum sifach Arabibus dictum, coctionis organa inuelliens simplex corpus, & ipsiusque historia. 179  
 Peritonæum totius corporis membranarum præter carnosam maxima. 179  
 Peritonæum instar vini vitris. 179  
 Peritonæum non æquè ubique crassum, & infra vmbilicum duplex. 179  
 Peritonæum nonnunquam adipem habet adnatum, sed magis versus ventriculum & lumbos. 179  
 Peritonæum quot locis peruium. 179. in vaulieribus priuatim perforatum quæ vteri cervix fertur. fol. 180.  
 Peritonæum minime sensus expers, ut quidam existimarunt. 180  
 Pes quot in partes diuidatur, quot ossibus constet, horumque descriptio. 44  
 Pedis in brutis principium quod. 44  
 Pes ut manus nouem musculorum ope mouetur, horumque historia. 116  
 Pia mater altera membrana est cerebrum contegens, ipsiusque historia. 24  
 Pia

# Index.

<i>Pia mater vndique cerebrum contegit præter quam ad corporis callosi regionem.</i>	24	<i>Processus duo inferiores, totidemque superiores thoracis vertebrarum, quid præsent.</i>	17
<i>Pia mater extrinsecus lævis, &amp; aqueo humore obducta, intrinsecus aspera, &amp; venis arterijsque repleta.</i>	240	<i>Processus vertebrarum lumborum ipsorumque historia.</i>	18
<i>Pistoribus quod excellentes sint quid observandum.</i>	fol. 129.	<i>Processus duo præter prædictos aliquo vertebrarum lumborum in quibusdam hominibus.</i>	18
<i>Pimeli quid.</i>	71	<i>Processus posteriores, ac laterales vertebrarum sacri ossis, ipsorumque descriptio.</i>	18
<i>Piscis brachij primus est musculus cubitum flectentium.</i>	99	<i>Processus laterales vertebrarum sacri ossis sinum habent, huiusque descriptio, &amp; usus.</i>	19
<i>Piscis cruris nonus est musculus.</i>	112	<i>Processus scapulae caput humeri amplexantes.</i>	24
<i>Pituita capitis qua percoleatur.</i>	249	<i>Processus duo scapulae, ipsorum descriptio, &amp; usus.</i>	24
<i>Pituita per caput non expurgatur nisi ubi exuperat, ut in distillatione.</i>	244	<i>Processus secundi scapulae descriptio.</i>	24
<i>Planta pedis, vide pecten pedis.</i>		<i>Processus vlnæ duo.</i>	28
<i>Pleuræ costas succingens membrana.</i>	223	<i>Processus posterior vlnæ appendicem habet, nonnullam verò duas, &amp; quomodo coniungantur.</i>	28
<i>Polymorphon cur os cuneiforme dictum.</i>	7	<i>Processus appendicis capitis vlnæ usus.</i>	28
<i>Porus sarcoidus, caro callosa.</i>	2	<i>Processus asper radij iuxta cubitum, &amp; ipsius usus.</i>	29
<i>Pori foramina cutis cava quem habeant usus.</i>	71	<i>Processus octavi &amp; quinti ossium brachialis.</i>	32
<i>Pori optici, nervi visorij cur plerisque distincti.</i>	311	<i>Processus acutij ossis coxendicis usus, alter inferior.</i>	37
<i>Pori veteres græcis meatus urinarij distincti.</i>	189	<i>Processuum femoris sedis elatioris descriptio, &amp; usus.</i>	39, 40
<i>Pregnantium veri situs.</i>	193	<i>Processus inferioris fibulae descriptio, &amp; cum osse calcis connexus.</i>	40
<i>Pregnantes &amp; virgines quæ menstrua excernant, similiter &amp; alia.</i>	276	<i>Processus appendicis fibulae descriptio.</i>	40
<i>Pregnantes vterum in medio non habent, sed ad dexteram, aut laevam.</i>	193	<i>Processus ossis tali anterioris regionis, eiusque usus.</i>	60
<i>Pregnantes cur non habeant menstrua.</i>	198	<i>Processus primæ, ac secundæ laryngis cartilaginis, &amp; ubi copulentur.</i>	46
<i>Pregnantes multæ cur menses habeant, &amp; multæ verò non.</i>	198	<i>Processus tertiæ laryngis cartilaginis.</i>	26
<i>Præsepiola dentium foueæ.</i>	10	<i>Processus vteri vesperilionem alis similes.</i>	194
<i>Processus quid.</i>	1	<i>Processus cerebri: spinalis medulla.</i>	239
<i>Processus, siue nodos, aut apices ossa quadam habent.</i>	61	<i>Processus duræ meningis cerebrum à cerebello dirimens.</i>	239
<i>Processus ossis cuneiformis instar alarum.</i>	7	<i>Processus instar falcis duræ meningis, dextram cerebri partem à sinistra diuidens.</i>	239
<i>Processus duo maxilla inferioris, ipsorum descriptio &amp; usus.</i>	10	<i>Processus cerebri instar tinearum, ipsorumque situs, &amp; munus.</i>	244
<i>Processus secundus maxilla inferioris appendicem habet, in homine maxilla copulatam.</i>	10	<i>Processus tenuis membranae instar Peluis, &amp; ipsius munus.</i>	244, 245
<i>Processus vertebrarum dorso, &amp; ipsorum varietates.</i>	14	<i>Processus os cur ita dictum.</i>	7
<i>Processus posteriores vertebrarum cervicis, præterquam primæ bifidisunt.</i>	11	<i>Pulmo duæ in partes dirimitur, ipsius situs &amp; historia.</i>	227
<i>Processus laterales primæ cervicis vertebrae, &amp; ipsorum usus.</i>	11	<i>Pulmonis figura quæ.</i>	227
<i>Processus secundæ cervicis vertebrae dens, siue dentalis, dictus ipsiusque historia.</i>		<i>Pulmo ungula bubula similis.</i>	227, 228
<i>Processus quatuor cervicis vertebrarum post secundam.</i>	15	<i>Pulmonis substantia &amp; membrana.</i>	228
<i>Processus inferiores superioresque cervicis vertebrarum quomodo similes.</i>	15	<i>Pulmonis munus.</i>	228
<i>Processus posteriores, ac laterales cervicis vertebrarum cur diuidantur.</i>	ibid.	<i>Pulmo extrinsecus levis, &amp; vinctuoso humore obtectus, ubi asper.</i>	228
<i>Processus 7. thoracis vertebrae habent: Posteriores quo differant, utque committantur.</i>	16	<i>Pulmo haud in hominibus, atque in brutis euidenter diremptus occurrit.</i>	228
<i>Processus laterales thoracis vertebrarum quomodo differant, curque ipsorum sinus, &amp; huius differentia.</i>	16	<i>Pulmoni haud quintus adest lobus, ut Galenus ait.</i>	228
<i>Processus omnes in homine frequentius sursum, quam deorsum tendunt, &amp; extrorsum nonnulli promi-</i>		<i>Pulmo ubi costis adhaeret nigrior est, &amp; minime coloratus.</i>	228

# Index.

Pulmo ubi costis adheret thorace etiam vulnerato, 228  
aere impletur. 228  
Purgationes puerperarum quandiu durent. 196  
Tylosus, seu lanior inferius ventriculi orificium.

Q

Q V A T R I V M pedis os.

R

R A D I C E S dentium foramen habent quod vena, nervo, ac arteria ingressum præbet. 19  
Radius. 27.28  
Radij descriptio, & usus. 28  
Radius uti vlna committatur ipsiusque historia. 29  
Radius appendice donatur, hæc sinu & processu aspero, ipsorumque usus. 29  
Radius lineam habet secundum sui longitudinem porrectam, ipsius latera, horumque usus. 29  
Radij inferioris partis descriptio, interioris, & exterioris, sinusque exterioris, & horum usus. 29  
Radius quatuor agitur musculis horumque historia. 107  
P A R O S O D ' S græcis humor crystallinus dictus, quod sit lenti similis. 240  
P A R O S O D ' S tertia oculi tunica vneque dicta. 246  
Realdis bene observavit, exterius interiusque ossis humeri caput ex alterius ossis appendice extrui. fol. 27.  
Recurrantes nervi dicuntur, qui sursum laryngem versus recurrunt. 313  
Renum minus. 187  
Renum situs, figura & substantia. 187  
Renes phaeoli figuram præferunt. 187  
Renes nunquam sibi ipsis è directo locantur, & fere semper elatior est. 187  
Renum in interna parte artificium. 188  
Renes colatorium illud, & sinus non habent, quos aliqui confinxerunt. 188. quosque habeant sinus. fol. 188  
Renes duabus donantur membranis, harumque descriptio. 2  
Renes durum intus adipem, & aequum humorem continent. 188  
Renum modo dexter modo sinister editior est, sicque vneque emulgentes. 268  
Respiratio quot modis quibusque instrumentis fiat. fol. 94  
Respirare, vide Respiratio.  
Rete, vide omentum.  
Rete mirabile in hominibus minime conspicitur, sed in bobus, qua in re Galenus excusationem meretur.  
Rete in primo, & secundo cerebri ventriculis consistens. 243  
Retina secunda oculi tunica. 246  
Riuuli in septo ventriculorum cordis haud ab uno ventriculo in alterum permeant. 230

Riuuli iuxta superiorem corporis callosi partem, eorumque munus. 243

S

S A C R V M os. 18  
Sanguis in iecore fit ex chylo & ab vitraque bile, atque à ferositate expurgatur. 190  
Sanguis è venis excidens in humorem instar rosis convertitur. 190  
Sanguis menstruus ex philosophorum, & medicorum sententia ad fetus nutritionem effectus, quod verum non esse autor demonstrat. 198  
Sanguis menstruus, quam malus. 198  
Sanguis menstruus cur generetur, & in mulieribus expurgetur. 198  
Sanguis menstruus retentus varias inducit agitudines. 198  
Sanguis quomodo è venis ad membra deferatur. 264  
Sanguis ex hæmorrhoidibus detractis ad quid conferat. 268  
Sanguinem vnde mittere præstet in pleuritide. 269  
Sanguis dextri cordis ventriculi parum ab eo differt, quem vena cava continet. 289  
Sanguis dextri cordis ventriculi qua in sinistram trahatur, nondum auctori visum. 289  
Scapula ut plurimum 12. constant vertebrae, & ipsarum historia. 16. vide thoracis uertebrae.  
Scapula haud peculiarem habent musculum, ipsas in priora flectentem. 96  
Scapularum in partibus varietas. 22  
Scapula cervicis, & huius sinus, horum descriptio, & usus. 23  
Scapula sede anteriori descripta, & ipsius usus. 24.  
posteriori cum suis sinibus, & horum usu. 24  
Scapula duos habet processus horumque historia. 24  
Scapularum triangularis figura ex inaequalibus lateribus, & ipsorum historia. 86  
Scapula brachij motibus agitur nisi quod minime circumagitur. 86  
Scheleton ossa omnia simul commissa. 2  
Σκλερότης quarta oculi tunica aliter dura, & cornea. 244  
Σκωληκος δ' S apices cerebri processus tinea similis. 244  
Secundina vaccis veluti quibusdam uteri herent. fol. 194  
Secundina ex quibus consistet, cur ita dicta, ipsius figura, & sinus. 197  
Secunda quida. 197  
Secundinarum minus. 197  
Sedes, vide Anus.  
Semen cur recta & impetu iaculari oporteat. 109  
Semen elaboratum in maribus ubi colligatur. 188  
Semen utile ad generationem potissimum concurrat. 189  
rit. 189  
Semen à muliere uti à viro emittitur. 189  
Semen ex optima portione excrementi, quarta coctionis fit. 190  
Semen

<i>Semen cur in testibus albefcat.</i>	190
<i>Semen quā in utero ingrediatur non confpicitur, neque in uiris unde egrediatur.</i>	193
<i>Semen in gravidis quā emittatur.</i>	195
<i>Semen in utero receptum quo utatur ordine in formatione.</i>	196
<i>Sensus exteriores, ipforumque præstantia.</i>	245
<i>Sensus uisus cur præcipuus.</i>	245
<i>Sensus cur deperdatur motu seruat, &amp; contra.</i>	310. & 321.
<i>Sensus olfactus, gustatus, &amp; tactus quibus instrumen- tis fiant.</i>	322
<i>Serapion primus medicinae theoriā à praxi se- iunxit.</i>	
<i>Sifac Arabibus quid.</i>	179
<i>Sinuli in interiore uteri facie in puerperis, &amp; ipso- rum usus.</i>	193
<i>Sinus duo primæ cervicis vertebrae in quos capicula duo occipitis inseruntur, super quos caput attolli- tur, &amp; inclinatur.</i>	14
<i>Sinus primæ cervicis vertebrae dentale excipiens.</i>	14
<i>Sinus lateraliū thoracis vertebrarum processuum, ac ipforum differentia.</i>	16
<i>Sinus duo thoracis vertebrarum. Duo insuper primæ ac duodecimæ ipforum usus forma, &amp; situs.</i>	17
<i>Sinus lateraliū processuum sacri ossis vertebrarum descriptio, &amp; usus.</i>	19
<i>Sinus processuum coccygis vertebrarum usus.</i>	19
<i>Sinus tres primi ossis pectoris ipforumque usus.</i>	21
<i>Sinus cervicis scapulae descriptio, &amp; usus.</i>	23
<i>Sinus cervicis scapulae cur non pro ratione capitis hu- meri satis profundus.</i>	
<i>Sinum posterioris scapulae sedis usus.</i>	26
<i>Sinus scapulae processus usus.</i>	24
<i>Sinus posterior, anteriorque superioris partis tro- chlea humeri, &amp; ipforum usus.</i>	26
<i>Sinus interioris capitis humeri iuxta trochleam, &amp; ipforum usus.</i>	27
<i>Sinus in medio humeri posteriore sede, progressus &amp; usus.</i>	27
<i>Sinus capituli cervicis radij usus.</i>	28
<i>Sinus inter processus vlnæ, qua hæc trochlea committitur, ipsius asperitates, &amp; usus, &amp; ipsius usus.</i>	28
<i>Sinus ad internum latus processus appendicis capitis vlnæ; alter sinus appendicis.</i>	29
<i>Sinus quinque radij ad externum inferioris partis la- tus, &amp; ipforum usus.</i>	30
<i>Sinus ossium brachialis, &amp; ipforum usus.</i>	30
<i>Sinus quinti ossis brachialis.</i>	31.32
<i>Sinus primi ossis brachialis, quinti, sexti, septimi, &amp; octavi.</i>	31.32
<i>Sinus primi ossis postbrachialis.</i>	32
<i>Sinus secundi ossis pollicis manus, &amp; terij.</i>	34
<i>Sinus ossis coxendicis, in quem femoris caput inseri- tur, ipsius descriptio &amp; usus.</i>	36. & 21.1.
<i>Alij duo sinus.</i>	37
<i>Sinus ossium pubis.</i>	37
<i>Sinus inter inferiora femoris capita, &amp; ipsius usus: aliique duo sinus.</i>	38
<i>Sinus quatuor maioris femoris processus, partis su-</i>	

<i>terioris, ipforum descriptio, &amp; usus.</i>	38.39
<i>Sinus appendicis tibiæ, sedis superioris, capitulum cum impressione, &amp; ipforum usus.</i>	39
<i>Sinus fibulae anterioris lateris superioris regionis.</i>	40
<i>Sinus inter appendices inferioris tibiæ ac fibulae, in- star surculæ, ipsius descriptio, et usus.</i>	40. alius of- 41
<i>Sinus capitum inferiorum tibiæ, ac fibulae, &amp; ipforum usus.</i>	41
<i>Sinus quinque ossis tali, &amp; ipforum usus.</i>	42. inter 43
<i>malleolum, &amp; calcem.</i>	
<i>Sinus ossis calcis, ipsiusque usus.</i>	24.2
<i>Sinus ossis navicularis, &amp; ipsius usus.</i>	43. alter versus 44
<i>latus internum.</i>	
<i>Sinus quarti ossis tarsi, &amp; ipsius usus.</i>	44
<i>Sinus quinti cruris muscoli.</i>	111
<i>Sinus iecoris, &amp; ipsius usus.</i>	185
<i>Sinus in rene.</i>	187.188
<i>Sinus tres dura meningis inter cerebrum.</i>	240
<i>Sinus quatuor durae membranae, ipso- rumque historia.</i>	286.287
<i>Sinus, quæ tertia vena intra caput efformat, et ipsius usus.</i>	287
<i>Συνυωσθῆς, siue ἀκρυωσθῆς sinus in cubito.</i>	24
<i>Situs uteri in prægnantibus, &amp; non prægnantib.</i>	193
<i>Spadones cur non gignant.</i>	276
<i>Spina scapulae, ipsiusque historia.</i>	25
<i>Spina latini quid.</i>	90
<i>Spiritus vitales in corde gignantur, &amp; ex qua mate- ria.</i>	239
<i>Splen, vide lien.</i>	
<i>Spondilia Græcis, vertebrae Latinis dorso ossa di- cuntur.</i>	13
<i>Spongoides siue ἄσπυος ossis capitis os.</i>	4
<i>Stomachus propriè superius ventriculi os.</i>	180.181
<i>Strangoglossi vulgo dicti qua in parte fiant.</i>	227
<i>Suffusionis materia, &amp; generationis locus.</i>	247
<i>Sudor fœtus inter ipsam, &amp; primum ipsius inmol- eram colligitur.</i>	197
<i>Sura manus cruris os.</i>	39
<i>Sutura coniunctionis species.</i>	3
<i>Symphisis siue ὄστρον, &amp; ipsius species.</i>	3
<i>Συνεργωσις, &amp; Diorthrosis, &amp; ipsarum species.</i>	2
<i>Συννευρωσις articulationis species.</i>	3
<i>Συνχονδρωσις articuli species.</i>	3

## T

<b>T</b> ALUS pedis os.	42
<i>Talus ita obiectus est ut non appareat.</i>	40
<i>Talus in externum latus variis quam in internum lu- xatur.</i>	40
<i>Tactus sensus membris omnibus communis.</i>	324
<i>Τάγρας Græci appellant palpebrarum cartilagi- nes.</i>	45
<i>Tarsus brachialis similis, etsi quatuor tantum ossibus constet, ipsiusque historia.</i>	344
<i>Tendo in musculis ex quo efformetur, &amp; quando.</i>	72
<i>Tendines primi manus digitorum musculi, priusquam ad secundum os pertingant, partuntur, perque bu- in/modi</i>	

# Index.

iusmodi partitionem alterius musculi tendo defer-	
tur. 101. idemque in pedibus.	119
Testiculi viriles duos habent musculos, eorumque hi-	
storia 91. Sic & muliebres.	92
Testium figura, & substantia.	170
Testium situs, curque pendeant.	170
Testium involucria.	170. 171
Testes vi plurimum duo, quanvis interdum vnicus,	
interdum tres, & in his quæ subfit deceptio.	170
Testium muliebrium situs, & hystoria.	195
Testium muliebrium magnitudo, figura, & substan-	
tia.	195
Testes muliebres non eodem semper numero.	195
Testes muliebres serofam humiditatem intus conti-	
nent.	195
Testes muliebres vnica donantur membrana, & ipsius	
descriptio, & vsus.	196
Testes ac nates cerebri.	244
Thorax quid, cuius figura, ipsiusque hystoria.	20
Thorax 89. musculos obtinet cum abdominis muscu-	
lis, ipsorumque hystoria.	92. 93
Thorax 24. costas obtinet, interdumque ab altero la-	
terum 13. ipsarumque differentie.	20
Tibia maius cruris os.	39
Tibia, & fibula.	39
Tibia, & fibula supera & infera sede appendices ha-	
bent.	39
Tibia cum femore connexus.	39
Tibia ac fibula ad talum connexus.	40
Tibia & fibula in medio distantia, & ductus.	41
Tintinnabulum vnam significat, & cur.	227
Tiplion temporum foramen, eacum latinis dictu.	12
Totusque quatuor priores dentes.	10
Tonsilla vide Glandula.	
Torcular cerebri quod.	288
Tragadero Hispanis quid.	180
Transuersales abdominis musculi.	59
Triangulus vna cum tribus lineis, harumque vsus.	29.
dicti trianguli latera, horumque vsus.	29
Trochanter femoris processus.	38
Tuberculum ossium pubis vsus.	27
Tuberculum appendicis tibiae, ipsius impressio, aliæque	
qualitates.	39
Tuberculum superiorum processuum cervicis verte-	
brarum.	15. 16
Tuberculum & foramina sacri ossis vertebrarum, ip-	
sorum descriptio, & vsus.	19
Tubercula primi ac tertij ossis brachialis.	31
Tubercula ossium coxendicis, ipsorumque vsus.	36
Tuberculum ossis calcis, ipsius descriptio, & vsus.	43
Tunica stomachi tres, neque variæ fibras obtineat.	180
Tunica stomachi tres, ipsarum fibræ & vsus.	182
Tunica duæ tenuium intestinorum, ipsarum fibræ, &	
tertia ex peritonæo 182. aliorum intestinorum tu-	
nica.	183
Tunica duæ ex quibus vesica cõponitur, ipsarumque	
fibræ.	183
Tunica propriæ testes involucentes quomodo inuicem	
aliisque iungantur partibus, & earum vsus.	191
Tunica duæ communes testiculos involucentes, 100. &	

duæ propriæ ipsarumque hystoria.	6. & 191
Tunica duo genitalis.	152
Tunica vteri ipsarumque fibræ.	194
Tunica interior vteri aliarum omnium crassissima.	194
Tunica laryngis, & asperæ arterie, earumque hi-	
storia.	226
Tunica tertia asperæ arterie non aequaliter crassa.	226
Tunica cor obtegens, tenuis.	229
Tunica prima oculi araneæ dicta quod aranearum re-	
lis sit similis.	246
Tunica secunda retina dicta, & ipsius hystoria.	246
Tunicam secundam cur aliqui inter tunicas non vetu-	
lerint.	246
Tunica oculi tertia, vna dicta & ipsius hystoria.	246
Tunica quarta dura & cornea dicta, atque ipsius hi-	
storia.	246
Tunicam quartam cur quidam plures vna existima-	
runt.	246
Tunica quinta nomine caret, eo quod veteres effu-	
gerit.	247
Tunica sexta adhaerens sive alba dicta.	247
Tunica venarum, ipsiusque fibræ.	263
Tunica venarum ipsi & alijs partibus communis, et	
ipsius vsus.	264
Tunica arteriarum quas obtineant fibras, ipsarumque	
vsus.	264
Tunica arteriarum cur venarum tunicis validiores.	264
Tunica interior arteriarum quæ ob duritiem nomina	
habuerit.	264
Tunica interior arteriarum cutem obtinet instar tu-	
nicae ventriculi & intestinorum.	7. 64

## V

VARICES cur facile in cruribus fiant.	278
Vasa spermatica latinis primi, & secundi semi-	
nis meatu.	276
Vasa spermatica, vide seminis ductus.	
Vena sola, vide vena coniugis experts.	
Vena ex iecore, nervi ex cerebro, arterie ex corde	
prodeunt.	263
Venarum fibræ quod à musculorum fibris differant.	263
Vena quid, ipsarum tunica, & fibræ.	263
Vena ubi alia donentur tunica alijs partibus commu-	
ni, & ipsius vsus.	263
Venarum munus præcipuum.	264
Vena iecoris cur tenuissima donentur tunica.	264
Vena in hominibus tres, ipsarum ortus & distributio.	264. 265.
Vena porta cur ita dicta.	266
Vena porta ortus, & distributio.	266
Vena porta quomodo ex iecore prodeat.	266
Vena porta quot ramis præcipuis e iecore emergat.	
fol. 266.	
Vena porta in quot ramos dirimatur extra iecur, &	
quo ij tendant.	266
Vena porta munus præcipuum.	267
Vena duæ à porta in cystima tendentes.	266
Vena à porta in lienem, ac omentum tendentes.	266
Vena cum liene, ac ventriculo consortium habet.	267



- Vena à porta ventriculorum petentes.* 120. 266. 267  
*Vena hæmorrhoidales.* 267  
*Vena à porta ad mesenterium tendentes.* 121. 267  
*Vena caua ex iecore an ex corde prodeat diffentiunt medici, ac philosophi.* 168  
*Vena caua principium habet ex iecore.* 168  
*Vena caua ramos in vniuersum corpus effundit, & per eos sanguinem.* 168  
*Vena caua quomodo sanguinē à porta excipiat.* 268  
*Vena caua ē iecore egrediens haud bipartito scinditur, vt magna ē iecore emergens.* 268  
*Vena caua supra iecur distributio.* 268  
*Vena caua corde superato haud per dorsi longitudinem fertur, vt quidam existimant.* 269  
*Vena caua quomodo cordi iungatur.* 269  
*Vena caua in faucibus in ramos diremptus.* 269  
*Vena caua infra iecur distributio.* 269  
*Vena caua ab osse sacro, arteriam magna subit, quomodo diuidatur, ramiq; ipsius disseminentur.* 276  
*Vena caua in crus propagatio.* 277  
*Venarum in iecur propagatio.* 268  
*Vena à caua ad diaphragma accedentes.* 269  
*Vena corenutrientes.* 269  
*Vena coniugis expertis à caua exortus, incessus, distributio.* 269  
*Vena à ramis vena caua ad tertiam vsque costā descendentes.* 270  
*Vena sub pectoris osse proximē ad vmbilicum repentes. 270. varius ipsarum exortus.* 270  
*Vena ad cervicis vertebrae iter habentes; alia caluam ingredientes.* 270  
*Vena à caua iuxta fauces exorta earumque diremptus.* 270  
*Vena iugularis interior, & ipsius ramorum distributio.* 271  
*Vena iugularis exterior vnde oriatur, vt diuidatur, & quas in partes ramos effundat.* 271  
*Vena in inferiores cervicis musculos, & elatiores thoracis exhausta, ipsiusque rami.* 270  
*Vena in faciem et caput vniuersum distributa series. fol. 272.*  
*Vena saluarella, siue lienis dicta exortus.* 273  
*Vena saluarella non bene in lienis affectibus pertunditur.* 273  
*Vena communis ex axillari, et humeraria exortus.* 272  
*Vena iecoraria ductus, & distributio.* 273  
*Vena iecoraria interdum occultatur cephalica accedens, interdum sola se in conspectum dat.* 274  
*Vena ramus iecoraria, per brachium excurrēs inter cutem & carnem.* 273  
*Vena communis incessus, ac diremptus.* 273  
*Vena communis nunc altior assurgit, nunc inferius subsistit.* 274  
*Vena inter pollicem, & indicem cur malē pro iecoraria pertundatur.* 274  
*Venarum brachij eadem series.* 274  
*Vena inter paruum digitum, & anularem, siue inter anularem & medium cur non bene pro iecoraria pertundatur.* 274  
*Venarum manus magna in diuisione varietas.* 274  
*Vena testem petens sinistrum ac dextrum, vnde oriatur, & quem ductum seruent.* 275  
*Vena sinistri renis inuolucrum, & dextri petentes vnde orta.* 274  
*Vena emulgentes vbi ex vena caua oriuntur, vtque situ variant.* 274  
*Vena emulgentes quomodo arterijs copulentur in viris. 275. in mulieribus.* 275  
*Vena emulgentes etsi ortum habēt variū, incessum tamen eundem seruant.* 275  
*Vena ad spinalem medullam, ac lumborum musculos accedentes.* 276  
*Vena ad vesicā cervicem, atque vteri in mulieribus fundum ac cervicem tendentes.* 276  
*Vena peritonaeam & abdomen consēdēns ramos suos ei copulat, quae deorsū sub pectoris osse fertur.* 276  
*Vena in femur distributa.* 277  
*Vena maioris crus adennis exortus, atque diremptus.* 277  
*Vena malleolum ac pedem adennis varietas.* 277  
*Vena in crus disseminata, & in pedem pertingentes. 278. 279.*  
*Venarum pedis distributio varia.* 279  
*Venarum pedis consideratio.* 279  
*Vena quatuor differentes in pedis pectine pro sanguinis extrahēte secundum medicos.* 279  
*Vena iuxta genu, ex qua duntaxat græci complures sanguinem mitti volebant.* 279  
*Vena vmbilicalis.* 279  
*Vena vmbilicalis in iecur ingrediens, in ramos minimē scinditur, vt inquit Vesalius.* 279  
*Vena vmbilicalis in homine arefcit, & veluti in ligamentum seu tendinem abit.* 185  
*Venarum arteriarumq; vmbilicalium incessus.* 196  
*Vena vteri non iatunescunt, nisi pregnantibus.* 194  
*Venarum caput petentium paria sex.* 285  
*Vena prima, secunda & quarta, et prima secundaque arteria caput petentes, quae subeant foramina.* 286  
*Venarum arteriarumque varius in capite cōgressus, ac separatio.* 286  
*Vena à quatuor duræ matris sinibus prodeuntes, & intra caput distributa.* 287  
*Vena tertia, quinta & sexta mammas petentes per quae ingradientur foramina, & quomodo distribuantur.* 287  
*Vena arterialis ortus atque distributio.* 288  
*Vena arterialis quam obtineat tunicam, & cur ita dicta.* 288  
*Vena arterialis, & arteria venalis munus.* 288. 189  
*Ventriculi cordis horumque historia.* 230  
*Ventriculus dexter cordis sinistro longē maior.* 230  
*Ventriculus sinister medium serē in corde locum tenet.* 230  
*Ventriculorum cordis munus.* 230  
*Ventriculi cordis singuli duo habent foramina, & quorsum.* 230  
*Ventriculi cerebri tres, horumque historia.* 242  
*Ventriculus primus, & secundus cerebri.* 242  
*Ventriculus primus, & secundus cerebri aquam intus continent.* 242



# Index.

<i>Ventriculus, ipsiusque historia.</i>	181	<i>bus, duos, præter prædictos obtinent processus Vesalio non visos.</i>	18
<i>Ventriculi situs figura.</i>	181	<i>Vertebra ossis sacri sex ut plurimum, nonnunquam vero quinque, ipsarumque connexus.</i>	18
<i>Ventriculus cur minimè in dorso illinendus.</i>	181	<i>Vertebra ossis sacri contrarium à cæteris dorsi vertebrae situm obtinent, &amp; quæ ex ipsis processus habeant.</i>	18
<i>Ventriculos haud ibi est ubi vulgo fertur.</i>	181	<i>Vertebra coccygis quatuor sunt ut plurimum inter- dum verò tres, ipsarumque descriptio.</i>	19
<i>Ventriculus duo habet officia ipsorum nomina, situs, &amp; usus.</i>	181	<i>Vertebra prima coccygis quâdo processus habeat.</i>	19
<i>Ventriculus cibum retinere potest citra tantam pylori conuenientiam.</i>	3, 181	<i>Vertebra coccygis sinum obtinent, ipsarumque connexus.</i>	19
<i>Ventriculus intus levis, &amp; varij eius colores.</i>	181	<i>Vertebra coccygis caudæ imaginem exprimit.</i>	19
<i>Ventriculus os inferius cur angustius.</i>	181	<i>Vertebra coccygis, nec foramē habet, nec caue sunt Vesalio multorum oculis in anatome cæpit diducere.</i>	19
<i>Ventriculus pro assumptorum ratione stringitur, ampliatur.</i>	182	<i>Vesalio priuatim non meminit ossis decimi tertij superioris maxillæ quod ipsum parui faceret.</i>	8
<i>Ventriculi magnitudo &amp; substantia.</i>	182	<i>Vesalio nunquam duos vidit processus, in quibusdam lumborum vertebrae occurrentes in aliquibus hominibus, qui in simijs habentur.</i>	18
<i>Ventriculus primus, &amp; secundus cerebri superne atque ad latera leues sunt, inferius asperi.</i>	242	<i>Vesalio secus ab auctore sentit in secundi pollicis ossis manus ad primum connexu.</i>	34
<i>Ventriculus primus secundus, &amp; tertius quid in se contineant.</i>	243	<i>Vesalio ait caput calcis ossis paruo digito respondētis, in sinum censeri cum in caput inferatur.</i>	45
<i>Ventriculus tertius cerebri, &amp; ipsius rinuli.</i>	240	<i>Vesalio inquit articulum primum quatuor digitorum manus secundo pollicis similem esse, cum sit primo similis.</i>	34
<i>Ventriculus quartus cerebri quis nonnullis dictus, nihil præter aquam continens.</i>	243	<i>Vesalio ait os pectinis pollicem sustinens, posterius processu donari, cum sinulum habeat.</i>	45
<i>Ventriculi tres priores cerebri tenui membrana succinguntur, quartus non.</i>	243	<i>Vesalio musculus omnibus easdem adesse partes inficiatur.</i>	72
<i>Vertebra latinis spondilia græcis dorsi ossa dicta.</i>	13	<i>Vesalio frontis musculorum connexionem non aduertit.</i>	74
<i>Vertebra dorsi 30. &amp; ipsarum enarratio.</i>	13	<i>Vesalio inquit visorium nervum in medio partis posterioris auris minimè committit, &amp; musculo obtegi, qui in hoīe delitescit, in brutis conspicuus.</i>	75
<i>Vertebra dorsi quomodo inuicem ante ac pone copulentur, &amp; quibus alligantur.</i>	14	<i>Vesalio inter oculi motores musculum reponit, palpebras attollentem.</i>	75
<i>Vertebra dorsi quàm variè perforantur, quod aditum nervis venis, &amp; arterijs præbeant.</i>	14	<i>Vesalio priores duo narium musculi quannvis euidentes latuerunt.</i>	76
<i>Vertebra dorsi quo foraminibus variant, &amp; cur.</i>	14	<i>Vesalio præter communes decem laryngis musculos duos proponit, nec auctori, nec Realdo visos.</i>	82
<i>Vertebra dorsi luxata, si plures fuerint minus, si unica, maius inferunt periculum, &amp; cur.</i>	14	<i>Vesalio inquit quintum oculi musculum, ipsam sursum agere, quod esse nequit cum rem ipsius partē inferatur.</i>	76
<i>Vertebra dorsi quomodo committantur.</i>	98	<i>Vesalio duos insuper musculos intra nares collocat, cum nihil interim præter cutem &amp; membranā carnosam habeatur.</i>	76
<i>Vertebra dorsi omnes prima excepta quomodo inferiorum &amp; superiorum processuum interuentu committantur.</i>	16	<i>Vesalio inquit priores duos genarum musculos ex processibus temporum mamillaribus exoriri, cum iuxta malarum apicem emergant.</i>	76
<i>Vertebra colli septem, earumque historia.</i>	15	<i>Vesalio inquit priores duos genarum musculos ita vniui, ut vnicus videantur, cuius distincti tamen sint.</i>	77
<i>Vertebra prima cervicis quo ab alijs differat.</i>	14, Secunda.	<i>Vesalio cum Galeno prioribus duobus genarum musculis, inferius labrum diducendi, &amp; ad latera vna cum superiore trahendi, aut ad faciei motum conferendi, minus adscripsit, auctor vero inferiore maxillam diducendi.</i>	77
<i>Vertebra primæ dorsi cum secunda connexus.</i>	14	<i>Vesalio nouem linguae musculos proponit cum decem</i>	6 ij dnm-
<i>Vertebra duæ priores colli quomodo committantur.</i>	14, 15.		
<i>Vertebra cervicis secunda quomodo tertiæ, &amp; alijs committatur.</i>	15		
<i>Vertebra quatuor cervicis inter secundam, &amp; septimam, præter septem processus cunctis dorsi parte communes, alios insuper quinque sortitæ sunt.</i>	16		
<i>Vertebra thoracis 12. ut plurimum sunt, colli vertebrae commissæ.</i>	16		
<i>Vertebra cruribus ut inuicem differant.</i>	16		
<i>Vertebra thoracis duas obtinent foveas in quas costarum capita inferuntur. Ac prima &amp; duodecima duas obtinent, unde ligamenta prodeunt. Ipsarum forma &amp; situs.</i>	17		
<i>Vertebra prima &amp; duodecima ut inuicem committantur.</i>	17		
<i>Vertebra lumborum quinque, ipsarumque historia.</i>	18		
<i>Vertebra lumborum quo ab alijs differant.</i>	18		
<i>Vertebra lumborum eisdem quos et alia septem processus obtinent ipsorumque descriptio.</i>	18		
<i>Vertebra lumborum aliquot in quibusdam homini-</i>			

duntaxat sint.	80	Vlna & radius quo differant.	28
Vesalius quatuor faucium musculos proponit inconfi-		Vlna et radius aliter superius, aliter inferius commit-	29
cuos cum ipsorum munere fibrae quaedam fungatur.	83	tuntur.	29
Vesalius inquit membranam à musculis abdominis		Vlna à principio ad finem descriptio cum triangula-	28, 29
secundi paris ubi ad ipsius medium pertingunt,		ri ipsius figura, & lineis.	28, 29
producta simpliciter esse, cum in duas dirimatur.	90	Vmbilicus quomodo fiat, & ex quibus vasis.	196
Vesalius primum, et secundum musculum intercosta-		Vmbilicus quomodo corporis medium occupet, ip-	196
les externos vice minus habet, auctor duorum.	48	susque in vterum incesus.	196
Vesalius de musculo quadrilatero volæ manus mem-		Vnguini materia, & adhaesio.	45
branam mouente non agit.	93	Vngues venas ipsos nutriendos non habent, eorumque	45
Vesalius inquit quatuor manus musculos brachiale		usus.	45
potissimum extendere flectereque, cum priores duo		Vngues sensus expertes, augentur inslar capillorum à	45
manuum potissimum flectant, alij duo extendant.	105	radice.	45
& manus sursum deorsumque agenda non infer-		Vox quomodo efformetur.	226
uire.	105	Veteres Græci vrinarios ductus appellant.	189
Vesalius inquit secundum femoris musculum, totum		Vteri oris structura.	195
se subtus primum abdere, cum tamen dimidium fe-		Vteri os in prægnantibus ita occluditur, vt nihil ad-	195
re ipsius detectum occurrat.	113	mittat.	195
Vesalius inquit sextum pedis musculum in processum		Vteri os immobile persiat cervicem etiam confixam et	195
inferi, cum in sinum inferatur.	118	diducta.	195
Vesalius minime aduertit peritonæum sub vmbilico		Vteri os naturaliter non ex arbitrio reseat, &	195
gemium esse, atque inter vnam alteramque mem-		clauditur.	195
branam vmbilicales arterias, ac vrinariam me-		Vteri os in prægnantibus, & non prægnantibus quo-	195
atum ferri.	180	modo diducatur occludaturque.	195
Vesalius censet fracto peritoneo transversos abdomi-		Vteri prægnantium situs.	193
nis musculos intestina continere; secus auctor.	180	Vterus à superis ad ima prominentem habet lienam,	193
Vesalius priores tres cerebri ventriculos tenui intus		& ipsius usus.	193
membrana obtegi vti Gale. notauit inficiatur.	243	Vteri ac cervicis extima interiorique facie descri-	193
Vesalius venæ caue ramos in brachium tendentes an-		ptio.	193
tequam ad axillam pertingant diuidi vult, cū post		Vteri angulorum positio quos alij cornibus, alij noui-	193
axillam dirimantur.	270	lunio contulerunt.	193
Vesalius, ubi iugularis interior ad caput pertingit,		Vterus cellulas minime habet, quas aliqui confixe-	193
maiorem ipsius rami vnam cum soporalis arteria		runt.	193
ramo sermone deducit, cum solus feratur.	271	Vteri substantia, membrana, ipsarumque fibrae.	194
Vesalius vmbilicalem venam suo in iecur ingressu in		Vteri venæ non tumescunt nisi prægnantibus.	194
plures scindi ramos prodiit, quod falsum est.	279	Vterus suscepto semine occluditur, colligiturque.	194
Vesalius inquit arteriam vnam cum venâ con-		Vterus & mammae per quas venas consortium ha-	277
scendentem, per ipsius etiã foramen ingredi, quod		beant.	277
secus se habet.	280, 286	Vterus crateris pedem interna facie representat.	193
Vesalius nervum visorum dum ponit oculum inferi-		Vterus earum quæ recens peperere sinulos quosdam	193
tur, ad latus inclinare prodiit, cum ad amussim in		habet, horumque usus.	193
medium inferatur.	311	Vulnere commissurarum capitis periculosa quam	6
Vesica cor inuoluens, vide mēbranæ cor inuoluentes.		osium.	6
Vesica fellea vide cystis fellis.		Vuae nomina, & historia.	227
Vesica in homine musculum ad cervicem habet, et hu-		Vuae figura & munus.	227
ius historia.	100	Vuae tertia oculi tunica.	246
Vesica duabus componitur tunicis, harumque fibrae.	188	Vuae cur ita dicta.	227
Vesica situs, & historia.	188		
Vesica figura & qualis.	188		
Vesica quas obeat suis fibris functiones.	188		
Vesica vtri, & mulieris discrimen.	188, 189		
Vesica quomodo meatibus suis vrinam excipiat, eo-			
rumque historia.	189		
Vesica muliebri situs.	193		
Vlna manus cubiti os.	28		
Vlna & radius ossa duo à cubito ad brachiale porre-			
cta, quod maius quod minus ipsorumque historia.	28		

# P R A E F A T I O.



NATOMES Historiam literis consignaturus, in qua grauis est inter artis proceres dissensio; de ipsius primum origine dicendum mihi esse, & causas propter quas ea primum inuenta, deinde intermissa est, in medium afferendas duxi; ut qui humanorum corporum dissectioni coram adesse nequeunt, quibusnam ex huiusce artis scriptoribus maior sit habenda fides, intelligant. Quoniam verò historia hæc ad medicam potius facultatem, quam ad aliud vllum disciplinæ genus pertinet, & medicos habuit primos inuentores, ab huius origine auspicabor. Medicinæ igitur inuentum vsque adeo vetus est, ut nulla totius orbis terrarum gens, quantumuis barbara & fera non aliquando genus aliquod remediorum habuerit. Veruntamen in Græcos duntaxat artis inuentio refertur, tum quod ab ipsis magis quam à cæteris nationibus exulta fuerit, cogente forsitan necessitate, ob gesta semper cum exteris nationibus bella, in quibus generis omnis vulnera infligi necesserat; tum etiam quia sine bellis imposito, ipsisque rerum dominis factis, qui natura ad malum propensi erant, vitam in otio, & luxu degentes, totos sese voluptatibus, ac libidinibus dederunt; qui autem mentis erant sanioris, omnem virtutibus operam nauantes, in studia se ac rerum naturæ contemplationem penitus abdiderunt. Itaque ij nimis laboribus, illi vero inordinato vitæ genere, suorum corporum constitutionem ita labefectarunt; ut innumeris ea ægritudinum formis obnoxia reddiderint; pro quibus debellandis nouas etiam auxiliorum species adinuenire oportuit. Ex Græcis igitur omnium primus medici nomen adeptus est Æsculapius Apollinis filius, Mercurij, qui cognomine dictus est Trimegistus, nepos. Vixit is non multo ante bellum Troianum, tantæ apud Græcos auctoritatis vir, ut in Deorum numero ab ipsis fuerit collocatus. Successores habuit filios duo Podalyrium, & Machaonem, viros pariter in arte præclaros; ab Homero non sine admiratione in bello Troiano celebratos, quanuis nihil eos præter vulnera persanasse, nullamque eorum, quæ ad victus rationem, quæ ad purgationes, & serapia hodie nobis vñtatissima pertinent, curam gessisse referat. Quod sane chirurgicam medicinæ partem omnium vetustissimam, & in maxima apud ipsos existimatione habitam fuisse testatur. Cum enim omnem illi ægritudinum causam in sua, ut ipse Homerus asserit, peccata referrent, iure optimo nullam ad eas propellendas opem, præterquam diuinam poscebant. Neque verò alienum à ratione est, quemadmodum illorum temporum homines temperantius victitabant, victuque vtentes parciore, laboris multo plus exantlabant, sic eos quoque vitam degisse salubriorem. Quum primum verò, uti diximus, alij delidia torpescere, atque in voluptatum fluctus, potissimam morborum originem, demergi;

alij se totos in literarum, & philosophiæ studia (res haud minus corpori  
 pernicioſa, quàm animo ſalutaris) recipere ceperunt, intemperans illorum  
 vitæ ratio, horum autem oppidò laborioſa effecit, vt Medicinam, cuius an-  
 tea nullus, aut exiguus ſanè apud ipſos uſus erat, omnes poſtmodum exi-  
 guo emolumento perquirerent. Quandoquidem vti antea, dum ſobriè vi-  
 uerent, abſque vlla medici, & medicinæ opè vitam magna ex parte valen-  
 tes, vegetique quàm longiſſimè prorogabant, ita nunc deſide hoc & in-  
 temperanti viſtus genere, ægrè admodum ex temperantioribus aliqui, in-  
 ſtar infirmæ baſis muri aſiduo ſe ſuffulcientes ad ſenectutis principia per-  
 duci queunt. Hanc ob cauſam excellentes viri complures à bello Troiano  
 medicinam fecerunt, donec ex philoſophis nonnulli, ob indefeſſas vigi-  
 lias, & rerum naturalium contemplationem in morbos incidentes, philo-  
 ſophiæ medicinam coniungere ceperunt, vnius ferè, ac eiufdem facultatis  
 vtranque eſſe exiſtimantes. Ea tempeſtate magni Philoſophi complu-  
 res, ijdemque pro ſummis habiti medicis extitere, clariffimi verò ex his  
 Pythagoras, Empedocles, & Democritus, qui ex quorundam ſententia  
 præceptor fuit Hippocratis Coi, viri non minus arte quàm ſacundia inſi-  
 gnis. vnde inter tot præſtantiſſimos viros ſolus æterna memoria dignus  
 extitit. Is omnium primus Medicinam à ſapientiæ ſtudio ſeiunxit. Huic  
 Diocles Caryſtius ſucceſſit, Diocli Praxagoras, & Chryſippus, quos poſt-  
 modum ſubſequuti ſunt Eroſphylus, & Eraſiſtratus, qui omnes in diuer-  
 ſas curandi vias proceſſerunt. Iſdemque temporibus in tres partes medi-  
 cina diducta eſt, vt vna eſſet quæ viſtu, altera quæ in medicamentis, tertia  
 quæ ferro duntaxat mederetur. Primam *διαίτητικὴν*, ſecundam *φαρμακευτικὴν*,  
 tertiam *χειρουργικὴν*, ab opere vnāquamque denominantes appellarunt.  
 Ex his qui diætā duntaxat in curatione adhibebant, rerum quoque na-  
 turæ cognitionem minimè interim neglexerunt, tanquam ſine ea trun-  
 ca, & debilis medicina eſſet. Poſt hos Serapion theōricen à praxi primus  
 omnium ſeiunxit, uſum duntaxat, & experimentorum in dies occurrentium  
 notitiā, medicinæ neceſſariam eſſe contendens. Hunc ſequutus  
 eſt Apollonius Glaucius, atque alij non pauci, à profeſſione Empirici nun-  
 cupati. Cum ergo qui viſtu ſolo medebantur in duas diuiſi eſſent ſectas,  
 altera rationalem artem, altera uſum tantum ſibi vendicante, qui rationa-  
 lem medicinam profitebantur, cū ad rectè curandum neceſſariam eſſe  
 contenderent, tam euidentium, quàm abditarum cauſarum morbos effi-  
 cientium notitiā, ſimulq; conſtitutionem, officium, poſitum, figuram,  
 magnitudinem, colorem, duriciem, molliciem, aſperitatem, ordinem,  
 compoſitionem conſpirationemq; internarum corporis noſtri partium,  
 cadauera quædam humanā incidere ceperunt, in quibus ſitum, figuram,  
 ordinem, conſortium, interioris ventris, & aliarum corporis partium ob-  
 ſeruabant. Hiſce temporibus florere Lycus Marinus, alijq; diſſectionis  
 proceres. Poſt quos Hierophylus, & Eraſiſtratus humanæ ſtructuræ reſeſſus  
 (utinam

(utinam id nunquam tentassent) altiùs indagare cupientes, nonnullos sup-  
plicio damnatos habere studuerunt, eosque viuos dissectari iubentes, qua-  
dam in corpore notatu digna occurrentia obseruabant. Id et si æqui bo-  
nique fieret, anam tamen populo non leuem porrigebat, ditam crudeli-  
tatem in miseros illos exercitam detestandi. Quò accesserant, quòd qui ex-  
perientiam solam sequebantur, de nullorum præterea remediòrum inuen-  
tione solliciti, quàm eorum, de quibus in morbi alicuius curatione pericu-  
lum prius fecissent, rei summam non in causæ morbi notitiâ, sed in auxi-  
lij ad ipsius sublationem idonei inuentione positam esse asserebant; illud  
insuper addentes, non infrequenter euenisse, vt abiecta quæpiam muer-  
cula simplicissimi auxilij ope, tot absque dissectionibus, quasi miraculo  
quodam, homines quamplurimos à grauissimis vendicasset morbis, quos  
multi præclarissimi medici, suis tantum freti rationationibus, post con-  
tentiones multas deploratos deseruerant. Adeo vt odium populi vniuersi  
& rationes ab empiricis medicis in ipsos adductæ, & immanitas nulla vr-  
gente necessitate in quosdam exercita, effecerint, vt non solum viuentium  
hominum, verum etiam mortuorum dissectio verita fuerit. Sicque dum  
nimium diligentes medici illi esse studebant, effecerunt vt quod sed ulita-  
tis necessitas ipsa postulabat, id postmodum ab ipsis adhiberi fuerit inter-  
dictum. Quam quidem ob rem posteriores, cum humani corporis Anae-  
tomen in patria sua obseruare non possent, aut Alexandriam, vbi et non  
nunquam exercebatur, petere, aut in alijs eam animantibus administrare  
eoacti sunt; quanuis illa interim eligerent, quæ ad hominis imaginem pro-  
pius accederent, quòd scilicet vti hæc eximiam faciem gerebant non om-  
nino dissimilem, idem quoque in corporis penitioribus fore iudicarent.  
Vixit hisce temporibus Galenus ex Pergamo Asiæ ciuitate, omnium quot-  
quot hætenus in arte sua maxime excelluerunt, longè sapientissimus, ac  
eloquentissimus. Is docendi cupiditate flagrans, ac inter hominis, & be-  
stiæ structuram parum omnino discriminis adesse ratus, humanæ fabricæ  
historiam, simia, vti ex eius scriptis videre est, ob oculos posita, descriptit.  
Quoniam verò ea tempestate, pauci omnino, ijque non multæ auctoritatis  
viri, literarum monumentis hæc ipsa consignauerant, ipse autem in alijs  
medicinæ partibus summè excellebat, plenam apud omnes fidem ipsius  
historia facile adinuenit, neminem scilicet, ob veritatem humani corporis  
dissectionem, qui repugnaret offendens. Hanc nominis exstimationem,  
ad nostra hæc usque tempora Galenus obrinuit, nemine ab ipsius placitis,  
vellatum quidem vnguem discedente; donec Andreas Vesalius multorum  
oculos diducere cepit, in quæuis aliorum scripta iurandum nulli esse osten-  
dens, vt multorum inos est, qui videri, quàm verè scientes esse malunt; qui  
cum laboriosum nimis ducant, singula diligenti trutinâ examinare, vi-  
deantque, cum hac ratione pleraque constanter affirmare non possint, se-  
minus scientes à vulgo habitos iri, auctoritatis tantum scriptoribus qui-  
busdam



busdam tribuerunt, vt nullo pacto adduci queant, vt falli eos potuisse fateantur, minimè interim cogitantes, eos, quibus tantum fidei exhibent, homines vti & nos fuisse, & facile in aliquo cecutire, facile hallucinari potuisse, quemadmodum vel doctioribus in dies in multis contingere obseruamus. Atque eo magis quòd cum antiquitus libri omnes manuscripti essent, præterquam quòd multa in transcribendo minus accuratè scripta excidebant, plerunque etiam fiebat, vt quis in libri alicuius lectione aliqua in margine adnotaret, ac dein qui transcribebant, notas eas esse nescij, inter auctoris seriem infererent. Hoc & alijsmodis quamplurimis, quos secum vnusquisque excogitare potest, credibile est veterum libros ita mendosos esse, vt tantam ipsis fidem nemo sani iudicij, ni prius veritatem sedulo indagauerit, habere nec possit, nec debeat, quantam inertes isti adhibent. Qui si tantum laboris subire recusant, suam saltem inscitiam huius vel illius scriptoris auctoritate ne tueantur, præsertimque ijs in rebus, in quibus contrarium licet manu deprehenderet. Siquidem si Anatomen, de qua nunc agimus, sedulo considerauerimus, multa nobis in ea facillè occurrent ex quibus perspectissimum fiet, eos qui Galenum tueri conantur, humanam ipsum Anatomen descripsisse asserentes, præterquam quod iniuriam auctori faciunt, dum ipsum passim mentiri ostendunt, sibi ipsis quoque humani corporis refectione visam fuisse nunquam attestantur. Et quo hæc me veritate potius quàm alia re compulsam dicere vnusquisque intelligat, nonnulla huc ex Galeno afferam, in simia cæterisque brutis omnibus, in homine vero nullatenus occurrentia. Ac primùm quidem de ossibus verba faciam, in quibus error nullus subesse potest, adeo scilicet duris, vt formam suam amittere facile nequeant, neque enim verisimile est, eam post Galeni tempora exuissæ. Air igitur Galenus in superiori maxilla duas haberi futuras, proximè ad caninos dentes deorsum exporrectas. Hæ in simijs omnibus occurrunt, hominum verò vix, ac ne vix quidem vnus inter centenos eas obtinet. Air insuper posteriores ceruicis vertebrarum processus acuminatos esse, in simia sic se habent, in homine autem bifidi sunt. Decimam thoracis vertebram cum editiori, humilioriq; sibi proximis coarticulari prodidit, id in simia verissimum est, in homine de duodecima vertebra accipiendum. Sacrum & Coccygis os ex ternis extrui ossibus asserit, sanè quidem in simia, in homine autem sacrum os ex quinque, vt plurimum, interdum ex senis conflatur, coccyx vero ex quaternis. Inquit præterea humeri os extrorsum obliquari; verum quidem in simia, in homine autem rectum persistat. Vlnæ air exiguum quendam adesse processum stylo similem qui carpo articulatur, cum tamen in homine nullum connexus vestigium sese offerat. Pulmonem quinque lobis distinctum esse prodidit, quod neuiquam sanè posset asserere, si hominis dissectionem semel saltem esset inuitus. Sed quid his diutius immoror? quando quidem si hominis Anatomen toties Galenus conspexisset, id ipsum proculdubio minimè reticuis-

set,



set, vti sanè de ossibus bis sibi visis meminit, illius nimirum cadaueris quod ex ingenti fluminis cauea extraxerat, & illius hominis, quem suspensio necatum, corui iam ferè vniuersum laniaueraut. Quòd si quando is ephebus adhuc Alexandriam concesserat, forsàn vt euenit, ad ipsius aduentum iam disseccioni finis erat impositus; aut verò ipsi, cùm historia hæc vim potius memoriæ quam iudicij exposculet, temporis progressu excidit, vt ex his, quæ nobis scripta reliquit, colligere est. Quemadmodum verò ex adductis exemplis perspectum euadit, Galenum simiæ potius quàm hominis historiam descripsisse, alia pariter quædam in medium afferri possent, oscitantia ipsius argumenta, vt capitis super primam, & secundam ceruicis vertebraam motus, manus motus ad exteriora; venæ coniugij expertis exortus, & alia deprauati contextus indicia, vt quod inquit detecto cerebro, aut ipsius ventriculis compressis, sensum motumque protinus deperdi, vbi necessario legendum est, & compressis. Verùm hic haud in quenquam inuehi, sed incios potius monere institui, his me atque alijs, quæ breuitatis gratia prætermitto, in eam sententiam firmiter adduci, vt aut Galeno, vel perquam rarò, vel nunquam hominis Anaromen visam fuisse, aut ipsius scripta insigniter deprauata esse existimem. Qui verò ipsum mordicus tuentur, eò ignauia deuenerunt, vt suam potius ignorantiam Galeni auctoritate contegere, quàm perquirendæ veritatis laborem subire velint. Quare vnique consulo, vt se aut in Italiam conferat, vbi refectionis conspiciendæ facile potestas dabitur, aut si ei auctorum dictis standum est, ijs potius fidem adhibeat, qui omne vitæ suæ tempus huic studio impenderunt, maiori humanorum cadauerum copia, quàm Galenus vnquam simiarum habuerit, quàm ijs qui tubicinum more ex cathedris non visa canunt, sed quæ puerulus quiuus libro ante oculos posito legere seorsum possit.





## Ioannes Valuerdus Lectori.



**L**EST amici quidam mei, in ea erant sententia, ut Vesalij figuris posthabitis, noua mihi essent paranda; nolui tamen id ipsum efficere, tum confusions vitanda gratia, quæ hinc suboriri posset, propterea quod non ita perspectum sit, in quibus cum eo conueniam, in quibus item ab eo dissentiam; tum quia ipsius icones affabrè a deo exculpæ sunt; ut non sine inuidia, aut malignitatis crimine rejci eas potuisse duxerim; eoque magis quod præstantiores eas reddere tam facile mihi fuit, quam arduum unicuique futurum est, hys atque illis reiectis æquè præstantes parare. Quoniam verò nostra in are ducta sunt, neque historia citra magnam confusionem interijci queunt, singulas cuiusque libri iconas, ad ipsius calcem apposuimus. Proinde sciendum est, notas in interiore margine toto opere occurrentes, in omni figura exprimere, quid in eo pagina loco, cui idem numeri character ac nota præpositus est, contineatur. In nota vero prior character alijs edior, eum designat, qui talis in pagina facie occurrit. Secundus character, scilicet tabulam figurarum significat; postremus literam siue signum denotat in figura comperiendum. Et quia nonnunquam euenit plures in eadem tabula figuras contineri, ideo in notis quibus post tabule numerum apposita est litera t. aut figura, huiusmodi signa figuram designant, sequens autem ipse numerum, postremum verò signum in tali figura conquirendum. Fit etiam interdum ut in vno libro figura siue tabula alterius requirantur, & tunc aut dictio in pagina facie iuxta numeri characterem occurrens, te docet quo eam in libro reperire queas, aut in nota primum liber, deinde cetera quæ diximus omnia designantur.

Primus itaque Liber ossa, & cartilagines, humana fabrica veluti basim continet.

Secundus ossium vincula atque indumenta complectitur, cuticulam nempe, cutem, adipem, membranam carnosam, musculos, ac membranam denique ossa conuestientem & cetera dictam.

Tertius organa enarrat, ad corporis nostri conseruationem, tam in indiuiduo quam in specie requisita.

Quartus vitales partes edocet, cor scilicet, ceteraque in thorace contenta organa.

Quintus de instrumentis sensui motuique famulantibus cerebro nimirum agit, sensus etiam quosdam exteriores continens.

Sextus duo meatuum genera, venas nempe atque arterias prosequitur, quarum ope fabrica hæc enutritur, & vita fruitur.

Septimus & postremus instrumentis dicatus est, quarum ministerio sensu pollemus motuique, & sensibus item exterioribus nonnullis.



IOANNES VALVERDVVS  
HISPANVS.



## De Ossibus

perfecta habere oportet. Sunt autem ossa ex corporis nostri partibus durissima, & postea cartilaginea. Que una cum ossibus vniuersum corpus sustentant, in hisque reliquæ omnes partes adnascuntur atque firmantur: Ex hisce ossibus quædam grandia sunt, concaua, & medulla intrus referta; Alia parua & intrus spongiosa, atque etiam medullosa, licet in aliquorum cauo medulla non facile conspicitur. Grandia vt plurimum ab vtroque, aut saltem ab altero extremo aliud os adiunctum habent, quod latini Appendicem hoc est rem ab alia pendentem (licet improprie quodammodo) appellant. Græcis proprie magis *ἐπιφύσις* dicitur, hoc est, quod ad aliud secundum naturam ad nascitur. Huiusmodi Appendice donantur Humerus <sup>a</sup> supra, & in puerulis etiam <sup>b</sup> infera sede: <sup>c</sup> vlna infera iuxta brachiale, & in pueris etiam supra, iuxta cubiti os: <sup>d</sup> Radius <sup>e</sup> femur: & Tibia ab vtroque extremo. Præstant accessus hi tum vt ex eis ligamenta prodeant, quibus ossa inuicem committuntur, tum etiam vt ex eisdem quorundam musculorum tendines principium desumant. Hæc insuper ossa processus quosdam, quos græci *ἐπιφύσεις* appellant, qualibus scapula, femur, omnesque dorli vertebræ donantur. Horum alij suam appendicem ex altero habent osse, vt duo <sup>f</sup> processus femoris & interior scapulæ processus anchoræ similis: Alijs vero processibus nullæ sunt appendices, vt maxilla inferioris (licet in eo in recensnatis vestigia aliqua conspiciantur) calcis, tali, humeri iuxta cubitum, nec non omnium fungosorum ossium processibus: Rursus verò multæ appendices suos processus obtinent, sic vlnæ appendici processus inest iuxta brachiale mucroni similis, & Tibiæ appendici, qui interiore malleolum efficit: Sic & pedij ossis minimi digitem sustententis appendix processum habet, cui octauus, vt dicemus, pedem mouentium musculus, inseritur: femoris præterea atque humeri appendices, illius quidem inferior, huius vero superior, processus habent, adeo insignes, vt capitis potius quàm processus nomen vterque mereatur. Hæc, atque huiusmodi aliæ, quas breuitatis gratia in suum locum reijcio, sunt omnes Appendices atque processus ossium proprie dicti: Verum in operis progressu vnamquaque partem communi appellatione vocabimus, haud vsque adeo seuerè agentes. Nam appendices processusque donatas, qualis femoris est, processus simpliciter appellare sufficit. Neque etiam omnes processus hoc nomine donabimus, quia humeri & femoris processus potius capita vt diximus dicenda sunt. Eos pariter qui alijs ossibus inferuntur omnes capita appellabimus. Cæterum ossa hæc omnia tam magna quàm parua, (eo excepto quod linguae radici impositum est, <sup>h</sup> Hyoides dictum) varijs inuicem modis committuntur, quorum singuli sua nomina à veteribus Anatomicis acceperunt, quibus & nos in operis progressu vt cogemur, tum quod à nemine fuerint nostro sermone reddita, tum quod apud posteriores omnes Anatomicos in usu fuerint, foretque potius quædam doctrinæ confusio quàm explicatio, noua ad ferre vocabula. Quare cum has ob causas illis mihi vtendum sit, ne illorum de in explicatio me diutius detineat, vel doctrinæ cursum interrumpat, satius erit ea prius explicare. Illud igitur in primis scire oportet: vniuersam inuicem coherentium ossium compagem Græcis *Σκέλετον* dici, quasi aridum siue assecatum dicas. Modus quo hæc committuntur duplex genere est; Vel enim, conjunctione quam latini Articulationem, vel vnione quam *Σύμφυσην* Græci appellant, inuicem copulantur. Articulatio est naturalis duorum ossium copulatio, medio vinculo quod vtrique semper amplectitur; nonnunquam verò in vtriusque medium inferitur. Symphysis, naturalis duorum ossium vnio est: addo dictionem hanc/ naturalis / ob ea ossa quæ prius rupta, arte coherant, superinducta carne dura, alba & nervosa, quæ inter vtrunque os adnascitur, illi similis, quam in vulnere cicatricibus conspiciamus, quæ idcirco chirurgis Porus Sarcoides, idest caro in callum obdurata dicitur. Coniunctio tribus fit modis, aut enim ossa manifestè mouentur, quod ar- &c. admodum non sint colligata, & hanc græci *διαρθρώσειν* Latini Articulationem vocarunt; aut motu admodum obscuro mouentur quod arctissime inuicem coherant, & hanc Græci *συνάρτησιν* Latini Coarticulationem appellantur, aut nullo pacto mouentur, indissolubili vinculo coherentes, cui congressui veteres nullū, quod quidem ego sciam nomen imposuere, idcirco eum nos, innominatum appellabimus

a tab. i. iii. x  
b tab. ii. y.  
c tab. ii. z.  
d tab. ii. i.  
e tab. ii. iii. 11.  
f. x.

f. ta. i. iii. T

g tab. i. 4.

h tab. ii. H. t.  
v. fig. vii.

Commissura.

Σκέλετον

Articulatio.

Coniunctio tri-  
fariam fit.

Secunda coniu-  
ctionis Species.  
Tertia.



appellabimus. Diarthrosis & synarthrosis vno ex tribus modis fiunt, Aut rotundo capite in profundum sinum inserto, cuius exemplum in Diarthrosi est, Articulatio femoris cum coxendice, humeri cum scapula, priorum ossium digitorum cum ossibus postbrachialis; in synarthrosi copulatio Tali cum osse nauculari, septimi ossis brachialis cum primo & secundo eiusdem: Aut fit plano capite, in paruum sinum inserto, sicut copulantur in Diarthrosi, prima colli vertebra cum secunda atque omnes dorsi vertebrarum processus superiores & inferiores, radius cum ulna; In synarthrosi Sura cum tibia; costæ cum vertebribus thoracis, & cum osse pectoris, ossaq; tarsi inuicem: Aut ita committuntur vt alterum leuiter extuberans caput lateribus habeat, medio depressum; alterum contra sinum habeat medio exuberantem, lateribus cauium, quem in modum connectuntur in Diarthrosi Tibia cum femore, radius cum humero, In synarthrosi talus cū calce, & nonnulla brachialis ossa iter sese. Primum articulationis modū tam in Diarthrosi, quā in synarthrosi appellarūt veteres Arthrodiam, secundum Enarthrosim, Tertium Ginglimon, nullo præterea quā manifesti & obscuri motus facto discrimine. Innominata copulatio vno & ipsa ex tribus modis fit; Aut enim ossa, medijs veluti ferræ dētibz pectinatim cōgrediuntur, vt in capitis ossibus videre est, quæ coniunctio veteribus Sutura dicta est; aut per simplicem lineam committuntur, vt fit in ossibus nasi & maxillæ superioris, & hanc Græci Harmoniam appellant, nos illi nullum seorsum nomen imponimus: Aut instar clauī cuneū os ossi infigitur, vt dentes in maxillis, cuneiforme in alijs capitis ossibus multaq; maxillæ superioris appendices, quam connexionem græci Gomphosim appellant, nostri hæcenus nullum illi nomen imposuerunt. Symphysis siue vnio bifariam fit, medio scilicet neruo aut ligamento vt fit implerisq; appendicibus ac dorsi vertebribz, diciturq; sineuosis; aut media cartilagine, vt fit in aliquibus partibus ossis pectoris, occipitis, coxendicis, Synchondrosis dicta. Atque hæc sunt omnes ossium copulationes earumq; nomina vnicuique à veteribus indita: Qua in re inter omnes, qui hæc in hanc vsque diem tractarunt, ad Galeni mentem proximè accedere mihi videor, etsi is initio libri de ossibus vsque adeo confusè agit, vt fateri cogamur, aut deprauatum esse contextum, aut illi, quæ prius dixerat, memoria excidisse. Nam cum prius afferuisset in synarthrosi motum aliquem fieri, posterius exempla coniunctionum adfert, in quibus motus non reperitur. Quare aut in synarthrosi nullum vult reperiri motum, & sub Diarthrosi omnem motus speciem complexus est, aut tertij membri fuit obbitus, quod ipsi nunc addidimus, cuius ille species sunt quas ipse Synarthrosi aut motui obscuro adscribit. Ait præterea Symphyfim seu vnionem fieri quandoque media carne, quod si in ossibus verum est, id fit in dentibus quos idem refert Symphysis minimè copulari, ideoque ipse eam diuisioni nostræ minimè addo, vt neque vnionem ossium adicio nullo intermedio coherentium: cum mihi hæcenus ea visa non fuerit. Sed vt sese res habeat, satis fit harum coniunctionum appellationes veteribus vsurpatas innotuisse, ne nobis eorum scripta legentibus, tenebras offundant: Ideoq; illud adicere lubet, Collum ipsis dictum fuisse processum quendam acutum ad cuius extremum tuberculum enascitur, quod caput appellabant; Quod si processus capite destituebatur non Collum sed Coronon, quod processum acutum significat, vocabant. Sic & nerui apud eos dicebantur tam mufculorum capita, ossiumq;ue ligamenta, quā qui ex Cerebro & spinali medulla exoriuntur. His hunc in modum vnuerfum positis, operæ præcium est vt ad singulorum ossium tractationem aggrediamur, à capite membrorum omnium principiū, ducto exordio.

Coniunctionū nomina.

Tertiæ coniunctionis species diuisio.

Collum.

Caput.  
Coronon;  
Neruis

## De Ossibus Capitis.

## Cap. 2.

at.iii.fig.i.

Omne quæ capillis obtegatur partem, Caput Medici appellant, cuius naturalis figura est, globi ovalis instar, aut leuiter vtrinq; compressi, posteriore parte laterioris, quam anteriore, ex vtraque verò eminentis (licet posterior pars paulo magis extuberet) in medio plani sunt & præter hanc, capitis figuræ quatuor mon-

Anat.

A ij

struolæ

Naturalis capitis figura.

Quatuor naturalis capitis figura.



struoræ potius quàm naturales; quarum prima est quæ anteriore parte <sup>b</sup> depressa est, posteriore eminentior; secunda ex <sup>c</sup> opposito se habet, antè protuberans, postè demissa; Tertia vtrinque <sup>d</sup> depressa in summo acuminata, qualem Genuefens mulieres puerulis suis effingunt, quali etiam Thersthem fuisse Homerus tradidit: Quarta <sup>e</sup> est, in qua caput in latera magis quam in anteriorem posteriorem ve partem prominet, qualia Indorum Peru regionis capita sunt, raro apud nostros visa. Sunt & præter has pleræque aliæ capitibus figuræ, quibus referendis non immorabor

*Caluaria & ip  
suis partes,*

cum ratissimè conspiciantur. Quod naturalem figuram sortitum est osse vniuersum integitur, quod Græci κεφάλιον Latini Caluariam vocant. Id octo ossibus constat; quorum primum <sup>f</sup> ferè frontem occupat, & bregma superat frontis os, à sede quam obtinet dictum. Secundum & tertium verticem torum <sup>g</sup> constituunt, ac verticis ossa dicuntur. Quartum & quintum vtraque <sup>h</sup> occupant tempora, in quibus sunt aurium foramina. Sextum <sup>i</sup> torum occupat amplectitur & medium basis cranij, os occipitis dictum. Septimum <sup>k</sup> in medio basis cranij, instar cunei inseritur, vnde Cuneiformis nomen adeptam est, & centrum siue radicem cavitatis oculorum alteramque exterioris lateris sedem constituit. Hoc quidam inter capitibus ossa referunt, alij inter ossa maxillæ superioris, quod inter vtraque medium sit, sed verius inter capitibus ossa recenseretur, cum magnam basis ipsius partem occupet. Octauum basis ossis frontis vniuersum foramen <sup>l</sup> implet, quod nasi foramina respicit: Id plerisque *σφυσος* idest Colatorium dictum est, quod, instar cribri peruium sit; Alijs vero *σπασσος* idest quod spongiæ modo foraminulentum existat. Ossa hæc in cunctis hominibus semper aut medijs quibusdam futuris committuntur, vt Cranij ossa, aut medijs lineis siue harmonijs vt reliqua omnia, licet in nonnullis senibus futurae inconspiciæ sint. Cranij naturalem figuram seruantes sunt vt plurimum futurae, quarum duæ illud transuersim dirimunt, altera per medium secat. Priorum altera iuxta bregma <sup>m</sup> ferrur, & tempora vtraque pertingit, quam latini futuram carnalem appellant siue arcuatam, quod arcus imaginem referat. Hæc in alijs magis in summo est, in alijs minus, semper tamen apice medij digiti pertingitur; si brachialis principium superciliorum medio in nasi cauo accomodet & medium digitum ad capitis verticem rectè deprimas; Altera <sup>n</sup> per occiput fertur a literæ græcorum imaginem formans, dicta ob id Lambdoyds. Tertia <sup>o</sup> à medio posterioris per cranij longitudinem in coronalem vsque porrigitur; hæc raro (multo- que rarius in mulieribus quàm viris) per frontis medium ad nasi vsque summum inter supercilia tendit; sagittæ perquam similis est, ideoque sagittalis dicta fuit. Atque hæc omnes relatæ futurae literam H maiusculi expriment vt optimè ab Hippocrate adnotatum est, lib. de vuln: cap: Quæ autem capita à naturali hac structura euariant, etsi cranio vt prædicta integuntur, haud tamen eidem futuris donantur. Nam cui anterior capitis eminentia deest, id sagittalem tantummodo & Lambdoydem, habet imaginè T maiusculi constituentes: P Vbi posteriori eminentia de perditur, solæ sagittalis & coronalis seruantur, eiusdem <sup>q</sup> I inuersi formam exprimentes. Vbi verò sola in vertice eminentia seruatur, coronalis & Lambdoyds deperduntur sed harum loco adest altera, quæ per capitis medium porrigitur, crucem <sup>r</sup> cum futura coronali representans. Insunt præterea Caluarijs omnibus futurae duæ, præter relatæ, in temporibus supra aures <sup>s</sup> circulari ductu ab extremo Lambdoidijs ad extremum coronalis progredientes; Hæc autem sunt ossium connexum interuentu, non vt prædictæ; imò verticis os vtrinque definit instar squamæ attenuatum, atque in ossa temporum accedentia ad sumum latius subingreditur: proptereaque eas nonnulli non futuras simpliciter, sed squamosas futuras appellant. Donantur insuper caluariæ omnes exigua linea, siue, vt latius loquamur, futura quadam communis octauo & frontis ossi, quæ interius cranij partem anteriorem ambit, & eam quæ ad latera est foraminis ossis frontis, nares respicientis. Huic nullum à veteribus nomen est inditum, nos semper hyoidem appellabimus, tum quod v græcorum perquam similis sit, tum vt circumlocutionem in ea referenda euitemus. Hisce omnibus proprijs futuris, accedunt duæ præterea lineæ, <sup>u</sup> siue harmoniæ, quarum vtraque ab extremo futuræ Lambdoidis oritur, atque interius occiput exporrigitur (licet

b.t.iii. fig. ii.  
c.t.iii. fig. iii.  
d.t.iii. fig. iii.  
e.t.iii. fig. v.

f.t.i.B.t.iii.  
fig. i. L.  
g.t.ii. a.t. iii.  
fig. i. R.  
h.t.ii. D.t.  
i.t.iii. B.t.iii.  
f. i. E.  
K.t.iii. fig. vi.  
O.O.O.  
t.v. fig. iii.  
l.t.v. fig. vi. z

*Caluaria ossa  
bisuriam com-  
mittuntur.  
Caluariæ natu-  
ralis commissura*

*Sutura Cor-  
nalis.*

*Lambdoyds*

*Sagittalis.*

*Capitum non  
naturalium su-  
tura.*

*Sutura squamo-  
sa.*

*Sutura hyoidis*

*duæ lineæ seu  
harmonia.*

m.ta.ii. A.ta.  
iii. A.I.A.B.

n.ta.ii. iij.  
o.ta.iii. c.ta.  
iii. f.i. m.

p.ta.iii. f.ii.  
q.t.iii. f.iii.

r.t.iii. f.iii.

s.t.ii. D.ta.iii.

fig. i. F.G.H.

t.t.v. fig. i.

u.t.iii. f. vi.  
cc.

x ta.iii. f. vi. nn-

y ta.iii. f. vi. op.

z t.iii. f. i. G.

a ta.iii. f. i. F.

b ta.iii. f. i. g.

c t.iii. f. vi. d.

d tab.v. f. i. L.

e tab.v. f. j. x.

(licet paulo obscurius) & per occipitis vertebra fertur, quæ primæ colli vertebrae, & auris osi rupem referent committitur, sensimq; ac sensum progreditur sese facie adiungens donec ad occipitis extremum pertingat, ubi <sup>x</sup> exigua linea inter illud & os cuneiforme transversum inserta iuxta nasi foramina palatum spectantia congressus ipsarum perficitur. Ex harum utraque, altera, posteriora versus, <sup>y</sup> per temporum caua obliquis ductibus sursum tendit versus anteriorem futurarum squamosarum sedem, <sup>z</sup> vnde in priora parumper, ad coronalis extrema deorsum fertur: Hinc rursus modicè deorsum repit <sup>a</sup> ad vsque externum ferè oculi angulum, ubi ramum edit <sup>b</sup> qui in oculum ingreditur per superiorem laterum totius (spacii) partem pertransit, donec alteri alterius lateris inter supercilia committatur: Facto hoc ramo linea suo ductu ulterius progreditur <sup>c</sup> & eodem modo rursus descendens quo per tempora ascenderat, ad extremam vsque postremorum dentium maxillarium sedem pertingit, atque inde oblique parumper per omnem eam cautatè rursus fertur quæ nares respicit, donec intra <sup>d</sup> octauum & cuneiforme os in eam desinat, quæ eodem met modo per omne alterum latus ascendit. Sutura hæc in interiore cranij parte cerebrum respiciente apertè visitur, qua etiam in parte alterutroque spectatur ramusculus ab ea exortus, osi frontis & cuneiformi <sup>e</sup> communis. Hi ramuli in oculorum etiam cauo cõspiciuntur, paulò supra eorum centrum siue radicem; linea tamen sine harmonia in feriori parte iuxta nasi foramina, quæ palatum spectant, ferè inconspicua est. Hæ sunt naturæ, hæ lineæ, siue harmoniæ ossis capitis, quorum alia magis, alia minus conspicuæ sunt, vt faciliè in quouis cranio videre est, multoque magis in grandioribus, quàm in paruulis spectanti occurrunt; & quemadmodum in vtrisque si coquantur, facili negotio abscedunt, sic in senibus nulla ratione sciunguntur, quin potius vnica ossa videntur. Medijs hisce futuris, lineis atque harmonijs ossa omnia capitis hunc in modum sciunguntur. Frontis os editiori sede ab ossibus verticis diiuditur, medio futuræ coronalis; inferius ab ossibus maxillæ superioris medio illius, quæ nares pertransit, iuxta supercilia ab exteriorè oculorum angulo per latera incipiens: ab ossibus temporum medio alterius partis secturatum squamosarum; inferius in cranij spatio, ab osse cuneiformi media linea, quæ intra radices oculi est, ita vt hoc frontis os quodam modo orbiculare sit. Verticis ossa inuicem dirimit sagittalis: in anteriore sede eadem ab osse frontis sciungit Coronalis: posteriore autem ab osse occipitis lambdois: inferius ab osse temporum squamosæ futuræ dirimit: à cuneiformi pars lineæ ossibus capitis, & maxillæ superioris communis, quam in priora ab interiore squamosarum sede ad fines vsque coronalis ferri dicebamus; quo fit vt verticis ossa quadrilatera videantur, præterquam ubi instar squamarum attenuantur, temporumque ossa subeunt qua in parte solida sunt, in reliquis vacua, aut cauernosa, atque omnia paulo magis in longitudinem quam in latitudinem protensa. Temporum ossa superiore sede, qua ossibus verticis committuntur, squamosæ conglutinationes sciungunt; posteriore verò & inferiore sede eadem ab occipitis osse dirimit linea ex finibus lambdoidis exorta: sede anteriore à cuneiformi ea linea, seu harmonia, quæ per temporum caua repens, coit cum anteriore squamosarum futurarum parte: à priorè maxillæ superioris osse ea futura, quæ literam S exprimit: Ita vt si eorum processus (quemadmodum inferius dicemus) adimas circularia euadant hæc temporum ossa. Occipitis os à verticis osse futura A referens dirimit: ab ossibus temporum lineæ à Lambdoide exortæ: & à cuneiformi transversa linea, in quam duæ illæ à Lambdoide coeunt; Id quinque lateribus constat, quorum duo ad infimam sedem futuræ Lambdoidis, duo ad extremas harmonias tendunt, alterum lineam constituit, qua ipsum cuneiformi committitur. Cuneiforme os ab occipite dirimit prædicta linea, ab ossibus temporum altera, quæ vtrinque ab ea nascitur, & vt diximus, per media tempora ad futuras squamosas pertingit: ab osse frontis, ac verticis ea linea dirimitur, quæ ab extremo prædictæ oritur, & ramo, qui ab ea exortus, & oculum per externum angulum peruadens, transversum repit, vt diximus, donec ramo alterius lateris committatur: ab octauo osse dirimitur earum extremis, quæ per fines postremorum dentium maxillarium prorepentes, in eum quem diximus modum inter oculorum radices coeunt: haud secus quoque à superiore maxilla reliquo dictarum linearum disungitur. Octauum os ab osse frontis dirimitur per futuram Hyoidem, quæ illud vni-

Dua alie lineæ siue harmoniæ.

Ossium capitis diuisio.

*Summarum  
linearum capi-  
tis manus.*

*Comparatio of-  
sium capituli in-  
ter se.  
Verticis ossa.  
Occipitis os.*

*Occipitis os ex  
tribus constat.*

*Frontis os.*

*Ossa temporu.*

uerfum superius ambit, præterquam ea in parte, quã diximus à cuneiformi dirimi medijs earum extremis, quæ nali spaciū in palatum deriuans tranſuerſum amplectitur: à duobus vero maxillæ ſuperioris oſibus, quibus dentes continentur, per lineam quæ ab vno latere in aliud per narium foramina decliuſ fertur: ab oſſe cuneiformi, huiusce lineæ parte quæ inferius proxima eſt foraminibus à naſo in palatum deriuantibus, iuxta poſtremos dentes maxillares. Hæ omnes futuræ, lineæ, atque harmoniæ, capituli oſſa eo quem diximus modo circunſcribentes, minimè quidẽ aduerſum ictus caput tuerur, vt nonnulli arbitrantur, multo enim magis iniurijs obſiſteret vnicui os, præterquam q̃ longè periculoſiores ſunt futurarum percuſſiones; ſed illud potiſſimũ præſtant, vt dura menynx inter oſſa ſeſe inſinuas firmiùs cranio hæreat, nec ſuper cerebrũ collabatur, ſimulq; vt pericranio ex dura menynge, vt ſuo loco dicemus, exorto, per eas aditus pateat, Conferunt in ſuper, vt per eas capituli humiditates tranſmittantur, euaporentq; Atq; hanc ob cauſã pueri, quibus cerebrũ humidius eſt, hæce futuras obtinent longe patietiores, magiſq; diductas, præſertim verò in bregmate, vbi plurima ſcatent humiditate. Sed, vt ad rẽ redeamus, Ex huiſce omnibus oſibus verticis oſſa tenuiſſima ſunt, & maximè mollia, intus cauernoſa, præterquã vbi temporũ oſſibus cõmittũtur, interiore æquẽ ac exteriore ſede læuia, licet interiùs paruas quaſdã foueas, veluti f̃ furculos edãr, f̃ tab.v.ſ.ij. in quos venæ arteriæq; duræ menyngis firmiùs inferũtur. Occipitis os validiùs multo eſt, & durius, licet nõ æquẽ omni ex parte, nã qua ex carne eſt, vnde nullus exoritur muſculus, tanto durius eſt oſſe frontis, quãto illud verticis oſſiũ duritiẽ ſuperat: ſed neque tota hac ſede parem adipiſcitur craſſitiẽ: ad ſui enim radicẽ longè craſſiſſimũ eſt, & quæ craſſiſſima occipitis ſedes, totaq; pariter ipſius excarnis pars intrus cauernulis cõſtat, valida eiũdem oſſis ſquama ſeiunctis, h̃ quales habent verticis & frontis oſſa, vbi pariter excarnia ſũt; Reliqua iſtiũ oſſis ſedes tenuis & valida eſt, nec non cauernulũ expers; interiore verò eius parte i lineam inſtar tuberculi eminet, quæ per ipſum mediũ ab initio partis excarnis ad dorſi vſque foramẽ exporrecta, oſſis robur non parũ adauget: vtrinq; ab hoc tuberculo interna ſede duo veluti ſinus, ſiue anguli efformant̃ quos cerebellũ implet: Poſtrema pars vltra dorſi foramẽ ſenſim, ac ſenſim craſſeſcit, donec cuneiformi oſſi cõmittatur, vbi euidenter craſſior eſt, Hoc itidẽ os externa ſede ad eiũdẽ foraminis latera modicẽ in priora, duo proponit capitula, ſiue tubercula, lõga magis quàm lata, quæ primæ colli vertebre cõmittunt, quibus tãquã fulcris caput attollimus, & declinamus. Capitula hæc duæ appēdices ſũt, vt liquido in pueris cernitur, licet in ſenioribus earũ coalitus adeo deliteſcat, vt eiũdemmet oſſis partes videãtur. Illud aduertere oportet, puerulis id os tres in partes eſſe diſtinctũ, medijs tribus lineis cartilagine oppletis, quarũ vna à ſagittalis futuræ extremo ad dorſi vſque foramina perreptat, iſtiũq; oſſis partes, quod occupat appellamus, in duo mēbra dirimit: Aliæ duæ vtrinq; e medio diſti foraminis iuxta extrema duo capita cũ priore dorſi vertebra coeũtia, in lineas, quæ cũ lambdoyde coeũt, e regione mamillariũ proceſſuũ pertinet: os tamen vnũuerſũ intus omni ex parte læue eſt, perinde atq; exteriùs ſede ipſius excarni: reliquũ qđ baſis capituli portionẽ cõſtituit, inſigniter aſperũ atq; inæquale ſeſe offert, quò muſculi firmius illi infererẽtur. Frõtis os inter durũ ac molle medio modo ſe habet, & licet iuxta ſupercilia leuiter cõcauũ ſit, paulò tñ ſuperiùs ſolidũ, ac durũ rurfus euadit, p̃ totã frontẽ ad capitulos, vſq; vbi tenuius, ac mollius fieri incipit, quoad occipitis oſſi proprius accedat, quæ ſedes, q̃ in nup̃ natis tenera ſit, à mollitiẽ bregma dicta eſt. Os id nulla in parte tenuius eſt, quã quæ oculorũ caua ſpectat, & in ea quæ octauo p̃ capituli oſſi cõmittit̃: hac enim ſede duabus admodũ tenuibus ſquamis cõſtitutũ eſt, cauus, æreũq; reſertis, nõ ſecus, ac caua ſupercilij proxima. Illud autẽ aduertere oportet, hæce cauities quas ſupercilij proximæ eſſe diximus, illis comunicari, quas in cuneiformi oſſe adeſſe dicemus, medijs quibusdã ſpiraculis poſ octauũ tranſuerſim perreptãtibus. His in ſiniũs, ſeu cauitatibus aër ſeruat̃, qui ad Cerebrũ, vt in pulmonibus, qui ad cor ipſũ deſert. Temporũ oſſa ſingula à ſeipſis inſigniter variãt, ſiquidẽ pars eorũ ſuperior, quæ verrici cõmittitur tenuis eſt, ac ſolida, exteriùs læuis, intrũs modicẽ inæqualis, & cerebri figurã referens, qđ vt ſuo loco dicemus, exteriore in parte, propẽ craniũ anfractus quõſdã & ductus, interſtorũ gyris ſimiles eſt, Inferior ſedes quæ cuneiformi, & verticis oſſi cõmittit̃, aſpera eſt, dura, & inæqualis, præſertim verò extrinſecus, vbi i lineã ijs, q̃ ab extremo lambdoidis exoriantur q̃ t.iii.ſ.vi.a

exoriuntur cōmunē,osq; occipitis à cuneiformi detrimētū,respicit. Ossa hæc punicis *Ossium tempo- rum processus-*  
instar,aspera occurrūt,ideoq; λεῖπῶς hoc est lapidea græcis dicunt.Eorū vnūquodq;

- x tab.iii. f.i. triplici ꝑcessu donatū est,vno in posteriore sede vltra auris foramē, \* q̄ à mām.æ specie  
vi. K. mamillaris fuit appellatus:altero inferiūs paulū versū interiora ad extremū sedis,qua  
et.iii. f.vi. s inferior maxilla superiori iungit,quē à \* styli scriptorij, seu galli calcaris imaginē, græci  
στῦλοειδῆ nūcuparūt.Processus hic adeo tenuis existit,vt licet solidus,leui tñ negotio  
r.iii. f. ix. x. abrūpt,ideoq; in caluarijs ē terra effossis rarō visit. \* Tertius ꝑcessus anteriore partē  
u. t.iii. f.i. a. occupās,in ꝑ processū ossis supioris maxillē dedit,externū oculi angulū efformātis;atq;  
x ead.o. ambo acie constitūt,os iugale dictū,q̄ iugū vti dicemus,similitudine referat:In medio  
y ta.iii. f.vi. rica remanēt. Haud secus variū est ꝑ cuneiforme os,ideoq; illud veteres πωλομορφον, Cuneiforme os.  
uoo. t.v. f.iii. hoc est multiplicis figurę,appellarūt:Id ad latera & in tēporū cavis tenue ac solidū est;  
z tab. v. f.iii. spectat, intus cauū;in cauo autē duo adsūt z antra,tenui \* eiūsdē ossis squama interfin-  
C.D. dā;in cuius inferiori ēt sede minus cōstitit antrū eodē modo circūscriptū. Neutra verō  
a t.v. f.iii. E. vsq̄a pūa sūt q̄ in frōtis, & b nariū cauū,et si Galenus hāc ossis partē instar cribri pfo- Cuneiforme os  
b ead.F. ratā esse,cēfuit,quō p eā capitis pūita expurgaret. Sed in hūc vsū qdā c veluti glādula peruium nō ē.  
c lib.v. t.ii. f. in sinu eo delitescit, quā os illud in crassiore sui parte habet cerebro puā, & equi sellæ  
xiii. s. f. xv. F. pquā similē: Ab ea duo meatus emanāt,minimū caui, p quos pūita expurgat,quem-  
f. ix. A. admodū,vbi capitis foramina in genere ꝑsequemur, ostēdemus.Sūt insup huius ossi lex Ossis cuneiformis processus.  
d t.v. f.i. y. ꝑcessus veluti alæ qdā, d duo iuxta crassiorē ipsius partē, q̄ cerebrū spectat, q̄ cētrū seu  
e ta.iii. f.vi. radicē vtriusq; oculi constitūt,papilionis alarū effigiē exprimētes; c duo ad latera, qui  
oob. t.v. f.iii. tēporū caua implēt fūb ossē iugali vespertilionū alis similes: & duo potremi in f infe-  
II. riore parte, q̄ à suis lateribus in postremos dentes maxillares descēdūt,ac veluti incuruā  
p ta. iii. f.vi. ianua cōstitūt,ad principiū cavitatis narium palatū respiciētis, eandē propē figurā cū  
pPy. tab. v. f. magnis exhibētes,vnde os πτερυγοειδῆ dictū fuit,quasi alarū dicas:in duarū alarū me-  
iii. H. dio sinus adest, à quo, vti dicemus, validus exoriet musculus, s in ore delitescēs, inferio-  
g li. ii. t.vi. D risq; maxillæ motū adiuvās. Octauū capitis os (quod foramē ossis frōtis nares spectans Olfactum capi-  
tis os.  
h tab.i. p: quod habet processū alterum in h inferiore sede, qui nariū foramina interfecat, & se-  
i t.v. f.i. u. cundo superioris maxillæ ossi iungitur, vti diximus;alterum in superiore parte cerebrū  
respiciente, qui sedem vtrāque interfecat, qua sita sunt olfactus organa.

De Aurium Ossiculis .

Cap. 3.

E T si Galenus,ac Vesalius post capitis ossa statim ad os iugale deueniūt, q̄ processus  
ossū tēporaliū portio existat: nihilominus cū ex alio etiā ꝑcessu primi ossis supe-  
rioris maxillæ fiat,haud mihi de ipso dicēdū esse,ante absolutā ossū eius maxillæ tracta-  
tionē,visū est,ad quā statim aggrediar,vbi de ossiculis intra aures existētibus dixero. Iā  
docuimus,vtriq; tēporū ossi cavitatē insculpi,q̄ auris dī. Hæc quatuor à se ꝑducit fora-  
mina, de qbus sigillatim suo loco dicemus, nūc de primo solū verba faciā,q̄ ad dicēdo-  
rū explicationē necessario requirāt.Id à principio cavitatis ossū tēporaliū exortū, in ca

- at. t.v. f.iii. A. pitis cauū, quo cerebrū continet,instar cochleæ anfractuōsus tendit; In eo sinus quidz Primum tempo-  
seu cavitates adsūt,q̄ nō secus,ac illud tenui mēbrana cōtegunt, quæ alterius neruorū raliū ossū fo-  
ramen.  
b t.v. f.iii. b. b quinti paris Cerebri soboles est.Ex hisce cavitatibus,q̄ admodū variæ sūt,atq; dissimi-  
c t.v. f.iii. H. les,vna est c orbicularis,& plana osseo circulo aliquatūlū extuberātē circūseptā:In hac  
d tab. v. f.iii. tria reperiunt ossicula: Primū d ad circuli exteriorē auriq; pximā sedē duobz tenuibus  
IO. ꝑcessibus seu cruribus innitit,firmaturq; horū exterius ac c auri proximius,breuius  
e t.v. f.iii. r. est,crassius,latiusq;ue, in apicem deficiens: Interius vero consistens (quod membranæ Primum auris  
orbicularem illam cavitatis sedem succingenti, propinquior est, immo in eam magis ossiculum.  
f t.v. f.iii. quam in exteriorē inseritur) longius & tenuius est, in incuruū apicem quasi vn-  
quam deficiens,quo ea membrana adhæret. Os id quadrilaterum supernē est & planū;  
maiori q; ipsius sedes plana, reliquū orbiculare est, ita vt incudem, seu maxillarem dē-  
tem referat, cū binis tantum donetur processibus, ipsius radici similibus. Hoc se cōspi-  
cium exhibet, auris foramine per mediū discisso. Intra hoc idē foramen, iuxta eā cau-  
tatē tenuis admodū membrana subest, instarq; nitri pellucida, q̄ operculi modō tegit  
obturatq;

Secundum ofsi-  
culum.

obturatque principium cauitatis aurem spectantis. Huic membranæ secundum ofsi- g tab.v.f.iiii.  
culum transfuersim infernitur, ( non secus atque in tympano chartæ pergamenæ fides CLMNPQ  
subtenduntur ) longum, tenue, modiceque vt fémoris os incuruum. Hoc superiøre parte duos sibi exiguos processus vindicat, ijs similes, quibus ipsum fémoris os donari diximus, quorum beneficio membranæ firmitus adnectitur. Vltra hos processus in exiguum caput idque rotundum ac læue definit, ita vt si duo ofsis fémoris capita demas quæ iuxta genu sunt, tanto illius figuræ similis reddatur, quanto magnitudine diffidet. Exiguum hoc caput à membrana parumper introrsum abscedens alterius ofsis parti incudi simili, tenuissimarum membranarum interuentu committitur, haud secus ac si quis malleum incudi alliger. <sup>h</sup> Tertium os triangulare est, ferreo instrumenti quo <sup>h</sup> t.v.f.iiii. z.  
equo insidentium pedes nituntur, simile, iacetq; in eadem cauitate prope cæcum foramen, eiq; inniuitur maior primi ofsiculi processus.

### De Ofsibus Maxillæ superioris.

Cap. 4.

Primum maxillæ  
superioris os.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Sextum.

Aliud maxillæ  
huius ofsiculi.

Prima sutura  
superioris max-  
illæ.  
Secunda.

**Q**Uæ inter os ac supercilia intercedit facies, superior maxilla dicitur, ex duodecim constata ofsibus, vtrinque senis, nō minus magnitudine, quàm figura varijs, licet omnibus propè tenuibus ac duris, quò minus pōdere grauēt, firmissq; iniurijs resistāt. <sup>a</sup> Horum <sup>a</sup> primū externum oculi angulū constituit à finibus superciliorū ad proximā <sup>a</sup> tab.iiii. f.i.  
vsq; nasi sedem, non minimam malæ portionē, alteramq; ofsis iugalis sedē efformans, <sup>QQQ</sup>  
vt mox dicemus: Secundum <sup>b</sup> quod instar squamæ tenuē est, ac propè rotundum, in in- <sup>b</sup> ead.n.  
terno sedis oculi angulo consistit, iuxta lachrymalem: estq; inter maxillæ ossa minimū: Hoc rarò in caluarijs ē terra effosis visitur, & ob insignem ipsius tenuitatē, & quòd in fede summē humida resideat, vbi facili negotio putredinē acquirit. Os id octauū capitis ofsis pars, procul omni dubio videtur, quod cuius caluariam per mediū secanti, osq; octauum integrum extrahenti facili erit intueri, nam medijs quibusdam squamis ea inuicem cōmissa deprehendet. <sup>c</sup> Tertium huic statim succedit, quadrangulū, & paulo <sup>c</sup> ead.p.  
maius totū id spacij, quod ab extremo secundi ofsis ad oculi centrū est, cōprehendens, adeo tenuē, vt instar squamæ pelluceat: si effringatur, quibusdā in tus finibus, alijs squamis circundatis plenū cernitur. Quartum <sup>d</sup> cum suo pari cui cōmittitur, ( sunt hæc om- <sup>d</sup> ead.ss.  
niū maxillæ ossium longē maxima, dentes omnes excipientia ) vniuersum ferē palatū, nec non maximā nasi laterū partē, omnemq; propè inferiōrē ipsius sedē cōstituit. Po- stemis tamē hisce duabus partibus ea ne utiquā solida sūt, sed foraminibus instar suo mellis peruia. His præter alia ipsorū foramina vnū accidit ( in malæ acumine id nititur, in oculorū cauo incipiēs ) quod et si à principio tenui squama circundatur, tamē paulo ante, quā terminetur, penitiūs in valido osse exculptū est: parua super ipsū linea ad forame tantūmodo pertingēs visitur, neq; vero altius altera subit, quæ in aliquibus pueris in initio palati apparet, ad caninos dētes pertingēs, quæ nulla ( quā quidē ego viderim ) ratione in priora tēdit, vt in brutis fit animāibus. Quintum <sup>e</sup> & quod illi ex opposito la <sup>e</sup> ead.q.  
tere est, anteriōrē omnē nasi sedē ad cartilagine vsq; suas, & laterū medietatē consti- ruunt, suntq; dura, solida, tenuia, infernē quā supernē latiora. Sextū simul cū suo cōiuge <sup>f</sup> palati extremū, & nariū amplitudinē in os pertinentē cōstituit; suntq; ossa hec lata <sup>f</sup> ta.iiii. f.vi.  
tenuia & valida; Posterioris autē cuiuslibet ipsorū regionis latera apicibus processuum cu neiformi subiacentiū innituntur; Altera medietas in aere pendet literam C referēs. <sup>III</sup>  
Hisce duodecim ofsibus aliud accedit § inter cuneiforme & palati ossa situm, quod na- g ead.ss.  
si cauum in palatum pertineas diuidit, viderutq; eo caput sustineri: Id aratro simile est, cuius seorsum non meminit Vesalius, quòd exigui sit apud ipsū momenti. Hæc inuicem omnia lineis quibusdam distinguuntur, quas semper tum clarioris doctrinæ gratia, tum quòd eas Galenus hoc nomine appellet, futuras vocabo. Quoniam verò de capitis ossium futuris agentes, eas etiā quæ superiori maxillæ communes erant enu merauimus, nūc ipsius proprias prosequemur, quæ nouē sunt, quatuor vtrinque in me- <sup>h</sup> tab.i. P.  
dio vna. Prima <sup>h</sup> quæ media est, vniuersā maxillā à supercilijs ad palati extremū per lon- <sup>i</sup> l.iiii. f.i.y.  
gitudinē secat: secūda <sup>i</sup> sub offe iugali exoritur, ab ea quā per temporū caua tēdere dixi- <sup>fi</sup> v.d.  
mus, indeq; decliuus procedit, eminetiā in priore efformās, ad apicē vsq; ofsis malæ, tū ductū obliquo, in priora ferē per mediū eiusdē malæ partim rectā, partim obliquē, do- nec in

K. ta. i. n.

l. t. iiii. f. i. m.

m. t. iiii. f. i. q.  
p. ta. iiii. f. vi.  
u. u.

o. t. iiii. f. i. a.

nec in oculū ingrediat sup foramē <sup>k</sup> quarti ossis, rursusq; in arcū intra eundem oculū, extremū angulum versus tēdit, donec eō vnde inceperat, ptingat, iuxta timā quæ in inferiore cavitatis oculi parte visit: Tertia secūdā similis eodem tramite in opposito latere incedit: <sup>Quarta,</sup> Quarta iuxta lacrymalē incipit, & per oculi exteriora descendit, in eā vsq; sedē, in quam secūda ingressa est, vbiq; in ipsum fert in supiora obliquē aliquāculū tendēs, ad mediā ppē oculi cavitatē vbi ramulum edit, qui in superiorā itidē repēs (priora uersus) ei quā os frontis à maxilla superiore dirimere diximus, committit, iactō hoc ramo, ad cetrū vsq; oculi pgregreditur, vbi in orbē parump ascēdēs, rursus cum ea cui ramulū cōmitti diximus, coit. Quinta in altero latere eodem ductu pcedit. Sexta & septima <sup>m</sup> à supciliorum intijis exortæ, recto tramite per nasi latera in ipsius cartilagine ferunt. Octaua <sup>n</sup> palatū tranſuerſim circuit, iux ta ipsius extremum, ab imis maxillaribus incipiens, e futura qua superiorem maxillā à cuneiformi dirimi diximus, & anteriora versus in orbē fert, donec in medio primæ futuræ cum nona coeat, q̄ ab opposito latere eundē ductum seruat, sitq; ex vtraq; circulus. Hæ, quas diximus, futuræ ppriæ, atq; cōmunes maxillæ superioris ossa à se inuicem & ab ossibus capitis, <sup>Ossium maxil. huius dici. so.</sup> hunc in modū dirimūt. Primū à quarto p secūdā futurā diuidit: à cuneiformi medio illius q̄ per tēporū ossa decliuis terebat (eāq; est q̄ in oculorum cauo conspicit) ab ossibus tēporum bñficio illius, quē <sup>o</sup> literæ, similis est, & duos pcessus os iugale efformātes iungit: ab ossē frontis medio illius quā in oculum per externū angulū iuxta extremū supciliorū ingredi diximus. Secundū os a quarto dirimit pars tertiæ linæ quæ ab interno oculi angulo tantisper fert, donec ramulū edit in cetrō itidem oculi (vbi diximus) cuius beneficio a tertio dirimitur: ab ossē vero frontis eius linæ parte seiungitur, qua frontis os a superiori maxilla separari diximus. Tertium a quarto distinguit maior illius linæ pars q̄ ad oculi vsq; centrū perreptata cuneiformi illud huiuscemet linæ extremū diuidit: ab ossē frontis eiusdē linæ sedes, q̄ secundum ab ossē frontis dirimebat. Quartum os ab ossibus nasi sui lateris seiungit quarta futura: à suo vero cōiuge pars futuræ cōmunis, q̄ a nasi fundo in palatū ferē regreditur: a primo, secundo & tertio, medio dictarū linearū se iūgitur; ab ossē frontis iuxta lacrymalē medio per quā exiguæ linæ, quæ a supciliij principio ad proxima lacrymalis loca prorepit, quæ pars exiit illius, quā toties superiorem maxillā a frōtis ossē seiungere diximus. Quintū a suo pari, communis futuræ principio distinguitur: ab ossē frontis extremo illius quæ ipsū a tota maxilla dirimit: a quarto, quarta vt diximus futura. Sextum a suo pari extremū cōmunis futuræ diuidit: a quarto quinta futura: a cuneiformi parte illius futuræ suæ linæ quæ per tempora descendens, & per extremos maxillares, versus priora obliquē fertur. Atq; hæc sunt maxillæ superioris ossa atq; futuræ.

De Ossē iugali.

Cap. 5.

ata. ii. FF.

b. ta. ii. f. t. iiii.  
f. i. z. f. vi. 7.

c. lib. ii. ta. i. B  
ta. ii. A.

In temporum vtroq; pōticulus ex duobus <sup>2</sup> pcessibus efformat, quorū alter ex priore maxillæ superioris ossē, alter ab ossē tpm pdit, hic lōgiōr multo est, sed tenuior, ille cōtra se habet. Processus hi i tpm medio simul coeunt per lineā seu harmoniā <sup>b</sup> literæ similem, iugūq; vt diximus efformāt q̄ græci *πύγωνα* latini iugale os appellarunt, q̄ boum iugo simile sit: Id etsi ossis nomine donat, te vera tñ os nequaquā est, est aut i id paratū vt tpm <sup>c</sup> musculo q̄ maxillā inferiorē claudit ppugnaculū esset, quē admodum suo loco dicemus, ideoq; durum effectum est, foris gibbum, intus vero cauum, quōd minis incommodaret.

De Maxilla inferiore.

Cap. 6.

ata. iiii. f. vii.  
& viii.

Inferior maxilla dicitur, pubis totius, inferiorum dentium ac mandibularum regio; <sup>2</sup> hanc duo cōficiunt ossa, extremo mēto agglutinata, in infantibus quidem per lineā suæ harmoniā cartilagine oppletam, vt sit in occipitis ossē, in grandioribus vero per symphism suæ vnionem. Ab hac linea aliquot musculorum tēdines labrum <sup>inferius</sup>

Inferior maxilla cū os non est.



Prior maxillæ  
huius proces-  
sus.  
Alter.

Animantia oia  
crocodilo &  
Pſitaco exce-  
ptis inferiorem  
maxillā mo-  
uent.

Dimota maxil-  
la ut reponat.

Duo maxillæ  
huius forma-  
na.

inferius mouētes prodeunt. Hæc autem maxilla in summo mēto lata est, vbi in homi-  
ne summa cum difficultate tam cocta quàm cruda discinditur; hincq; sensim ad ex-  
tremas vsque mandibulas minor euadit, vbi rursus<sup>b</sup> lata, sed tenuis magis efficitur,  
sicque aures versus tenuior semper euadens ascendit, donec in duos processus veluti  
cornua desinat, quorum prior qui latior est, c in mucronē productus sub osse iugali  
desinit, in eumq; , vti dicem<sup>9</sup>, tēporum musculus validissimē inserit. Alter, (qui ro-  
dior est, habetq; ab extremo Appendicē maxillæ, in homine adiunctam, ideoq; incō-  
spicuā) in paruulū sinū inter iugalis ossis radicem & d anteriore auditus organi sedē  
inſculptū inserit, ampliorq; vtrinque redditus capitulū edit, quod faciliorem maxillæ  
motū efficit, quæ sola in homine cæterisq; animantibus mouetur, exceptis Croco-  
dilo, qui superiore tantūmodo, & Pſitaco qui vtrāq; mouet. In hoc sinu, præter car-  
tilaginē oibus articulis communē, altera viſit inter maxillæ capitulum, ipſumq; repo-  
ſita, ligamento aut tendini quodammodo ſimilis: hæc nunquam ex ofsibus, sed ex li-  
gamentis articulum in orbē continētibus enaſcit; eius ope dura ossa inuicem maiori  
ex parte cōmittuntur, tum vt facilius eorū motus reddatur, rum vt ex assiduo motu mi-  
nus offendant. Solet nonnunquā maxilla hæc, ore nimium diducto, ex sede dimoue-  
ri, verū facile reponit, si ad auris summū, pollicem admoueat i priora paululū, ac va-  
lidē in trorsum ab utroque deinceps latere adigas. Donatur præterea maxilla hæc duo-  
bus vtrinque; foraminibus, quorum e alterū ab interiori regione nō procul a nūc cō-  
memoratis processibus incipiens, in exteriorem pertinet ad imū labrum, inter dētis  
canini & p̄ximi maxillaris<sup>f</sup> radicem. Foramina hæc principio grādiōra sunt, minusq;  
rotunda, quorum vtrūq; viam præbet nerui<sup>8</sup> ramo tertij paris, qui ad dentiū radi-  
ces vti dicemus tēdit vnā cū vena & arteria, p̄ditq; per imum exterioris longē mino-  
ris, in multos dispersus ramulos p̄ inferius labrum disseminatos. Præter hæc forami-  
na alijs prorsus nullis inferior maxilla prædita est, nam alueoli quibus dētes implan-  
tant, re vera foramina nequaquā sunt. Cæterum maxilla hæc<sup>h</sup> latiori, tenuiori q; se-  
de ad summi menti regionem, asperitatibus insuper i quibusdam extuberat, quibus mu-  
ſculi eam mouentes firmitus inseruntur.

b. ta. iiii. fi. i.  
fi. vii. & viii. E  
c. ta. ii. l. t. iiii.  
fig. i. S

d. ta. ii. l. t. iiii.  
fi. i. h. fi. viii. A

e. iiii. fi. viii.  
F

f. t. iiii. fi. vii. G  
g. li. b. vij. ta. i.  
fig. ii. T

h. t. iiii. fi. viii.  
H D

## De Dentibus.

## Cap. 7.

Dentes sentit  
augenturq;.

Dentes trigin-  
ta duo.

Nemo absq; de-  
tibus in lucem  
prodit.

Singulis denti-  
bus adest ner-  
uus, vena &  
arteria.

Quamuis à reliquis ofsib<sup>9</sup> dētes distinguant, tū sensu, & quia denudati sunt, quod  
cæterorū nulli cōtigit, tū etiā quod toto vite tempore incrementum suscipiāt, vt  
in his cōspicit, q. b<sup>9</sup> dēs aliq; exēp<sup>9</sup> est, nā illi opposit<sup>9</sup> cū à suo pari nō arceat,  
nequaquā cōsumit, sicq; extra reliquorū dentium seriem fucereſcit, q in tātam mo-  
lem assurgunt, quāta in dies masticatione deteritur; Nihil hominis ab aliorum ossiū  
numero minimē ideo excludēdi sunt, cū nullum præterea ipsi nomen appositē ma-  
gis adaptari queat. Sūt autem<sup>a</sup> dentes numero trigin- ta duo, vtrinque; sexdecim, donan-  
turq; singuli appendice, q̄ pueris ante annū septimū vel nonū decidit; & quod vulgo  
de ipsorū mutatione fert, aliud nihil est, quā huiusce appēdicis amissio, cū enim dētes  
ex spermatidis corporis nr̄i partibus existāt vbi, semel deciderint, nunquam postea re-  
nascunt. Quod si quis mihi obijciat, eos, quod nō ante vnū ab ortu annum nascant,  
partes spermatidas nō eſſe, respōdeo neminē sine illis in hanc lucem prodire; Quod  
vero minimē spectatib<sup>9</sup> occurrāt, p̄pterea fit, q̄a toti ginginis obteguntur. Horū prio-  
res quatuor græcis τομας hoc est icisorij dicti sunt, his em̄ ingestos cibos cōfringimus  
atq; horum lingulis vnica subest radix. Canini deinceps vtrinque; singuli cōstitunt, sic  
dicti quod canum dentes similitudine referant. Ultra hos maxillares quini ab vtroq;  
latere habentur, latinis molares dicti, quod his cibum conteramus. Verum ex  
his inferiores binis radicibus nuntur, quandoque etiam ternis; superiores ternis,  
nonnunquam verò quaternis præsertim postremi duo: sunt & prioribus al-  
tiōres radices quàm posterioribus: omnium tamen radices perinde ac incisorio-  
rū, & caninorū in summo exiguum foramē habent, quod neruo, venæ, atq; arteriæ in-  
gressum præbet: estque illud circa maxillarium numerum obseruandum, nonnullis  
quaternos tantummodo vtrinque eſſe, alijs quinos ab vno laterum, ab altero qua-  
ternos

a. ta. v. fig. v.



Secundum.	¶ neruorum cerebri par. Secundum ¶ ex medio prioris assurgit ferturq; in posterio- ra, quousque in exteriorem istius ossis sedem contendat: Id angustum est, anfractu- sum, dictumq; grecis <i>τρυφλόν</i> , latinis cœcum, quod additum sit ipsius principium;	q tab. iiii. f. v. a. r. v. fig. i. a r. iiii. f. vi. Y
Tertium.	ac ¶ ramulum quinti paris neruorum cerebri transmittit. Tertium ¶ sese extra cranium (licet cum difficultate) conspicuum exhibet ductuq; obliquo versus auris foramē ten- dit, donec introitum in illud pertineat, quod iudem, non iniuria cœcum dici posset cum secundo, et si grandius multo est, & obliquum minus: Per id, strepitum ab ore in aures deferri percipimus, cum aere vel aqua os refertum habentes, aquam per eas extrudere nitimur. Per ipsum quoq; secundus quinti neruorum cerebri ¶ paris ramu- lus & ¶ soporalis arteriæ propago feruntur. Quartum in media istius ossis fedē pūmi- cem referente insculpitur, ¶ atq; à posterioribus in priora per mediam ossis longitu- dinem fertur, quousq; in lineam pertingat, quæ cuneiforme ab occipitis osse dirimit, non procul ab vndecimo cuneiformis ossis foramine nasi concauam (pectante, datq; soporalis arteriæ viam. Ex occipitis foraminibus primum ¶ Quartum est, omniumq; totius capitis foraminum longè maximum, quod medullæ spinali aditum præbere diximus. Secundum & tertium, à suo vtrunq; latere super bina istius ossis b. capita- la incisa sunt, atq; à posterioribus ¶ anteriora tendunt, suntq; parua & rotunda, ac d. se- primum cerebri neruorum par transmittunt, Quartum in posteriore ¶ alterius verte- bræ istius ossis fedē vīsitur, quod illinc vbi dicta vertebra primæ colli vertebra com- mittitur incipiens, per mediam ossis latitudinem paululum subit, tantisper in priora repens, donec in sublimiorem alterus commemoratorum foraminum sui lateris, sedem desinat. Huic foramini, Quintum oppositi lateris, correspondet, præbentq; ambo ¶ venæ atq; arteriæ viam, quæ per processum laterum vertebrarum colli fora- mina prorumpunt, Sextum & septimum ¶ è regione illius futuræ conspicuntur, quæ ex sinibus lambdoidis exoritur, paulo antè quam in processum ossis temporum mam- millisimilem pertingat: quinimo exteriore sua fedē & istius ossis interiore, in medio dictæ futuræ assident: horum vtrunq; ramum venæ iugularis exterioris transmittit, Communia foramina. Communion foraminum primum & secundum, ¶ inter occipitis & temporum of- sa, vtrinq; vnum, sita sunt, in medio eius futuræ, quæ à sinibus lambdoidis exori- tur inter alteram ossis temporum pumici similis partem, & occipitis ossis capitula: Hæc mediocriter grandia sunt, non ideo tamen læuia, non æqualia, ac per ea venæ i in- terior iugularis transmittitur, simulq; pituitæ à capite destillantis portio expurgatur. Tertium & quartum cuneiformi, occipitis, & temporum ossibus communia sunt, ¶ ad extremum lineæ ex sinibus futuræ lambdoidis exortæ, vtrunq; à suo latere, ¶ sopor- alis arteriæ gratia, exculpta sunt & præter commemorata, quamplurima in capitis ossibus foramina, ¶ qualia in osse octauo habentur, complura quidem illa & satis exigua, inter quæ vnum cæteris paulo grandius vīsitur, ad istius ossis principium, quæ frontis ossi adiungitur, per quod exterioris venæ iugularis ramulus transmittitur; qualia item intra cranium vīsuntur; ad sagittalis commissuræ latera, potissimum verus sinus lambdoidem, per quæ in cerebrum ramuli aliquot iugularis venæ exterioris ferun- tur, alij verò nonnulli ex dura meninge in Pericranium tendentes prodeunt; qualia etiam in frontis osse iuxta supercilia occurrunt, Verum enimvero hæc propriè forami- na nequaquam sunt, cum vniuersos minimè peruadant, ideoq; illa silentio inuol- uam. Superior maxilla tredecim donat foraminibus, sex proprijs, totidemq; com- munibus; ex proprijs primum & secundum in quarto istius maxillæ ossium pari ha- bentur, habentq; à suo vtrunq; latere à medio inq; partis oculi orbitæ principium, & in malas vīq; decliua feruntur, atq; ea sunt inter q̄ in ipsis ¶ vīsuntur: Horum princi- pium tenuis ossis squama, extremum verò ipsum os circumambit; perq; horū vtrū- que secundus ¶ ramulus tenuioris radices tertij paris neruorum cerebri transmittit- tur. Tertium & quartum in sexto ossi ¶ pari vtrunq; in suo situantur, non procul à postremorum maxillarium radicibus, tenduntq; in oculi centrum ambo in suorum laterum foramina ¶ pertinentia, quæ pituita in nasum desinit. Iuxta hæc duo, vtrinque, nonnihil ad posteriora, exiguū aliud ¶ spiraculum adest in ipsa vt plurimum pertines, nonnuncquam verò inter futuras definens, quibus quartū istius maxillæ os cunei- formi cōmittitur; Hæc ramulo quartij ¶ paris neruorū cerebri per palatum disseminato egressum	lib. vii. t. i. f. i. ii. c. r. iiii. f. vi. V u. li. vii. t. i. fig. ii. G. x lib. vi. t. i. f. i. i. n. y t. iiii. f. vi. V. z lib. vi. t. a. v. fig. x. l. a. t. iiii. f. vi. z. r. iiii. f. vi. ll. c. t. v. f. i. d. d. r. a. v. fig. ix. oo r. t. iiii. f. vi. z. f. lib. vi. t. v. ff. g. r. a. v. fig. i. y. h. tab. iiii. f. v. z i. li. vi. t. iiii. f. i. D. f. t. i. S. K. t. iiii. f. vi. f. i. lib. vi. t. a. iiii. L. t. iiii. d. m. t. v. f. iiii. A. n. t. i. t. iiii. f. i. inter Q & S. o. lib. vii. t. a. i. f. i. o. p. r. a. iiii. f. vi. n q. r. a. iiii. f. vi. a r. i. vii. t. i. f. i. z
Superioris maxilla foramina Primum & se- cundum ex- prijs.		
Tertium & quar- tum quintum & sextum.		

egressum præbent. Ex communibus primum iuxta oculi lachrymale<sup>s</sup> inter se-  
cundum & quartum istius maxillæ os situm est, & in nasi usque concauum decliue  
fertur; ac primum priorum paululum magnitudine superat; cum tamen nonni-  
hil delitescat, in caluarijs minimè conspicuum occurrit, ideoque haud mirum est  
omnes illud silentio præterisse. Per hoc foramen tertius ramus, tenuissimæ radices  
tertij paris neruorum cerebri fertur, nec non etiam pituitæ in nares, & palatum  
delabentis portio, secundum eandem ab opposito latere structuram feruat. <sup>Primum for-  
men ex commu-  
nibus.</sup> <sup>Secundum.</sup> <sup>Tertium.</sup> <sup>Quartum &  
quintum.</sup> <sup>Sextum ex se-  
ptimum.</sup>  
Tertium in medio prioris maxillæ futuræ exculptum est ad primos anteriores dentes,  
intra fauces, inter quartum os, & suum par. Hoc etsi in hominum nonnullis duas in  
partes, quæ denuo protinus coeunt, discissum cernitur, ferè tamen vnicum est. Quar-  
tum & quintum totius maxillæ foraminum maxima existunt, atque ambo suum  
oculum ad imam concaui sedem occupant, cuneiformi, & primo eiusdem maxillæ  
osis communia; ac per ea prior ramulus<sup>s</sup> tertij paris neruorum cerebri in tempo-  
rum musculum contendit. Sextum ac septimum narium sinus constituunt, quos, ut  
diximus, inferior octauæ osis processus discriminat; naturali præcipuè inspirationi  
vocique, præter alios vsus quos habent complures, idonea. Præter commemorata  
foramina alia quamplurima, sed exilia, venarum & arteriarum ramis quibusdam  
transmittendis exculpta sunt: Huius generis aliqua visuntur è directo interioris  
oculi anguli, iuxta futuras secundo, & tertio istius maxillæ osibus communes. In  
nasi quoque osibus huiusmodi occurrunt foramina, nec non in primo superioris  
maxillæ osse, in parte osis malæ, in qua nunc vnicum, nunc bina conspiciuntur.  
Tale insuper in quarto eiusdem maxillæ osse, inferius à lacrimali afsidet. Atque hæc  
sunt capitis, & maxillæ superioris foramina tum propria, tum communia, numero  
nouem & quadraginta: Quod si aliquod nobis memoria excidit, suo illud loco  
recensebimus.

De Osse Hyoide.

Cap. 9.

Minentissimæ laryngis parti ad linguae radicem affixum<sup>s</sup> os reperitur. <sup>Lib. iij. c. v. L.</sup>  
Eius, siue *hyoidæ*, dictum quod u græcorum literæ per quam simile existat, & vn-  
decim ferè osibus extructum: quorum<sup>b</sup> primum, quod facile ad motus ad nucam  
digitis occurrit, omnium latissimum est, foris gibbum ac tubere prominens, intus  
vero concauum. Supra sede in obliquum, ac modicè ouatum sinum deprimitur,  
pro musculorum, quos in eos inferi dicemus, ratione. <sup>b. v. f. vij. A. B.</sup> <sup>ead. E. F. I. K.</sup> Huic ofsiculo alia duo,  
utrinque adstant, istius osis latera constituentia; Alterum humilius quod breuius  
est, sed latius, cuius extremum superiori processui primæ cartilaginis laryngis colli-  
gatur; Alterum elatius, idemque angustius & longius, quod ex ternis quaternis ve  
ofsiculis, haud secus ac suum par ab opposito latere, ferè construitur, quæ simul in-  
uicem continuata serie tantisper coeunt, alliganturque, quousque temporum osis  
processui styli scriptorij imaginem proponenti, compingantur. In mulieribus ve-  
rò nonnullis, ofsicula hæc desiderari contingit, ipsorumque vicem teres quoddam  
ac validum ligamentum gerit, quod in commemoratum processum inferitur,

De Dorso.

Cap. 10.

Dorsum os aqueductum quendam ex multis constructum riuius similitudine re-  
fert, per quod medulla è cerebro ad Coccygis usque os porrigitur; <sup>Lib. i. c. v. f. j.</sup> <sup>b. tab. j. lib. ij. ex. v. f. x. vij. s. 2. 3. 4. 5.</sup> constatq;  
ex triginta ut plurimum ofsis, quæ Spondylia Græci, Latini Vertebrae appella-  
runt. Horum vnum quodque, primo excepto, anteriore sede, quæ vertebræ corpus  
dicitur, latum est & propè sphericum; corpus tam supra quam infra sede b  
Appendice donatur: inter vnam verò & alteram appendicem. cartilagineum ligamen-  
tum interiacet. Corpus foraminulis quibusdam incerta serie sparsis incisum specta-  
tur, & quibus nullum insignius sese offert, eo quod in interiore corporis regione si-  
nalem medullam spectante sedem habet, satis magnum pro vertebræ mole, atque  
*Anat. Val.* <sup>B</sup> in mul-

*Dorsi vertebra-  
rum processus,*

*Foramen ner-  
uis egressu præ-  
bens,*

*Connexus ver-  
tebrarum dorsi,*

*Dorsi luxatio,*

*Dorsi divisio in  
vas partes.*

in multa definens exigua spiracula. Porro tum hoc, tum reliqua, ramulis aliquot venarum & arteriarum aditum præbent, quæ ofsibus hisce vitam & nutrimentum largiuntur. Reliquis in partibus vnaquæque vertebra multos vndique processus veluti spinas obtinet, vnde omnes Spinæ appellationem sortiti sunt. <sup>c</sup> Horum processuum alij sursum, alij deorsum, quidam in latera, quidam in posteriora feruntur. Inter posteriorum vnumquemque (ex his qui appendice donantur, quorum magnus est numerus) media afsidet cartilago, ne ofsibus noxa ex motu accedat. Haud secus quoque inter singulas huiusmodi vertebas, quoddam <sup>d</sup> vtrinque foramen iacet (vnde egressus neruo, venæ autem & arteriæ, vt suo loco dicemus, ingressus patet) quod fit singulis vertebis leuiter in sinum depressis, licet non æqualiter omnibus; siquidem in colli vertebis, quo propius imo acceditur, tanto superior vertebra inferiore magis exculpta est; In lumborum vertebis res contra se habet; thoracis autem vertebra æqualiter omnes excuantur. Omnes hæ vertebrae ad os vsque sacrum (duas priores excipio, quarum altera corpore, altera superiori appendice destituitur) suis inuicem corporibus vinciuntur, non membranarum, aut tunicis spinalium medullarum ambientibus, sed medio ligamentorum, quæ inter corpus vnumquodque, ac suam appendicem enascuntur tam inferiori quam superiori sede; medio insuper <sup>e</sup> cartilagineo ligamento, quod singulis interiacet corporibus. Exteriore sede inferiores superioris vertebrae processus cum superioribus sequentis vertebrae processibus coniunctione Arthrodia dicta, quæ Diarthrosis species est, articulantur. Vertebrae tendinibus quibusdam ab ipsis exortis, arte adeo vinciuntur, vt citra luxationis periculum facile omnes moueri queant. Sed illud animaduertere oportet, si eas (vt fieri solet) luxari contingat, vnam aliquam exilire ac dimoueri perniciosius esse, quam multas simul; sic enim spinali medullæ, noxæ minus infertur. Sunt hæ vertebrae vt diximus, peruiæ, sed inæqualiter, à summo enim ad imum nonnihil angustatur foramen, ita vt licet æquæ omnes perforatæ sint, magnitudine tamen foraminum differant: & quemadmodum superioris vertebrae foramen, inferioris foramine grandius existit, sic inferior vertebra superiore magnitudine superat, quò scilicet superior minus pondere grauet, inferior vero validius onera sustineat. Dorsum quatuor in partes vniuersum diuiditur, in Collum, Scapulas, Lumbos, & os Sacrum.

## De Vertebis Cervicis. Cap. I I.

*Cervicis vertebrae septem.*

*Posterioribus processibus.*

*Dua vertebrae alijs distinctas.*

*Duo prima vertebrae sinu.*

Quod ab occipitis extremo ad humeros interest, Cervix appellatur, <sup>2</sup> vertebis septem constans, quarum priores duas vndique simul iungunt ligamenta quædam, quæ ab osse occipitis exorta illas extrinsecus ambiunt, reliquæ anteriore tantum sede, quam vertebrae corpus vocamus, colligantur in eum, quem superiore capitulum vertebrae modum; Vertebrae quoque omnes, posteriores processus bifurcatos obtinent, prima <sup>b</sup> excepta, quæ durior, & solidior est, ac latiore alijs donata foramine, verum tenuior illis, nec parum structura differens existit; quandoquidem, præterquam quod grandius multo ipsi foramen adest, corpus etiam intus concavum obtinet; & in eo sinus efficitur, cartilagineo circumdatus, <sup>c</sup> quo processus dentiformis, quem secundam <sup>d</sup> vertebrae promere dicemus, excipitur: Solidi vero corporis quo destituitur, loco, tuberculo quodam in anteriori sede augetur. Huic præterea ad latera vtrique cavitatis medullæ, (qua parte validior est quam cæteris) <sup>e</sup> sinus insculpitur oblongus, exterioribus lateribus nonnihil prominens, interioribus vero excavatus, ita vt ambobus simul iunctis, absolutus sinus euaderet. Sinus hi duo, <sup>f</sup> occipitis ossis capitula, græcis improprie admodum *κορυμβας*, hoc est, Acutos processus dicta, excipiunt; ac super ea capitulis motus efficitur, vbi illud attollimus, & reclinamus. Ad vtraque horum sinuum istius vertebrae latera, processus visitur <sup>g</sup> latior multo, cæteris vertebrae cervicis processibus; Atque in huiusmodi processibus quantum & sextum <sup>h</sup> musculorum caput mouentium par inseruntur. Hi propter tubercula in ipsis oborta, minimè vt cæteri inferiorum vertebrae processus dirimuntur; haud secus tamen ac inferiores, omnes perforati sunt, pertinentque ipsorum foramina

*e* ta. vj. f. j. R.  
*R.* lib. ij. c. xv.  
*fig.* xxvij. j.

*a* tab. v. f. v.

*b* tab. v. f. vj.  
*A. B.*

*c* v. f. vj. a.

*d* v. f. vj. D.

*e* v. f. vj. CC.

*f* t. iiii. f. j. l.

*g* v. f. vj. E.

*h* li. j. c. xiiij.

*H. L.*



foramina in secundum, & tertium occipitijs ossis foramen . Prima hæc cervicis vertebra posteriore processu ideo destituitur, ne musculis aliquot super eam repentinus officeret; sed ea in parte <sup>1</sup> aspera est, & veluti acuta linea extuberat, vnde quartum caput mouentium musculorum par exoritur . In inferiore huius vertebrę regione sub duobus commemoratis sinibus, alij totidem insculpuntur minores quidem illi, inæquales, multoque minus quàm superiores caui, gręcis γλωσσος ἔξω appellati, quodd oculi referant cavitatem . His sinibus duo excipiuntur tubercula, quę ad laterales secundę vertebrę processus habentur, medio cartilaginis, quę illorum supplet inæqualitati . Et super hos sinus caput in latera circumducimus, vt cum renuimus . Tubercula hæc siue capitula efficiunt, vt quę in processibus secundę cervicis vertebrę exculpuntur foramina, obliqua paululum sint, non recta, vt quę in lateralibus primę vertebrę, aliarumque omnium processibus insculpta habentur foramina . In medio duorum secundę vertebrę capitulorum ex superiori corporis ipsius regione, <sup>k</sup> processus quidam insignis, & altus, admodumque solidus enascitur, paulo anteriùs humilior, ac leuior, quàm posterius, quem, quodd denti, ac potissimum hominis canino assimiletur, dentem, seu dentiformem appellarunt . Processus hic primę vertebrę cavitatem subit, quam illic haberi diximus, vbi vertebrę ipsius corpus consistere debuisset, qui sinus cartilagine oblitus, anteriorem dentis partem, leui & lubrico tubere prominulam excipit; posterior dentis pars latior est, & ad latera, veluti capitulo extuberans; sub qua vtrinque ad latera exiguum sinum, & alterum in posteriori sede obtinet . Qui in lateribus consistunt vnā cum primę cervicis vertebrę sinibus, qui ipsis respondent, foramen vtrobiq; constitunt, nervis quibusdam transmittendis aptum, qui nonnunquam in musculos collum flectentes procidunt . Posterior sinus in hoc exculpitur, vt ligamentum insigniter validum ipsi firmus obnolatur, quod ab vno vertebrę latere ad alterum transfuerim procedit; Ad quod pariter suppetias fert prima vertebra, ea sede, vnde illud exoritur aspera, & inæqualis, ac foramine, quod os minimè altius subit, prædita . Superior huius processus pars, pineę nucis modo in mucronem exacutitur, altiusque extra primam vertebra prominēt, & ab ipsius medio <sup>l</sup> validum, ac teres ligamentum educitur, quod ipsum occipitis ossi alligat . Ita vt primę vertebrę cum secunda contextus perficiatur, medijs duobus secundę vertebrę latis tuberculis, totidemque primę vertebrę sinibus, & tertio eiusdem, quo dens secundę excipitur . In postrema etiam tuberculorum regione, secunda vertebra paululum excauatur, non secus, ac prima . Ambas vero foramen interiacet, per quod secundum par nervorum dorſi transferuntur; etsi prima vertebra, multo magis quam secunda exculpta est . Quę de secunda vertebra nobis dicenda superiunt, omnia illi cum alijs quinque communia sunt :

<sup>m</sup> Posteriorē nanque processum, non secus, ac reliquę bisidum obtinet; In quibus omnibus processus hi in duos mucrones desinunt, potissimum verò priorum quinque vertebrarum, quandoquidem septimę processus <sup>n</sup> ferè integer est . Verum enimvero vertebrę hæc omnes à capite Appendice donantur, præcipue autem septima, cui ea, quàm ceteris omnibus longior multo contigit; vnde posterioribus thoracis vertebrarum processibus nonnihil assimilatur, quamvis hi paullo acutiores existant . Verum tam ij, quàm illi inferius excauantur, superius vero prominent eminente linea, quam in medio superioris partis obtinent, quę alteri excauatę lineę respondet, eandemmet in inferiori regione structuram seruanti: ita vt processus triangulares videantur . Ex superiore alterius lineę ligamentum educitur, quod in inferiorem processus altioris vertebrę lineam inferitur, cuius medio processus hi colligantur, dexteris musculis vti dicemus, à sinistris per illud diremptis . Laterales quatuor vertebrarum, secundę subiacentium processus, alijs ampliores existunt, ac eorum vnusquisque duplici mucrone donatur, haud secus, ac posteriores processus, etsi illi minus asperi, & inæquales sunt quàm hi : estque apex horum anterior posteriore amplior, atque altius tendit, præsertim verò in sexta vertebra, in qua interior istius processus apex euidenter

Prime vertebrę asperitas.

Secunda cervicis vertebra .

Vertebra huius processus.

Ligamentum vertebrę huius corpus comprehendens.

Appendices posteriorum processuum .

Processus laterales quatuor posteriorum vertebrarum .

i t.v.f.vj.

k t.v.f.vi.D  
li.ii.f.xv.f.  
xxvij. H

l li.ii.f.xv.f.  
xxvij. l.

m t.v.f.vi.B

p ead.G.



*Ratio diuisionis  
posteriorum, et  
transuer, aliu  
processuum.*

*Ascendentes de  
scendentes, que  
processus.*

amplior cernitur. In septima verò apices propemodum delitefcunt, quoniam insignis est processus, & muscoli ab eo extorti haud ita firmiter ipsi adhærent, ac qui ex altioribus producuntur. Neque vero adeo huiusce validus est, ac cæterarum cervicis vertebrarum motus. Cuius quidem varietatistam in lateralibus, quàm in descendentibus processibus, ea ratio fuit, vt musculorum ex posteriore cervicis sede productorum validior fieret insertio: Quam etiam ob causam ° posterior se- ead.B  
cundæ vertebræ processus, subsequentes latitudine, ac longitudine superat; ex eo siquidem secunda, tertia, & quarta musculorum caput mouentium paria educuntur. Ascendentes, descendentesque in omnibus cervicis vertebris secundæ subiectis fibi similes sunt, & secunda quoque descendentes processus obtinet, aliarum processibus non dissimiles, exiguo scilicet, ac modicè orbiculari sinu, supernè deorsum, P & ab anteriori sede in posteriorem ducto, insignitos. Ascendentes P t.v.f.vi.H  
verò processus orbiculari tuberculo, siue capitulo donantur, ieuiter adeò eminente, vt ex sinu ne id, an ex tuberculorum numero sit, non absque difficultate intelligas. Tuberculum hoc sinui descendendum superioris vertebræ processuum includitur, cartilagine, perinde ac sinus incrustatum; & ab anteriori pariter sede deorsum in posteriorem obliquè paululum fertur; Qui obliquus ductus quò vertebræ scapulis propius accedunt, eo maior euadit. Ita vt medijs duabus articulationibus secunda vertebræ tertiæ committatur, perinde ac tertia quartæ, ac reliquæ deinceps omnes. Superest vt de 9 harum vertebrarum corporibus, deque ipsorum q ead.i.  
contextu dicamus. Iam igitur scire oportet, eas omnes, (prima quæ corpore destituitur excepta) corpore oblongo donari, eoque r pleniore, quo inferâ magis pos- ead.  
sident sedem: committunturque inuicem, non ad eum modum, quo vertebrarum thoracis, ac lumborum corpora, plana scilicet superficie; sed superior corporis harum vertebrarum pars in medio caua est, & pro corporis figura oblonga; inferior verò oblonga est, atque in eam exporrecta longitudinem, vt hac sede, vertebræ sinum, quo includitur, impleat: quod ad faciliorem cervicis motum effectum est. Contextus hic in secunda, & tertia nonnullisque subiacentibus vertebris admodum conspicuus est. In septima verò, quæ primæ thoracis vertebræ articulatæ haud ferè apparet; quòd ideo effectum est, quòd eam adeo vt cæterâ moueri, minimè ex usu esset. Illud quoque obseruandum venit, quatuor cervicis vertebrae, inter secundam & tertiam positas, præter septem processus, omnibus dorſi vertebris communes, s alij præterea quinque insigniri; quorum primus, & secundus supe- ead.KK.  
riorem corporis vniuscuiusque harum vertebrarum partem occupant. Tertius, & quartus lateribus adstant; r Disiuncti enim sunt, vt dictum est, laterales processus. ead.LL.  
Quintus, posterior is processus ramus existit, qui bifidus itidem est.

*Quinque alijs  
baris vertebrarum  
processus.*

### De Vertebris Thoracis.

Cap. 12.

*Thoracis verte-  
bræ duodecim.*

*Harum verte-  
brarum descri-  
ptio.*

Cervicis vertebris, Thoracis vertebræ adnæstuntur, numero ferè a duodecim; a t.vi.f.i.LL  
etsi nonnunquam, portento quodam, vnâ deesse, vnâ verò accedere contingit; Verùm rarius multò desiderari, quàm superaddi euenit. Harum vertebrarum superiores, ab inferioribus, ob dictam rationem, magnitudine superantur: & priorum corpora, haud vsquequaque rotunda sunt, sed vt cervicis vertebrarum corpora oblonga; Posteriorum omnino orbicularia sunt, tantoque superioribus, fungosiora, quanto maiore substantia prædita; & quo maiora sunt, eo frequentioribus foraminulis, haud peruaidentibus, nulloque, vt diximus, ordine positis, exculpuntur. Hæ quoque omnes vertebræ sinum vtrinque habent, cui costarum capita inferuntur, adeo cartilagine obiectum, vt vix spectanti occurrat. Sinus hic à prima ad nonam vsque vertebram inter vnus, & alterius vertebræ corpora iuxta foramina nervos transmittentia insculpitur, etsi grandior ipsius pars ad inferiorem præcipuè vertebram pertinet; In decima vero, vndecima, ac duodecima, vniuersus in ipso corpore inciditur. Nihilominus in prima & duodecima

decima vertebra (præter sinus, qui in elatiore laterum corporis ipsarum parte vi-  
suntur) duo insuper in humiliore eorundem laterum sede habentur, superioribus  
profundiores, asperioresque (etsi duodecimæ sinus, minus quàm primæ profundus  
est) sed spiraminibus referti, ex quibus quædam prodeunt ligamenta, duas hæc  
costas vertebri, quibus inarticulantur, coadnectentia. Hæ omnes thoracis ver-  
tebræ suos, & ipsæ processus obtinent septem numero, duos nimirum ascenden-  
tes, totidemque descendentes, duos laterales, posteriorem vnum. Posteriores, *Septem harum  
vertebrarum  
processus.*

b cad. P.B.

ad nonam vsque vertebra, <sup>b</sup> omnes proceri sunt, propemodum æquales, ac  
triangulares, ferunturque in exteriora paululum, decliues, angustiores sem-  
per redditi, donec in mucronem triangularis figuræ desinant super eundem infe-  
rioris vertebrae processum; omnesque inuicem annectit ligamentum ex promi-  
nente linea eductum, quam in medio superioris partis inferioris processum secun-  
dum longitudinem ferri diximus. Decima vertebra processum minimè adeo ex-  
trorsum prominentem, nec ita scitè triangularem imaginem commonstrantem  
exerit; quin potius duo exteriora latera, ampla admodum sunt, inferius verò an-  
gustum, asperum & inæquale; adhæc in mucronem, vt superiores, processus hic  
minimè desinit, sed latior nonnihil efficitur. Vndecimæ vertebrae processus, mul-  
to minus exporrigitur, easque mucro amplior insigniter est; atque adhuc magis  
duodecimæ processus, iam ad processum vertebrae lumborum imaginem ac-  
cedens. Cæterum vt varia hisce processibus figura obtigit, sic etiam descensu di-  
fcrepant. Siquidem nouem superiorum vertebrae processus, nonnihil extror-  
sum, vt diximus, decliues feruntur; trium vero postremarum processus adeo ob-  
scure ad imum tendunt, vt intuentes propemodum effugiant. Laterales <sup>c</sup> nouem *Transuersi pro-  
cessus.*

c cad. M.

priorum vertebrae processus, æquales ferè sunt; decimæ verò iam liquidò mi-  
niores fieri incipiunt, sicque deinceps magis, ac magis in duodecimam vsque.  
Huiusce varietatis ratio est, nouem priorum costarum in sinum cartilagine obdu-  
ctum insertio, qui in horum processuum <sup>d</sup> summatibus introrsum nonnihil vi-  
situr; secus quàm in inferioribus contingit: ideoque tam amplos fuisse processus,  
minimè oportuit, nec eisdem quibus superiores, sinibus donari; quanuis in de-  
cima nonnunquam insertionis quoddam veluti vestigium appareat. Sinus n̄ licet  
anteriorum horum processuum sedem occupent, alij tamen superiores, alij inferius  
iacent, quidam medium tenent locum. Siquidem primæ vertebrae processum  
sinus deorsum magis spectant, nonæ verò sursum, sextæ medio se habent modo.  
Verùm processus omnes in hominibus frequentius sursum, quàm deorsum ten-  
dunt, ac modicè extrorsum prominent. Illud quidem verum est, cùm proces-  
sui superius promineant, inferius verò cælentur, ac capitulo in summo donen-  
tur, effici hinc vt deorsum spectare videantur; haud ideo tamen, posteriorum  
trium obscurus est in superiora ductus. Hæc ad laterales processus spectant. su-  
perest, vt de <sup>e</sup> inferioribus, ac superioribus dicamus, qui quatuor numero sunt,  
duo inferiores totidemque superiores: quorum interuentu omnes dorsi vertebrae

*Horum proce-  
ssuum sinus.*

e cad. N.Q.

prima excepta, inarticulari diximus, hunc in modum: Aut superiore inferioris  
vertebrae processu, inferioris superioris vertebrae processus subeunte; vt fit in om-  
nibus dorsi vertebri, à secunda ceruicis ad vndecimam vsque thoracis: Aut con-  
trà, inferioribus superioris vertebrae processibus sequentis superiores subintran-  
tibus, vt fit in cæteris omnibus à prima lumborum vertebra ad imas vsque. Ita  
vt omnes dorsi vertebrae altera sede, apices horum processuum proximæ verte-  
brae excipiant, altera verò excipiantur; prima ceruicis vertebra excepta, quæ vtrin-  
que in sinus, quibus eam insigniri diximus, suscipit; & thoracis duodecima,  
cuius quatuor processus omnes, proximarum vertebrae processus excipiun-  
tur, superiores quidem, inferioribus vndecimæ thoracis, inferiores verò primæ  
lumborum vertebrae processus. Atque ideo ipsi omnes istius vertebrae proces-  
sus, modicè extrorsum protuberant; qui verò excavatos excipiunt, introrsum:  
Quod in cunctis præterea processibus, tam superis, quàm inferis eodem pro-  
prius modo se habere intelligendum est. nam qui excipiuntur tuberculo promi-  
nent,

*Processus su-  
periores & in-  
feriores.*

*Inferiorum &  
superiorum pro-  
cessuum connex-  
us.*

*Prima ceruicis  
& duodecima  
thoracis verte-  
brae connexus.*

neat, qui verò suscipiunt sinu excavantur; et si difficile est vtrunque in nonnullis internoscere.

## De Vertebriis Lumborum.

Cap. 13.

Lumborum vertebra quot.

**L**umborum vertebrae <sup>a</sup> quinque numero sunt, omnium quas commemoravi- <sup>a. t. ii. iii. in- ter L. & M. t. vi. f. i. l. l.</sup>  
mus maximæ, eoque minus peruiæ, quo spinæ medulla suo per eas progressu  
tenuior euadit. Ipsarum quoque corpora multis foraminibus referuntur, quæ  
tanto corporum vertebrae thoracis, & colli foraminibus maiora sunt, quanto  
corpora hac magnitudine excellunt, ac vberius nutrimentum postulant, & quod  
<sup>Processus vertebrae lumborum.</sup> inter vertebrae cæleri foramen diximus, neruis emittendis aptum, vniuersum fe-  
<sup>Transuersi.</sup> rē ad superiorem refertur vertebrae; inferior vero humiliorem tantummodo ip-  
sus sedem efformat. Hæ omnes vertebrae eisdem & ipsæ, quibus & aliæ septem  
<sup>Transuersi.</sup> processibus donantur. <sup>b</sup> Quorum transuersi longè tenuiores, ac longiores sunt, <sup>b. t. iii. iii. q.</sup>  
transuersis thoracis vertebrae processibus; uidebanturque quasi costarum vsum  
præstaturi, etsi primæ, & ultimæ vertebrae processus, aliarum vertebrae processibus  
breuioribus sunt. Præterea eorum nulli sursum manifestò assurgunt, præter  
ultimæ vertebrae processus, ad id adactos, ut ilium ossa sibi ipsis proxima eui-  
<sup>Posterior.</sup> tantent. <sup>c</sup> Posteriores harum vertebrae processus validi sunt, crassi, & breues; <sup>c. t. iii. i. r.</sup>  
si latera spectes, lati ac tenues: si verò longum ipsorum ductum ab imo ad super-  
num, angusti, & in extremo acuti; ac in lineam leuiter asperam desinentes.  
Inferiore sede lati sunt; & exiguis duobus donati sinibus, in quorum medio exi-  
guus collis educitur, à quo uti dicemus, ligamentum exoritur, quod lineæ su-  
perioris partis eiusdem processus, proximè subiacentis vertebrae inseritur. Ho-  
rum posteriorum processuum appendix solidior est, quàm quæ eisdem thoracis  
vertebrae processibus adest. <sup>d</sup> Ascendentes processus quæ se inuicem è regio- <sup>d. t. iii. s.</sup>  
<sup>Ascendentes.</sup> ne spectant, longum & profundum sinum adipiscuntur: <sup>e</sup> Descendentes eiden- <sup>e. t. iii. s.</sup>  
<sup>Descendentes.</sup> ter declius feruntur, & externo ipsorum latere, paululum anteriora versus, in  
capitulum latiusculum desinunt, quod in elatioribus subiacentis, uti diximus, ver-  
tebrae processus inseritur. Præter hosce processus, ex hisce vertebrae quædam, in  
nonnullis hominibus duos præterea descendentes processus obtinent, iuxta vsque  
foramina conspicuos: qui tam rarò in humanis corporibus; in simijs versus  
adeo frequenter occurrunt, ut minimè mirum sit, Galenum tantoperè de illis fuisse  
solicitem, Vesalijs autem oculos semper effugisse.

## De Osse Sacro.

Cap. 14.

Os sacrum cur  
ita dictum.

**O**s id veteribus Sacrum siue amplum ideo dictum fuit, <sup>a</sup> quòd sui, suorumque <sup>a. t. ii. iii. in- ter L. & M. t. vi. f. ii. l.</sup>  
processuum magnitudine, reliqua omnia totius dorsi ossa facile superet.  
Nonnulli etiam latinorum Sacrum id appellarunt; quòd in partu dehiscere, ac  
rursus committi persuasum haberent: quod quidem, foetu superstitè, secundum  
naturam esse nequaquam potest; os enim id vsque adeo renitens foetum, mollem  
nimis, ac tenerum, partus tempore omnino perderet. Id ipsum os ponè gibbum  
est, antè cauum; senis ut plurimum vertebrae, nonnunquam verò quinis insigni-  
tum, scitè adeo contextis, ut in natu maioribus, anteriore sui regione, vix leue  
connexionis vestigium occurrat. In posteriori autem sede, vnio prorsus obscura  
est, præterquam primæ vertebrae cum secunda, quæ se interdum conspicuam  
præbet; multoties etenim haud secus quàm lumborum vertebrae committuntur.  
Attamen in pueris, tam anteriore, quàm posteriore sede, omnium sex vertebra-  
rum coalitus conspicui sese offerunt. Vniuersæ istius ossis vertebrae contrario ab  
alijs dorsi vertebrae, positu situantur: ex alijs siquidem ampliores, humiliorem in  
dorso locum obtinent; Ex his verò proceriores, superiorem sibi regionem ven-  
dicant; Adeo ut vniuersum os apprimè monachorum cucullè imaginem represen-  
tet. Harum vertebrae prima lumborum vertebrae adeo assimilatur, ut nisi in-  
genti

Sacri ossis ver-  
tebra quot.

genti vtrunque processu donaretur, arduum foret eam ab illis distinguere. Atque hæc & reliquæ pariter omnes istius ossis vertebræ, <sup>b</sup> posteriores processus similes lumborum vertebra processibus educunt, quamvis eo minores euadant, quo magis declivius feruntur. Sexta & vltima processus minimè adipiscuntur, sed orbiculari duntaxat, & lato prominent tuberculo, aut corpore, quo primæ Coccygis vertebræ committuntur, haud secus, ac vertebrarum corpora inter sese, siue etiam Coccygis in quouis animante vertebræ copulantur, <sup>c</sup> laterales processus longiores sunt, ac latiores, sicque inuicem coherentes, vt vnicus videatur processus; & quo humiliores sunt, eo breviores efficiuntur. Præterea vnique eorum paululum versus posteriora, in extremo <sup>d</sup> sinus insculpitur, quo vtrunque ilium os excipitur. Sinus hic asper, & inæqualis est, in cuius medio, linea modicè prominens, <sup>e</sup> tuberculi, aut spinæ instar extuberat, quæ ipsum in duos veluti sinus dirimit, quorum anterior posteriore minus excavaatur; & in medio transuersum educit processum, qui sinum hunc rursus in duos alios superiorem vnum, alterum inferiorem discriminat. Sinibus hisce, figura laterum ossium ilium apprimè correspondet, ipsisque cartilaginei ligamenti interuentu inferuntur. Verum sinus in prioribus tribus vertebrae euidentiores sese offerunt, quod ampliores quam in alijs angustioribus existant; quamvis interdum pateant, adhæreantque. Atque ex ipsis quartus femur mouentium musculus educitur. Lateralis præterea quinti ossis processus, quæ sexti ossis processui iungitur, Tuberculum nonnihil prominens, & crassum edit, cui duos tendines, siue ligamenta implantari dicemus. Sic quoque inter istius ossis vertebras vtrunque <sup>f</sup> foramen cælatur, ad illius, quod reliquis omnibus vertebra inest, modum, neruis exitum præbens. foramina hæc, quinque ferè sunt, nonnumquam quatuor, pro vertebrarum numero. nec minus posteriore, quàm anteriore ossis sede ob adherentes processus, occurrunt. At posteriora foramina anterioribus longè minora sunt; per eorum verò vnumquodque neruum profilire docebimus. Præter hæc autem foramina, & inter posteriores processus, alia itidem spectantur; in pueris nervosis ligamenti oppleta, perinde, ac interualla, siue foramina, quæ inter posteriores vertebrarum thoracis, ac lumborum, processus, haberi diximus: In proeclatæ autem ætatis hominibus, quod ligamenta iam in os abierint, minime apparent,

Posterior ossis processus.

Processus laterales.

Sacri ossis foramina.

Alia istius ossis foramina.

De Coccyge, siue Cauda. Cap. 15.

<sup>a</sup> <sup>b</sup> <sup>c</sup> <sup>d</sup> <sup>e</sup> <sup>f</sup> <sup>g</sup> <sup>h</sup> <sup>i</sup> <sup>k</sup> <sup>l</sup> <sup>m</sup> <sup>n</sup> <sup>o</sup> <sup>p</sup> <sup>q</sup> <sup>r</sup> <sup>s</sup> <sup>t</sup> <sup>u</sup> <sup>v</sup> <sup>w</sup> <sup>x</sup> <sup>y</sup> <sup>z</sup> <sup>aa</sup> <sup>bb</sup> <sup>cc</sup> <sup>dd</sup> <sup>ee</sup> <sup>ff</sup> <sup>gg</sup> <sup>hh</sup> <sup>ii</sup> <sup>jj</sup> <sup>kk</sup> <sup>ll</sup> <sup>mm</sup> <sup>nn</sup> <sup>oo</sup> <sup>pp</sup> <sup>qq</sup> <sup>rr</sup> <sup>ss</sup> <sup>tt</sup> <sup>uu</sup> <sup>vv</sup> <sup>ww</sup> <sup>xx</sup> <sup>yy</sup> <sup>zz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup> <sup>jjj</sup> <sup>kkk</sup> <sup>lll</sup> <sup>mmm</sup> <sup>nnn</sup> <sup>ooo</sup> <sup>ppp</sup> <sup>qqq</sup> <sup>rrr</sup> <sup>sss</sup> <sup>ttt</sup> <sup>uuu</sup> <sup>vvv</sup> <sup>www</sup> <sup>xxx</sup> <sup>yyy</sup> <sup>zzz</sup> <sup>aaa</sup> <sup>bbb</sup> <sup>ccc</sup> <sup>ddd</sup> <sup>eee</sup> <sup>fff</sup> <sup>ggg</sup> <sup>hhh</sup> <sup>iii</sup>

*Costæ omnes  
quatuor & vi-  
ginti.*

*Integræ costæ  
septem.*

*Cartilagineæ  
quatuor.*

*Costarum in-  
feriorum.*

*Costarum in sub-  
stantia descri-  
ptæ.*

*In longitudine  
et latitudine.*

*Quid commu-  
ne habeant co-  
stæ.*

*Differentia in-  
ter cartilagineas.*

*In longitudine,  
et latitudine.*

**T**horacem<sup>a</sup> dissectionis professores vocant, cauum illud omne costis compræ-  
hensum, quod ouata figura circumscribitur. Mediam thoracis sedem ante-  
rius, os latum occupat, à<sup>b</sup> jugulo inter duas clauiculas ad mucronatam vsque car-  
tilaginem porrectum, <sup>c</sup> Pectoris os communiter dictam. Thoraci vigintiquatuor  
costæ adsunt, vtrinque duodecim; nonnunquam verò (licet per quam raro, quod  
mihi in sola muliere Pisis videre contigit anno 1544. dum Anatonen exerceret  
Realdus Columbus) ab altero latere tredecim occurrunt, multoque adhuc rarius  
vndecim ab altero sese offerunt. <sup>d</sup> Harum costarum priores septem, integræ ha-  
bentur, ac pectoris ossi committuntur; Reliquæ mutilæ sunt, nec ad illud perue-  
niunt, vnde illas latini adulterinas, spurias, nothas, illegitimas appellantur.  
Verum tam hæ, quam illæ partim ossæ, partim cartilagineæ sunt. Posterior pars  
ossæ est, anterior cartilaginea: quibus cartilaginibus integræ cum pectoris ossæ  
committuntur; Nothæ obliquo ductu sursum tendunt, singulæ proximis sibi su-  
perpositis, & diaphragmati adhærentes, medio ipsius Diaphragmatis, postre-  
ma excepta, quæ nullatenus vndecimæ<sup>e</sup> adiungitur; atque vndecima, quæ mul-  
tories quoque decimæ nequitiam copulatur. Omnes, internâ thoracis cauitate  
læues sunt, ac sinum possident, secundum vniuscuiusque longitudinem excul-  
ptum, qui sese magis conspicuum præbet, vbi thoracis vertebis committuntur ad  
medium vsque, quàm eam ante regionem; magisque in his, quæ inter tertiam &  
nonam habentur, quàm in alijs. Nam cum sinus hic<sup>f</sup> ramis venæ costas nutritu-  
ræ, vnâ cum nervo & arteria tutius deducendis cælatus fuerit; rami tres superio-  
res, qui tenuiores sunt, minimè tam grandi sinu opus habuerunt; tres verò infe-  
riores quamvis magni sint, quia tamen costæ tenues, atque introrsum depre-  
sæ habentur, neque ipsi altum postularunt sinum. Illud quoque animaduerte-  
re oportet, ossæam harum costarum partem, substantia nequitiam sibi similem  
omnino esse, nam quò propius ad cartilagineam os accedit, eo tenerius efficitur.  
In longitudine Neque vero omnium par est longitudo, nam cum thorax ouatus sit, superæ at-  
que imæ breuiiores, mediæ longiores existunt. Variant insuper latitudine; su-  
perior nanque sibi subditam latitudine superat, potissimum verò suprema & ce-  
terarum omnium latissima. Verum hæ atque illæ omnes, tenui ossæ, membra-  
næ, aut squamæ instar, exterius obducuntur, intus spongiosæ sunt. Haud secus  
quoque cartilagineæ, minimè parem, vt de costis retulimus, vndique speciem  
ostendunt; Notharum enim cartilagineas multò molliores sunt, vnde nonnulli  
costas hæc *χρόνους* hoc est cartilagineas vocant; integrarum multò duriore  
sunt, præcipuè autem in senibus, in quibus, si separet, ossæ videntur, qualis in  
bobus nonnullis, ac veruecibus ætate confectis visuntur. Varia quoque est cartila-  
ginum vt & costarum latitudo, ac longitudo, quamvis sextæ, septimæ & octauæ  
costæ cartilagineæ, quò pectoris ossi viciniore sunt, eo semper magis deperdan-  
tur; superiorque cartilagini continuatæ, tam ipsæ, quam aliæ ad postremam vsque,  
in acutum mucronem desinant, contra quàm in integris fiat: Quarum<sup>h</sup> primæ  
extremum, multò latius exortu à costâ est: Reliquæ ad sextam vsque, vbi à co-  
stis abscedunt, quousque ad pectoris os perueniant, angustantur; ibique in ca-  
pitulum terminantur, quo, illi coarticulari postea dicemus. Verum tam co-  
stæ, quam cartilagineas externa sede incuruæ, & leues sunt, licet non eque om-  
ni ex parte; quæ enim dorso committuntur, præterquam quod tuberculo promi-  
nent, nonnihil etiam asperæ sunt, quò aptior fieret ligamentorum insertio, quæ  
illas corporibus transuersisque vertebrarum thoracis processibus colligant. Om-  
nes quoque, in priora nonnihil, vbi transuersis processibus committuntur, tuber-  
culum ostendunt, cui pars tendinum vndecimæ<sup>i</sup> dorsales mouentis<sup>j</sup> musculi alli-  
gatur; Atque adhuc vltimus paululum asperæ, inæqualesque sunt, ac tuberibus  
veluti prominentes, quibus quartus<sup>k</sup> thoracem mouentium musculus adnecti-  
tur; in-

a. t. i. i. i. i.

b. t. i. i. i. o.

c. t. i. i. i. p.

d. t. i. i. i. i. i.  
2. 3. 4. 5. 6. 7.

e. t. i. i. i. i. i. i.  
12.

f. lib. vi. t. i. i.  
G. G. t. v. f. i. i.

g. t. i. i. i. i. i. i.

h. t. i. i. i.

i. t. i. i. i. i. i. i.

k. t. i. i. i. i. i. i.

I. li. i. c. xiv. de quæ externi <sup>1</sup> intercostales musculi, vti suo loco dicemus enascuntur. Interna pariter fede paruas quasdam asperitates ostendunt, vnde intercostalium <sup>m</sup> internorum pandet origo, eorundemque inferio perficitur. Prima vero costa superiori fede, præter commemoratas, multò maioribus priuatim donatur asperitatibus, à quibus <sup>n</sup> quartus dorsum mouentium muscularum exoritur. Illud verò minimè ignorare oportet, Costas omnes, vbi à dorsi vertebra primùm recedunt, decliues obliquo ductu in posteriora ferri; indeque ad thoracis latera deorsum semper obliquè versus anteriora declinare, in cartilaginum vsque principium; quæ circumlatum sursum conscendunt, adeo vt cartilago vnaquæque cum costa ex qua educitur, <sup>o</sup> veluti triangularem solidumque angulum efformet; duodecima excepta, quæ nullatenus interdum sursum intendit. Animaduertendum quoque est, ex hisce omnibus costis, nouem superiores duobus in locis thoracis vertebra articulari, postremas duas vnico; decimam vnico vt plurimum, nonnumquam vero duplici. Quæ duplici articulantur fede, duo etiam habent capitula, alterum maius, quod vertebræ corpori inarticulatur, alterum minus, quod transuersorum processuum eiusdem vertebræ apicibus inseritur, in eos sinus, quibus processus hosce insculpi diximus. Atque ex hisce capitulis maius, eo elatiorem sedem minorem obtinet, quò corporis vertebræ sinus sublimior est quam proclinationis discrimen. Aliud præterea est inter harum costarum articulationis discrimen. Prima enim costa, primæ thoracis vertebræ, secunda intacta iungitur, rotundo capitulo & sinu pari figura, & magnitudine respondentem: Reliquæ ad octauam vsque duabus vertebra acuminato capitulo articulantur: Tres postremæ, quæ vertebrarum duntaxat corporibus coarctantur, haud valdè protuberantibus capitulis, neque sinibus admodum profundis inseruntur. De Costarum ad thoracis vertebra articulatione diximus; superest vt quam coitus speciem cum pectoris osse moliantur, edoceamus. Quod simul de hoc osse agens, præstabo, ne toties eadem cogar repetere. Os igitur hoc, in P medio thoracis positum, totum id spacij, vti diximus, amplectitur, quod à iugulo inter clauiculas ad eam vsque sedem porrigitur, quam communiter sed perperam vti suo loco docebimus, stomachi os appellamus. Os id tenue est, superius amplum, desinitque in eius veluti mucronem; vnde nonnulli ensẽ appellauerunt. Senis ferè aut septenis ossibus componitur, quæ in proæctæ ætatis hominibus, ita inuicem connectuntur, vt ex binis duntaxat, ternis vè ossibus, constitutum videatur: Nonnumquam etiam sed rarissimè, ex vndecim ossibus constat, vt nos Romæ vidimus anno 1554. in puella annum circiter septimum agente, cui os id in sex ossa diuisum erat, quorum postrema quinque ab imo ad summum per ossis longitudinem secta conspiciabantur. Istius ossis partes mediæ omnes cartilagine articulantur: Sed quia in humanis ferè vti diximus corporibus, binæ duntaxat articulationes occurrunt, de ipso, ac si ex ternis tantummodo ossibus constitueretur, agemus. <sup>1</sup> Quorum primum ceteris insigniter amplius est & nonnihil etiam crassius, ita tamen vt ipsius crassitiem amplitudo plurimum superet. Posteriori fede, quæ thoracis respicit cavitatem, in medio nonnihil magis cauum est; anteriore modicè prominens; ac secundum ipsius longitudinem, in medio crassius paulò est, quam à lateribus, quibus primi paris costarum cartilagines inseruntur; eæque superior ipsius sedes, inferiore crassior, ampliorque. Præterea sinum vtrinque vnum longum, ac posteriora versus incisum, nec non cartilagine incrustatum obtinet. Duobus hisce sinibus clauicularum capitula inarticulantur; in eorumque medio superiori fede sinus alter efficitur, semilunè instar, isque ipsius est, quem communiter iugulum appellamus. Inferior ossis pars leuiter aspera est, & secundo ossi laxè aded committitur, vt nunquam lateat connexus; imò in his, qui graui asthma laborant, vtriusque interdum motus animaduertitur. Secundum istud os priore angustius, ac tenuius <sup>r</sup> est; inferiusque paulò antè quam terminetur, latius est quam superius, vbi primo ossi committitur: Quæ in parte sinum vtrinque obtinet, ambobus communem, cartilagine obductum, cui secundæ costæ cartilago, instar obtusioris trianguli verticis modicè prominens inarticulatur. Præter hosce sinus, præfens os similes alios complures vtrinque sibi



*Costæ in primis  
et secundis os  
inserte.*

que sibi vendicat, sed non æquè inuicem distantes; siquidem prioris lateris primus, tertiæ costæ cartilaginem excipiens, à sinu secundæ costæ gratia inciso, longius distat, quàm tertius ab eo, qui quartæ costæ cartilaginem suscipit, sicque deinceps ad sextum vsque, quod septimo adiungitur. Adeo vt primum os primam excipiat cartilaginem; secunda inter primum, ac secundum inseratur; Secundo, tertia, quarta, quinta, sexta, & septima suscipiantur, capitulis quibusdam secundæ costæ cartilaginibus modo prominentes, eo articulationis genere, quæ Athrodia dicitur, quam speciem fecimus Synarthrosis. Tertium<sup>s</sup> os minus multo est, & s. i. ii. y. inferiori secundi osis fedi interna ex parte committitur, quæ septimæ costæ articulatur cartilago. Id ostendit & angustum est, humiliorique fede in mucronatam interdum abit cartilaginem. Verùm aduerte, os id in plerisque desiderari; & in ijs secundum os, è regione cartilaginis tertij paris costarum, bipartito scinditur. Ea cartilago<sup>i</sup> illinc, vbi septimæ costæ cartilagine, secundi osis extremo vtrinque committuntur, educitur. Hæc anteriori Hepatis, ac ventriculi regioni loco propugnaculi est, ensi similis, vnde Latini Ensisformem appellant; cum tamen ipsum os vniuersum appositè magis Hispano pugioni conferri possit: Primum namque os, pugionis caput, Secundum, capulum, Tertium verò ferrum æmulatur. Pectoris os vniuersum fungosum est, tenue, & anteriori, quàm posteriori parte solidius; hac enim fede multis, atque inæqualibus donatur spiraculis, haud altè perueantibus, per quæ nutrimentum suscipit. Huiusmodi spiramenta in primo osse tanto euidentius occurrunt, quàm cæteris, quantò id reliqua ossa crassitie superat. Iam verò vt ad costas redeam, Pectoris os in id effectum est, tum vt ipsi costæ infererentur, tum etiam vt cor atque pulmones tutaretur: Costæ vero in thoracis tutelam factæ sunt; posteriore quidem regione, minus tuta, ossæ: anteriore autem, quæ manus oculosque habuit custodes, cartilagineæ; qua facilius inspiratio redderetur.

*Mucronatæ et  
tilaginis vssus.*

t. i. ii. p.

### De Corde Osse, seu Cartilagine.

Cap. 17.

*Cordis os ex  
quibus extrin-  
sur.*

**Q**uamuis nullum vnquam humano in Corde os reperiri contingat, quoniam tamen in quibusdam animantibus, os quoddam, aut dura saltem instar ossis cartilago visitur, quod nos in nonnullis ingrauescentis ætatis veruecibus obseruauimus, & Galenus in Elephante visum sibi esse refert, idcirco quidnam istius osis loco, in humanis corporibus, ac præcipuè in senibus obseruetur, aperiam. In cordis medio, vt fufius suo loco dicemus, ad clatiorem<sup>a</sup> interstitij duorum ipsius ventriculorum sedem, venæ arterialis, & magnæ arteriæ radices, perinde inuicem continerantur, ac si duo CC scapulis suis committerentur; ac simul ambo, corpus ad cartilaginis duritiem proximè accedens constituunt, cuius figura literam X similitudine refert, radix enim magnæ arteriæ, magnitudine nonnihil excedit. Hasce radices, siue ossa cum Galeno appelles, seu cartilagine, vt re vera sunt, parum interest, modò ex commemoratis radicibus consurgere, quæ temporis progressu indurescant, minimè ignores.

a. li. iii. c. i. ff.  
iii. sub BCD.

### De Scapulis.

Cap. 18.

*Quibus parti-  
bus scapulae cor-  
pulentur.*

**S**capulæ ea sunt ossa, quibus brachia articulantur, inter primam, & quintam costam (stante corpore) sita, ac in nonnullis ad sextam pertingentia. Harum vtraque à suo latere occipitis ossi, dorsi vertebris, & costis, musculorum quorundam interuentu, copulatur: Occipitis quidem ossi, beneficio secundi<sup>b</sup> paris musculorum scapulas mouentium, quod hanc quoque multis posteriorum processuum vertebrarum dorsi apicibus committit. quemadmodum posterioribus aliquot cervicalibus vertebrarum apicibus, eam, tertium par musculorum e easdem scapulas mouentium nescit. Eandem posterioribus quarundam thoracis, & colli vertebrarum processibus firmat quartum eorundem<sup>c</sup> musculorum par. Costis verò scapulam d. li. iii. c. x. iungit

a. t. li. iii. c. i. ff.  
t. vi. ff. iiii.

b. lib. ii. c. ix.  
d. r.

c. lib. ii. c. xii.  
G.

d. li. iii. c. x. r.

e lib. ij. c. v. f. jungit <sup>e</sup> primus illam mouentium musculus, & thoracem mouentium <sup>f</sup> secundus.  
 f lib. a. c. viii. Vtraque hæc scapula seorsum admodum inæqualis est, omniq̃ue ex parte sibi dissimilis: nam præter varios ipsius processus, sinus, Tubercula, & Appendices, ipsius quoque figura triangularis est, cuius latera minimè æqualia sunt; imò latus posterius, quod trianguli istius ossis basis est, quodq̃ue secundum dorsū longitudinè iuxta posteriores thoracis vertebrarum processus, exporrigitur, reliqua omnia magnitudine superat. Id ab extremis nonnihil prominet, quā cæteris committitur lateribus, in medio modicè cauum, licet multoties cavitatis eiusmodi desideretur, tuncq̃ figuram hanc C latus exprimit. Admodum quoque tenue huiusmodi latus vniuersum spectatur, quamuis ab extremis quàm in medio minùs, & inferior sedes superiore paulò crassior existat. Huic lateri duæ plerunq̃ue adnascuntur Appendices; altera grandior & crassior, quæ semper ad <sup>g</sup> inferiorem lateris sedem spectatur, instar obtusi, modicæq̃ue orbicularis trianguli angulum efformans; altera minor, quæ ad inferiorem lateris consistit sedem, <sup>h</sup> vnde processus educitur in exteriore istius ossis sede positus, & spina, vt inferius dicemus, vocatus. Præter hæc Appendices huic insuper lateri cartilago vndequaue, accedit, illi similis, quæ cæterorum ossiū, nulli ossi commissuræ extremis adnascitur. quæ longè homini minor, quàm cæterorum animalium cuius obtigit. Haud secus quoque, reliqua duo istius ossis latera inuicem differunt. <sup>i</sup> Anterior enim ad maioris extremum, obliquè versus anteriora contendit, <sup>k</sup> Superius verò, quod tanto minus est inferiore, quanto inferius est posteriore breuius nonnihil deorsum in anteriora fertur, donec in sinum quandam exiguum definat iuxta scapulæ ceruicem, inferiori proximè accedens. Nec solum longitudine & figura, latera hæc, sed crassitie quoque inter se dissident. Anterior enim <sup>l</sup> quod altius fursum conscendit, (à superiore, ac maiore cuiusmodi istius ossis basim esse diximus, sciunt) eò crassius, ac solidius efficitur, in crassam definens marginem, quæ (præter quam quòd musculorum quorundam gratia, quos ex ipsis educi docebimus, ossa hæc in medio depressa & validiora reddit) inferiore sui sede <sup>m</sup> impressionem obtinet, vnde musculus <sup>n</sup> brachium retrorsum flectens, principium desumit: superiore verò, non procul ab istius ossis ceruice, asperitate donatus, ex qua musculus cubiti extensionis auctor, enascitur. Superius scapulæ istius latus, tenue, acutumq̃ue est, ac in sinum <sup>o</sup> semicircularem, vt diximus, terminatur, qui ramo quinti paris <sup>p</sup> nervorum spinalis medullæ, nec non venæ arteriæq̃ue, posteriori istius ossis sedi, nutrimentum deferentibus, adiutum præbet. Ad huius lateris extremum, inter ipsum & inferius latus scapularum, vtraque, vt diximus <sup>q</sup> ceruice prædita est, in quam, vt crassior euaderet, vniuersa ipsorum amplitudo coartari videtur; & vbi extorsum prodit nonnihil dilatatur; Atque in medio sedis ipsius anterioris, <sup>r</sup> sinus spectatur, pro ceruicis longitudine oblongus, cui ossis humeri caput inarticulati dicemus. Sinus hic inferiore sui parte circularis est, superiore verò acutus; quod propter impressionem effectum est, internæ ceruicis sedi factam, per quam tutius muscoli, brachium intrò, extraque circumflectentis tendo defertur. Hac in parte, tam sinus, quàm superior huius ceruicis sedes, magis quàm inferius prominent, quòd ex vtriusque huius articuli <sup>s</sup> ligamenta, nec non externum primi <sup>t</sup> musculi cubitum flectentis caput, producantur. Sinus hic cartilagine cæterorum sinuum ritu obductus, haud satis altè pro ratione <sup>u</sup> capitis humeri exculptus est; quod nulli præterea articulo euenit, præterquam huic, & quodammodo etiam femoris cum coxendice articulo, vt suo loco dicemus, idq̃ue variorum, qui in hisce partibus fiunt, motuum gratia. Verum huic defectui, præter multa huius articuli ligamenta, <sup>x</sup> processibus quibusdam prospectum est, qui humeri caput ita amplexantur, vt omne luxationis periculum auertant. Quem pariter in vsum, cartilago, qua hic sinus obducitur, adeò extorsum protuberat, vt magnitudine addita, ossis paruitati suppleat, & motum minimè interrumpat. Huiusmodi cartilago ossi nequaquam connascitur, neque illi, sed ligamenti ipsum in orbem amplexantibus adhæret; estq̃ue externa sede crassa, sensim magis gracilescens, quò propius ad sinus centrum accedit, ad quod multò antè quàm perueniat, desinit, annulli effingens

Scapularum figura.

Maius latus scapulæ.

Ipsius appendices.

Latus anterior ac superius.

Lateralium horū discrimen.

Latus superius.

Cervix scapulæ.

Cervicis sinus.

Cartilago sinus huic adu. ges.

x c. vi. f. iiii. EEEKK.

Cartilaginosis hu  
iusce vjus.

Prior scapulae  
processus.

Alter.

Anterior scapu  
lae sedes.

Posterior pars.

Secundus scapu  
lae processus.

effingens imaginem, cuius pars digito incumbens in triangulum exacuitur, exte-  
rior orbicularis existit. Cartilago hæc quamvis humeri luxationis promptitudini  
occurrat, vbi tamen deorsum luxatur, repositionem efficit difficiliorem, in medio  
enim duplicatur, osque restitui prohibet. Quare tutò agendum est, donec suum  
in locum reponatur: tumque humeri os non nihil agitandum, quò explicetur carti-  
lago. Istius ossis processus duo sunt; prior <sup>y</sup> qui superior est, è spina, qua os id insi- y ead. K. KK  
gniri mox dicemus, educitur, humeri que summum constituit, atque ideo Hume-  
ri summum nobis dicitur. Alter, qui <sup>z</sup> inferior & minor est, ex elatiori <sup>a</sup> scapula: z ead. FF  
cervi- ceruicis sede principium sumit, ac antrorsum tendens, paulò amplior euadit, a ead. C  
regione anterioris articuli huius, sedis, definens. Inferior huius processus pars, læ-  
uis admodum est, & caua, instar antiquæ Græcorum literæ C. ideoque *στυμοειδής*  
ipsis dicta: Alij *ἀγκυροειδής*, hoc est Anchoræ similem appellantur; quòd aliquam  
cum ea Anchoræ parte, quæ solo infigitur, similitudinem obtineat. Superiori par-  
te processus hic asper, & inæqualis est, & in elatissima sui principis fede, nonnihil  
crassior, exiguo, asperoque <sup>b</sup> tubere prominens, cui clavicula innititur, valideque b ead. F  
deuincitur. Asper quoque iste processus in apice est, & ex huiusmodi asperitate  
<sup>c</sup> internum primi cubitum flectentium musculi caput, ac peculiare huius articuli li- c li.ii. t. vi. m  
gamentum exoriuntur. Inter huius quoque processus apicem & tuberculum, cui  
clavicula innititur, <sup>d</sup> asperitas quædam occurrit, ex qua tutò <sup>e</sup> ligamentum in su- d t. vi. f. li. iii. F  
periorum huius ossis processum pertinens educitur. Istius processus asperitati fora- c li.ii. t. vi. c  
mina quædam correspondent, scapula: cervici vndequeque incisa, nec peruia, ex  
quibus articuli humeri ligamenta enascuntur. <sup>f</sup> Anterior scapula: sedes, tantum ex f t. vi. f. li. iii.  
pilpitur, quantum marginis anterioris lateris crassities extrorsum eminet (id caui M M M.  
§ sextus brachium mouentium musculus implet) estque omni ex parte lævis; & g li. ii. t. vii. F  
<sup>h</sup> sinus quosdam obtinet, (ac si costæ in eam fuissent impressæ) multo magis in h t. vii. H  
senibus quàm in iuuenibus conspicuos, Hac etiam in parte, ad maioris anguli extre- i ead. e.  
mit <sup>i</sup> exiguum spectatur Tuberculum, cui secundus scapulam mouentium muscu- K ead. NO.  
lus inferitur. Et aduerte sedem hanc <sup>k</sup> quæ spinæ, seu squamæ correspondet, ex qua  
processus Humeri summum dictus, educitur, aliùs quàm alibi excuari & orbicu-  
larem esse; ac si natura huiusmodi spinam in hoc osse efformans, ipsum in poste-  
riora magis extrahere, ac profundius antrorsum efficere voluisset. Huius verò im-  
pressionis sedes, quæ spinæ istius sinibus correspondet, profundior est, quàm quæ  
medium spectat; spinæ enim medium extremis crassius existit, vti mox demonstra-  
bimus. Ex reliquis præsentis ossis sinibus, qui cervici proximus est, omnium maxi-  
mè cauus visitur; tum quia ex spinaeductus posteriora versus porrigitur; tum quia  
cervix ibi crassior est, & antrorsum paululum protuberans, ipsum multo maiorem  
reddit; ad id etiam conferente lateris scapula: anterioris crassitie, <sup>l</sup> Posterior scapu- l ead.  
la: sedes, ex qua processus spinæ similis educitur, cuius apex, summus Humerus vo-  
catur, parumper curua est, quò magis iniurijs occurrat: & duos obtinet exiguos si-  
nus, Alterum <sup>m</sup> sub dicto processu, inter ipsius extremum, & crassiorem extuberan- m ead. V  
toremque lateris anterioris sedem; <sup>n</sup> Alterum inter superiorem eiusdem spinæ par- n ead. b. c.  
tem, & superius scapula: latus consistentem; ex hoc sinu tertius brachium mouen-  
tium <sup>o</sup> musculus, ex illo <sup>p</sup> secundus educitur. Spina hæc insigniter supra medium  
9 posterioris scapula: sedis consistit, & ex posteriore maioreque ossis latere, quæ <sup>r</sup> su-  
perior Appendix incipit,educta, principio coarctata fertur; ac deinde <sup>s</sup> superius  
repentè ampliatur, inferius <sup>t</sup> tenuior remanens. Tumque iuxta scapula: cervicem,  
vbi ab ea spungitur, rursus angustatur, modicèque antrorsum contendens, triangula-  
ris, ac teres principio efficitur, ac postea diffunditur, & processum exerit, in <sup>u</sup> Ap-  
pendicem terminatum, quæ in pueris ex pluribus ossiculis conformatur, cartilagi-  
nis interuentu coalescentibus. Processus hic *ἀκρομήσιον*, hoc est Humeri summum  
dicitur. Estque omni ex parte lævis præterquam superiore, quæ aspera existit, &  
spiraculis quibusdam minimè peruijs donata, præcipuè in superiore <sup>x</sup> Appendicis, x ead. E.  
sede. & ad squamæ seu spinæ basim, quibus secundus <sup>y</sup> scapulam attollens musculus y li. ii. t. x. A.  
inferitur, & vnde <sup>z</sup> primus brachium mouens educitur. In anteriori quoque huius a li. ii. t. x. A.  
processus

b ead. f. v. c.

processus fede<sup>b</sup> sinus insculpitur, exiguus adeo, vt sinus ne, an caput sit, minimè internoscatur: cui clauiculæ capitulum implantatur, medijs quibusdam validissimis tendinibus, & cartilagine, illius instar, quam in maxillæ inferioris articulo concurrere diximus cum superiore, vtrinque quæ ossa spectat, læui & lubrica, atque huius duntaxat articuli ligamenti innixa.

De Clauiculis.

Cap. 19.

**I**Am diximus Clauiculas in sinum superioris Scapulæ processus, qui summus Humerus dicitur, à suo latere articulari, atque in duos præterea sinus, in superiori laterum primi ossis pectoris, fede insculptos. Diximus insuper sinus huiusmodi orbiculares esse, ab anteriori in posteriorem partem ductos, nec non, illa multò, quàm hac parte latiores, sed introrsum altiores quam extrorsum existere. Iam verò scias oportet, harum Clauicularum capita, quorum vtrumque pectoris ossi à suo latere committitur, haud absimilem à suis sinibus obtinere figuram. Sunt enim

Clauicula quomodo pectoris ossi committantur.

a t. vi. f. v. A.

b ead. B.

c ead. C.

d ead. D.

oblonga, depressa, & triangulari<sup>a</sup> quodammodo forma circumscripta, cuius latera angulorum ipsa constituentium modo, inæqualia sunt. Siquidem<sup>b</sup> primus angulus in superiori lateris parte ad humiliora consistens, obtusus quodammodo est; quemadmodum etiam secundus<sup>c</sup>, in superiori capitis parte nonnihil versus posteriora conspicuus; sed<sup>d</sup> tertius in posteriori fede, deorsum parumper positus, acutior, longiorq; est: Ad hæc, prout maiores minoresue anguli existunt, eodem quoque modo, trianguli huius latera sese habent. Nam quod à primo ad secundum dicitur breuius est: quod à tertio in primum, longius, ac modicè obliquum: quod à secundo ad tertium procedit, medio se modo habet. Hæc capitis clauiculæ pectoris ossi, connexi figura est, quod exigua donatur appendice, multa teneraq; cartilagine, quæ vniuersum caput læue reddit, obducta; Sed cartilagine, atque appendice sublatis, asperum caput remanet. Præter huiusmodi cartilaginem, illi similem, quæ in sinibus, in quos capita hæc inferuntur, occurrit, alia insuper in hoc

Articuli huius cartilago.

e li. vii. f. ix. S.

articulo priuatim visitur, e instar illius, quam in inferioris maxillæ cum superiore articulo, repositam esse diximus, cuius tanta est, quanta vniuersi ossis pectoris, sinus, & capitis, clauicularum amplitudo: estq; omni ex parte tenuis & æqualis; & quæ sinum respicit, admodum leuis, vinctuosq; humore perfusa; & ligamentis articulum in orbem amplexantibus connata, ideoq; triangularis. Capitulo isto educta, altera ex clauiculis, summum humerum versus, licet obliquo nonnihil tramite procedit. Nam simulatq; ab osse pectoris abscedit, extrorsum flectitur, ac deinde priora versus, in caput definens, quod duobus scapulæ processibus articulatur: Adeo vt ex harum clauicularum capitibus, quod pectoris ossi committitur, extrorsum inflectatur; quod verò summo humero connectitur, in priora curuetur. Horum ossium vtrumque duplici<sup>f</sup> prominentia, dupliciq; depressione sibi mutuo correspondentibus insignitur. Prior prominentia, quæ longior est, g iuxta pectoris os, anteriori fede, visitur: huic à<sup>h</sup> posteriori parte cavitatis responderet, quæ thoracis respicit cavitatem. Secunda & breuior prominentia, ad summum humerum vergit, i posteriori fede, thoracis cauum spectante. Ita vt clauiculæ huius extremum, quod pectoris ossi conterminatur, introrsum obliquetur; quod verò scapulæ comittitur, extrorsum; atque os id vniuersum sliteræ figuram exprimit. Caput elatori scapulæ sedi, summo humero articulatz, commissum, tuberculo adeo exiguo prominet, vt sinus ne an tuberculum sit ægrè diiudices; pars verò inferior, humiliori scapulæ processui Anchoræ simili annexa, latior est, quemadmodum etiam processus. Verùm tam caput hoc, quàm quod pectoris ossi committitur, magis fistulosa sunt, quàm<sup>k</sup> media clauicularum sedes; sunt enim alijs quoque partibus crassiora; vt autem initio libri retulimus, quò crassius existit os, eò maiorem obtinet cavitatem. Media regio, quæ tenuissima, solidissimaq; est, ac propèteres, humiliori sede, in<sup>l</sup> lineam protuberat; quæ non procul incipit à clauiculæ capite, pectori articulo, ad medium ferè primi ac postremi ipsius angulorum, & paululum vltra

Reliqui ossis huius foria.

Clauicularum figura.

f t. vi. f. iiii.

g ead. F.

h t. vi. f. v. I.

i ead. E.

Caput clauiculæ summo humero articulatam.

K ead. H.

l ead. F. G.

Ossis huius substantia.

Ossis huius lineæ  
aliquos, impres-  
siones foramina  
et asperitates.

clauiculæ medium pertingit. Ab huiusmodi lineæ primus thoracem mouentium  
musculus principium desumit. Iuxta huius lineæ principium, non procul ab  
huius clauiculæ capite<sup>n</sup> asperitas sinuosa conspicitur, vnde ligamentum educitur  
partem hanc ossi pectoris colligans; Iuxta extremum quoque altera occurrit, ex qua  
ligamentum enascitur, quo clauicula tuberculo arctissimè deuincitur, ad antero-  
ris scapulæ processus radicem posito, cui commemorata iungitur asperitas. Ad in-  
feriorem clauiculæ sedem huic asperitati respondentem, vbi clauicula amplior euadit,  
altera eiusdem figuræ<sup>o</sup> asperitas conspicitur, multo profundior; potissimum  
iuxta curuitatem summo humero proximam, vbi validiora multò, quam supe-  
riori parte ligamenta producantur. At superior huius clauiculæ sedes læuis tota  
est, præterquam iuxta ipsius capita, vbi nonnihil exasperatur; idq; ligamento-  
rum quorundam, & P musculorum, & hisce partibus, vt suo loco dicemus, pro-  
ducendorum gratia. Sic quoque in anteriori vtriusque harum clauicularum par-  
te, ad radicem primi eorum anguli, quos capiti, pectoris ossi, articulo adeste  
diximus, <sup>q</sup> lineæ prominet ante medium clauiculæ desinens, ex qua maior primi  
<sup>r</sup> musculi, brachium mouentis portio deducitur. Præterea hac eadem in parte, vbi  
retrosum inflectitur, & vbi non procul ab ipsius capitis coniunctione cum pro-  
cessu, qui summus Humerus dicitur, articulatio caua efficitur, <sup>s</sup> asperitas ingens  
occurrit, vnde potissima secundi brachium mouentis <sup>t</sup> musculi pars ducit origi-  
nem. Posterior huius clauiculæ regio, nihil, cuius nonmeminerim, asperitatis  
obtinere, præter <sup>u</sup> grumum quendam, siue tuberculum, in medio curuitatis partis  
huius consistens: vnde ligamentum educitur, quod interiori scapulæ processui  
innititur. Nihil præterea in clauiculis obseruatione dignum occurrit, quàm quæ  
in solidissima earum parte, quæ media est, potissimum verò posteriora versus,  
nunc bina nunc terna habentur spiracula, minimè peruia, per quæ nonnulli ve-  
narum, arteriarumq; ramuli ipsas enutrientes deferuntur.

## De Osse Humeri.

## Cap. 20.

Humeri os ma-  
ximum totius  
corporis ossium  
exceptis femo-  
re, ac duobus  
cruris ossibus.  
Superior hume-  
ri pars.

**H**umeri os appellatur, os brachij inter humerum, & cubitum interiaccens;  
quod femore, nec non Tibia, fibulaq; exceptis, omnium ossium maxi-  
mum est. Summa eius regio, scapulæ commissæ, <sup>a</sup> Appendicem constat ingenti,  
quæ caput edit grandiusculum, leui adeo <sup>b</sup> impressio diuifum, vt nesciam cur  
duo adeste capita, quisquam proderit. Interior pars, quæ maior est, & <sup>c</sup> semi-  
globi instar orbicularis, læuis, æqualis, & cartilagine obducta, quæque in scapu-  
læ sinum inferitur, internum appendicis latus vniuersum, externiq; plusquam  
mediam sedem constituit. Exterior, quæ nonnihil aspera est, & inæqualis, <sup>d</sup> re-  
liquum externi lateris occupans, nulli ossi committitur; imò in Tuberculum ve-  
luti protuberat, in quod multa, & validissima ligamenta, os id scapulæ necten-  
cia implantantur. Et quemadmodum reliquæ ossium partes, quibus aliquid con-  
nascitur inferitur, ue, asperæ sunt, sic quoque & præfens impressio, caput istud  
dirimens, aspera cernitur. Porro exterior pars, præterquam quod inæqualis aspe-  
raq; est, in duo rursus capitula seu grumos, processus ue diuiditur, in posteri-  
orem scilicet, maiorem, & anteriorem multò minorem; quos, sinus in anteriori  
huius appendicis parte, extrorsum parumper consistens, dirimit; estq; is insigni-  
ter longus, depressoq; ac canaliformis in modum teres, & externæ primi <sup>e</sup> musculi  
cubiti mouentis radicis similis, quem ab eo educi dicemus. Sinus hic non tan-  
tum ad Appendicem pertinet, verum etiam per humeri ceruicem, cui ea coale-  
scit, impressiùs breuem, & crassam protenditur. Inferior humeri pars vlnæ, &  
radio articulata, longè adhuc magis, tum sinuum, tum capitum multitudine, ac  
figura variat. Primum enim, in media huiusmodi inferiori sede, sinus vnà  
cum duobus <sup>f</sup> tuberculis adest, trochleæ, seu orbisæ imaginem exprimens, præ-  
terquam quod orbita æqualiter toto ambitu exculpitur; <sup>g</sup> internum verò hume-  
ri caput, magis quàm <sup>h</sup> externum prominet; externa enim sede, nullum vlnæ,  
quæ

Inferioris hume-  
ri sedes descri-  
ptio.

Orbita.

m. li. i. c. iiii. d.

n. t. vi. f. v. G.

o. ead. N.

p. f. b. i. i. c. iiii. d.

q. t. vi. f. v. E.

r. li. i. c. iiii. d.

s. t. vi. f. v. K.

t. li. i. c. iiii. d.

u. t. vi. f. v. o.

v. ead. c.

w. ead. c.

x. ead. c.

y. ead. c.

z. ead. c.

aa. ead. c.

ab. ead. c.

ac. ead. c.

ad. ead. c.

ae. ead. c.

af. ead. c.

ag. ead. c.

ah. ead. c.

ai. ead. c.

aj. ead. c.

ak. ead. c.

al. ead. c.

am. ead. c.

an. ead. c.

ao. ead. c.

ap. ead. c.

aq. ead. c.

ar. ead. c.

as. ead. c.

at. ead. c.

au. ead. c.

av. ead. c.

aw. ead. c.

ax. ead. c.

ay. ead. c.

az. ead. c.

ba. ead. c.

bb. ead. c.

bc. ead. c.

bd. ead. c.

be. ead. c.

bf. ead. c.

bg. ead. c.

bh. ead. c.

bi. ead. c.

bj. ead. c.

bk. ead. c.

bl. ead. c.

bm. ead. c.

bn. ead. c.

bo. ead. c.

bp. ead. c.

bq. ead. c.

br. ead. c.

bs. ead. c.



quæ huic orbitæ articulat, luxationis periculum imminabat, cum illi Radius,  
 vi dicemus, adhæreat, qui vlnæ, quò minus è suo loco abscedat, hæc in parte pro  
 fulcro est. Aliud pariter inter exquisitas, & præsentem trochleam discrimen in-  
 tercedit; in illis enim funis per omnem sinus ambitum ducitur; hanc vlna in or-  
 bem, vniuersam amplexari minimè potest, quòd medium superioris ipsius partis  
 i squama ossæ pellucens occupet, cui vlna, cum brachium extendimus vel inflecti-  
 mus, maioris roboris ergo, innitur. Ex duobus hisce sinibus, in superiori huius  
 orbitæ sede insculptis, <sup>k</sup> posterior <sup>l</sup> anteriore amplior multò est; & super vtrumq;  
 vlnæ processus circumaguntur, quos græci *κροτώνες* appellant, quia sinus inter ipsos  
 positi, termini existunt. Anterior sinus anteriorem processum excipit, cum brachium  
 inflectimus, cum verò extendimus, posteriorem processum, quem cubitum  
 vocamus, posterior sinus admittit. Suntq; sinus hi, affabrè adeo parati, vt brachium  
 non vltra quam vsus postulet, & flecti, & extendi sinant. Ad externam pariter hu-  
 meri orbitæ sedem, nonnihil in priora teres, longum & læue <sup>m</sup> caput habetur  
 cartilagine perinde, ac orbita obductum, quod in magnum, terentem, & modicè  
 cauum sinum, quem in superiore <sup>n</sup> radij sede insculpi dicemus, inferitur. Ad ex-  
 ternum huius capitis latus humeri os insigniter protuberat, & quibudam donatur  
 asperitatibus, ex quibus, & ex linea, (quæ ab ipsis exorta, sursum aliquantisper per  
 externum latus conscendit) sex <sup>o</sup> musculi enascuntur, vt suo loco dicemus, tumq;  
 sedem hanc externum Humeri caput semper appellabo. Et quemadmodum ex-  
 ternum humeri latus prominet, sic quoque ab interno latere teres educitur <sup>p</sup> pro-  
 cessus, quem internum humeri Caput vocabo. Id etsi nulli ossi committitur, ab ip-  
 sus tamen apice aliquantisper lato, musculus exoritur, à quo tendinem volam <sup>q</sup> ma-  
 nus inuestientem produci audies; nec non musculi duo motus brachialis opifices.  
 Ex infima verò fede portio eius <sup>r</sup> musculi exoritur, qui primus <sup>s</sup> radium deorsum  
 flectit; cum obscura etiam quorundam <sup>t</sup> digitorum aliquot flectentium musculorum  
 parte. Sic quoque præfens caput in anteriori sua sede, iuxta cavitatem siue orbitam,  
 paruum obtinet sinum, <sup>u</sup> per quem, tertium brachium petentium <sup>x</sup> neruum ferri  
 dicemus; in posteriori autem alterum, <sup>y</sup> quo quintus brachij <sup>z</sup> nervus deducitur.  
 Caput hoc, externo grandius est, licet ad tactum secus occurrat, cuius quidem rei  
 in causa est, radij ad externum articulario. Veruntamen ambo, & alterius ossis  
 constant appendice, quæ in natu minoribus media linea siue harmonia committit-  
 tur, in maioribus verò per vnionem siue symphysem: ideoq; non paucis ea ciuf-  
 demmet ossis portio visa est, sed reuera pars alterius existit, vt optimè aduertit Re-  
 aldus Columbus. Cæterum humerus rectus est, ac propè teres, licet humiliori sede  
 nonnihil excauetur, posterius latus, antèrius prominens; elatiore sede contrà se  
 habet, & in medio propemodum triangularis, quod in musculorum ex eo edu-  
 cendorum, vt suo loco dicemus, gratiam effectum est. In media etiam postero-  
 req; humeri sede, secundum ipsius longitudinem <sup>z</sup> sinus quidam quarto manum  
<sup>b</sup> adeuntium neruo deducendo paratus consistit. Is ab interiore parte inchoat, &  
 per posteriorem incedens, in exteriorem, deorsum obliquus tendit, prout ductus  
 ipse postulat. Ad hæc, in anteriori ipsius sede, <sup>c</sup> extrorsum, supra medium longi-  
 tudinis, adest asperitas, in quam validissimus brachium mouentium <sup>d</sup> musculus in-  
 feritur; & vnde postremum <sup>e</sup> cubitum flectentium educitur. Alia insuper occurrit  
 asperitas iuxta sinum, quo externum musculi caput, primi cubitum flectentium,  
 vehitur; ex qua interior carnosâ huius primi musculi pars, enascitur. In humero  
 foramen notatu dignum nullum occurrit, paucis quibudam, & minimis quidem  
 exceptis, iuxta sinus, & circum vndiq; capita, in id incisis, vt melior in illis, vali-  
 diorq; articuli huius ligamentorum insertio, atque ortus fieret. Sunt & alia non-  
 nulla, venis deducendis parata, quæ per ossis longitudinem occurrunt, potissi-  
 mum internæ ipsius sede; in qua maximus venarum ipsum enutrientium nume-  
 rus conspicitur.

Duo orbitæ su-  
perpositi sinus.

Externus istius  
ossis caput.

Internum.

Inferioris ossis  
appendix.

Humeri ossis si-  
nus.

Humeri ossis  
foramina.

i t. vi. fi. vi.  
N Q.

K ead. o.  
l ead. N.

m ead. P.

n ead. e.

o ead. fi. vii. N

p t. vi. fi. vi. s.

q li. ii. t. i. r.  
lii. r.

r ead. V.  
s li. ii. t. vii. Q  
t li. ii. t. v. o.  
t. vi. z.

u t. vi. fi. vi. T  
x li. vii. t. ii. T  
y t. vi. fi. vi. V  
z li. vii. t. ii. \*

a t. iii. e.

b li. vii. t. ii.  
lii. q.

c ta. i. ii. iii.  
iuxta S.

d li. ii. t. ii. l.  
lii. q. Δ Δ L.

e li. ii. t. ii. N.



Vlna, ac radij  
deserimus.

Duo vlna pro-  
cessus.

Sinus inter duos  
hosce processus  
insculptus.

Radius humero-  
ni committit-  
ur.

Vlna reliquum.

**A** Cubito ad Brachiale, <sup>a</sup> ossa duo porriguntur, quorum maius, Vlnam, mi-  
nus verò Radium vocabimus. Duo hæc ossa utraque longa sunt; sed tum ar-  
ticularionis modo, tum figura inter se varia. Vlna enim finibus quibusdam, & ad  
id requisitis processibus, in orbitam, qua Humeri os <sup>b</sup> inferiori sede donari dixi-  
mus, inferitur; siquidem in superiore sui regione, omnium maximè crassa soli-  
daq; , duos obtinet processus, quorum vnus alterum antecedit. Prior <sup>c</sup> ille est, <sup>e</sup> t. ii. f. 3. t. vi.  
qui sinum supra orbitam exculptum subit, cum brachium reducimus, illi quo-  
dammodo figura similis, latus enim nonnihil est, solidus ac durus. <sup>d</sup> Posterior est, <sup>d</sup> ead. o. D.  
quem communiter Cubitum appellamus, & posteriorem sinum, supra orbitam  
incisum subingreditur, cum brachium extendimus. Inter hosce duos processus si-  
nus <sup>e</sup> insculptur ad literæ C imaginem accedens, tantæ longitudinis, quanta est in-  
terualli inter vtrunque longitudo, quem græci *στυλοειδῆ* hoc est cauum, quod in  
medio sit excavatus, appellarunt. Is totus læuis est, & cartilagine incrustatus, cuius  
interuentu æquè adeo humeri orbitæ coaptatur, vt vel minima re addita vel ademp-  
ta, impediri motum necesse foret. Et supra eam veluti funem agitatur cum bra-  
chium extendimus, aut reducimus. Exteriori vtriusque horum processuum sedi  
asperitas adstat, ex qua valida quædam ligamenta hosce articulos amplectentia  
enascuntur, & aliqui præterea muscoli tum ex his qui <sup>f</sup> cubitum extendunt, & <sup>f</sup> lib. ii. t. xij.  
<sup>g</sup> flectunt, tum ex his, qui <sup>h</sup> secundos & <sup>i</sup> tertios digitorum articulos inflectunt; <sup>g</sup> b. c.  
Tuberculis etiam quibusdam ad id conferentibus, qui ad prioris processus radi-  
cem consistunt. Sic quoque ad anterioris processus radicem asperitatibus qui-  
busdam vlna insignitur, prædictorum musculorum ortui pariter deseruienti-  
bus. In infima itidem dicti sinus regione, vbi teres is esse desinit, parua linea si-  
ue impressio visitur, vnde ligamentorum quorundam, vlnam humero artè col-  
ligantium, pender exortus. Estq; illud notatu dignum, postremum huiusce os-  
sis processum, vna vt plurimum, nonnunquam verò duplici appendice insigni-  
ri, quæ in senibus per vnionem siue symphysium coalescunt. Radius qui Vlnæ su-  
perstat, quæ humero committitur, tenuis aliquantulum est, & à capite, ex lon-  
ga tenuiq; ceruice in amplum ac teres desinit <sup>k</sup> capitulum, in cuius medio ro-  
tundus, & leuiter cauus sinus insculptur, <sup>l</sup> externum humeri caput excipiens;  
& super hoc caput, radius sursum deorsumque agitatur, nihil tamen interim ob-  
stans, quò minus flectatur, extendaturq; brachium. Quinimò radij sinus super  
ipsummet humeri caput flectitur, & extenditur, absque vllò prorsus luxationis  
periculo, quamuis sit modicè cauus; tanta est articulati capitis longitudo, ac la-  
tutudo. Verum Vlna post suum cum humero articulum, ad brachiale tendens,  
sensim ac sensim, donec ad ipsum perueniat, coangustatur; Ibiq; in validam  
tenuemque abit ceruicem, ex qua <sup>m</sup> caput educitur, ad cuius extremum rotun-  
da perpetuò Appendix visitur, cuius exterior sedes inæqualis est, & processum  
styli scriptorij <sup>n</sup> instar acutum obtinet, qui osi paruulum digitum sustinenti cor-  
respondet, & brachiali, quemadmodum dicemus, sustinendo opitulatur, cum id  
extrorsum abscedit. Ad internum dicti processus latus inæqualis sinus exculpi-  
tur, in quo habetur <sup>o</sup> cartilago, quæ à radio pronata, inter brachiale, atque vl-  
nam tota propemodum, ita reponitur, vt eorum neutri adhæreat. Atque idem  
omnino præstat, quod ea, quam inter maxillam inferiorem, & osis temporum  
sinum, nec non inter clauiculas, & pectoris os consistere diximus. Præter hunc  
sinum, reliquum huius Appendicis, brachiali commissum, non secus ac ceteri  
Appendicum sinus, & capita, cartilagine totum obtegitur. Hæc itidem Appen-  
dix, alium sibi vendicat sinum, <sup>p</sup> longum quidem illum, & canalis modo tere-  
tem, ad vlnæ vsque ceruicem pertinentem; & per eum <sup>q</sup> tertij musculi brachia-  
le extendentis tendo transmittitur. Istius osis reliquum variæ, ac multiplicis fi-  
guræ est. Infima siquidem ipsius regio, iuxta posterioris processus, qui humero  
commit-

a. t. ii. f. x.  
Y. t. vi. f. vii.

b. t. vi. f. vi.  
L. M.

c. t. ii. f. 3. t. vi.  
fig. vii. c.

d. ead. o. D.

e. t. vi. f. vi. o.

f. lib. ii. t. xij.  
b. c. d.

g. lib. ii. t. vii.

h. lib. ii. t. v. o.

i. lib. ii. t. vi. o.

k. t. vi. f. vii.

l. M.

m. ead. P. Q.

n. ead. R.

o. t. vi. f. vii.

p. ead. V.

q. li. ii. t. ix.

r. d.

committitur radicem, gibba nonnihil est ac figuræ triangularis; & detracta cute ex-  
carnis statim conspicitur, muscutorumque cubitum extendentium tendinibus qui-  
busdam ⁊ velata. Prima huius trianguli linea inferiorem istius ofsis sedem occupat,  
& secundum vlnæ longitudinem satis detecta porrigitur. Siquidem tam⁹ musculus  
is, qui per externum vlnæ lat⁹ exporrigitur, & brachiali paruum digitem sustinen-  
ti inseritur, quàm qui per internum lat⁹ extenditur, & in brachiale ⁊ desinit, ante  
eiusdem brachialis os paruum digitem sustinens, ita huius ofsis latera comprimunt,  
vt lineam hanc extrorsum prodire cogant; quæ hoc modo vltra medium longitu-  
dinis vlnæ contendit. ⁊ Secunda linea ab interiore latere radicis primi processus in-  
cipit, & commune lat⁹ sibi & primæ lineæ constituit, per quod ⁊ musculus bra-  
chiale flectentem transmitti dicemus. Tertia ⁊ ab externo latere radicis primi pro-  
cessus inchoat, vnde validum membranæ instar, ⁊ ligamentum educitur, quo vlna  
radio secundum longitudinem connectitur. Inter hanc & primam lineam lat⁹ res-  
ponitur, quod à musculis interiorem vlnæ sedem occupantibus comprimitur, qui-  
bus omnibus vlna & radius cedunt, eique potissimum, qui ⁊ tertium priorum qua-  
tuor digitorum articulum flectit: & aduerte lat⁹ hoc secundum sui longitudinem  
primo & secundo asperius existere, hincque eorum muscutorum portionem enasci,  
quo ex vlna educi audies. Lat⁹ inter primam & tertiam lineam repositum, cæteris  
duobus minus excavatur, & priuatim lineam nonnihil obtusam sibi vendicat,  
longam, nec insigniter eminentem, & tertiam, quàm primæ lineæ propinquiorem,  
ex qua tres musculi producantur, eorum scilicet, qui radium sursum agunt<sup>b</sup> mini-  
mus, & duo quorum alter vti dicemus pollicis, alter indicis & medij motibus deser-  
uit. Hunc in modum, etiam vltra suæ longitudinis medium, vlna se habet, teres  
inde deorsum futura, nisi secunda linea protuberans accederet, quæ oblique deor-  
sum protensa quadrangulari musculo, isthinc vti dicemus<sup>c</sup> educto, sedem adaptat.  
Superest nunc vt radij historiam prosequamur, qui suprà infrâque<sup>d</sup> vlnæ commit-  
tuntur, in medio tamen ita obliquatur, vt eam<sup>e</sup> nusquam contangat. Quod ideo po-  
tissimum effectum est, vt eo innixa vlna, sursum deorsumque flecteretur: partim  
verò in gratiam commodioris exortus muscutorum, tam internum quàm exter-  
num cubiti lat⁹ occupantium. Vlnæ ac radij varia insigniter est inferior à superio-  
re articulatione; Superius enim vlna radium excipit, inferius contrâ se habet. Ad ex-  
ternum igitur lat⁹ anterioris vlnæ processus, exiguus transversim<sup>f</sup> sinus insculpi-  
tur, quartæ circuli parti similis, lævis & cartilagine obductus, quo internum capitis  
radij lat⁹ suscipitur, cui sinum adesse retulimus, externum humeri caput excipien-  
tem. Infrâ tamen, iuxta brachiale radius crassescit, dilataturque, ac in § appendicem  
desinit, interno cuius lateri exiguus admodum sinus inciditur cartilagine in crusta-  
tus, instar illius, qui vlnam donari nuper diximus. In hunc sinum superior externi  
lateris, appendicis radij sedes inseritur, exigui tuberculi, quod & ipsum cartilagine  
obducitur interuentu. & super ambos hosce articulos radius sursum deorsumque  
revolvitur. Haud secus iuxta cubitum radius ante suam ceruicem asperum exierit  
processum, vlnam respicientem, cui primus cubitum flectentium musculus infer-  
ritur. Reliquum radij brachiale versus, neque admodum etiam teres est; quinimò  
interiori latere, secundum sui longitudinem, ⁊ acutam & insigniter accliuem lineam,  
è regione tertij vlnæ lineæ positam obtinet; ex qua membranosum illud<sup>h</sup> ligamen-  
tum educitur, quo vlnam radio, quâ inuicem magis dehiscunt, colligari diximus.  
Lineæ istius latera, quò musculis per vtraque ductis, cedant, paululum deprimentur.  
Sed internum lat⁹ asperius, & cauum magis externo est, quod ex eo tertium polli-  
cisos flectens<sup>i</sup> musculus educatur. Externum radij lat⁹ è regione commemoratæ  
lineæ consistens, teres propemodum est, & iuxta suæ longitudinis medium, aspe-  
rum nonnihil occurrit, atque inde minor radium sursum flectentium<sup>m</sup> musculus,  
& superior deorsum<sup>n</sup> reducentium enascuntur. Inferior<sup>o</sup> radij sedes, etsi eam cras-  
sescere dilatarique diximus, quod vniuersum illi brachiale articulare oporteret, vt,  
vlna ferè immota, manus in pronom supinumque agi posset, quoniam tamen os  
adeo tenue, ad tam crassum caput, fractionis periculum subiret, minus quàm bra-  
chialis

Vlna longitu-  
do.

Radij historia.

Asper radij pro-  
cessus.

Inferioris radij  
partis descre-  
ptio.

chialis postularet crassities, caput adactum est. Huic defectui vlna subuenit, sustinens & ipsa brachiale, <sup>p</sup> acuti duntaxat processus medio, quem in ipsius Appendice haberi diximus, Reliquum nanque huius appendicis brachiale versus cartilagine obducitur, quæ ab inferiore sinus parte in radij appendice, brachialis excipienda gratia, insculpti, exoritur, & vlnæ appendicem conscendit, ad apicem vsque ducti processus, ita eum à brachiali diuidens, vt licet ipsum vlna sustineat, minimè tamen ei processus inferatur. Neque etiam in processu stylum scriptorium referentem, aliquod insertionis vestigium occurrit, quòd media interponatur cartilago, ipseque articulus laxus potius quàm arctus existat; imò verò brachiale radio, vt par erat, vniuersum articulatur. Interna iudem radij sedes, cui appendix coalescit, ipsaque simul appendix nonnihil excavantur, <sup>q</sup> vt postremo <sup>r</sup> musculo radium in pronum agendum cedant, nec non etiam vt tendinibus digitos <sup>s</sup> flectentibus, liber aditus pateat. Externa sedes paululum teres & gibba est, quòd validior existat. Nihilominus, quoniam tali ea existente, facile contingere posset, vt <sup>t</sup> tendines supra eam ad extendendos digitos, deducti prolaberentur, quatuor hac in parte sinus exculpti fuere, quibus tendines, ceu per foramina, vel annulos traicerentur. Præter quos quatuor sinus, alius pariter in <sup>u</sup> externa sede, quæ radij appendix vlnæ appendici articulatur, sinus consistit, & per eum <sup>x</sup> musculi paruum digitum extendentis tendo defertur.

## De Osibus Brachialis. . . . . Cap. 22.

Brachialis ossa  
quor.

**B**rachiale appellamus ea ossa, super quæ <sup>a</sup> manus agitur, quibus vlna, & radius, <sup>a</sup> vt diximus, committuntur. <sup>t</sup> Ocho id osiculis constituitur, quaternatim compositis; quæ omnia in natu maioribus, extrà dura sunt, intus verò spongiosa, & medulla perfusa (potissimum grandiora, in quibus ea euident, & conspicua est,) ac paruis quibusdam spiraculis passim incisa minimè peruijs, ac venarum, arteriarumque aliquot ramulis aditum præbentibus. Ossa hæc omnia, non minus magnitudine, quàm figura, & in situ inter se variant; non enim alterum alteri vsque adeo simile est, quin facile singula seorsum internoscantur. Verùm vtcunque differant, affabrè adeo inuicem adhærent, aptanturque vt brachiale vnico constare osse videatur, sitque ipsorum numerus inuentu difficilis, nisi <sup>b</sup> membrana, quæ ipsa constituta detinet, adimatur. <sup>c</sup> Cuncta simul interna sede <sup>c</sup> sinuatam figuram C literæ instar efformant; externa verò alteram incuruam, illi similem, quàm radij caput præbere retulimus. Suntque his tantummodo partibus ligamenti obuincta; nam superiore sede, quæ radio committuntur, læuia sunt & cartilagine obducta, quemadmodum & inferiore, quæ palmæ & pollicis osibus coarctatur. Pars horum osiculorum, cuius medio inuicem coaptantur, nec inæqualis, nec aspera est, neque ligamenti, aliarum modo referta. Imò eorum nonnulla, sinus suos læui cartilagine incrustatos obtinent, quibus reliquorum capitula, siue tubercula excipiuntur, præterquam in ossium inferioris ordinis connexu, vbi exiguum quid cartilaginei ligamenti interponitur, quod ferè inuentum oculis effugit, vbi ossa hæc minus arctè, quàm superiora deuinciuntur. Cum enim superiorum ossium ordo, radio, vnus ossis instar committatur, inferior vero primò pollicis ossi; & quatuor postbrachialis veluti multis seiunctis quæ ossibus coarticuletur, oportuit superiora ossa, concinnè magis minorique intermedio, quàm inferiora, inuicem adaptari. Porro vtiusque ordinis ossa, propter varios manus, & brachialis motus, multa esse oportuit. Iam ergo Brachialis structuram, in genere descripsimus. Nunc sigillatim vniuscuiusque nomen, situm, figuram, sinus, tubercula, & connexus formam prosequemur, à superiori ordine, qui radio committitur, exorsi. In hoc igitur ordine, ossa quatuor habentur, quæ pro ea, qua disponuntur serie, numerabimus; <sup>d</sup> Primum id appellantes, quòd huiusce ordinis internum latum constituit, secundum, tertium & quartum quæ deinceps ad externum vsque sequuntur. Eodem prorsus modo, quatuor reliquæ <sup>e</sup> inferioris ordinis ossa enumerabimus, qui quidem

Brachialis ossa  
cur plura.p. vi. f. vii.  
R.q. ead. n.  
r. li. ii. c. vii. x  
s. li. iii. c. v. e. c.t. li. iii. c. iii.  
iii. 345. b.

u. vi. f. vii. a.

x. li. iii. c. ix. b.

b. li. iii. c. viii.  
A. c. xii. l.  
c. vi. f. vii. iii.

d. ead. l. 1. 2. 3.

e. ead. 5. 6. 7. 8.

quidem ordo quinto, sexto, septimo, & octauo ofibus constituitur. Primum & secundum superioris ordinis ossa, sinui radij Appendici exculpto arctè admodum inarticulantur, medio cartilaginis, qua ea in parte obteguntur. Tertium cartilagini innititur, quæ à radioeducta, ipsum ab vna dirimit, vti diximus; quamuis, vbi manum extrorsum flectimus, externum huius tertij ossis latus, nonnihil etiam vlnæ processum stylo scriptorio similem contingat. Tertium istud os, nullum ferè in homine suum cartilagine obductum, qui visu dignoscatur obtinet, in quem dictus inseratur processus. Quartum istius ordinis <sup>f</sup> os, nullatenus vlnam contingit. licet in superiorem ipsius sedem portio ligamenti suscipiatur, quod ex acuto vlnæ processu nascitur. In hanc quoque istius ossis partem tendo inferioris <sup>g</sup> brachiale flectentium musculi inseritur. & ex humiliori eiusdemet ossis regione musculus exoritur, primum digitum ab alijs abducens; nec non etiam eius <sup>b</sup> musculi portio, qui duorum <sup>i</sup> primum parui digiti os flectentium habetur exterior; adeo vt quartum hoc os nullatenus coniugia sibi ossa contingat, præterquam interno latere, nonnihil palmam versus, vbi depresso capitulo committitur ad externum tertij ossis brachialis latus, per eam coniunctionis formam, quam Arthrodiam vocant, quæ ad Synarthrosim refertur. Os id omnium brachialis ossium minimum existit, paucioresque reliquis sinus, pauciora obtinet tubercula, imò teres propemodum est, etsi longius, & minus crassum. Cum enim musculus inferius educat, superius verò validissimi tendinis insertionem admittat, sursum, deorsumque magis quàm in latera, prominere ipsum oportuit. Id inter superioris ordinis ossa refertur, quod tertio eius ordinis ossi coarticuletur, etsi veteres seorsum ipsum enumerant. Præter istud os, reliqua omnia varijs inuicem locis colligantur. Nam primum, quod foris gibbum est, intus depressum, ac longius paulò quàm latum, præterquam quod radio articulatur, secundo etiam brachialis ossi committitur, amplo capitulo, quod sinum secundo, in id, ossi exculptum, subingreditur. Inferiore præterea sede quinto & sexto, eiusdem brachialis ossibus iungitur, medio tuberculo, quod ab eo ductum, sinum duobus supradictis ossibus communem subit. Inter tot tubercula, insignem os id sinum tantummodo adipiscitur; quo septimi ossis; cunctorum brachialis ossium maximi, caput excipitur. Ita vt primum os radio, nec non secundo, quinto, sexto, & septimo brachialis ossibus committatur. Secundum, quod tanto minus primo est, quanto id tertium magnitudine superat, ab omni parte sphericum quodammodo est, præterquam ab inferiore, vbi depressum existit; ac primo & septimo, eo quem diximus modo connectitur, tertio verò per connexum, qui Arthrodia dicitur, synarthrosis membrum. Atque ita secundum istud os radio, & primo, tertio, ac septimo brachialis ossibus committitur, octauum ferè contangens. Tertium à lateribus, secundo & quarto conterminatur, adeoque sinuatur, vt nullo prorsus modo vlnam queat contingere; inferiore autem sede sinum octauum ossis subit, amplo, sed parum tumefcente capitulo. Paululum id teres existit, præterquam superius. Quartum tertio duntaxat articulari iam diximus. Quintum, quod in inferiori ordine primas obtinet, quadrilaterum quodammodo est, & superiori latere sinum adipiscitur, qui primi ossis capitulum excipit; externo autem latere alterum obtinet, quo sexti ossis caput admittit; rursusque inferiori sede alterum, insignem quidem illum, & oblongum, atque intus extraque magis, quàm à lateribus, aut in medio excauatum, in quem alterum primi ossis pollicis capitulum inseritur, eo articulationis genere, quæ Ginglimos dicta est, speciem Diarthrosis; longè aliter ab ossium brachialis inter se connexu. Insuper, quintum os inferiori sede alterum sibi, & sexto communem sinum adipiscitur, qui primum os indicem sustinens, ex parte admittit. Quintum itaque os primo & sexto brachialis ossibus, conterminum existit, & primum pollicis os vniuersum, primi verò postbrachialis ossis portionem sustinet. Sextum os, quod secundum, minimumque huiusce ordinis ossium habetur, quodammodo triangulare est, internoque latere quinto in eum, quem diximus modum, committitur; externo autem latere, septimo coarctatur, per articulationem

Brachialis ossa  
vlnæ ac radio,  
vt committantur.

Quartus ossis  
brachialis descriptio.

Primi ossis descriptio.

Secundi.

Tertij.

Quinti.

Postbrachialis.

Sexti.

f pro isto &  
sequentibus  
vide tab. vi.  
fi. viii.  
g li. i. c. ix.  
xi. a.  
h li. ii. c. iii. q.  
i li. ii. c. iii. q.

Septimi.

Oſtaui.

tionem Gynglimon, Synarthrosis, seu motus obſcuri ſpeciem; partem verò ſuperiori primum attingit; inferiore præter ſinum quinto communem, alterum quoque ſeptimo communem obtinet, quo poſtbrachialis oſis medium digitum ſuſtinentis portio ſuſcipitur. Ita vt os id primo, quinto & ſeptimo brachialis oſibus, poſtbrachialis verò primo & ſecundo committatur. Septimum, brachialis oſium maximum, veluti quadrilaterum eſt, longum magis, quàm latum, & inferius ſinum primo & ſecundo brachialis oſi communem ſubit, inſigni capite, lato, atque admodum accliu; interiore ſede ſexto oſi committitur, exteriore autem interno oſtaui oſis lateri vnuerſo, depreſſo parum per capite, ac ſinu leuiter incifo. Articulus hic, aliqua ex parte cartilagine obducitur, qua ſeptimum os octauo artiſſimè deuincitur; Quod minimè tamen obſtat, quò minus ſeptimum iſtud os, omnium brachialis oſium, extrorſum facillimè luxetur, tum quòd maximum ſit, atque iſtibus euitandis minus idoneum, tum quòd ligamentum, quo cæteris colligatur, nonnihil hac in parte tenuius, quam reliquis brachialis partibus exiſtit. Os itaque id primo, ſecundo, ſexto & octauo brachialis oſibus, ſimulq; poſtbrachialis oſi medium digitum ſuſtinenti committitur. Octauum triangulare propemodum eſt, & inſtar cunei, inter ſeptimum tertiumque adigitur, quibus committitur; ſeptimo quidem eo quem diximus modo, tertio autem, medio ſinu quem ſibi exculptum adipiſcitur. Duobus præterea poſtbrachialis oſibus, annu arem, parumque digitum ſuſtinentibus coarctatur. Quare os id quatuor continuum oſibus eſt, alterique ſeſami ſemen emulanti, (vnde tum ipſum, tum ſui generis reliqua, ſeſamina, hoc eſt ſeſamo ſimilia fuerunt appellata) ad externum brachialis latus conſiſtenti, vbi quartum poſtbrachialis os, paruum ſuſtinens digitum octauo brachialis oſi committitur. Oſiculum id validiorem reddere huiusmodi articulationem videtur; ſimulque quarto prædicto poſtbrachialis oſi ſuſtinendo, ac ſuffulciendo opitulari. Octauum iſtud os, interna ſede quàm manus volam ſpectat, <sup>k</sup> proceſſum notatu dignum, ſibi priuatim vendicat, Cliteræ ritu exculptum, cuiusmodi etiam proceſſum, licet paulò minorem, <sup>l</sup> quintum brachialis os adipiſcitur. Ab altero in alterum horum proceſſum apicem validiſſimum, neruoſumque porrigitur <sup>m</sup> ligamentum, ſub quo tendinibus ad digitos ſteſtendos tendentibus, tum iter præbetur, quò minus iniurijs laceſſuri, aliquamve in partem deſteſtere valeant. Vniuerſa hæc ſedes inter vtrunque proceſſum media, levis quodammodo eſt, ne ſubditis hiſce tendinibus noxæ quidpiam accedat, reliquum verò brachialis aſperum exiſtit, quòd ligamenta, quibus commemorata oſſa deuincuntur, firmius adhæreant.

x t.vi.f.viii.  
M.

l ead.h.

m lib.ii.tab.  
iii.6.

## De Poſtbrachiali. Cap. 23.

Poſtbrachiale  
quos conſteſt of  
ſibus.

QUod<sup>a</sup> brachiali ad primos vſque digitorum articulos ſpacijs intereſt, Peſten, ſeu <sup>a</sup> t.i.rr.e.vi.  
<sup>b</sup> Palma manus, vel Poſtbrachiale dicitur. Id licet quinque oſibus conſtrui, di-  
cere poſſimus, primo etiam <sup>b</sup> pollicis oſſe connumerato, tum quòd poſtbrachialis <sup>b</sup> t.vi.f.viii.  
pars quodammodo exiſtat, tum quia nos non minus eam partem quam os illud oc-  
cupat, Poſtbrachiale appellamus, quàm reliquum; quoniam tamen primus pollicis  
articulus primo aliorum digitorum articulo per quam ſimilis eſt, vtque cæteris om-  
nibus obſeruatum numerandi ritum ſequamur, <sup>c</sup> quatuor eſſe dicemus; quæ reli-  
qua digitorum oſſa longitudine ſuperant, ſuntque magna ex parte ſphærica, caua,  
& medulla intus reſerta. Longiſſimum ipſorum eſt quod medium digitum ſuſti-  
net, tum quod indicem, ſicque deinceps minora ſiunt. Omnia verò poſtbrachialis  
oſſa, tam infera quam ſupera ſede <sup>d</sup> Appendicem obtinent, cuius medio eorum <sup>d</sup> ead.Q.R.  
vnum quodque brachialis oſibus, in hunc modum committitur. <sup>e</sup> Primum duobus <sup>e</sup> pro iſto &  
capitulis, & ſinu, toti ſerè ſexto coarctatur, & quinti portionem attingit, ſinum <sup>f</sup> ſequentibus  
quem quinto & ſexto brachialis oſibus communem haberi diximus, ſubintrans. <sup>f</sup> vide tabu. vi.  
ſi.viii.  
Secundum depreſſo & obliquo capitulo in modicè cauum & obliquum ſinum,  
quem inferiori ſeptimi oſis ſedi exculpi diximus, inferitur, ac præterea etiam in  
ſexti oſis partem. Tertium & quartum vtraque octauo committuntur duobus  
perquam

Oſium horum  
appendices.Poſtbrachialis  
oſſa, vt brachia-  
lis oſibus com-  
mittuntur.



perquam exiguis capitulis vix quidquam prominentibus: Ossium post brachialis appendices arcuè adeo ossibus suis coarctantur, vt superiores, nec dum in puerulis appareant. Ibi ossa hæc, nonnihil externa fede latiora, quàm interna occurrunt, omnia exteriore facie tumescencia, interiore reducta, euidentiùs multò quam brachialis ossa. Superiores ipsorum appendices lateribus sibi inuicem coalescunt, media qua colligantur cartilagine. Inferiores quoque & ipsæ insignes existunt, & in rotundum, ac ab externa fede in internam, oblongum caput desinunt, quod cartilagine incrustatum, primi cuiusque digitorum ossis sinum ingreditur, per articulationem Arthrodiam, Diarthrosis speciem. Lateribus quoque Appendices hæ inuicem coalescunt, prout superiores committi diximus, licet minus validè: Nihilominus tamen quæ se mutuò aspiciunt, suos quoque sinus obtinent, ex quibus cartilaginea ligamenta educuntur, quorum opera validè admodum inuicem connectuntur. Ceterum ossa hæc in medio secundum postbrachialis longitudinem, nequaquam sibi ipsis adherent, quòd appendices sint ossibus crassiores: Quod ideo effectum est, vt tribus illis spacijs, inter quatuor postbrachialis ossa constitutis, sex muscoli caperentur, ex illis octo quos <sup>f</sup> primum quatuor digitorum os flectere dicemus, binis eorum in quolibet spacio repositis: Quibus musculis, vt sedes aptior adaptaretur, ossa hæc interna fede, quæ volam respicit, excauata nonnihil fuere; nec non lineis quibusdam & impresionibus secundum longitudinem insignita, prout à musculis ab eis educitis comprimuntur. Externa verò fede, quæ volæ manus respondet, leuiter exasperantur, quòd tribus <sup>s</sup> musculis brachiale mouentibus, aptam insertionem præbeant.

Inferiores appendices.

Postbrachialis ossium appendices cur ossibus ipsis crassiores.

f li. ii. t. viii.  
A. xlii. m.

g li. ii. t. liii.  
A. t. ix. xli. A.

De Ossibus Digitorum. Cap. 24.

**V**Nusquisque manus digitus tribus ossibus per quam duris <sup>a</sup> constituitur, trium articulorum interuentu connexis; non ideo tamen medulla destitutus; quinimo præterquam quod ab extremis, appendicum modo, spongiosa sunt, in medio etiam caua existunt. Primum verò cuiusque digiti os secundo grandius, crassiusque est, & secundum tertio. Et eorum quilibet amplius ab initio est, quam in summo, ac in paruum impensè caput desinit. Omnium extrema, medio crassiora existunt, quemadmodum etiam se habet omnis propemodum longorum ossium series; vt scilicet, pondere minus grauent, validioresque redderentur appendices. Verùm digiti omnes æquè teretes, ac leues sunt, quò minus lædantur, tuberculis scilicet omnino destituti. Sunt quoque ossa hæc, introrsum aspera, & excauata, quò melius apprehensa perstringant; extrorsum gibba, vt noxas melius ferant; in medio caua, ne sibi ipsis impedimento sint. Id quod in paruo digito perspicuum fit, qui externa & superiori fede teres est, interna vero, atque inferiore cauus. Idem quoque in pollice videre est, qui, quòd ceterorum digitorum præsidio sit destitutus, teres interna fede existit. Cetera omnia digitorum ossa exteriùs teretia sunt, adeo vt ne in articulis quidem vel tantillum promineant; præterquam primum pollicis os modicè latum, atque depressum, nec non tertium quodque digitorum os, quæ licet exteriùs gibba sint, nihilominus non procul ab articulo, vbi secundò ossi committuntur, ad summum vsque, haud æquè ac reliqua extrorsum protuberant, quò vnguibus locum cedant. Sunt præterea huiusmodi ossa, nonnihil interna fede caua, & exiguum veluti canale constituant, per quem tendines digito flectentes tuto deducuntur; primo pollicis osse excepto, palmæ os interna sui regione respiciente; quod etsi larus volam spectans, ab vtroque capite planum, iuxta articulos, & in medio depressum obtinet; minimè tamen æquè ac cetera digitorum ossa, latum, planum & cauum est; quin potius gibbum, & interiore magis, quàm exteriore fede acutum existit. Idque summa cum ratione effectum est; Cum enim procul omne periculum abesset, ne tendines qui ad secundum, tertiumque digiti huius articulum flectendum transmittuntur, aliquam in partem deflecterent, quod musculis, quos huic ossi propinquos esse dicemus, firmiter admodum adnectantur, canali ipsi sum donari minimè necesse fuit, vt neque ligamento, quod ceteris digitorum ossibus

Singuli digiti ternis constituitur ossibus.

Ossium horum magnitudo.

Figura.

a ti. aat. vi.  
fi. viii. ABC  
DEF.



sibus secundo libro adesse docebimus. Aduertere tamen oportet, tertium singulorum digitorum os in apice, vbi nulli ofsi committitur, nonnihil prominere, asperoq; donari capitulo, vnâ cum binis ligamentis, quibus tendo adiungitur; qui interiorum digiti partem subit, & ad apicem vsque tendens terminatur. Ast operæ precium erit, articulationis horum digitorum formam sigillatim prosequi. Scire itaque in primis oportet, primum pollicis os quinto brachialis ofsi ita coartculati, vt vndeque sursum deorsumque agi possit, multò tamen ad latera, quàm aliam in partem facilius; sinus enim ofsis brachialis, quo excipitur, anteriùs posteriusque altius quàm ad latera insculpitur, illi verò istius ofsis caput ad amussim figura congruit. Adeo vt ad Gynglimon atque Arthrodriam, Diarthrosis membrum, referri possit articulatio. Secundum eiusdem digiti os per coniunctionem Gynglimon, Diarthrosis speciem coartculatur, quamuis Vesalio secus visum sit. Primi enim ofsis extremum in capitulum definit, secundi ofsis sinum subiens. Verum quia capitulum hoc interno pollicis latere modicè versus exteriora prominet, esseque in transuerso oblongum, ac lateribus magis, quàm medio depressum, caput verò contrario modo eandem figuram sortitum est; propterea os istud extensionis flexionisque motu, magis quàm laterali pollet. Sed non vltra rectam lineam extenditur, propter primi ofsis caput. Illud quoque minimè ignorare oportet, in interiore huiusce articuli sede, <sup>b</sup> ofsicula duo, instar sesami seminis exigua conspici, quæ ne digitus plus quàm par sit flectatur, prohibent, vti sanè, ofsiculis hisce deficientibus, eueniret, cum caput interius nonnihil depressum sit. Tertium os contrario nexu secundo compingitur, secundi enim inferior sedes duo educit capitula nonnihil teretia, & sinu dirempta, cartilagine perinde atque capitula, obducto. Superior tertij ofsis sedes binos sinus obtinet, colle veluti quodam in eorum medio consistenti, diuisos; & in hos duo inferioris partis secundi ofsis capitula inseruntur. Sinus verò, quem secundum os in medio duorum capitulorum exculptum habere diximus, capitulum in medio duorum sinuum consistens excipit. Adeo vt tertium os secundo excipiatur, & secundum tertio, eum in modum vt extendi quidem, flectique possint, nullo autem pacto in latus agi. Nequeunt verò dicta de causa magis, quàm erigantur, extendi. Hoc eodem connexu secundi, ac tertij digitorum articuli committuntur. Primus enim quatuor digitorum articulus, primo pollicis articulo similis est, non autem secundo, vt Vesalius non benè animaduertens prodidit. Atque ideo id digitis omnibus commune est, vt facilius extendantur, flectanturque, quàm in latera moueantur; quamuis pollex, index, paruusque digitus, in latera nonnihil magis, quàm annularis, aut medius agantur. Quod quidem ideo euenit, quoniam postbrachialis ofsium capita, quibus hi digiti compinguntur, latera paulò magis depressa obtinent. Vt verò primi digitorum articuli minùs quàm secundi, ac tertij flectantur, ofsicula quædam sesami seminis instar, <sup>c</sup> grandia efficiunt, quæ in huiusmodi articulis consistent, neq; illos flecti sinunt. Haud secus quoque primi huiusmodi articuli, cæteris magis sursum flectuntur, resupinanturque, quòd postbrachialis ofsium capita minùs quàm ofsium digitorum capita promineant. Quæ in hominum quoque nonnullis adeo comprimuntur, vt digitos sursum euidenter flecti sinant.

## De Ofsiculis Sesamo semini similibus.

Cap. 25.

Vinum ossa huiusmodi compinguntur.

Quoniam ofsiculorum quorundam mentio incidit, quæ in interna articularum digitorum sede occurrunt, quibus ea in articulis, quibusve corporis sedibus reperiuntur, scire operæ precium est. In primis igitur inter <sup>a</sup> quartum postbrachialis, & octauum brachialis os, vnum occurrit. In interiore <sup>b</sup> secundi pollicis articuli duobus subrotunda, & solida, granisque Orizæ quodammodo similia, licet paulò breuiora, alteram nanque partem magis depressam obtinent, & cartilagine obductam, cuius medio, primo pollicis ofsi committuntur, alterum quidem iuxta internum capitis huius ofsis latus, alterum verò iuxta externum. Atque inter vnum & alterum tendo defertur, quo <sup>c</sup> tertium istius digiti os flecti dicemus. Alia insuper digitorum ofsibus

<sup>a</sup> t. vi. ff. viii.  
<sup>N.</sup>  
<sup>b</sup> ead. T.

<sup>c</sup> lib. ii. t. vi.  
<sup>N.</sup>

Primum pollicis os brachialis articulat.

Secundum quoque modo primo coartculatur.

Tertium quoque modo secundo.

Primus quatuor digitorum articulus primo pollicis articulo similis.

osibus adherent, vt ipsorum processus & capitula videantur. ex quibus ligamenta educuntur, & in ea musculorum tendines inseruntur. Eodem prorsus modo, ad primos quosque digitorum articulos, duo alia spectantur<sup>d</sup> ossicula, quorum alterum altero eo minus est, quod propius ad paruum digitum accedūt, in quo minora sunt, ac veluti cartilaginea. Senibus etiam quibusdam ad internam tertij pollicis articuli sedem vnum huiusmodi adest ossiculum. Huius quoque generis alterum, in secundis, ac tertijs quibusque quatuor digitorum articulis occurrit, adeo tamen exiguum, vt milij granum videatur. Huiusmodi autem ossicula, vicena saltem vtraque in manu habentur. Eiusdem omnino generis os etiam in pede spectatur, primi manus ossi<sup>e</sup> correspondens, vbi quartum pedij os paruum digitum sustinens ossi<sup>f</sup> tarsij eiusdem pedis, quod aleam æmulari dicemus, committitur. Verum in primis digitorum pedum articulis difficulter reperiuntur, præterquam in pollicis digito; licet in senibus, quod paullo maiora existant, minori negotio inueniantur. In secundis & tertijs articulis nunquam ferè occurrunt, præterquam in pollice: in quo bina<sup>g</sup> ossicula spectantur, eaque satis magna, (licet minora ijs, quæ ad eiusdem digiti connexum habentur) quorum interius multo grandius est. Atque vtrunque, ea in parte, quæ capiti ossis pedij digitum hunc sustinentis committitur, sinum cartilagine obductum obtinet: subtus verò, solum versus, teretia sunt, & phaeoli cauo similia. Ossicula hæc satis valida sunt; & præter id quod cæterorum modo præstant, vt articulos flecti minimè sinant, tendinum etiam tutelæ deseruiunt, qui ad secundum, tertiumque pollicis os flectendum transmittuntur. Cum enim ea promineant, per duos veluti colles tendo deducitur, ita vt cum pedem solo figimus, deteri nequaquam possit. Ossium horum alterum, illud est, de quo tanta apud plerosque præstigiatores mentio habita fuit; ossiculum quoddam in homine haberi, incorruptibile, atque ex eo tanquam ex semine, hominem die iudicij proditum afferentes. Id autem quàm verum sit, Theologis decernendum relinquimus; quemadmodum etiam & illud, quàm meritò fatidicæ, ac Striges mulierculæ in huiusmodi osse, tanquam re ad fascinationes suas, ac scelera efficacissima, perquirendo studium impendant.

Ossicula sesamina quos in pedibus habentur.

Præstigiatores

De Osse Ilium, & Coxendice. Cap. 26.

<sup>a</sup> Lateralibus sacri ossis processibus duo grandia<sup>a</sup> ossa, vtrinque vnum committuntur; quorum vtrunque tribus ex ossibus constituitur, per connexum, qui Vnio dicitur, in homine coalescentibus. Eorum Primum, elatiorem sedem quæ lateri respondet, constituens, os Ilium dicitur: Secundum, inferiorem sedem occupans, quæ femoris ossis caput inferitur, Coxendix appellatur. Anterior pars Pectinis os dicitur. Huiusmodi ossa in id fuere, parata, vt femora ipsis articulerentur, & vt intestinis, nec non etiam vesicæ, & in mulieribus vtero, sustinendis opitularentur, fueruntque grandia admodum effecta, & multis donata processibus, atque tuberculis, quoniam ex ipsis omnes propemodum femur mouentes muscoli, & nonnulli etiam ex his, qui tibia, Thoracem & dorsum mouent, producendi erant. Vbi verò Sacro ossi connectuntur, figura insigniter variant; quemadmodum etiam apices lateralium sacri<sup>b</sup> ossis processuum se habere retulimus. Vnicuique enim horum processuum sinui, Tuberculum, & vnicuique tuberculo, sinus respondet. Adeo vt horum cuiuslibet Sacrum os, mutuo congressu committatur: vsque adeo tamen æqualis est huiusmodi connexus, vt moveri ossa nequeant. In minoribus enim per lineam, siue harmoniam, in natu autem maioribus per Vnionem committuntur: Partium, horum ossium figuram facile erit ex summo sacri ossis processuum figura petere: qui vt diximus, longo in primis sinu donantur, cui longū in hoc osse tuberculū ei congruens respōdet. Anteriori verò sedi, seu labijs<sup>c</sup> sinuū processuū, quæ euidenter prominere diximus, sinus in interiore huius tuberculi sede insculpti correspondēt, in quos labia hæc inferuntur. Et posteriori eorumdem sinuū regioni: nonnihil inferiori, labia quædam siue processus ossium istorum correspondent, quæ squamæ infar,

Coxendicis os ex ossibus tribus constituitur.

Ossium horum usus.

Figura lateris ossium coxendicis sacro ossi articulatorum.

d t.vi.ii.viii.

e t.vi.ii.x.µ.  
f ead.4.

g ead.7.

a t.ii.iii.O.

b t.vi.ii.iii.  
NNP Qe.

c t.iii. iuxta  
M.ta.vi.ii.  
NN.

ſtar attenuata, planam cum quarto ſacri ofſis laterali proceſſu cōpagem conſtituunt. Rurſus <sup>d</sup> oblongo tuberculo in medijs ſinibus tranſuerſorum ſacri ofſis proceſſuum <sup>d ead. OO.</sup> conſiſtenti, longus etiam horum ofſium ſinus, commemoratos proceſſus excipiens reſpondet. Attamen duobus illis ſinibus, quos in poſteriore laterali ſacri ofſis proceſſuum fede haberi diximus, ultra longum tuberculum commemoratum, ofſa hæc haud æquè ad amuſſim reſpondent, vt neque tubercula in duos ſinus, ſuperiorem & inferiorem eos dirimenti; tum quia ofſa hæc non tantum prominent, quantum ſinus excauantur, tum quia tuberculum ſinus hoſce dirimens, haud inſertionis in hanc llium ſedem gratia effectum eſt: Imò inter vnā, alteramque partem crassa cartilago ligamenti naturæ compos reponitur, quæ vniuerſum illud interuallū infarciens, ne ſe ofſa contangant prohibet. Verum aduerte, vniuerſam horum ofſium ſedem ſacro ofſi commiſſam, aſperam eſſe ac inæqualem, atque admodum crassam, quemadmodum & reliqua ofſa in illis ſedibus, quibus alijs committuntur, quò validiora euadant; Adhæc in poſteriora magis, quàm laterales ſacri ofſis proceſſus, porrigitur, tum quòd ofſa hæc, muſculorum ex iſſis eduكتورum ergo, grandiora eſſe oportuit, tum quòd totam corporis molem ſuſtinent. Reliqua, ofſis illium ſedes, <sup>e t.iii.o. f tab.i.ii.iii. 11.12.13.</sup> ſemicirculo ſiue ſtabello ſimilis eſt, & ſuperiore ſui fede circum circa <sup>f</sup> Appendicem obtinet, quæ teretem quandam veluti marginem, non nihil extrorſum porrectam exhibet; exterius aſpera & inæqualis eſt, atque impreſſionibus quibuſdam prædita, tam externa, quàm interna ſui regione; hac quidem, vt amplior reddita, carnosa tranſuerſi abdominis <sup>g li.ii. t.vi. a. h li.ii. t.iii. 11. li.ii. t.i.o.</sup> & muſculi partem admittat; illa verò, vt potiſſimam oblique <sup>h</sup> aſcendentis portionem educat, & <sup>i</sup> obliquus etiam deſcendens inſeratur; hi enim tres muſculi ſedem hanc vniuerſam occupant, quæ anteriùs, ſuperiusque craſſior eſt, quàm verſus lumbos. Anterior huiuſce appendicis pars, priuatim craſſior eſt, vt <sup>k</sup> primus & ſextus tibiæ motores muſculi ex ea principium deſumāt. In medio pariter interioris partis ofſis llium, læuis atque ampla impreſſio habetur, è regione lateraliū proceſſuum quintæ lumborum vertebræ conſpicua, ex qua nonus <sup>l</sup> muſculus, doſum mouens enaſcitur. Præter huiuſmodi compreſſionem, ſedes hæc vniuerſa caua eſt atque aſpera, & ex ea ſeptimus femoris motor muſculus ortum adipiſcitur, ut ſuo loco dicemus: quemadmodum & altera ad externum latus, iuxta elatiorem ſinus regionem, femur excipientis, ad cuius vtrinque latera, tuberculum notatu dignum prominet, quod iſſius cavitatem adaugere videtur, & quò minus ſexti, ſeptimique <sup>m</sup> muſculorum femoris tendines per ipſum deducti, exiliant, prohibet. Ex hiſce tuberculis quòd ad externum ſinus latus conſiſtit, non tibiā mouentis <sup>n</sup> muſculi exortui deſeruit, cuius ergò tota hæc ſedes externa, non nihil aſpera, & inæqualis eſt, paruumque ſinum adipiſcitur, ex quo noni huius muſculi <sup>o</sup> tendo producitur: Quod latus internum occupat, os iſtud craſſius, validiusque reddit, quale ipſum eſſe oportuit, quòd ipſi femoris caput in articulandum eſſet; & quòd latiſſimus ei omnium ſinus, quo dictum os excipitur inſculpendus eſſet: Ideoque llium os, ad elatiorem ſui, qua ſacro ofſi committitur, ſedem, craſſius adhuc redditur, ac tuber conſtituit ad internum ſerè ſecundi tuberculi latus exporrectum, quod ofſis huius robur adauget, & exortui cedit decimi <sup>p</sup> muſculi, qui femur ex tortum mouet. Externum coxendicis latus, interno aſperius viſitur, & ex eo muſculi tres, regionem hanc, vtj dicemus, vniuerſam occupantes, enaſcuntur, diuidunturque ſecundum duarum linearum diuiſionem, quæ in orbem per eam partem feruntur, eamque tres in partes ſubobſcure dirimunt. Illud quoque notatu dignum occurrit, quod media ſinus in hoc ofſe inſculpti pars, in quem femoris caput inſeri diximus, altius non nihil, quam reliquum iſſius, excauatur, ac ſubaſpera eſt, ſolaque minimè cartilagine obducitur, quò potiùs foraminulis quibuſdam oppleta cernitur, ex quibus teres illud <sup>q</sup> ligamētum producitur, quod in medium femoris caput inſeri reſequimus. Adhæc, ſinus huiuſce labia anteriore ſede minùs, quàm poſteriore prominent; cuius ope fit, vt prout neceſſitas poſtulabat, femur benè ſectere poſſimus. Verum aduertere oportet, ad humiliorem ſinus cuiuſmodi regionem haud continuo duſtu labia in orbem ferri, quin potiùs interrumpi, quò exiguæ cuiſdam <sup>r</sup> venæ cedant <sup>r li.vi. t.ii. o.</sup> quam

Ofſis llium ſedura.

Iſſius appendix.

Ofſis iſſius impreſſiones quedam & tubercula.

Externum coxendicis latus.

Partis huius ſinus.

e t.iii.o. f tab.i.ii.iii. 11.12.13.

g li.ii. t.vi. a. h li.ii. t.iii. 11. li.ii. t.i.o.

k li.ii. tab. 3x.

l li.ii. t.viii. 32.

m li.ii. t.viii. X.

n li.ii. t.iii. o. tab. xv. fi. i. F G. c. xiii. r o t.ii. i. r.

p lib. ii. t. xv. fi. xvi. E E.

q li.ii. t. xv. fi. xvii. o.

quam

quam per hanc partem ferri dicemus, & in asperam eam, quæ cartilagine nequaquam incrustatur, sedem, contendere, nutrimentum huic articulo suppeditantem, vnde viscidus ille humor emanat, qui in ipso visitur, eumque humefcentem, ac mobiliorem reddit. Haud secus quoque, circum sinus istius oras, cartilago quædam leuiter extrorsum promines obtenditur, & cauitatem eam obteggit, per quam prædicta vena deducitur, caputque femoris ita complectitur, vt ipsum non ita facile luxari sinat, quamuis tamen promptius ea sede, per quam dicta vena proropat, quàm alibi luxetur. Inter superiorem præterea ossis ilium sedem, quæ sacro ossi committitur, & eam coxendicis partem, in quam femur inferitur, sinus instar canalis habetur, per quem<sup>s</sup> neruum crus adeuntium quartum transmitti dicemus. Obseruandum quin etiam in Coxendicis osse occurrit, acutus quidam processus, ex quo<sup>u</sup> ligamentum educitur, in lateralem processum quintæ sacri ossis vertebræ desinens; nec non etiam principium decimi, siue alia ratione vndecimi femur mouentis<sup>x</sup> musculi. Neque verò prætereundus est sinus in posteriore sede interni<sup>y</sup> lateris coxendicis, sub processu exculptus, cui miro artificio veluti trochleæ, decimus femoris motor<sup>z</sup> musculus dequincitur. Præterea, infimæ coxendicis sedi, cui sedentes innitimur, <sup>a</sup> processus adest, factus ex Appendice parem cum ipsomet osse latitudinem crassitiemque seruante, tum maioris ipsius roboris ergo, tum quatuor<sup>b</sup> musculorum ex ipso, vt dicemus, educatorum gratia. Hunc in modum se habet Coxendicis os, quod mulieribus amplius multo quàm viris obtingit; quemadmodum etiam, & laterales sacri ossis processus foeminae ampliores obtinent, quò sæui aptior sedes aptetur. Anterior<sup>c</sup> huiusce ossis pars, quam communiter Pubis os appellamus, superiore nonnihil tenuior est, & sociæ suæ<sup>d</sup> cartilaginis interuentu committitur, qua concinne adeo deuinciuntur, vt vnica pars videatur, & quo proqueior ætate homo fit, eo minùs cartilago hæc ipsis interiecta conspicua redditur, idque in viris æquale, ac in mulieribus. Verùm in mulieribus ossa hæc non tam longo spacio, quàm in viris committuntur, neque verò in partu dehiscunt, vt nonnulli arbitrantur. Illud quidem verum est, in ima sede iuxta ipsorum coalitum, longiori interstitio in mulieribus, quam in viris ea inuicem dissidere, quemadmodum etiam infimæ aliæ ipsorum sedes se habent, quò parturientibus molestiæ minus contingat. Ad quod etiam<sup>e</sup> Coccygis os non parum confert, quod partus tempore, in posteriora, vt diximus obliquatur, vt facile in brutis animantibus videre est. Atque id mulieres liquidò in seipsis experiuntur, quòd ipsas toto partus tempore federe nequaquam sinit, sedentesque maiori molestia pariunt, flexis autem genibus stantes, aut paululum in priora deflexæ, minus pariendo anguntur. Vtrumque Pubis os maximum sibi foramen vendicat, quo leuius multò redditur, quodque duobus<sup>f</sup> musculis, & § membrana, ipsis interfita, vt suo loco dicemus, obturatur; Atque per id foramen<sup>h</sup> neruus duntaxat vnà cum<sup>i</sup> vena, & arteria transmittitur, non quidem per ipsius medium, sed per sinum in elatione ipsius regione cælaturum, Elatior horum ossium sedes aspera est, & ex ea<sup>k</sup> retri duo Abdominis musculi enascuntur. Anterioris quoque lateris pars aspera, identidem cernitur, vnde neruosum caput secundi tibiae mouentis<sup>l</sup> musculi ortum adipiscitur. Qua etiam in parte capitulum occurrit, ab interno acetabuli Coxendicis latere, ad duorum vsque pubis ossium connexum pertinens, octauoque femur mouenti<sup>m</sup> musculo exortum porrigens. Capitulo huic acuta in posteriori sede linea correspondet, ex qua decimi femur mouentis<sup>n</sup> musculi portio principium desumit. Postremò huiusmodi ossa nonnihil crassa sunt, iuxta infimam connexus sedem, & quæ in ipsis haberi foramina diximus, vbi crassa, & teretia propemodum sunt, quò maius ipsis robur accederet, vtque ex harum partium vtraque nonnulli penis musculi, & corporis pars ipsum constituentis, principium assumerent. Os id vniuersum, licet in ætate prouectioribus vnicum videatur, nec plus quàm vnā appellationem obtineat; in puerulis tamen triplici osse, vt diximus, secundum tria, quibus donari retulimus nomina, per

*Cartilago hunc sinus circum obducta.*

*Coxendicis os mulieribus latius.*

*Pubis os.*

*Pubis os in mulieribus minime dehiscent.*

*Coxendicis os tripartitio scissum.*

s li. vii. t. lii. lii.  
71. lii. t. x. &  
t. lii. t. 14.  
u lii. t. xlii. o  
x lii. t. xlii. b.  
x. t. xlii. b.  
y t. lii. t. 15.  
z lii. t. xlii. a.  
a t. lii. t. 14.

b lib. ii. t. x. a.  
c. x. t. xi. µ. a.  
x. & t. xlii. z.

c t. lii. t. lii. pp.  
d ead. c.

e ead. N.

f lii. t. vii. a.  
g lii. t. xlii. c.  
h lib. vii. t. lii. cc.  
i lib. vi. t. lii. t. lii. s.  
k lii. t. lii. a.  
Δ. t. v. Δ.  
l lii. t. vi. Δ.  
m lii. t. vii. a.  
n lib. lii. t. xv. lii. G.

binas lineas cartilagine oppletas distinguitur: quarum prior à posteriore istius ossis fede, paulò ante cum sacro osse connexum educitur, & rectà fertur, sinum interfecans, quo femur excipitur, & paulò supra medium ossis pubis foramen procedens. Altera ex elatiori externa pubis ossis fede descendens in medium sinus, cui femur inseritur, cum priore coalescens, desinit. Quoniam verò, non minus in agnis ædisq; quàm in homine huiusmodi lineæ occurrunt, eas facile in illis videre vnusquisque poterit.

## De Osse femoris.

## Cap. 27.

Femoris os omnium humani corporis longissimum existit, & Appendice ab utroque extremo donatur. Harum appendicum <sup>a</sup> superior coxendicis ossi iungitur, <sup>b</sup> inferior tibie ossi, ut diximus, quamvis dispari ratione articulatur. <sup>b</sup> cad. 16.

Quomodo coxendicis ossi iungatur.

Cruri.

Sinus inter inferiora duo istius ossis capitula sculptus.

Ossis femoris processus. Maior.

Maior.

**F**emoris os omnium humani corporis longissimum existit, & Appendice ab utroque extremo donatur. Harum appendicum <sup>a</sup> superior coxendicis ossi iungitur, <sup>b</sup> inferior tibie ossi, ut diximus, quamvis dispari ratione articulatur. <sup>b</sup> cad. 16. Superior namque pars rotundo capite committitur; quod & istius ossis <sup>c</sup> ceruice <sup>c</sup> t. ii. iii. 18. Coxendicis ossi adesse diximus, reponitur, cui tum magnitudine, tum figura exactè congruit. Caput id cartilagine vniuersum obducitur: Verum ad sui centri medium, nonnihil inferius exiguum sinum obtinet, angustum, profundum, & modicè inæqualem, cui teres <sup>d</sup> ligamentum à Coxendicis acetabuli centro eductum <sup>d</sup> lib. ii. t. xv. fix. xviii. O. c. t. iii. 16. implantatur. Inferior duobus <sup>e</sup> capitibus, in quæ dirimitur, ossium omnium capita magnitudine superantibus, adnectitur, quæ in posteriorem magis quam anteriorem sedem exporrecta, non solum cruris extensionem, flexionemque moluntur, verum etiam musculorum quorundam, <sup>f</sup> pedem mouentium exortui deserviunt, nec non etiam nonnullorum, <sup>g</sup> crus, & femur, ut suo loco dicemus, <sup>g</sup> lib. ii. t. xiii. t. c. xii. 2. mouentium infertionem admittunt. Articulus hic nullo prorsus modo in latera ducitur, quòd capita vtrinque admodum promineant, sinusque in ipsorum medio, vtrique communis habeatur, in quem genu <sup>h</sup> mola, ut <sup>i</sup> suo loco dicemus, inferitur. In posteriori etiam horum capitum sede, alius inter ipsa sinus longè maior exculpitur, <sup>k</sup> modiceque asper, cartilagine nequaquam obductus, quoniam asperum, & inæquale tibie ossis tuberculum admittit, quod in tibie ossis sinuum medio protuberat, validissimo ligamento in hunc sinum implantato exortum porrigens, vnà cum alio admodum pariter robusto, ex posteriori eiusdem tibie ossis regione deducto, Sinus præterea hic, maximo cruris <sup>l</sup> nervo deducendo inferitur, qui vnà cum vena, & arteria tutius per ipsum defertur. Horum ossium latera cæcis plurimis donantur foraminibus, ex quibus validissima quædam articulum hunc continentia ligamenta educuntur. Ad externum tamen exterioris capitis latus, nonnihil in posteriora, sinus subobliquè insculptus, priuatim visitur, per quem quarti <sup>m</sup> musculi crus mouentis tendinem, tuto deferri trademus, ut nullam in partem queat deflectere. Internum caput ad posteriorem sui regionem, exiguum impressionem adipiscitur, qua priorum trium, & quinti crus mouentium musculorum tendines deducuntur. Os id ad superiorem sui sedem, iuxta ceruicis radicem duos obtinet processus, alterum <sup>n</sup> externum, qui omnibus ossium processibus magnitudine præstat, & appendice notatu digna editus; alterum <sup>o</sup> interiori sede, versus posteriora, & exteriori longe inferius, qui minor est, & ex Appendice pariter efficitur. Processus hos græci *τροχαντήρας* appellant, quòd paruis similes existant, magnum, aut paruum addentes; cum verò simpliciter recensent, maiorem subintelligunt. Ex interno processu, sexti <sup>p</sup> septimique femur mouentium musculorum tendines educuntur; & in asperam lineam, quæ iuxta processus istius radicem habetur, sub obliquè posteriora versus ad tertiam circiter ossis partem ducta, octauus <sup>q</sup> musculus femoris motus autor inferitur. Maior processus externo latere gibbus occurrit, & in benè ossaris, profectionisque ætatis hominibus, quatuor sinus siue fossiculos proponit; quorum primus maximus est, atque latissimus, & posteriorem eminentiæ



nentiæ huius sedem occupat. Ab huius sinus radice aspera linea educitur, deorsum per oſis posteriora oblique nonnihil deducta, cui primi femur mouentis <sup>r</sup> musculi portionem inferi dicemus. Secundus sinus, in anteriori latere consistit, primo asperior, & modicè depressus. Tertius primo, & secundo, superius paulò, interiacet, quodammodo gibbus. Quartus, ad huius processus apicem visitur, reliquorum angustissimus. Sinus hi priorum quatuor femur mouentium musculorum insertionem admittunt, <sup>s</sup> primus quidem primi, <sup>t</sup> secundus secundi, sicque deinceps. Ad huius præterea processus radicem in anteriori sede versus latus exterius, asperitas occurrit, cui <sup>u</sup> septimus musculus femoris motor implantatur. Oſis istius reliquum, teres ferè vniuersum est, & omni ex parte læue, præterquam in anteriore iuxta ceruicem, vbi asperum visitur. Ex eius modi verò asperitate <sup>x</sup> octauus crus mouentium musculus educitur, os id circum vndique ambiens, præterquam posteriori sede, vbi linea leuiter prominens, acuta, & inæqualis adest, quæ à processuum radice exorta, vltra oſis ferè medium decliuus proreperit, cui <sup>y</sup> quintus femur mouens musculus validissimè immittitur. Ad inferiorem tamen huius lineæ sedem, iuxta inferiorum capitum radicem, femur amplum, & planum occurrit, per quæ huiusmodi planitiem, maxima quædam vena, vnà cum neruo, & arteria in crus deferitur. Ad hæc femoris os, haud recto ductu illinc, vbi coxendici implantatur, deorsum tendit, sed ipsius ceruix oblique, vti diximus, extrorsum, ac transuersim propemodum descendit, quò scilicet musculis, venis, & arterijs, per internam femoris sedem reptantibus, sedes præbeat. Quod reliquum est femoris, oblique ductu nonnihil extrorsum, vsque ad genu descendit.

De Duobus Cruris Oſibus. Cap. 28.

<sup>a</sup> Genu ad Tarsum <sup>a</sup> oſsa duo interiacent, brachij oſsibus à cubito ad manum porrectis, respondentia: Quorum quod internam cruris regionem occupat, crassius est, & latinis communi appellatione Tibia dicitur; quod verò exterius consistit, minusest, Sura vel Fibula vocatum. Ambo hæc oſsa suis infra supraque appendicibus donantur. Verum supra Tibiæ sedes longè, quàm fibulæ crassior ampliorque visitur, eiusdemque appendix, anterius etiam quàm posteriorius amplior existit, vbi deorsum magis porrigitur. Huic appendici duo <sup>b</sup> sinus duabus semilunis confimiles, insculpuntur, aspero inæqualique <sup>c</sup> tubere, ac lubrica cartilagine obducto dirempti, quibus duo femoris oſis capita implantantur; Tuber verò sinu excipitur, quem duo femoris capita posteriori parte seingere diximus. In medio autem elatioris Tuberis huius sedis, cartilagine nequam obductæ, aspera impressio consistit, ex qua validissimum educitur <sup>d</sup> ligamentum, sinui, quem duo femoris capita dirimere diximus, insertum. Anterior tuberis regio parum omnino extuberat, quin potius depressa est, atque aspera; ex ea tamen nulla præterea ligamenta enascuntur, quam quæ <sup>e</sup> cartilagine quædam anteriori huius tuberis sedi deuinciunt, quæ vt mox dicam, tibiæ sinus adaugent. Cum enim hi parum omnino excauentur, nec femoris capitum, in ipsis repositorum magnitudini, correfpondeant, natura defectu prospexit, vnam præter communes, vtrique addens cartilaginem, nec tibiæ, nec femori aliter adherentem, quàm ligamentorum quorundam interuentu, genu articulum circum circa complectentium, ex quibus cartilagine hæc producuntur, harumque cartilaginum beneficio, anteriori, posteriorique tuberis sedi copulantur, quod tibiæ sinus dirimit, in quos femoris capita reponi diximus. <sup>f</sup> Cartilagine hæc cæteris mollitie antecellunt, & ligamenti naturæ compotes propemodum existunt, quæque oſsibus applicantur, æquales satis, lubricæ, ac læues, vntuosoque humore oblitæ spectantur. Circum vndique articulum <sup>g</sup> crassæ occurrunt, & multò ante <sup>h</sup> sinuum centrum attenuatæ desinunt; ita vt ambæ eandem semilunarem figuram cum sinibus, in quos excipiuntur, exhibeant. Atque ideo ad laterum medium

Tibia.

Fibula.

Isparum appendices.

Genu cartilagine.

Isparum substantia, & figura.

Anat. Val.

D ij

crassiores



crassiores impensè redduntur, quà verò anteriori posteriorique tuberis capitibus dictos sinus dirimentibus proximè accedunt, longè<sup>i</sup> tenuiores sunt, & in acuti-  
 cad. P. P.  
 tos quosdam apices definunt, quorum beneficio inuicem coalescunt; quamvis apices, posteriorem tuberis sedem attingentes, paulò magis distent; Per horum verò medium crassissimum ligamentum, ex tubere in femur insertum deducitur. His positis, facile videre est, harum cartilaginum interuentu, tibix sinus, non minus in homine, quàm in ceteris animantibus cauos magis euadere. Hunc in modum tibix cum femore connexus sese habet. Fibula verò haud sursum adeo conscendit, vt in femur includi possit, ideoque<sup>k</sup> tuberculo committitur, quod

*Tibia, ac fibula in superiori sede articulationis.*

*In inferiori.*

ad exteram appendicis tibix sedem consistit, nonnihil posteriora versus cartilagine obductum, medio sinu, quem interno superioris partis latere obtinet, leuiter cauum, amplum, alteraq; perinde cartilagine incrustatum: Ima sede, tibix quoque osi, licet dispari nexu,<sup>i</sup> committitur. Externum enim tibix latus longam impressionem adipiscitur, in quam internum fibulæ latus includitur, leuiter prominens, & nonnihil perinde, ac impressio asperum. Nulla tamen cartilagine obducitur, imò hac in parte tibia fibulaq; validissimo ligamento coherent, quod eas non solum in ambitu amplexatur, verum etiam quà mutuo congressu committuntur. Superior itaque tibix appendicis regio femori, exterior verò fibulæ, dicta ratione compingitur. Anterior<sup>m</sup> huiusce appendicis sedes nonnihil depressa est, atque aspera, inq; huiusmodi asperitatem<sup>n</sup> musculorum crus mouentium tendines inseruntur, quorum occasione elatior externi lateris tibix appendicis pars, nonnihil prominens occurrit, cui<sup>o</sup> quarti musculi crus mouentis tendo, vt dicemus, implantatur. Hac quoque sede fibula capitulum exerit, ex

*Tibia, ac fibula ad talum articulationis.*

*Sinus.*

quo<sup>p</sup> septimus pedem mouentium musculus educitur. Inferiores verò tibix fibulaque appendices, ambæ processum educunt, maiorem quidem<sup>q</sup> interna sede, minorem verò<sup>r</sup> externa, qui declius deorsum procedit. Hos inter, sinus furculæ instar insculpitur, cui talus, per articulum Ginglimon Diarthrosis speciem inferitur. Sed de talo suo loco dicemus. Nunc sinum duntaxat, qui humiliorem vtriusque horum osium sedem occupat, prosequi est animus. Is, amplior est, & in duos videtur diremptus, in sui enim medio longum, & leuiter prominens<sup>s</sup> tuber obtinet, ad latera verò altius exculptus euidenter cernitur. Fibulæ processus externa sede, qua sinum respicit, concauus, & perinde, ac sinus ipse levis est, & cartilagine obductus; interna verò parte alterum crus respiciente gibbus est, & facile ad tactum deprehenditur carne scilicet denudatus; Estq; interior ea<sup>t</sup> cruris pars, quam communiter Malleolum appellamus. In ima istius processus sede impressio celatur, ex qua cartilagineum producitur<sup>u</sup> ligamentum, tibix osi calcis colligans. Hæc etiam appendix in humiliori anterioris lateris regione<sup>x</sup> sinum proponit oblongum asperum, & inæquale, à quo ligamentum educitur, quod

*Malleolus interior.*

*Malleolus exterior.*

tibix, tali<sup>y</sup> ceruicem iungit. Posterior quoque huius appendicis sedes, vbi malleolum educit, leuiter introsum excauatur, & sinus quosdam ostendit transversis quibusdam ligamenti circundatos, sub quæ tutò vt dicemus, aliquot<sup>z</sup> musculorum tendines, nullam in partem deflecentes feruntur. <sup>a</sup> Fibulæ appendix, crassior & ipsa efficitur, & exterum constituens malleolum, eo tibix appendice decliuis fertur, quo hæc aliis ad genu sursum porrigitur, atque ideo fit, vt rarius in exterum latus, quàm in internum talus luxetur, adeo vt longitudine pares omnino euadant. Huiusce appendicis processus internum latus constituens adeo gibbus est, & cartilagine obductus, vt ipse potius à talo suscipi, quàm secus, videatur: nihilominus tamen exterum tali latus vnique appositè obtegit. Appendix hæc, vnà cum tibix appendice vndequeque talum amplexatur, præterquam sede<sup>b</sup> anteriore, vbi etsi minimè illis integritur, tendinibus tamen per pedis ceruicem ad digitos deductis optimè occultatur; nec non etiam<sup>c</sup> posteriore, vbi tendinibus pariter quibusdam obtegitur in calcem insertis, alijsq; pedem hæc adeuntibus; ita vt nusquam talus contingi queat; quos enim Malleolos appellamus nihil præterea sunt, quàm duo hæc capita, siue appendices tibix fibulæque, vt dixi-

dixi-

d li. ii. t. xv.  
f. xvi. g.  
c. t. vi. li. i. Y

f. cad. t.

g. cad. op.

h. cad. ff.

i. cad. aa.

K. cad. p. p.  
l. cad. x.  
m. li. ii. t. iii.  
iii. vi. v. t.  
n. iii. t. c. v. v.

o. li. ii. t. v. o.  
p. li. ii. t. vi. o.  
q. cad. y.

r. li. ii. t. xiii.  
A.  
s. li. ii. t. xv.  
f. xvii. a.

t. li. ii. t. xiii.  
z.  
u. li. ii. t. a. xv.  
DE.  
x. li. ii. t. xv.  
f. i. DE.

diximus; quum exterior, sinum posteriori latere obtinet transuerso ligamento obiectum, sub quo sexti, septimique pedem mouentium musculorum tendines deducuntur. <sup>a</sup> Ma verò internilateris parte in posteriora paululum <sup>d</sup> sinus alter eo inferior consistit, profundus, atque asper, cartilagineum educens <sup>e</sup> ligamentum, quo fibula talo propriè nuncupato deuincitur. Cæterum tibia fibulaque tota sui longitudine inuicem dehiscunt; Cum enim tanta sit tibie capitum, cui fibula committitur, crassities, tantaque reliqui corporis tenuitas, nullo profus modo, cum ambæ tibiæ porrigantur, sese possunt contingere. Fibula quidem in <sup>g</sup> medio nonnihil introrsum curuatur, ibique eo magis minusue tibie committitur, quo maior minorue ipsius obliquitates existit. Porro vniuersa fibulae amplitudo, ( præter æternum latus <sup>h</sup> a medio deorsum, partisque huius appendicem, quæ excarnia sunt, ) musculis quibusdam obtegitur, ita fibulam amplexantibus, vt cedentem propeque triangularem reddant, potissimum secundum longitudinis medium, qua in parte anteriùs excavatur, lineamque; insigniter prominentem edit, primum trianguli angulum constituentem. Posteriorius quodammodo plana est, ac lineas euidenter extruberantes vtrinq; adipiscitur, quarum interna <sup>k</sup> secundum angulum, externa <sup>l</sup> tertium constituit; Tribus hisce angulistria continentur latera. Primum inter secundum primumque <sup>m</sup> angulum reponitur, & vnà cum externo tibiæ latere <sup>n</sup> musculis quibusdam cedit, qui ab anteriori cruris sede in superiorem pedis regionem feruntur, de quibus suo loco. Hoc præterea in latere parua consistit linea, principium musculo pollicem <sup>o</sup> extendenti porrigens. Secundum latus, primo tertioque angulo interiacet, amplum, modicè cauum, atque asperum, & per ipsum <sup>p</sup> septimus, <sup>q</sup> octauusque pedis motoris musculi deferuntur; octauus verò ex asperitate, qua vniuersum hoc latus præditum est, omne sui principium assumit, Tertium latus inter secundum, & tertium angulum consistit; per quod musculi suram efformantes feruntur, ac potissimum qui secundum <sup>r</sup> os pollicis flectit, cuius principium ex isto pendet latere. Verum aduerte, <sup>s</sup> membranam ex secunda linea educi, quæ spacium omne inter tibiam fibulamque intersitum opplet, atque ambas deuincit, in secundam tibie lineam sese inferens, quæ triangularis & ipsa quodammodo est: Ac prima ipsius lineæ, siue angulus in anteriori sede consistit, eaque est quam communiter spinam vocamus. Secunda exteriorem, Tertia interiorem sedem occupat: ac tertia quidem obtusa est, ac propemodum teres, secunda paulo est, acutior, ac tenuior. Tres huiusmodi lineæ tria etiam latera constituunt. Primum secunda & tertia circumscribitur, planum, & quadantenus sinuatum; ac per ipsum iidemmet musculi deferuntur, quos per primum fibulae latus ferri retulimus. Secundum prima & tertia terminatur linea; egregiè incuruum, nec villo tamen obiectum musculo. Tertium inter primam tertiamque lineam consistit; haud impensè cauum, & musculis suram efformantibus occupatum, eoque potissimum <sup>t</sup> qui tertium os quatuor digitorum flectit, & illo quem pedis motorem <sup>u</sup> quintum statuimus. Ad elatiorem præterea tertij huius lateris sedem aspera, & transuersim porrecta linea conspicitur, in quam <sup>x</sup> musculus ille inseritur, qui latitans in poplite musculus nuncupatur.

Fibula secundum longitudinem figura.

Tibia figura.

De Patella.

(Cap. 29.)

y. li. ii. t. iii. z.

**A**D anteriorem genu compagem <sup>a</sup> os quoddam spectatur instar scuti rotundum, anteriùs posteriusque nonnihil planum, posteriore sui sede articulum spectante, laue, ac lubrica cartilagine incrustatum. Id in medio suæ longitudinis tubere prominet, in sinum, quem in medio duorum femoris capitum insculpi dicemus, inserto. Ad tuberis huius latera duæ impressiones occurrunt, dicta capita excipientes. Et quemadmodum externum caput interno maius esse retulimus, sic quoque intelligendum est, patellæ sinum ad grandius caput pertinentem

Patella finis, & figura.

longè profundiorē esse, atque ampliorem. Patella hæc, anteri<sup>a</sup> sede, ac in la-  
teribus aspera est, & foraminulis quibusdam ferè delitescētib<sup>us</sup> xia: Humilio-  
ri autem sede apicem exigui process<sup>us</sup> instar adipiscitur, qui etiorē tibiæ par-  
tem respicit; estq<sup>ue</sup> is perinde asper, & foraminibus insignitus. Iud<sup>o</sup> b musculorum b lii. c. vi. f.  
crus extendentium tendinibus firmi<sup>us</sup> adhæreat, quibus vnde aq<sup>ue</sup> coheret, præ- c lii. c. xv. f.  
terquam ea in sede, cui<sup>e</sup> cartilaginem obtendi diximus. Istq<sup>ue</sup> illud notatu di- i. 123.  
gnum, patellam hanc femori, aut cruris osibus, nequaquā conseri, vel alligari,  
sed vi tendinum, ac membranarum ex quibus educitur, & ad osibus arctè de-  
uiaciri. Os is adultis impensè solidum est, ac durum, & eademmodum eo à tendi-  
nibus, & cartilaginibus, quibus inuoluitur, probe deter<sup>et</sup>, perspicuum euadit: In in-  
fantibus autem vsque adeo tenerum occurrit, vt cart<sup>ilagin</sup>is naturæ compos videat<sup>ur</sup>.  
Estq<sup>ue</sup> id sui muneris, ne femoris capita in prio<sup>ra</sup> luxari sinat; quod quidem eo  
deficiente sæpius accideret, potissimum cū genua flectimus, aut per<sup>cl</sup>ium ali-  
quem siue scalas descendimus; aut vbi cruribus anxi, & corpore in priora acto,  
vi aliquid molimur.

Patella quomo-  
do femori alli-  
gatur.

## De Pedis Osibus.

## Cap. 30.

Pedis ossa quor.

P<sup>E</sup>s<sup>a</sup> in talum, calcem, os naviculæ, ceruicem, pestem seu plantam, & digi- a t. vi. f. x.  
tos dirimitur, idq<sup>ue</sup> non minus irorutis, quibus is in digitos finditur, quā in  
homine: quod quidem intelligi volumus, pedem in ipsis à tercio cruris articulo  
deorsum metientes: fecus quā nonnulli factitarint, qui cū viderent pleraque  
bruta nihil præter digitos humo figere, eam duntaxat partem pedis nomine di-  
gnarunt; minimè aduertentes, sese hac dimetiendi ratione tres in quolibet crure  
articulos constituisse, cū alioqui duo tantum habeantur. Scire igitur oportet  
primum pedis b os græcis ἀσπράλλον, latinis Talum vocari; quibusdam Balistæ nux b t. ii. f. iii. a  
eò quòd ipsi quadantenus assimiletur, appellatum est. In elatiorem istius ossis se- t. vi. f. x. f.  
dem, sura tibiaq<sup>ue</sup>, vt diximus, inferantur; ideoq<sup>ue</sup> huiusmodi pars teres nonnihil,  
& lubrica cartilagine obducta est. Dein à lateribus paulò magis quā antè, aut po-  
nè tumescit. In eius enim medio, nonnihil versus internum latus, per omnem  
partis huiusce ductum à posterioribus in priora, minimum altè depressus habe-  
tur riuiulus, quartæ rotulæ parti quodammodo similis. Pars hæc quatuor prædita  
est lateribus, quorum primum, & secundum angulos ipsius occupant, ipsamq<sup>ue</sup> se-  
cundum longitudinem comprehendunt; Tertium anteri<sup>us</sup>, quartum posteri<sup>us</sup>  
constitit; ita vt hoc tali os quadratum euadat, vnde latinorum nonnulli Quatrium  
ipsum appellarunt. Ex quatuor hisce lateribus internum, & externum leui cartila-  
gine obducuntur: suntq<sup>ue</sup> leuiter reducta, licet minimè pari vtrinque modo. Inter-  
num nanque latus minus cauum est, & fouea longè minor, quemadmodum etiam  
inferioris tibiæ appendicis process<sup>us</sup> minor est, & cartilagine pariter incrustatus.  
Externum impensius cauum visitur, & cartilago latior, ita vt interni lateris fibu-  
læ process<sup>us</sup> insertioni congruam sedem adapet, qui vt diximus, deorsum ma-  
gis quam tibiæ process<sup>us</sup> exporrigitur. Haud secus quoque internum tali latus as-  
pero sinu insculpitur, cui<sup>e</sup> c ligamentum inseritur, quod ab interno process<sup>us</sup> ti- c lii. f. x. f.  
biæ latere produci, ipsumque ossi colligare diximus. Externum pariter latus, al- fig. xvii. f.  
terum quoque sinum adipiscitur; qui<sup>e</sup> d ligamentum excipit ab externo fibulæ  
process<sup>us</sup>, qui malleolus communiter dicitur,eductum, & fibulam ossi, de quo  
agimus, colligans. Articuli huius ope pedem extendimus, atque reducimus. Ta-  
lo inidē ad infimam posterioris lateris partem asperitas adit, ligamenta quā-  
dam ex tibia produca excipiens, nec non alia in calcem inserta educens. Duos  
adhæc sinus latus hoc sibi veq<sup>ue</sup>dicat, alterum introrsum, maiorem; alterum ex-  
trorsum minorem; qui<sup>e</sup> e musculorum ima pedis subeuntium f tendines vehunt. e lib. ii. f. xv.  
Ab anteriori autem latere, s process<sup>us</sup> ceruicis instar oblongus educitur, in caput  
rotundum, & lubrica cartilagine incrustatum densens, atque alto h navicularis g t. vi. f. x. f.  
dicti ossis sinui sese inferens. Contextus huiusce opera, pedem in latera, & in h cad. inter  
orbem g & N.

Talus.

Talus quomo-  
do cruris ossi-  
bus connecti-  
tur.

Talilatera qua  
tuor.

Sinus.

Asperitas.

orbem agi arbitror. Ac ceruix quidem superiori parte asperitatem obtinet, spiraculis quibusdam insignitam, ex quibus pars ligamentorū educitur, quæ musculorū pedis digitos adeuntium tendines comprehendunt. Inferior tali pars duplici sede calcis ossi articulat, cui duntaxat incumbit; posteriori scilicet regione, ubi calcem grandi tuberculo donari audies, amplum sinum subeunte, talo ad inferiorem partem exculptum; atque anteriori, versus internum pedis latus; qua in parte calcis os longo sinu, & cartilagine obducto, insignitur, qui tuberculum in humiliori tali capitis sede consistens excipit, quod in navicularis ossis sinum inferi diximus. In horum duum articularum medio, & calx & talus exasperantur, sinusque quosdam profundos obtinent, ex quibus cartilaginea quædam ligamenta educuntur, eos inuicem validissimè connectentia.

Talus quomodo calcis articuletur.

De Osse Calcis, & Naviculari. Cap. 31.

Secundum pedis os Calcem efformat, omnium longè maximum, & prioris instar, durum. Ac pars quidem ipsius inferior, qua pedem firmamus, teres ac latiuscula est, aspera & inæqualis, musculorum quorundam inde productorum occasione. Ad partis huius extremum posteriora versus insigne Tuberculum educitur, ad cuius anteriori sede musculus enascitur, quem secundum quatuor digitorum os flectere dicemus; nec non ea musculosa carnis portio, quam quatuor in partes dirimi, & quatuor digitos pollicem versus adducere docebimus. Tuberculum id usum hunc præstat, ne talo incumbentes, prædictos musculos comprimamus. Superior huiusce ossis pars ad posteriore tali ad posticam usque ipsius calcis regionem, teres quodammodo est, & in medio sinuata; exiguum obtinens asperitatem, cui tibia, ac tali ligamenta inferuntur. Sedes calcis postrema euidentius extrorsum, quàm cruris ossa, porrigitur, quo quidem efficitur, ut tutius pedibus insistamus. Ad ipsius verò extremum, versus posteriora asperitates quædam occurrunt, & riui, quibus validissimus vniuersi corporis tendo, ut suo loco docebimus, implantatur. Internum calcis latus, in medio euidenter cauum, ab extremis autem prominens conspicitur, idque processum, qui ad ipsius extrema consistunt, occasione. Per huiusmodi sinu, tutò musculorum pedis inferiora petentium tendines deferuntur, vna cum vena, neruo, & arteria, iuxta posteriorem anterioris huiusce lateris processum flexi; cuius interno lateri sinum insculpi diximus, tali tuberculum prodire dicemus, pollicem ad reliquis digitis abducentem. Externum calcis latus nullo prorsus sinu donatur, imò asperum est, inæquale, atque excarnè, præterquam inferiore sede, ex qua musculus educitur, quo paruus digitus à cæteris remouetur; nec non etiam anteriore, quæ leuis, & modicè caua est, tendinibus cedens per ipsam repentibus, septimum octauique pedem mouentium musculorum. Ex anterioribus calcis partibus, quæ regione pollicis consistit, apicem eum, processus modo edens, quo internum istius ossis latus profundius effici diximus, talo duntaxat, uti diximus, articulat; Pars autè exterior, minimo digito situ respondens, anteriore sui facie laevis est, & lubrica cartilagine obducta, compressumque caput obtinet, ad latera quodammodo suspensum, in medio sinuatum, quod minimè in sinum, ut Vesalius prodidit, sed in quarti ossis pedis alæ consimilis caput, cartilagine pariter incrustatum inferitur, eo articulationis genere, quæ Arthrodia dicitur, Diarthrosis species. Tertium pedis os Naviculare à Scaphæ imagine appellatur, posteriorique sede cauum, & longum sinum obtinet, tali caput uti diximus excipientem. Anterior ipsius regio lubrica cartilagine obducta, ternas facies, siue latera exhibet, tria tarsal ossa, singula suum, excipientia. Latera huiusmodi planam usque adeo superficiem obtinent, ut nullum in ipsis sinum, nullum possis Tuberculum animaduertere; reliquum verò versus internum pedis latus, grandius, insigniusque prominens visitur, quod os cui confertur, duobus quoque alijs tarsal ossibus amplius, atque profundius existant. Superior istius ossis regio gibba est, & rotula non nihil similis, sed quadantenus aspera, exque huiusmodi

Ima calcis pars.

Tuberculum.

Tuberculi usus.

Internum calcis latus.

Externum.

Anterior calcis pars.

Naviforme os.

Anterior ipsius pars.

Superior.

i. li. ii. c. x. ii. iii. A.

c. vi. f. x. O.

i. cad. A.

a. tab. li. iii. a. c. vi. f. x. A. b. c. vi. f. xx.

c. cad. r. d. li. ii. c. xiii. e.

c. cad. p. t. xv. f. i. N.

f. li. ii. c. xiii.

g. li. ii. c. xiii. h. li. ii. c. xvi.

i. li. ii. c. ii. n. x. xiii. V.

x. li. ii. c. vi. y.

i. vi. f. x. A. 4.

m. cad. e.

n. cad. inter o. & n.

o. cad. i. 2. 3.

huiusmodi asperitate ligamenta prodeunt, os id nauiforme, talo & tarfi ossibus colligentia. Inferior sedes leuiter sinuata occurrit, pedis adaugens cauitatem, estq; hæc superiore asperior, quò ligamenta hinc validiora educantur. Hæc quoque sedes versus internum sui latus sinum insuper adipiscitur, per quem sexti <sup>P</sup> musculi pedem mouentis tendo reflexus prorepat. Terna hæc calcis ossa, nec sibi inuicem, nec brachialis ossibus vlla ex parte correspondent.

*Inter pedis, & manus ossa nulla est similitudo.*

## De Tarso,

## Cap. 32.

*Tarsus quot ossibus constet.*

**T**arsus <sup>a</sup> brachiali quodammodo similis est, et si ex quaternis duntaxat ossibus <sup>a</sup> t.vi.f.x.x. 2.3.4. constituitur, quorum tria proprijs destituta nominibus, nauiformi vti diximus articulantur. Quartum alex non prorsus absimile, senu obtinet latera; Primum anteriùs, quod duobus pedij ossibus committi diximus, Tertium interius, quod eiusdè tarfi ossi sibi proximo coarctatur; Quartum externo pedis lateri correspondet, obscure adeo, planum, vt lateris nomen nequaquam ferè mereatur; Quintum sursum vergit, nulli præterea ossi consertum; Sextum inferiora spectat, nulli quoque ossi adiunctum, estque cæterorum omnium maximè inæquale. In hoc latere longus consistit <sup>b</sup> sinus, septimi pedem mouentis <sup>c</sup> musculi tendinè transmittens, nec non etiam <sup>b</sup> cad.x. c lib.ii. t.xv. f.ii.xv. Tuberculum, cuius ope terræ firmatur. Verùm quia nonnulla istius ossis latera, vsque adeo angusta & inæqualia sunt, vt tesseræ latera non nisi obscure referant, imo verò grandinosa videantur, Os grandinosum Arabes vocantur. Alij *πολύμορφον*, vt Cuneiforme à multiplici forma nuncupantur. Os id, vti diximus, calci compingitur, soloque innititur; reliqua tria, & Nauiforme terram minimè attingunt, sed ex hac parte profundum sinum efformant. Hæc tarfi ossa, non minus quàm brachialis, figura, magnitudine, ac situ inter se variant. Quod enim tesseram refert, & primū, quod internum pedis latus occupat, ijs, quæ in medio habentur, magnitudine præstant; & tesseræ consimile grandius primo est; & quemadmodum illud, versus calcem insigniter porrigitur, sic primum antrosum magis eminet, quàm quæ mediam obtinent sedem. Tertium os, quod tesseram referenti assidet, secundo maius est, & antrosum magis porrectum; ambo tamen simul iuncta, cunei figuram præ se ferunt, superius nanque lata, inferius angusta occurrunt. Tertium, priuatim inferius magis coarctatur, antrosum magis productum, & secundo demissius quod inter primum ac tertium delirescit, atque in inferiorem tertij huius apicem quinti pedem mouentis <sup>d</sup> musculi tendo inseritur. Ossa hæc tamen omnia, simul iuncta figuram superius <sup>d</sup> cad.D.E. quodammodo teretem, inferius concavam, vt in pede conspicitur, efformant. Tria huiusmodi ossa, iuxta posteriorem sedem nauiformi coherentem, lubrica inuicem cartilagine committuntur; reliquis in partibus, mutuo nonnihil distant, & cartilagineis quibusdam ligamentis copulantur.

*Plantæ pedis ossa quot.*

## De Pectine, seu planta pedis.

## Cap. 33.

**P**edis Pecten, propriè loquendo, <sup>a</sup> superior pedis regio, Tarsum inter, ac digitos, <sup>a</sup> t.vi.f.x.x. 2.3.4.5. appellatur. Plantæ verò nomine, subiecta sedes, pectini respondens, intelligitur. Ipse tamen duas hæc partes nullo discrimine, nunc Plantam, nunc Pecten vocabo, cum vnum idemque sint, sitque apud cæteros Anatores professores ita in more positum. Planta hæc pedis manus postbrachiali consimilis existit, præterquam quòd quinque ossibus prædita est, quæ omnia tarfi ossibus seriatim committuntur, læuibus quibusdam capitulis, adeoque obscure prominentibus, vt non immerito planis ea superficiebus coarctari dixeris. Ex his, quod pollicem sustinet primo tarfi ossi cõseritur; secundum indicem fulciens, secundo; Tertium medio præpositum tertio committitur; postrema duo tesseram referenti attextuntur, perinde atque octauo brachialis ossi, duo postbrachialis ossa paruum mediumque digitū sustinentia coarticulati retulimus. Et quemadmodum inter articulum ossis, quo paruus digitus innititur, & brachialis, ossiculum sesamo semini consimile haberi prodidimus, haud

secus



b ta. vi. fi. x. <sup>secus quoque in pede</sup> alterum conspicitur, inter quinti ossis pedij, & quarti ossis  
 x. <sup>Tarsi articulum consistens. Vtque tarsi ossa, alia alijs antrorsum magis protendi di-</sup>  
 x. <sup>ximur, sic quoque ex pectinis ossibus, aliud altero magis in posteriora porrigitur.</sup>  
 e cad. vv. <sup>Omnia tamen hac in parte crassa existunt, capitibus quibusdam ferè triangularibus</sup>  
 d lib. ii. t. xv. <sup>prædita, quorum medio ossa inuicem à lateribus quodammodo læuibus, ac planis</sup>  
 fi. i. l. <sup>cōmittuntur, eo articulationis genere, quæ Arthrodia dicitur Synarthrosis species.</sup>  
 e t. vi. fi. x. <sup>Cæterum, donec digitis committantur, sensim angustiora redduntur, inferius acuta,</sup>  
 fi. i. x. <sup>superius verò rotunda; atque inter vnum alterumque os <sup>c</sup> spatium interiacet, quo</sup>  
 g t. vi. fi. x. <sup>d musculosæ illius substantiæ portio reponitur, quam primos digitorum articulos</sup>  
 h li. ii. ta. xv. <sup>flectere docebimus. Quà verò digitis copulantur, postbrachialis ossibus omninò as-</sup>  
 fi. i. a. <sup>similantur, suamque obinent appendicem in teres caput desinentem, à superis ad in-</sup>  
 e t. vi. fi. x. <sup>fera non nihil magis, quàm ab internis ad externa exporrectum, quod sinum primi</sup>  
 fi. i. x. <sup>digitorum ossis, vnumquodque suū subingreditur. Verum quod pollicem sustinet</sup>  
 g t. vi. fi. x. <sup>posteriori in infima sui sede, quæ tarso committitur, non quidem processum, vt Ve-</sup>  
 h li. ii. ta. xv. <sup>salius asserit, sed exiguum obtinet <sup>c</sup> fossiculum, cui septimus pedis motor musculus</sup>  
 fi. i. a. <sup>inferitur. Os verò cui parvus innititur digitus, vbi eidem tarso connectitur <sup>s</sup> pro-</sup>  
 e t. vi. fi. x. <sup>cessum educit, in externum pedis latus porrectum, cui <sup>b</sup> octauum pedem mouentis</sup>  
 fi. i. x. <sup>musculi tendo implantatur,</sup>

*Spatium inter pectinis ossa.*

*Digitorum ossibus quomodo articulantur.*

*Os pollicem sustinens posteriori in infima sede processum non habet.*

De Pedum digitis.

Cap. 34.

a ta. vi. fi. x. <sup>P</sup>ECTINEM siue Plantam pedis, digiti subsequuntur, <sup>a</sup> singuli, vt manus quoque  
 A z. <sup>digiti, ex ternis ossibus constructi, præter pollicem, quem <sup>b</sup> bina duntaxat explent.</sup>  
 b cad. x. <sup>Quorum prius, primum pectinis os constituit, confertque vt facilius pedem figamus,</sup>  
 e cad. y. a. <sup>non parum quoque ad id conferentibus ossiculis <sup>c</sup> sesami semen referentibus, quæ in</sup>  
 e t. vi. fi. x. <sup>priore digiti articulo consistunt, vt de his priuatim agentes diximus. In reliquis ossa</sup>  
 fi. i. x. <sup>huiusmodi eandem omninò cum manus digitis figuram sortiuntur, ideoque illud</sup>  
 g t. vi. fi. x. <sup>duntaxat de his, sermoni adiiciam, vtriusque pedis ossa, vno pauciora quam manus</sup>  
 h li. ii. ta. xv. <sup>haberi. Manus enim septem & viginti efformatur ossibus, præter sesamina; octo sci-</sup>  
 fi. i. a. <sup>licet brachialis, quatuor postbrachialis, & quindecim digitorum. In pede sex & vi-</sup>  
 e t. vi. fi. x. <sup>ginti habentur, Calx nimirum, Talus, Nauiforme, quatuor Tarsi, quinque Pedij,</sup>  
 fi. i. x. <sup>quatuordecim digitorum. Atque hæc ad ossium historiam satis superque. Superest</sup>  
 g t. vi. fi. x. <sup>modo vnguium, & cartilaginum tractatio,</sup>

*Singuli digiti quoniam ossibus consistunt.*

De Unguibz.

Cap. 35.

a t. vii. fi. xiii. <sup>V</sup>NGUES <sup>a</sup> vsque adeo noti omnibus sunt, vt de his mihi longo sermone agere,  
 e t. vii. fi. x. <sup>non sit opus. Illud intellexisse sufficiat, eos ex ossium, ligamentorum, tendinū,</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>carnis, & cutis concretionem gigni; & superiori tertij digitorum ossis radici, validis-</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>simo ligamento adhærere; cute foris obtendi, intus verò carnj vsquequaque affigi:</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>sensu omni destitutos esse; & pilorum instar, perpetuò à radice incrementum sulci-</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>pere. Quod quidem euident argumentum est, eos peculiari vena nequaquam enu-</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>triri, vt nonnulli existimarunt. Vngues digitis pro fulcro sunt, quò melius quiduis</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>possint comprehendere.</sup>

*Vngues ex quibus excutuntur.*

*Vnguium vsus.*

De Palpebrarum Cartilaginibus.

Cap. 36.

a t. vii. fi. xvi. <sup>T</sup>RIUSQUE oculi Palpebræ tam inferior quàm superior, <sup>a</sup> cartilaginē obtinent,  
 e t. vii. fi. x. <sup>longam, tenuem, ac teneram, ambarum oras succingentē. Atque ab ea pili Cilia</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>vocati enascuntur, vt sanè oportuit, quò erecti seriatimque dispositi consisterent,</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>remorum in tiremi ritu, vnde hæc cartilagine græci *Tappes* vocarunt.</sup>

*Oculi cartilaginibus vsus.*

De Aurium Cartilagine.

Cap. 37.

a li. ii. fi. i. <sup>A</sup>VRIS <sup>a</sup> cartilago tenera est ac tenuis; semper tamen eo magis durefcit, quò pro-  
 b li. ii. fi. i. <sup>prius cranio accedit, vnde producit, ducto principio ex foraminis <sup>b</sup> auris or-</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>biculo, qui in temporum osse conspicitur; ideoque ossis huius orbiculus toto ambi-</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>tu subasper occurrit. Auris autem munus est, aerem colligere, efficereque vt in in-</sup>  
 e t. vii. fi. x. <sup>gressu</sup>

*Auris munus.*



gressu strepitum edat maiorem, uti perspicuo visitur, cum impetuosior quispiam ventus ora nobis percutit; maximum nanque intra aures sonitum excitat, per eas veluti per cochleam ingrediens.

## De Nasi Cartilaginibus.

Cap. 38.

Prima et secunda  
nasi cartilago.

Tertia.

Quarta, et  
quinta.

**N**aso quinque adfunt cartilagines, quarum<sup>a</sup> duæ priores, ab inferiori nasi ossium<sup>a</sup> sede<sup>a</sup> prodeunt, & deorsum porrectæ, sensum ac sensum teneriores euadunt, ac veluti in cartilagineum ligamentum terminantur, anteriorem omnem nasi regionem, ab imis ossibus ad ipsorum usque apicem, constituentes. Ab octauo etiam capitis ossis processu, quo nasum interfecari tradidimus, altera enascitur cartilago, instar ligamenti mollis, quæ antrum procedens, interna sede, anteriori duarum prædictarum cartilaginum regioni, secundum ipsarum longitudinem adnectitur. Cartilago hæc nasum ab ossibus deorsum interfecat, & duæ ea constituit foramina, adeo se introrsum exporrigens, ut ossi, quod nasi concavum palato respondens, dirimit, adiungatur. Præter hæc cartilagines, aliæ insuper<sup>b</sup> duæ in naso habentur, prioribus<sup>b</sup> multo molliores nervosioresque, quarum utraque principium foraminis nasi à suo lateri constituit. Cartilagines hæc interna sede supra commemoratis colligantur, & solæ motu pollent, eundem alijs impertientes. Harum cartilaginum latiores, mollioresque partes, ad nasi latera sedem obtinent; nasi Alæ Anatomes professoribus dictæ, quod inter respirandum referentur, occludanturque duarum alarum instar.

## De Laryngis Cartilaginibus.

Cap. 39.

Prima laryngis  
cartilago.

Guttur cur magis in viris quam  
mulieribus conspicuum.

Secunda cartilago  
gutturis.

**L**arynx<sup>a</sup> prius illud foramen est, ex duobus, quæ in faucibus occurrunt; per quod<sup>a</sup> lin pulmones aer deferitur, ex tribus constans cartilaginibus; quarum<sup>b</sup> prima anteriorem ipsius sedem occupat, eum gulæ nodum efformas, quem communiter guttur appellemus; estque cæterarum longè maxima, foris quidem<sup>c</sup> gibba, intus verò<sup>d</sup> sima, rotula, aut scuti veteris instar, unde latinis scutiformis, id est scuto similis dicta est; & superius, quam inferius longè amplior existit. Et quæ minus extrorsum magis in viris quam in mulieribus prominere videatur, glandularum quarundam occasione, quas hæc ad cartilaginis huiusce latera sortiuntur, quibus teres collum redditur, & guttur occultatur; æquè in his tamen atque in illis extrorsum porrigitur; licet minor alioqui mulieribus, larynx vniuersa, quam viris obtigerit. Porro in utrisque cartilago hæc bipartita conspicitur, ut liquido<sup>e</sup> linea demonstrat, eâ ab imo ad summum interfecâ, quæ indiffecta etiam cartilagine, superpositis ipsi ligamentis probè detectis, obuia occurrit. Iurè itaque magis, geminæ cartilagines, quam vnica essent dicendæ, quoniam tamen cæteri vnâ fecerunt, eam forsam iam in homine copulatâ spectantes, ipsi quoque vnica nûcupabimus: Quæ tam supera, quam infera sede, binos educit processus, utrinque singulos; quorum<sup>f</sup> superiores longius porrecti, & inferioribus ossis hyoidis lateribus, <sup>g</sup> nervosorum quorundam ligamentorum ope obstringuntur; inferiores<sup>i</sup> posteriori<sup>k</sup> laterum secundæ cartilaginis parti alligantur. Secunda hæc cartilago, minor est prima, & maior tertia, totaque propemodum ad<sup>l</sup> posteriorem laryngis sedem, iuxta æsophagum reponitur; & quidquid primæ ad absolutam scuti veteris figuram effingendâ deest, superiori, posteriorique sede abundè supplet; insigni utrinque educto processu<sup>m</sup> in cuius utriusque extremo sinus insculpitur, in quem inferiores primæ processus excipiuntur. Inferiore verò sede integrum circum edit, cuius anterior pars in faucibus conspicitur sub radicem primæ cartilaginis. Secunda hæc cartilago intrinsecus<sup>n</sup> læuior est; posteriore autem<sup>m</sup> sede stomachi spectante, longam sibi<sup>o</sup> lineam vindicat, dorsi modo secundum ipsius longitudinē exporrecta cuius medio<sup>p</sup> sinus duo in hac cartilagine consistentes dirimuntur, ex quibus duos<sup>q</sup> musculos in tertiam confertos educi trademus. Elatior pars posterioris lateris huiusce cartilaginis, in duo longa<sup>r</sup> tubercula utrinque vnum definit, quorum interuentu tertiæ cartilagini, uti docebimus, adnectitur. <sup>s</sup> Humilior secundæ cartilaginis pars, ubi laryngis posteriora constituit, subtenuis occurrit, deorsumque magis quam aliarum vlla, cõtendit; ob id scilicet, ut inde musculi educerentur, quos per

omnem



u. t.vii. f. ix.  
x. xl.

x. cad. R. S.

y. ta. vii. f. ix.  
xi. xv.  
z. ta. vii. f. vi.  
vii. viii. P. Q.

a. t. vii. f. ix.  
x. y.  
b. ta. vii. f. ix.  
xi. Z.  
c. ta. vii. f. ix.  
x. xi. T.  
d. lib. ii. t. x. v.  
f. ix. x. xi. l.

e. ta. vii. f. xii.  
xiii. lib. ii. ta.  
xvi. f. iii. v.  
vi. xi. L.  
f. cad. a.  
g. cad. b.

h. li. ii. t. xvi.  
fi. xi. c. f. ix. ii.  
xiii. d.  
i. ta. vii. f. ix.  
x. r. r.  
k. t. vii. f. xiii.  
xiii.

omnem secundæ cartilaginis ductum decliues expandi, atque in tertiam inferi dicemus. Huic cartilagini veteres nullum nomē indiderunt; propterea eam nonnulli innominatam appellaverunt. Vesalio anularis dicta est, quod anulum quodammodo referat, quē sagittarij Turcæ gestant in dextræ manus pollice. Tertiam laryngis<sup>u</sup> cartilaginem græci ἀπὸ τῆς ἀντικλινῆς, hoc est gutturnium, siue phialam appellant, quia cum integra est, & membrana asperam arteriam intus succingente, obducta, gutturnij ori quo aqua manibus affunditur, per quā similis existit, hæc, etsi, re vera, duabus constituitur<sup>x</sup> cartilaginibus, dictorum ligamentorum, & laryngem succingentis membranæ beneficio laxissimè inuicem colligatis; quia tamen commemoratis membranæ oblecta, vnica videtur, cumq; maxima Anatomicorum pars, ipsam minimè diuidant, ego vnica perpetuò nuncupabo; illud tamen admonens, duas eā in partes dirimi, & in vtralibet eorum partem<sup>y</sup> profundum spectari sinum, <sup>z</sup> secundæ cartilaginis tubercula fuscipientem; Ita vt vniuersa hæc cartilago non minus ad internum, quā ad externū laryngis latus, cæteris omnibus longè facilius moueri possit. Vtraque pariter huiusce cartilaginis pars, infernè quam supernè longè amplior occurrit; pars vero ipsius anterior, in longum definit<sup>a</sup> processum, laryngis interiora subeuntem. Superiùs Apices sensim, ac sensim mutuò<sup>b</sup> dehiscunt, prout magis à principio distant; ac dein in posteriora tendentes, & tenuiores, mollioresque redditi, atq; adipe obliniti, mutuò rursus vniuntur (<sup>c</sup> vacuo in medio relicto) superiores vnus, & alterius partes, & sedem efformant<sup>d</sup> vasis os, quo aquam manibus affundimus, æmulantem. Cartilago hæc vsque adeo mollis flexilisque inibi est, vt vomitentibus anteriorum reflectatur; ac laryngem adeo exquisitè integit, vt nullo prorsus modo, vel tantillū quid in pulmones illabi queat. Tribus hisce cartilaginibus, alia<sup>e</sup> mollis accedit, quæ, substantia perquā similis est elatiori tertiæ cartilaginis sedi, cui committitur, apprimè congruum efficiens operculum. Cartilago hæc iuxta elatorem internamq; primæ cartilaginis partem, <sup>f</sup> ampla & antrosum curuata basi enascitur, ac introsum procedens, in apicem <sup>g</sup> veluti triangularem definit, qui stomachi regionem versus, exporrigitur; superiore autem parte palatum respiciente, nonnihil prominēs & tenera est; inferiore, quæ laryngem obtegit, firma est, & multò quā superiùs durior. Ipsi apex, stomachum respiciens, insigniter mollis occurrit, membranaque adeo crassa obducitur, vt ligamentum videatur. Quæ primæ cartilagini, sedes cōmittitur, multa quoque adipe referta est, & longè mollior quā in medio. Huiusmodi cartilago Περὶ λάρυγγος, græcè dicta est, quasi supra linguā dicas: non quod ipsius summitas linguæ, sed<sup>b</sup> quod rimæ superincumbat, quā duo tertiæ cartilaginis<sup>i</sup> processus cōstituunt, tibiarum linguæ similem. Reliquæ faucium cartilagine ad pulmones vsque occurrentes<sup>k</sup> C. literā figuram exprimunt. Quod ideo effectum est, ne posterior asperæ arteriæ pars, cui œsophagus adhæret, deglutitionem impediret; suntque omnes eò molliores, quò propius pulmoni accedunt. Hæc ea sunt omnia, quæ ad cartilaginum osiumque historiam pertinent. Appendicibus ergo & cartilaginibus prolixitatis vitandæ gratia dimissis, nec non etiam osculis sesamo semini similibus, quæ octo & quadraginta ad summum in manibus, totidemque in pedibus in quibusdam habentur; ossa omnia, prout in humanis corporibus communiter videntur, alia supputatione, ducenta viginti quatuor, alia verò ducenta & quindecim cōsurgunt, Quorum octo caput obtinet; aures sex; maxilla superior duodecim; duo inferior; os hyodis vndecim; quatuor & viginti dorsum; sacrum os sex, & nonnunquam quinque; quatuor Coccyx; Costæ viginti quatuor habentur; Pectoris ossis, tria sunt; alia verò supputatione septem: scapulæ duæ; duæ clauiculæ; sex brachiorum; octo brachialis vtriusque; quatuor postbrachialis; singulorum digitorum tria, Coxendicis duo sunt ossa; alia supputatione sena, femorum duo; quatuor crurum; vnum vtriusque genu; vnus in vtroque pede talus; vnum naviculare; quaterna tarsum constituunt; quina pedium; terna digitorum quemlibet, præter pollicem, cui bina duntaxat obtigerunt.

Tertia Cartilago ex duabus constat.

Laryngis operculum.

Gule Cartilagine.


Ossium numerus.

# CHARACTERVM, QVI TRIBVS PRIMIS OSSIVM TABVLIS ADHIBENTVR, INDEX.

**T**RIBVS hisce figuris ydem ferè inscribuntur characteres: quanquam si quis illarum alicui tantummodo peculiaris fuerit, ex numero promptè obseruabitur, quem singulis modo characteribus subiiciam in Indice, quo potissimum institui ossium nomina simpliciter ascribere, ea q. Latina & à probatis auctoribus hæcenus magis usurpata. Cæterum hic monitum volo Lectorè, primam figuram plurimum ab illa Vesalii differre, ut quæ vitio non careat: quod facile animaduertet, quisquis partes in quibus ab eo dissentio, cum natiuis contulerit.

- A 2. 3. Sutura coronalis, arcualis, futura puppis.  
B 2. 3. Græcorum maiusculum A referens: lambdoides, futura proræ.  
C 3. Sutura sagittalis, instar veru aut virgæ per longitudinem capitis repens.  
D 2. 3. Suture squamosæ, temporales, mendosæ.  
α 2. 3. Hoc os ynà cum suo coniuge verticis ossa vocantur: sunt quibus utraque syncipitis ossa nuncupantur: item paria & arcualia.  
β 1. 2. 3. Os frontis: inuerecundū, os puppis.  
γ 2. 3. Occipitis os, lamdæ os, os memoriæ: quibusdam etiam os basilare.  
\*q; 2. Ossicula auditorij.  
δ 2. 3. Ostopporis, lapidosum, squamosum.  
ε 2. Processus eiusdè ossis styli acusue imaginè referens, styloformis, calcar capitis.  
ζ 2. 3. Processus mamillaris.  
E 1. 2. 3. Processus laterales ossis cuneiformis.  
η 2. Pars ossis temporis, squamosa dicta.  
θ 2. Processus ossis cuneiformis; vespertilionum alis asimilati.  
F 1. 2. 3. Hic processus, quiq; ei cohæret, dicitur os iugale, os paris, ansa capitis. vndecim ossa maxillæ superioris priuatis carent nobis: & quia ea particulariter exprimemus, tabula quarta, hic aliud nihil dicemus, nisi quod in inferiore, notata G, sicut in superiore pariter, dentes sunt quatuor incisores, duo canini, & decem maxillares.

- H 2. Os Hyoides, os gutturis, os linguæ, os morsus Adami. Auicennæ cap. de guttore, os Alphaic: habes quatuor latera (obseruandum) duo superius, duo inferius.  
I K L. M. N. His characteribus in tribus ferè figuris conspicuis tota spina notatur, quæ carinæ similis ex multis vertebribus exstructa est, ab I ad K. collum, ceruix. Atlas à K. ad L. vertebra thoracis, dorsif, pectoris, interscapulij ab L. ad M. lumborum vel renum vertebra. ab M. ad N. os sacrum, latum. Os vero coccyx vel caudæ os N. inscribitur.  
O 1. 2. 3. Sternon, os pectoris, asler, scutum cordis.  
P 1. 2. 3. Cartilago ensiformis, malum punicum, scutum stomachi.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. costæ, quarū superiores septem legitimæ vocantur, reliquæ spuræ.  
Q 1. 2. 3. Clauiculæ, iugula, furculæ.  
R 1. 2. 3. Scapulæ, scoptulum opertum, spatula.  
λ 1. 2. 3. Processus scapulæ superior, quem summum humerū ferè vocamus, aliqui rostrum porcinum: eiusdè processus.  
μ 1. 2. 3. Inferior anchoræ similis notatur.  
S 1. 2. 3. Humerus, os brachij.  
TVX 1. 2. 3. Cubitus, vlna, fovele maius.  
Y Minus, seu radius.  
y 2. Processum hunc Latini gibberum vocant.  
ξ 1. 2. 3. Processus eiusdè ossis styloformis dictus.  
ZZ 1. 2. 3. Brachiale, carpus, raseta.  
Γ 1. 2. 3. Postbrachiale multis palma, pecten manus.  
ΔΔ 1. 2. 3. Digi, quorum prius dicitur pollex & promanus: secundus index: tertius infamis, verpus, medius: quartus annularis, medicus, cordis: quintus minimus, auricularis.  
Θο 1. 2. 3. Os ilium seu lumbare.  
π 1. 2. 3. Coxendicis os & coxæ.  
ρ 1. 2. 3. Pectinis & pubis os.  
ς 1. 2. 3. Cartilago quæ pectinis ossa committit.




|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| A   | 1.2.3. Os femoris: anche os.   | qq  | perioris maxillę.   |
| T   | 1. 2. 3. Processus exterior femoris, rotator dictus, & trachametra maior,  | 2.3. Processus laterales in lumborū vertebis. |   |
| U   | 1.2.3. Eiusdē ossis minor interiorq; processus,  | rr  | 2.3. Processus earundem à parte postica,  |
| Ξ   | 1.2.3. Patella, rotula, mola.  | ss  | 3. Earundem superiores processus,   |
| ΠΣ  | 1.2. 3. Hęc tota pars Celso crus dicta est.  | tt  | 3. Inferiores.  |
| Φ   | 1.2.3. Ostibię, focile maius, canna maior, seu domestica cruris.   | uu  | 1.2. Angulus qui oritur ex cartilagine costarumque compagine.   |
| Ψ   | 1.2.3. Fibula, sura, minus focile.   | x   | 1.2.3. Ossis humeri superior cōexus seu iunctura,   |
| ΦX  | 1.2.3. Malleoli, claviculę, quibusdā male tali: & X quidem interiorē, φ verò exteriorem, notat.  | y   | 2. Inferior, sed proprię capituli externi.  |
| Ω   | 1.2.3. Talus, astragalus, os balistę, nux,   | z   | 2.3. Iunctura maioris ossis brachij.  |
| a   | 1.2.3. Os calcis, calcar pedis.  | 1   | 1.2.3. Iunctura minoris ad brachiale.   |
| b   | 1.2. 3. Naviculare, os scapham referens,   | 2   | 1.2. Iunctura eiusdē quę est ad humeri caput.   |
| cc  | 1.2.3. Hęc pedis pars quatuor efformata ossibus Gręcis, & nobis etiā, tarsus dicitur. Raseta pedis: & ossa rosetę pedis. Tria autē interiora d e f insignita quibusdā priuatim chalcoides vocantur, extimum vero, notatum g vocamus os cubiforme tesseram referens, quadratum grandinosum. | 3   | 1.2. Brachij ossis maioris processus à parte anteriori.   |
| def |  | 4   | 1.2. Pars postica, quam nodum cubiti vocamus.   |
| g   |  | 5   | 2.3. Vertibulum, seu processus rotę similis.  |
| hh  | 1.2.3. Pedum planta, vestigium & solum.  | 6   | 2.3. Eiusdē ossis ad humerum infertio.  |
| ii  | 1.2.3. Digni pedis.  | 7   | 1.2.3. Ossis femoris colligatio inferior.   |
| κ   | 1.2.3. Ossicula sesamina.  | 8   | 1.2.3. Maioris radij cruris colligatio ad genu.   |
| ll  | 2.3. Termini seu processus maxillę inferioris.   | 9   | 1.2.3. Illa minoris, prope iam dictā.   |
| m   | 2. Tertium ossiculū auditorij à Vesalio nondum observatum.   | 10  | 1.2.3. Processus vlnę styliformis.  |
| n   | 1.2. Primum foramē quarti ossium maxillę superioris.   | 11  | 12.13.1.2.3. Summitas, siue eminentior pars ossis coxę.   |
| o   | 1.2.3. Angulosa extremitas ossis coxendicis.   | 14  | 2. Infimus processus eiusdē ossis.  |
| p   | 2. Primus coalitus, seu cōmissura superioris maxillę.  | 15  | 2.3. Sinus in inferiori eiusdē ossis parte.   |
|     |  | 16  | 16.3 Ossis scemoris nodi inferiores.  |
|     |  | 17  | 1.2.3. Collum ossis scemoris.   |
|     |  | 18  | 1.2.3. Summum ossis scemoris caput: hosce duos processus Gręci τρῶχεντας, Latini rotatores appellant. |



TABVLA II.

LIBRI I.



## TABVLA IIII. FIGVRÆ

I. II. III. IIII. V.

**P** R I M A *Figura naturalem inculpatamq; capitis conformationem ab altero latere oculis opponit: reliqua figuras mōstrosas insuetasq; ostendunt, quæ interdum casu inveniuntur. Prima autem peculiariter monstrat certa ossa, suturas & foramina capitis & maxillarum, quorum singula suis characteribus insigniuntur.*

|     |   |
|-----|---|
| AB  | Sutura coronalis.   |
| CD  | Sutura lambdoides.  |
| E   | Obleça vel sagittalis,  |
| GC  | Spatium quod est inter squamosam & lambdoidem.  |
| AFG | H. Commissura squamosa,   |
| I   | Os coronale.  |
| K   | Idem ex altero latere.  |
| L   | Os frontis.   |
| M   | Os basilare seu occipitij,  |
| N   | Temporis os.  |
| O   | Maximus p̄cessus ossis, cuneiformis,  |
| QQQ | Primum os maxillæ superioris.   |
| *   | Processus eiusdem ossis, ex quo maior cavitas in temporibus.  |
| RRR | Asperitas cui adnascitur musculus temporum qui maxillam inferiorem mouet.                             |
| SS  | Quartum superne maxillæ os.   |
| V   | Processus primi ossis maxillæ superioris, ex quo pars quedā constituitur ossis zygomatis vel iugalis. |
| X   | Processus ossis temporum, ex quo fit altera pars ossis iam dicti.                                     |
| Z   | Commissura eiusdem ossis,   |
| aa  | Iunctura os cuneale temporum ossi committens.   |
| b   | Linea ossi cuneiformi & frontis ossi communis.  |
| e   | Commissura cōmunis cuneo & quarto ossi maxillæ superioris.  |
| g   | Commissura cōmunis ossis frōtis, & primo maxillæ superne & cuneo.                                     |
| h   | Amplius processus maxillæ inferne, et sedes in quam infertur.   |
| k   | Mamillaris processus.   |
| l   | Maxilla inferior.   |
| m   | Hoc in loco cōueniunt termini su-   |


|    |  |
|----|--|
| n  | turarum, quibus maxilla superior ab osse frontis distinguitur. |
| o  | Secundum maxillæ superioris os.                                |
| p  | Meatus auditorij.  |
| q  | Tertium os maxillæ superne.                                    |
| rr | Eiusdem os quintum.  |
|    | Secunda commissura eiusdem maxillæ superioris.                 |
| s  | Eiusdem primū foramen cōmune.                                  |
| f  | Acutus ipsius processus.                                       |
| t  | Primum foramen ossis frontis.                                  |

## FIGVRA SEXTA.

**F** I G V R A *hac caluaria fundus, eiusq; infima sedes demonstratur: ut autē melius omnia perspicerentur, maxillam inferiorem amouimus.*

|     |  |
|-----|--|
| CC  | Termini future lambdoidis.   |
| F   | Pars commissuræ squamosæ.  |
| MM  | M. Bona portio ossis basilaris, seu occipitij.   |
| NN  | Pars ossium temporum.  |
| PP  | 2. 3. 4. 5. Cunei processus inferiores, quatuor his numeris notati.  |
| OOO | Os cunei,  |
| QI  | Primum os superioris maxillæ.  |
| SA  | Quartum os eiusdem.  |
| VX  | Os zygomatis. i. iugale.   |
| Y   | Commissura eiusdem.  |
| d   | Commissura cōmunis cuneo & primo ossi maxillæ superioris.  |
| e   | Cōmissura cōmunis cuneo, & quarto ossi maxillæ iam dictæ.  |
| f   | Iunctura communis eiusdem maxillæ secundo & quarto ossibus.  |
| g   | Media iunctura inter os frontis, & maxillam superiorem.  |
| h   | Sinus intra quem recipitur maxilla infera.   |
| i   | Processus styliformis.   |
| k   | Processus mamillaris.  |
| l   | Tubercula ossis basilaris.   |
| mnn | Omnes istæ literæ ostendunt terminos commissuræ lambdoidis, & circa m, est quintum foramen ossis basileos. |
| nn  | Linea iungens lambdoidem.  |
| op  | Linea incipiens à iam dicta scandens per tēpora, quæ ab initio diuisioni similior est, quàm lineæ.         |
| qq  | Pars commissuræ cuneum ambiētis, quæ ipsi cum sex ossibus maxillæ  |


TABVLA - III - LIBRI - I -




| superioris communis est. |  | FIGURA VII. VIII. |   |
|--------------------------|--|-------------------|---|
| ΠΠ                       | Sextum par ossium maxillæ superioris.  |                   |   |
| r                        | Linea quæ protenditur ab ossibus temporū ad meatum auditus, & videtur diuississe ipsum ab osse.  |                   |   |
| f                        | Quædam in osse temporis asperitas, itē processus spectans lineam cuneo, ossique basilari communē, quo ferè loco est tertium foramen commune. | A                 | 1. 2. Processus, seu caput huius maxillæ, per quod maxillæ superiori annectitur.                                  |
| M                        | Septimum os maxillæ superioris.  | B                 | 1. 2. Collum, eiusdem processus.  |
| tt                       | Eiusdem secundum foramen commune.  | C                 | 1. 2. Eiusdem maxillæ processus, in quem se inserit musculus tēporū.  |
| u                        | Pars asperior os basilaris.  | D                 | 2. Quædam asperitas per quam musculus abditus in ore cohæret.   |
| x                        | Foramen auditus.   | E                 | 1. 2. Asperio cui mansor musculus affigitur.  |
| y                        | Secundum foramen ossis temporum.   | F                 | 2. Foramen per quod ingreditur ramus tertij cōiugij neruorū cerebri.  |
| v                        | Eiusdem ossis foramen tertiu, conspicitur supra hunc characterem, quartum verò, quod maius est subtus.                                       | G                 | 1. Meatus quo dictus excidit neruus.  |
| z                        | Primum commune foramen.  | H                 | 2. Asperitudo quædam, cui infiguntur maxillæ huius motores musculi: ex eadem linguæ nonnulli musculi producantur. |
| a                        | Quartum os superioris maxillæ.   |                   |   |
| 2                        | Meatus, seu via spinalis medullæ.  |                   |   |

TABVLA · IIII · LIBRI · I ·


FIG-I




II




III



VII




IIII




VIII



V



VI





## TABVLÆ V, FIGVRA. I. ET II.

**H**Æ duæ figura partem internam cranij demonstrant. Observabis autem 2. secundam: 1. primam notari.

- ΓΓ. 2. Commissura coronalis.  
 ΔΔ. 1. 2. Lambdoides.  
 ΘΘ. 1. 2. Obelæa.  
 ΛΛ. 1. 2. Petrosa.  
 ΞΞ. 1. Sutura lambdoidis pars.  
 Π. 1. Linea quæ committit extrema lambdoidis.  
 ΣΣ. 1. 2. Iuncturæ ambientes os cunei quadam ex parte: huic communis cum osse frontis & octauo capitis osse.  
 E. 1. Cunei primum foramen.  
 F. 1. In hos sinus abditur neruorum vis foriorum coniugatio.  
 G. 1. Secundum foramen cunei.  
 H. 1. Tertium.  
 I. 1. Multa foraminula, quæ in octauo osse conspiciuntur.  
 K. 1. Foramen quod in osse frontis est.  
 L. 1. Quædam insertio per quam annectitur dura meninx.  
 M. 1. Fovea in qua delitescit glandula quæ pituitam à capite defluentem excipit.  
 N. 1. Radix ossi temporum & basilari communis.  
 O. 1. Anterior meatus, per quem derivatur pituita quæ diximus in glandula colligi, qui quum in opere anatomico vix conspiciatur, apertius ostendi non potuit.  
 P. 1. Vltimus riuulus, seu ductus postremus.  
 Q. 1. Quartum foramen cunei.  
 R. 1. Quintum.  
 S. 1. Sextum.  
 TT. 1. 2. Quidam veluti fulci in craneo ex venis duræ menyngis exarati.  
 XX. 1. Quintum foramen ossis temporis.  
 Y. 1. Perforatio communis ossi temporum, cuneo, & basilari.  
 a. 1. Foramen auris.  
 c. 1. Foramen commune ossi temporum & basilari.  
 d. 1. Secundum foramen ossis basilaris.

- e. 1. Spinalis medullæ meatus.  
 g. 1. Huius ossis quintum foramen.  
 hhii. 1. Cavitates duæ ossis basilaris quibus se insinuat cerebrum.  
 ꝥ. 1. Prominentia quædam in medio harum cavitatum.  
 ll. 2. Ab huius prominentiæ termino apparet quædam in craneo fovea, iuxta processû octavi capitis ossis notatum η. in prima figura.  
 η. 1. Foveæ supradictæ pars in frontis osse apparens.

## FIGVRA III.

**F**IGVRA hæc refert septimum capitis os, vocatum cuneale, simulq; os octauum, quæ ex parte spectat cerebrum ab altero osse cranei separatum: aliquid autem in medio ossis cunei ruptum est seu diuulsum, quo penitus quæ hic sunt cavitates, oculis perspicere queant.

- AA. Octauum capitis os.  
 B. Processus elatior eiusdem ossis.  
 CD. Duæ maximæ cunei cavitates.  
 E. Intermedium spatiû harû cavitatû.  
 F. Foramen alterius duarum istarû cavitatum naso respondens.  
 G. Cœcavitas posita in parte infima interstitij, duas huius ossis maximas cauernas distinguens, reliqua quæ hoc loco spectantur foramina, notantur in prima figura huius tabulæ.  
 H. Processus infimi huius ossis alis Vespertilionum fimiles.

## FIGVRA IIII.

**E**XPOSITVR hæc figura ossis temporum bona portio: id prope foramen auditorij per mediû distingitur, quo melius, quæ hoc loco habentur ossicula cum texture seu membrana appareant.

- AA. Pars foraminis subeuntis auditorij.  
 B. Quædam vt sic dicam, intertextura in hoc foramine posita.  
 C. Primum ossiculû auditus malleum referens.

|   |   |     |   |
|---|---|-----|---|
| D   | Nervus ex quinto pari neruorum cerebri.   | CC  | 2.3. Ouales sinus facti in parte summa processuum lateraliu ofsis primi.  |
| E   | Eiusdem nervi ramus per foramen cæcū ad tēporis musculū prorepens.  | D   | 1.2.3. Primæ cervicis vertebre copula dentem secundæ vertebre complexa, notatum D.  |
| IF  | Eiusdem quinti nervi ramus alius, qui elabitur ex eo foramine, per quod ingreditur vena quæ tendit ad auditorium. | EE  | 1.2.3. Processus laterales ofsis primi.   |
| G   | Quinti capitis nervi per amplum auditus foramen distributio.  | F   | 2.3. Asperitas quædam in primi nodi parte anteriore.  |
| HI  | Cavitas quædam rotunda, in cuius parte anteriori situm est secundū ofsiculum insignitum I.                        | G   | 2.3. Processus posticus septimi nodi. Hic fissus non est.   |
| KK  | Caverne quædam intra meatum auditorium.   | HH  | 1.2.3. Huius vertebre summi processus.  |
| L   | Ofsiculi primi ex omni parte liberi facies antica.  | III | 1.2. Hic, puta, notatur ipse vertebre.  |
| M   | Postica.  | K   | 1.2. Primi duo extraordinarij processus, qui nihil secundum latas differunt, in parte altissima ipsarum vertebrarum.                  |
| N   | Antica facies ofsis secundi.  | LL  | 1.2. Pars processuum lateraliu extraordinaria.  |
| O   | Eiusdem ofsis postica facies.   | MN  | 1.2. Horu nodoru processus infimi.  |
| R   | Tertium ofsiculū, cuius ante me nemo mentionem fecit.   | O   | 1.2. Lateralium processu foramina.  |
| P   | Hic tria simul ofsicula eodem situ, quem in auditorio seruant instrumēto, conspiciuntur à facie anteriori.        |     |   |
| Q   | Facies posterior eorundem ofsium.   |     |   |
| FIGVRA V.   |   |     |   |
| OSTENDVNTVR hac figura omnes dentes tam unius, quam alterius maxillæ, evulsi ex suo offe, vt facilius radices eorum conspici possint. |   |     |   |
| AA  | Dentes superioris maxillæ.  | AB  | 1. Pars anterior ofsiculi maioris in offe hyode, peculiariter autem A & B duritiem quandam instar costenotant. asteriscus: tuberculū. |
| BB  | Inferioris maxillæ dentes.  | *   |   |
| 1.2.  | Duo dentes cisorij, risorij.  | CC  | Sinum factum hac ipsa in parte.   |
| 3.  | Vnus caninus.   | D   | 2. Huius maioris ofsiculi postica facies, quæ quodammodo compressior est.   |
| 4.5.  | 6.7.8. Maxillares.  | EF  | 1.2. Infima latera ofsis hyodis, quæ copulata ofsi medio referunt figuram ipsylon v.  |
| C   | Maxillarum pars superior:   | G   | 1.2. Horum laterum inferioru connexio cum primo ofsiculo.   |
| D   | Pars superior dentium.  | H   | 1. Extremitas lateris inferioris, quæ annectitur finibus cartiliginis laryngis, quæ scuto similis est.                                |
| E   | Maxillaris diuisus, vt huius cauum interius melius videatur.  | IK  | 1.2. Latera eleuatiore subtilioraque ac rotunda huius ofsis.  |
| FIGVRA VI.  |   | L.M | N.1. Tria ofsicula, vt plurimū cōnata lateribus elatissimis ofsis hyodis.   |
| TRIBVS his figuris depinguntur septem cervicis vertebra: prima à fronte, secunda à latere, tertia à tergo.                            |   |     |   |
| AB  | 2.3. Horum spōdilorum processus à parte postica per medium diuisi.  |     |   |

FIGVRA VII.

AMBÆ he imagines referunt structuram ofsis sitæ ad linguae radicem, vocatum hyoides. Prima illud monstrat à fronte vna cum suis processibus, qui processibus styliformibus committuntur, qui sunt in ofsis temporum. altera, sublati processibus, partem posticam ostendit.

## TABVLA VI. FIGVRA I.

**FIGVRA** hac exhibet uniuersam spinam cum osse sacro, & coccyge ex vno latere.

- AB Collum cuius septem vertebrae sitae inter A & B suis notatur numeris.
- CD Spinæ pars thoracæ constituens duodecim constans vertebrais, quæ interceptæ C & D numeris suis insigniuntur.
- EF Quinque lumborum vertebrae.
- GH Os sacrum sex constructum spondylis.
- IK Cauda seu coccyx quatuor ossibus constans.
- LL Ipsa vertebrarum corpora; licet autem quædam solum notentur, idem tamé de reliquis intelligédum erit.
- MM Vertebrarum laterales processus.
- NN Processus inferiores.
- OO Processus superiores PP. processus à tergo.
- QQQ Foramina per quæ elabitur spinæ medulla.
- RR Cartilago hanc, & illam vertebrae iniuncti.

## FIGVRA II. &amp; III.

**D**VABVS his figuris exprimitur os sacrum, cum coccyge superiori loco posita faciem anteriorem, inferior posticam, tertia seorsim collocata coccygem designat.

- AB C.D.E.F.G.H.I.K. 1. Hi characteres signant decem vertebrae, quæ ab extremo lumborum protenduntur deorsum: harum sex priores ad os sacrum pertinet, reliquæ ad coccygem.
- LL MR. 1. 2. Earundem vertebrarum processus laterales. priuatim autem LL. notant latum illum processum vertebrae secundæ. R processus lateralis vertebrae quintæ tuberculum. cui, ut dicemus, nullum annexitur ligamentum.
- NN OO.P.Q. 2. Ossis magni lateris sinistrum, in quod os foemoris in-

feritur, & priuatim NN. notatur sinus protensus eiusdem lateris parte antica.


- P Q. 2. illum notat qui apparet in parte apposita. OO. lineam seu costam intermediam, qua sinus distinguuntur. In sinu qui retro est, P foueam factam in parte elatiore. Qeam quæ humilior est, 2. interstitium utranque separans.
- S 1. 2. Processus elatior è latere sinistro, primæ ossis sacri vertebrae.
- T 2. Sinus qui retrò spectatur in altiore, iam dicti processus parte, in quæ demittitur tuberculum quoddam ultimæ lumborum vertebrae.
- VX 2. Prædicti sinus alæ. à parte anteriore V, à postica X, notantur.
- Y 1. 2. Processuum infimorum primæ huius vertebrae cum secundæ summa parte connexus, qui in multis conspicitur, similisque est ipsi qui in lumbis habentur.
- Z 1. 2. Processuum lateralium duarum summæ vertebrarum sacri ossis connexio.
- a 1. 2. Sexti nodi tuberculi cui adhæret caudula.
- bb 1. 2. 3. Ligamentum cartilaginofum interiacens ultimæ sacri ossis vertebrae & primæ caudæ.
- c 2. 3. Cartilago à caudæ extremo dependens.
- dd Processus postici ossis sacri.
- efg hi k. 2. Vix conspici possunt: notant autem capacitatem in qua spinæ medulla concluditur.
- i. 2. 3. 4. 5. 6. i. 2. Notæ foraminum per quæ egrediuntur nervi.

## FIGVRA IIII.

**H**ic triplex apparet scapularum humeri delineatio. Prima anterior, secunda postica, tertia lateralis, quæ trianguli formam habet. Maius latus retrò varium est protensum ab Y ad Z, per X transiens. Minus elatus est, à Z ad A per a. Mediū vero à parte anteriori à B ad Y.

- AB 1. 2. Sinus in quem recipitur os humeri, verum propriè in figura secunda

TABVLA · V · LIBRI · I ·



|      |   |    |  |
|------|---|----|--|
|      | cunda A partem notat altissimam quæ angustior est. B verò quæ tū sublimior, tum latior est. In prima A notat huius sinus elatiorem partem, vnde enascitur (vt dicemus) copula duplex, qua hic connexus perficitur: præterea musculi <i>ἀκρομίων</i> mouentis origo est. | bc | 3. Sinus in parte externa huius scapulæ, inter spinam & processum suum elatiorem, b, priuatim partem eius tenuiorem & pelluentem notat. c, radium quendam sæpe inuentum in hac scapula, qua venæ ad huius ossis nutritionem introreperunt. |
| CD   | 1. 2. Scapulæ collum, & C peculiari-ter huius processus radicem à parte interna signat.   |    |  |
| E ff | 1. 2. Scapulæ processus ex parte interna, F huius tuberculum, quo iungitur clauibus: E cónexus ad summum mucronē processus. f asperitas ex qua ligamentum oritur, quod se infert in summum huius scapulæ, processum quem humeri mucronem, & summū humerum vocant.       |    |  |
| GH   | 1. 2. Radix seu germen spinæ quæ est in hac scapula, vt diximus, à parte externa.   |    |  |
| K    | 1. 2. 3. Spina huius scapulæ, propriè ab H ad K, <i>ἀκρομίων</i> seu humeri caput, K huius processus colligatio. i pars huius spinæ crassior signatur.  |    |  |
| L    | 1. 3. Sinus, cui inferuntur claues.   |    |  |
| MM   | M. 1. Alueoli ex costarum contactu.   |    |  |
| NO   | 1. Maxima incuruitas à facie anteriore, cui in 2. figura respondent G & H.  |    |  |
| S    | 2. Scapulæ extrema ora, è parte anteriore.  |    |  |
| T    | 2. Sinus ex quo nascitur magna portio musculi mouentis brachium.  |    |  |
| VV   | 2. Hac in parte maior est scapulæ cauitas è parte forinsèca, propter dorsū lateris anterioris: nā quod interiacer VV & GH subtilius est ac densus.  |    |  |
| X    | 1. 2. 3. Hic maius latus spatulæ initio suæ spinæ annectitur certis musculis.   |    |  |
| Y    | 1. 2. 3. Anguli inferioris connexio.  |    |  |
| Φ    | 1. 2. 3. Pars altissimi anguli huius scapulæ, qui nonnihil eleuatur ad partem anteriorem.   |    |  |
| Z    | 1. 2. 3. Angulus altissimus maioris lateris huius scapulæ.  |    |  |
| a    | 1. 2. Circulus constitutus in medio lateris altissimi huius scapulæ.  |    |  |
|      |   |    | FIGURA V.  |
|      |   |    | <b>D</b> E S C R I B V N T V R <i>hic claues seu furcula, imaginè prima, superior anteriorè, eius pars, secunda posterior, tertia inferior.</i>  |
|      |   | A  | 1. 2. 3. Furculæ caput, quod ossi pectoris annectitur.   |
|      |   | B  | 1. Huius capituli angulus primus.  |
|      |   | C  | 1. 2. 3. Secundus.   |
|      |   | D  | 1. 2. 3. Tertius.  |
|      |   | E  | 3. Linea eminētiō in anteriore clauium parte apparens, è regione primi anguli, notati B.   |
|      |   | F  | 2. 3. Linea eminens in clauium humiliori parte conspicua, & G propriè notat aspredinem, quæ est sub finem huius lineæ.   |
|      |   | G  | 1. 3. Pars media quæ tenuior est, compactior, ac ferè teres.   |
|      |   | HI | 1. 2. Clauēs hac parte progrediendo versus scapulæ summū processum dilatantur, suntq; in altiori parte quo loco est I, gibbosæ.  |
|      |   | LM | 3. Fossa quædam in infimi lateris ampliori parte, quæ aliquid aspredinis habet.  |
|      |   | N  | 3. Hinc vsque ad M extēditur quædam asperitas, ex qua oritur ligamentum quod in processum anteriorem scapulæ infigitur.  |
|      |   | O  | 3. 2. Gibbus concauæ pectoris parti oppositus.   |
|      |   | P  | Asperitas quædam apparens in parte clauium infima, quæ finitur vbi cum scapulæ capitulo connectitur.   |
|      |   | Q  | 1. 2. 3. In tertia figura signat tuberculum, quod copulatur dicto processui, in prioribus huiusdem tuberculi ortum.  |



FIGURA VI.

**D** VABVS his figuris os humeri sinistrum representatur, prima pars eius anterior, posterior altera.

- ABC 1. 2. Os is humeri caput quod scapulae iungitur.
- DE 1. 2. Huius capitis tuberculum externum, per quod articuli huius ligamenta connectuntur, priuatim anteriorem faciem D, oppositam E, notat.
- FG 1. 2. Alueolus capitis ipsius tuberculum seiungens internum, ab eo quod est in latere externo.
- HZ 2. Sinus partem humeri internam ab externa distinguens: eius terminum ad iuncturam ostendit H. quae vero in os is ceruice I.
- KL M. 1. 2. Huius os is trochlea, cui cubitus incumbit, priuatim K. eiusdem trochleae sinum. nam L & M latera monstrant.
- N 1. In parte anteriori ipsius humeri os is fouea supra trochleam.
- O 2. Fouea eiusdem os is a postica facie, in quam maior brachij os isium stipites se abdit, suo nempe processu postico.
- P 1. 2. Externum humeri caput intra quod recipitur minor stipes brachij.
- Q 1. 2. Linea quaedam elatior hac in parte os is humeri.
- R 2. Sulcus quidam per quam nervus quartus meat ad brachium.
- S 1. 2. Caput internum os is humeri.
- T 1. Caput internum a facie anteriori habet alueolum quendam, per quem tertius nervus inter eos, qui ad manum feruntur, delabitur.
- V 1. In eiusdem capitis externa parte alueolus est quinti nervi ad manum tendentium.
- XY Z. 2. Os is humeri postica pars. X proprie ostenditur pars elatior, quae sinuosa est. Z inferior, nonnihil protuberans. Y vero alueolus nervi quarti ad brachium tendentis.
- abcd 1. Huius os is pars anterior, a, notat

partem altiore, b c humiliores, lateris scilicet nonnihil protuberantis, locus insignitus tribus prioribus humiliores est, ac subcauus: sed d, notatur locus tum sublimior tum protuberans.

- e 2. Asperitas circa latus anterioris humeri os is.
- f 1. Alia asperitas quae habetur in parte anteriori prope sinum, unde musculus cubitum mouentium prius externo suo principio progreditur.

FIGURA VII.

**A** MBÆ haec figurae duo brachij recti ossa representant, a parte interna, prior, ab externa, altera.

- AB 1. 2. Id uniuersum quod cubitum carpumque, seu brachiale interiacet, quodque brachium vocatur, terminus ad cubitum A, ad brachiale B, signatur.
- C 1. Maioris cannae, a facie anteriore processus, qui inseritur in sinum qui est, ut diximus, supra trochleam in priore humeri parte, & proprie notatur pars huius processus externa.
- D 1. 2. Processus retro spectans priuatim gibberus, & cubitus dictus, character tamen internam partem processus magis notat.
- E 1. 2. Sinus gradioris cannae, in quem recipitur humeri trochlea.
- I 1. Asperitates quaedam apparentes in exortu processus interni cannae grandioris.
- M 1. 2. Minoris cannae ceruix.
- N 1. 2. Caput minoris cannae, quod humeri externo capiti colligatur per sinum, quem in medio habet.
- P 1. 2. Ceruix maioris cannae.
- Q 1. 2. Caput eiusdem cannae contiguum carpo.
- R 1. 2. Processus maioris cannae stylo similis, unde *zeugonion* Graece dicitur.
- T 1. 2. Cartilago bonam partem cannae minoris obuestiens, qua carpo articulatur, priuatim in priori figura

|     |  |         |   |
|-----|--|---------|---|
|     | ra notat huius cartilaginis partem natam ex infimo sinu articuli, minoris cannae: quem iam describemus x y z. in altera vero eius cartilaginis partem notat, qua iungitur articulo cannae maioris. |         | quam processus styliformis cannae maioris.  |
| V   | 2. Sinus exculptus in maioris cannae articulo, per quem transeat tendō musculi secūdi extendentium brachiale.  | γδ εζ θ | ξ. 2. Omnes hae literę vnionem articuli cannae minoris ad brachiale ostendunt, priuatim γ suum qui hac in sede primus est, δ secundū, ε & ζ tertium, & x quartum.                             |
| XY  | Z. 2. Triangulus in parte glabra maioris cannae. Z particulatim monstrat trianguli caput.  |         | 2. Sinus vtrique cannae communis.   |
| aa  | 1. 2. Prima linea, prominens in maiori canna.  |         | FIGURA VIII.  |
| Bb  | 1. 2. Secunda B. peculiariter in priori figura partem huius lineae quae tendit versus collū maioris cannae.  |         | <b>H</b> ARVM <i>Figurarum prior faciem manus internā, posterior externam demonstrat.</i>   |
| cc  | 1. 2. Tertia linea eiusdem cannae.   | I. 2.   | 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. 2. Ossia octo carpi singula suo numero locoque conspicua.  |
| d   | 1. Cannae huius latus quod est intra primam & secundam lineam.   | I. II.  | III. III. I. 1. 2. Quatuor palme seu volę ossia, quae retinent nomen numeri quo notantur.   |
| e   | 2. Eiusdem latus constitutum inter primam & tertiam lineam.  | ABC     | 1. 2. Tria ossa pollicis.   |
| f   | 1. Latus maioris cannae constitutum inter secundam & tertiam lineam.   | DEF     | 1. 2. Indicis item tria, quae in ceteris absque omni varietate cōspiciuntur.  |
| gg  | 2. Linea apparens in latere notatō e.  | N       | 1. 2. Ossiculum quoddam positum ad latere externo ossis octauī τδ xapτδ, i. brachialis, vbi id cum petine vocato iungitur.  |
| hi  | 1. His locis iungitur vtraque canna nempe h ad cubitum, ad carpū i, iuncturam notat.   | O       | 2. Ossis octauī processus, qui sese attollit versus internam brachialis faciem.   |
| kk  | 1. 2. Vacuum spacium quod inter cannam vtramque interiacet.  | P       | 2. Ossis quinti processus, ex quo oriuntur ligamentū trāuersum, quod, vt dicemus, deo fauente, in ossis octauī processū notatū O inserit.   |
| n   | 1. Infimae coarticulationis cannae minoris pars interior.  | Q       | Altissima cōnexio ossis palmae, quo sustinetur index, quae item sexto cohæret; & quadantenus quinto brachialis ossiculo.  |
| p   | 2. Eiusdem articulationis pars externa.  | R       | 2. Eiusdem ossis articulatio tuberculum producens, quod se in sinum ossis, digiti indicis recipit.  |
| q   | 1. 2. Minoris cannae processus rudis, iuxta eius collum.   | S       | 1. 2. Spacium inane inter palmae ossa, tum id quod indicem, tum alterum quod infamem digitos sustinet. Idem autem de reliquis, quod ad interstitium cōnexionemque attinet, intelligendum est. |
| r   | 1. 2. Linea tenuis cannae minoris per longitudinem, qua parte maiorem spectat, e xtenfa.   | T       | 1. 2. Duo sesamina ossicula, in secundo pollicis internodij parte interna. In priori figura interior melius cōspicitur, posterior in altera.  |
| ff  | 1. Diſta lineae internum latus.  |         |   |
| tt  | 2. Hoc loco canna minor rudior appareat ratione musculorum ipsum mouentium, qui hic inferuntur.  |         |   |
| xyz | 1. Sinus exculptus in canna minori, qui carpi processum recipit. z gibberum in eo conspicuum notat. y, & x, duos vtrique ē lateribus tuberculi sinus.  |         |   |
| a   | 1. 2. Pars elatissima articuli cannae minoris sinū ipsum loco altiori extendens, cui brachiale annectitur: magis autem foras eminet,   |         |   |

- V V 1. Ofacula duo sesamina in primo indicis internodio.
- X 1. Oficulum ex prædictorum numero, sed minutius, sinum in connectione indicis secunda.
- Y 1. Sesamoides situm in tertio pollicis articulo. Cætera de numero horum nihil differunt ab ijs, quæ ad indicem pertinent, quare superuacuum duximus ipsa designare.

FIGURA IX.

**V**TRAQUE hac effigie exhibetur oculis spectandi duo cruris vel tibie stipites, priori, facies anterior: postica verò altera.

- A B 1. 2. Summus articulus maioris stipitis, priuim in secunda ipse connexus notatur.
- C 1. Articulus superior minoris stipitis.
- D 1. Inferna articulatio maioris stipitis.
- E F 1. 2. Inferior articulatio minoris stipitis.
- F G 2. Sinus sunt, quibus recipiuntur capita fœmoris.
- K 2. Tuberculum separans eosdem sinus, quod inter vtrumque iam dicti ossis caput inferitur.
- V 2. Horum duorum stipitum connectio in parte superiori.
- X 2. Connectio eorumdem inferior.
- Y 1. 2. Stipitum interstitium.
- Z 1. 2. Minor stipes hac in parte non plane rectus est, non nihil etiam inflectitur introrsum, foris incurua, intus protuberans.
- a b 1. Stipitis maioris anterior pars, in quam figuntur musculi crus extendentes.
- φ 1. 2. Articulatio maioris stipitis externum astragalum constituens, propriæque notant huius articuli processum.
- l 1. Sinus rudis, a fronte infimæ iuncturæ stipitis grandioris, ex quo oritur cartilaginofum ligamentum quod in malleolum inferitur.
- m 1. Hac in parte apparet sinus, quæ tres


- tendones pertranscunt festinates ad plantam pedis.
- op 1. Pars minoris stipitis, excarnis.
- qq 2. Stipitis minoris sinus, per quem septimus & octauus musculi mouentes pedem traiciunt.
- r 2. Sinus in stipitis minoris humiliori coarticatione, ex quo nascitur ligamentum ad ostali progrediens.
- ff 1. Primus angulus minoris stipitis.
- tt 1. 2. Secundus.
- uu 1. 2. Tertius.
- xx 2. Primum latus minoris stipitis, priuim notant lineam eminentem, ex qua musculus pollicem extendens nascitur.
- aa 1. Secundum latus minoris stipitis.
- ββ 2. Eiusdem latus tertium.
- γγ 1. Primus angulus maioris stipitis.
- δδ 1. 2. Secundus,
- εε 1. 2. Tertius.
- ζ 1. Primum latus maioris stipitis.
- η 1. Secundum.
- θ 2. Tertium.
- xx 2. Linea aspera in tertio latere stipitis maioris conspicua, in quam infigitur musculus in poplite delitescens.

FIGURA X.

**D**VABVS hisce figuris proponitur effigies pedis sinistri: prior connexam eius partem, altera plantam exprimit.

- Γ 1. 2. Os, propriè loquendo, tali.
- Δ 1. 2. Calcanei, vel calcis os.
- Θ 1. 2. Os *σφαγεοειδές* nauiforme.
- I. 2. 3. 4. 1. 2. In ceruice pedis ossa quatuor quorū singula à numero sibi imposito nomina habent.
- II. III. IIII. V. 1. 2. Ossa quinque pectinis pedis: non autem in secunda figura signatur, quod alioqui res perspicua esset.
- A Ξ 1. 2. Ossa digitorum.
- c 2. Pars postica ossis calcanei.
- d e 2. Inferna eiusdem ossis facies, propriè finem notat, qua tendones aliqui ad plantam pedes continent.

|                |  |     |  |
|----------------|--|-----|--|
| fg             | 1. Externum ossis calcanei latus, propriè g, locum notat, quo trāseunt tendones septimi & octaui musculorum pedis.                   |     | reliqua processu donatum est: verum ei sinus est, per quem irripit musculus septimus pedē moventium.   |
| ζ <sup>n</sup> | 2. Latus infimum ossis cubiformis, n peculiariter indicat sinū, per quē traijcitur tendo septimi pedē moventis muscoli.              | p   | 2. Processus ossis pectinis minimum digitum sustinentis, cui adnascitur musculus octauus pedem moventium.  |
| μ              | 1. 2. Os sesamo simile, quod habetur è latere externo articuli ossis pectinis, cui digitus minimus & cubiforme innituntur.           | στν | 1. 2. Tria digiti indicis ossa; à quibus reliquorum trium ossa nihil differunt.  |
| νν             | 1. 2. Interstitium vacuum inter ossa pectinis,   | xφ  | 2. Pollicis ossa duo.  |
| ξξ             | 1. 2. Capitula ossiū pectinis quæ recipiūtur intra summa ossium digitorum acetabula.   | ψω  | 2. Duo ossicula, quæ subtus apparent ad os, quod pollicem sustinet, iuxta primum articulum digiti prædicti.  |
| π              | 1. Hic character nō ostendit aliquē sinum peculiarem ossis pectinis pollicem sustinentis (vt ait Vesalius) nō enim hoc os magis quàm | χ   | 2. Ossiculum quod inuenitur in secundo pollicis articulo. Quæ inter ossicula restant, vt sesamo similia, notare super sedimus, cum id superuacaneum videretur. |





TABVLA VII. FIGVRA I.  
ET II.

**E**X hisce duabus figuris prior effigiem refert laryngis seu gutturis, a parte anteriori vna cum aspera arteria, eiusq; ramis distributis per pulmonem. Secunda tantum ostendit guttur cum arteria aspera trunco a parte postica. Quoniam verò ipsa ramorum distributio per se satis clara est, nullis characteribus hic opus esse duximus.

FIGVRA III. IIII. V. VI. VII.  
VIII. IX. X. XI. XII. XIII.  
XIIII. XV.

**H**ARVM figurarum tertia monstrat laryngis cartilaginem uterum scuto similem, et inde scutiformem vocatam, a dextro latere. Quarta eandem monstrat a latere interno: Quinta vero, a fronte: Sexta ostendit secundam laryngis cartilaginem a parte anteriori: Septima eandem a dextro latere antrorsum, Sed octava retrorsum: Nona tertiam ostendit cartilaginem a latere dextro: Decima faciem eiusdem anteriorem: Undecima verò posticam: Verum duodecima partem imam epiglottidis (qua tanquam operculum gutturi imposita est) refert: Decima tertia elatiore, qua palatum spectat: Decima quarta ostendit asperam arteriam cartilaginem, effigiem C. referentem, a parte anteriori: nam posterior figura Decimaquinta notatur.

- A B 3. 4. 5. Summi processus primæ laryngis cartilaginis.
- C D 3. 4. 5. Duo imi processus eiusdem cartilaginis.
- E F 7. 8. Secundæ cartilaginis pars, cui annectuntur duo inferiores processus, primæ cartilaginis: In septima tamen figura tantum conspicietur E.
- G H 3. 4. 5. Hoc loco prima cartilago apparet angustior, & breuior quam alibi vsquam, & inter G & H apparet linea, quæ cartilaginem par-


titur in duo.

- I 1. 6. 7. Secundæ cartilaginis pars interior, quæ respondet cavitati laryngis.
- KL 6. 7. Eiusdem cartilaginis pars inferior, in qua habetur circulus rotundus. & priuatim huius circuli partem anteriorem notat, quæ sita sub faucibus adenibus digito tangi potest: L verò posteriorem, quæ ad imum vergit instar processus: eaque iterum notatur L in figura octava.
- M 7. 8. Linea prominens in parte posteriori secundæ cartilaginis.
- NO 7. 8. Duo sinus, vnus a latere, alter secundum multitudinem huius lineæ situs.
- PQ 6. 7. 8. Duo tubercula secundæ cartilaginis quæ sinibus primæ inferuntur.
- RS 9. 10. 11. Pars vtrique tertiæ cartilaginis.
- T 10. 11. Hac in parte tertiæ cartilaginis nihil habetur præterquam quædam textura vel membrana, & compulæ laryngis.
- VX 9. 10. 11. Pars tertiæ cartilaginis cum interstitio per quod iungitur secundæ.
- YY 9. 10. Tertiæ cartilaginis processus constituentes laryngis linguam, per quæ vox acuta, vel grauis redditur, prout magis minusve aperitur vel clauditur vterque hic processus.
- Z 9. 10. 11. Pars tertiæ cartilaginis quæ effigiem habet osculo gutturnij seu malubrij similem.
- a 12. 13. Ostioli laryngem claudentis radix, quæ ex prima cartilagine nascitur.
- b 12. 13. Ostioli huius apex introrsum vergens, & cum deglutimus, laryngem obtegens.





**A**D harum partium clariorem intelligentiam, præter figuras modo explicatas, iuuabunt quindecim priores figura expressa tabula decima sexta, lib. secundi.

TABVLA VII. LIBRI I.

FIG. I



II



## FIGVRA XVI.

**F**IGVRA hac exhibet cum superiores, tum inferiores palpebrarum cartilagine vndique liberas, quibus cilia innascuntur: hic autem ob rei facilitatem à notis abstinuimus.

## FIGVRA XVII.

**O**STENDVNTVR hac figura cartilagine nouæ lunæ speciem gerentes. Inueniuntur autem in sinibus, qui articulo summo maioris stipitis tibiæ insculpuntur.

**M** Cartilago quæ est in sinu lateris dextri, in summo articulo maioris stipitis, quo ingreditur caput exterioris ossis fœmoris.

**NN** Cartilago quæ est in latere sinistro, in quod recipitur internum fœmoris caput.

**OO** Hac in parte hæ duæ cartilagine sūt crassiores quàm in vlla alia.

**PP** Hoc loco lateris dextri cartilagine committuntur cum illis quæ sunt in latere sinistro, vtræque in acutum terminatæ.

## FIGVRA XVIII.

**A**MMBÆ hæ figura monstrant ungues manus eodem plane modo, quo detrahuntur manu cocta ad conficiendum sceleton. harum prior, quæ literis insignitur, offedit unguis partem internam & carni coherentem: secunda verò oppositam.

**A** Pars unguis extra cutem prominēs.  
**B** Unguis radix quæ mollior est & cute obiecta.

## FIGVRA XIX.

**E**XHIBET præsens effigies cartilaginem, quæ conspicitur in articulo clauiculæ, qua parte hæ colligatur cum scapula processu, qui humeri caput quibusdam dicitur.

## FIGVRA XX.

**H**ÆC forma est cartilaginis quæ inuenitur in eo articulo, per quæ clauces annectuntur ossi pectoris.

**H**IC finem faciemus exponendi figuras libri primi. Confidimus autem nihil hic præmissum fore, quod dignum ampliori explicatione censeri possit.

# IOANNIS VALVERDI

## de Corporis Humani Anatome.

### LIBER SECVNDVS,

In quo de ligamentis, & Musculis agitur.

De Ligamentis.

(Cap. I.



V<sup>m</sup> primo libro, Ossa, & cartilagine ceterarum corporis partium veluti basim, ac propugnaculum prosequuti sumus; de ipsorum vinculis hoc secundo agere par est: de carne inquam, de musculis, de membrana carnosa, de adipe, de cute, de cuticula, ac postremo de membrana, quæ ossibus cunctis obtenditur, dicta ob id Periostion, quorum interuentu ossa, & cartilagine conneſtuntur, vestiunturq; ducto à ligamentis exordio; quæ communiter non minus nervi

appellantur, vt primo libro diximus, quam musculorum capita, quam ue instrumenta, & vasa, quibus facultas sensitrix à cerebro, ad reliquis corporis partes deferuntur. Ligamenta hæc ex partibus homogeneis conflata sunt, & dura, (licet non æquæ ac cartilagine) albicantia, exanguia, & solida, & ex aliquo vt plurimum osse, seu cartilagine, dura ue quapiam membrana enascuntur. Primum ipsorum munus est, ossa inuicem colligare, ex quo, cum præcipuum sit, nomen traxerunt. Secundum est, musculorum tendines ita complecti, ne ab eo quo incedunt tramite aberrant, nunc sese in pontem componentia, sub quo deferuntur, vt in parte interna<sup>a</sup> brachialis, ac in tarso videbitur; nunc in anulos adaptata, vt in<sup>b</sup> externa eiusdem brachialis regione admonebimus. Tertius ipsorum vsus est, pavimenti strati<sup>c</sup> ue instar, musculorum tendinibus subſterni, vbi per asperum, atque acutum aliquod os euehuntur, cuius exempla, illius quidem in interna<sup>e</sup> brachialis sede, humus verò in<sup>d</sup> coxendicis osse habebuntur. Quartus est, musculorum tendines obtegere, vt in interna<sup>e</sup> brachij sede visitur. Quintus est, quo, interſtitij vice, musculis interiaceant, eos inuicem ſeiungentes, quod in<sup>e</sup> crure, & brachio, & pubis<sup>f</sup> ossis foraminibus præstant, quibus in partibus ligamenta hæc, externos musculos ab internis ſeiungunt. Sextum haud minoris à primo momenti est, quo<sup>g</sup> musculorum constitutionem ingrediuntur, in eum, quem ſequenti capite explicabimus modum. Hisce vinculis alia complura accedunt, quibus ſuſius loquendo, idem nomen adaptari poſſet, cuius notæ sunt, membranæ musculos obtegentes, Peritonæum, Membranæ cordis, Quæ costas amplexantur, Quæ thoracem interſecant, & Dura mater, quæ omnes non minus, quam ex ſupra commemoratis, vnaquæque ex osse, aut cartilagine principium deſumunt, & aliquid ſemper colligant, amplexantur ue. Hac etiam ratione musculorum quemlibet ligamenti nomine dignari poſſemus, eosq; potiſſimum, qui ex osse, aut cartilagine produci, in aliud inferuntur, cuiuſmodi ſunt, qui ex<sup>h</sup> coxendice ortum deſumentes, ossis femoris implantantur, qui præterquam quod femoris motus coadiutores exiſtunt, in colligando inſuper, tuendo, inueſtiendoq; articulo, opem minimè obſcuram confeſerunt. Porro ligamenta omnia, pro vſuum quos præſtant numero, non parum inter ſe variant, alia namq; plures ſimul præſtant, alia vnicum, vt in hiſtoriæ progreſſu obſeruabimus. Haud ſecus quoque ortu, atque inſertione diſſerunt; alia enim ex ſolis educuntur cartilaginibus, in eaſdemq; pariter deſinunt, vt laryngis nonnulla; aliqua ex ossibus enaſcuntur, & in ea inferuntur, vt genus humeriq; ligamenta, atque alia propemodum omnia. Alia uſus ad os, & cartilaginem pertinent,

Ligamenta ex quibus conſtantur.  
Ligamentorum vsus.  
Secundus vsus.

Tertius.

Quartus.  
Quintus.

Sextus.

Ligamenta alia

Ligamentorum diſcrimen.

a t.iii. 6.  
b t.ii.iii. 1.  
2.3.4.5.6.

c t.vii. 4.  
d t.xii. a.β.  
e t.iii.β. t.v. 9.  
f t.xv. fi. xv.  
g t.vii. u.  
h t.xiii. b.  
i t.xv. fi. vii.

K t.viii. A. L.  
ix. 11.

nent, ut quæ pectoris, costarum cartilaginibus colligant. Alia ex osse, aut cartilagine deducta, in aliam quamvis corporis partem terminantur, cuiusmodi sunt omnes propè membranæ. Quædam ex osse quopiam nascuntur, & in idem desinunt, ut quina ex fenis, externam brachialis sedem occupantia ligamenta, primum nanque ad radium, vlnamq; pertinet. Ligamentorum quoque substantia minimè omnium eadem sed diuersa est; Aliorum namq; substantia mollior est, & membranæ particeps, ut omnium fere articulos complectentium vinculorum, quamvis etiam ex his, alia alijs habeantur teneriora, quæ nanque digitorum internodia ambiunt, humeri ligamenta mollietate superant, hæc verò, femoris ligamenti molliora existunt. Alia prædictis habentur duriora, verum cartilaginibus mollietate antecellunt, quale illud est, quod ex <sup>l</sup> medio capitis femoris eductum, in coxendicis acetabulum inferitur; & quæ vertebrae <sup>m</sup> spinæ corpora intercedunt, & quod ex tuberculo in superiore tibia <sup>n</sup> appendicis sede consistente oriri diximus, femoris ossi confertum; atque ut vno verbo dicam, quæcunque ossibus interiacent. Situ præterea inuicem variant. Alia siquidem extrinsecus sedem obtinent, ut molliora; alia intrinsecus consistunt, ut cartilaginea. A figura etiam differentia desumitur, Quædam enim lata sunt, & tenuia, ut quæ inter gemina tum cruris, tum cubiti ossa reponuntur, atque alia item complura, quæ articulos circum vndique complectuntur. Quædam angusta, & crassa sunt, atque horum rursus alia teretia, ut <sup>o</sup> quod ex processu secundæ ceruicis vertebræ prodit, & in occiput inferitur; & <sup>p</sup> quod posterius dentem eundem comprehendit; Tum <sup>q</sup> quod in medio femoris ossis capite consistit, in coxendicis acetabulum insertum. Alia plana sunt, ut tertium peculiare humeri ligamentum; & quæ genu colligant, crassa quidem omnia, sed minimè rotunda, ut neque cartilaginea ligamenta tali os fibulæ colligantia. Mutuò tandem ligamenta differunt, quoniam Aliqua solida existunt, ut maxima ipsorum pars; Aliqua peruia sunt, ut brachialis vincula, quæ anulorum instar, musculorum tendinibus cedere diximus; quales item sunt <sup>r</sup> membranæ pubis ossis foraminum, nervo venæ arterięque viam præbentes; & <sup>s</sup> quæ tibia inter, ac suram consistit, quæ venę pariter per ipsam transiisse peruia est. He sunt vinculorum differentię. Verum id omnibus commune est, ut sensu non nisi obtuso prædita sint, quò minus continuò membrorum motu defatigentur: qua etiam de causâ, vinctuosus ille humor, in articulis occurrens, comparatus fuit, qui ligamenta continuò obliuens, ossium motum reddit faciliorem.

*De Cute, Cuticula, Membrana Carnosa corpus vniuersum obtegentē, et de Adipe, inter cutem, dictamq; membranam reposito. Cap. 2.*

Quoniam, qui nobis de Musculis habendus est sermo, aliquid forsan obscuritatis haberet, non pertractata prius Cute, Cuticula, Adipe, Membrana carnosa, quæ partes vniuerso corpori communi sunt integumento; quid primum eę sint, explicare operæpretium erit, orationis exordio à Cute desumpto. Quę duritię mollietq; media est, nervo sanguine referto similis; imò corpus est carnem inter & neruum, medium, nec sanguine admodum refertum ut caro, nec omnino expers ut nervi, ex semine, non minùs quàm spermaticę alię corporis partes, ortum; ex quo fit, ut disruptum, non nisi vestigio aliquo relicto, consolidari possit. Cutis hæc subditis sibi partibus diuersimodè affigitur; aliter enim volę manus, ac pedis plantę, quàm fionti adheret; secus labijs, naso, auri bus, & sedi, quàm ceteris partibus adnascitur. Omnes porro, perinde ac cuiusvis ceterorum animantium coria, detrahi exactè admodum possunt, ideoq; *δέρμα* gręcis, quo nomine res detracta facilis designatur, dicta est. Verum advertere oportet, uti adhesionem, ita etiam nervorum in eam pertinentium propaginibus excipiendis differre. Siquidem cutis volę manus complures excipit nervorum ramulos, ut suo loco dicemus, capitis vero cutis paucissimos, etsi nulla ipsius pars nervis vique eaque desinitur. Ex quo quidem apparet, quanta ijs fides habenda sit, qui cutis sensum è medio

Ligamentorum  
in substantia di  
scrimen.

In situ.

in figura.

Alia differen  
tia.

Ligamenta om  
nia obscure sen  
sunt.

De cute.

Cutis sensu ad  
modum exquisi  
to prædita.

l. xv. ff. xv.  
o.  
m. ta. xv. ff.  
xxviii. 2.  
n. ta. xv. ff.  
xxvii. x.

o. ta. xv. ff.  
xxvii. l.  
p. ead. K.  
q. ead. ff. xv.  
o.

r. l. xiii. b.  
s. l. xv. ff. xv.

medio tollunt; cū alioqui secus in dies euentus, nos in vulnere affectis, edoceat, quibus ea detracta est, in quibus nō sine magno ipsorum dolore, refuitur, imō longē maiori, quā pars alia vulneris quæcunque. Eo etiam cutis huiusmodi variat, quōd alijs partibus crassior obtenditur, vt in pedum plantis & capite; alijs tenuior, vt in facie; alijs media, vt in interna manus parte; ea tamē vniuersa homini tenuior, quā quadrupedibus obigit. Non minus ex motu ipsiusque priuatione, cutis differentia desumitur, in aliquibus enim partibus mobilis est, vt in fronte, & quoquo modo in occipite, facieque, atque in anteriore colli sede; in alijs immobilis, vt in cæteris omnibus corporis partibus. Quæ motu prædita est, aut particularis musculi interuentu mouetur, vt in fronte, collo, malis, labijsque; aut proximarum partium auxilio, vt cutis genarum. Quinetiam alijs in partibus pilosa cernitur, vt in capite, sub axillis, in pectine, viris in mento; in alijs glabra, vt in volis manuum, ac pedum plantis: Ast ea exiguis quibusdam spiraculis tota peruia est, *αὐρίδες* græcè dictis, per quos recrementa corporis expurgantur, & pili enascuntur. Spiracula huiusmodi in manuum volis, & pedum plantis, minora, quā in vlla alia parte habentur. Hisce cutis foraminibus alia insuper accedunt, palām occurrentia, qualia sunt nasi, oculorum, oris, aurium, pudendi, sedis, & vnguium foramina. Quam ob causam, horum foraminum vnumquodque paratum sit, cum de paribus cū subiectis agemus, figillatim edocebimus. Nunc scire expedit cuti huic, cuticulam obtendi, exanguem, & *Cuticula.* ceparum inuolucris modo, tenuem, quamuis in partibus nonnullis, potissimum in manuum vola, in pedum planta crassior occurrat; quā græci *ἐπιδερμίδα* hoc est, cutis efflorescentiam appellant. Cuticula hæc si quando disrumpitur, vt ferè in scabiosis euenit, siue diuellitur, vt cum vesica quæpiam excitatur, facili nullo relicto vestigio renascitur; secus quā cutis, tam dictā ob causam, tum quōd in eam complures venarum, arteriarum, neruorumque propagines terminantur: imō nonnulli cutem præterea nihil esse, quā horum omnium congestionem existimarunt. Cuti *Adeps.* copiosus adeps, perinde atque in suis subtenitur, in quouis corpore nisi admodum gracili conspicuus, atque ideo minimè arduum est, humanum corpus, prædicta membrana carnosā prorsus intacta, deglubere, quod in simijs canibusque non euenit, vt probè in ipsis Galenus aduertit, contrarium in homine obseruaturus, si explorare id ipsi licuisset. Adeps is ex sanguine è venis refudante gignitur, quæ per carnosam membranā reptantes in cutem inferitur. Qui sanguis tum natui caloris inopia, tum membranæ huius, suapte natura frigidæ vicinitate, cōgelascit, & in adipem abit: ideoque in frigidis humidisque animantibus, qualis femina est, ac sus, copiosior concrefcit, quā calidis & siccis, quales sunt, canis, leo, simia & alia, in quibus omninō paucus, vel nullus conspicitur. Quinimo præter hominem, suem, erinaceum, ouem, & glirum, nullum mihi præterea quadrupes occurrit, cui adeps inter cutem & membranā carnosā repositus adesset. In alijs etiam corporis partibus cōplurimis, adeps iste collectus visitur, quibus quidem opitulatur subuenitque, nutrimentum egentibus suppetitans, atque in molem ipsas attollens maiorem; vnde *αἰμαλὴ*, vt arbitror, græcis vocatus est. Adeps hic iuuenibus albicat, senibus verò flauescit, atque id magis minusque, prout senior quis, iuniorque est. Porro albedinis ipsius *Adeps cur ag-* rationem, in compotem aeræ substantiæ naturam, vt quidam faciunt, referre, om- *bis.* nino mihi risu dignum videtur; hac enim ratione oleum albissimum, dentes verò nigerrimos esse oporteret, quandoquidem nihil hisce minus, nihil illo acreum magis inuenies. Sed hæc cū ad rem minimè faciant, missa faciamus. Adipi membrana subtenitur, longè cuticula validior crassiorque, & fibris quibusdam implicita, quæ adipem peruadentes in cutem vsque porriguntur, quorum auxilio quoque substratis sibi musculis adhærescit, & cuti præterea validè admodum affigitur, medijs venis quāplurimis, arterijsque nonnullis, nutrimentū cuti deferentibus; nonnullis quin etiam neruorum propaginibus, sentiendi vim ipsi communicantibus, quæ per huiusmodi membranā adipemque prorepentes in cutem adiguntur. Mem- *Membrana car-* branæ istius, eadem est vbiq; crassities; motu nequaquam pollet, præter quā in *nosa quibus in* collo, fronte, occipite, ac facie, vbi carnosus quibusdam fibris adeo crassescit, vt mu- *partibus mouea-* sculi *tur.*



sculi nomen adipiscatur. Vñ quidem interdum sunt qui aurem mouerent, quod ipsi Romæ in Hispalensi quodam vidimus, cui nomen erat Manfiglio; alij cutem in dorsomouet, alijsque partibus, in quibus omnibus membrana hæc carnosus fibris referta est, equinæ, asininæque cutis instar. Hanc græci *ἐπίερνα*, quod membranam significat, appellarunt. Arabes postea Carnosam summa ratione addiderunt, quo nomine communiter appellatur, licet ij abdominis quoque musculos simul omnes huiusmodi appellatione dignentur. Sub hac membrana inter ipsam & musculos lentus, lubricusque humor consistit, qui musculus motum comparat faciliorem, quod membranis omnibus commune est, quæ corpus aliquod sedem aliquando commutaturum ambiunt. Is etenim humor eas oblinet, quò promptius excurrant: quemadmodum in Peritonæo, intestina obtegente videre est; & in ligamentis, quæ tendinibus, pedum, manuumque digitos aduentibus patent; atque in membranis cordis.

De Musculis, & primum quid sit Musculus. Cap. 3.

Musculus quid  
ex quibus  
constet.

**M**usculus, pars corporis nostri est <sup>a</sup> organica, voluntarij motus auctor & opifex: constatur is, ex neruoso ligamento in plura filamenta diducto; ex multis præterea carnosis fibris, filamenta complectentibus, atque integumentibus; nec non etiam ex aliquot venarum, arteriarum, neruorumque ramis, nutrimentum, vitam & sensum ipsi elargientibus. <sup>b</sup> Ligamenta statim à musculi principio, in multas partium tur fibras, ad finem vsque musculi perreptates, vbi rursus coalescentes, <sup>c</sup> validū quendam funiculum, siue lorum efformât, Tendinem latinis appellatum. In hunc autem tendinem musculi nequaquam desinunt, nisi cum procul inserendi sunt; ipsius enim caro, locum per quem deducuntur insigniter impediret. Estque illud minimè prætereundum, quod, quemadmodum prior ligamentorum distributio, musculi caput constituit, sic eorundem collectio caudam, medium verò ipsorum, <sup>d</sup> corpus efformat: vniuersum autem in musculorum nonnullis murem effingit, vnde apud Latinos Musculi appellatione fuit adeptus. Piscis quinetiam dicitur, quod ipsi quodammodo sit assimilis; etsi profectò vix vnum aut alterū figuræ huius, in <sup>e</sup> brachio <sup>f</sup> femoreque reperiatur. Deinde musculus omnis, membrana totus integitur, ex ligamentis, ipsius caput finemque ossi colligantibus,educta. Horum musculorum alij breues sunt, alij longi; illi vsquequaque carnei sunt, tendinem prorsus nullum effatu dignum educentes, hi tendine omnes donantur, licet inæquali, nec eademmet figuram seruanti; alij enim longam, alij teretem, alij aliam obtinent, vti mox dicemus.

Musculi figura.

De Musculorum differentijs. Cap. 4.

Musculorum differentijs.

**V**ariant inuicem musculi, ortu, munere, figura, colore, situ, & fibrarum genere. Quod enim ad ipsorum structuram attinet, ex fibris, venis, arterijs, neruis, carne, atque adipe omnes constituuntur; neque vllus est musculus, qui singulas hæc partes non obtineat, licet Vesalio secus videatur. Verum id quidem est, in aliquibus, venam, neruum, arteriamque, quæ sua est ipsorum paruitas, intuentium oculos effugere; vt in eo euenit, qui volæ manus tendinem producit. Adeps verò qui ferè inter carnum fibras concreuit, in senibus, atque gracilibus exiguus omnino, vel nullus occurrit; in pinguibus autem, copiosus perpetuò conspicitur, potissimum in duobus musculis <sup>a</sup> nates efformantibus. Varius ergo est musculus ortus. Quidam enim ex osse prodeunt, vt femoris, & cruris motores. Quidam ex cartilagine principium desumunt, vt <sup>b</sup> laryngis musculus, qui inter thoracis <sup>c</sup> cartilagine exurgunt. Alij ex alia quapiam dura membrana producantur, quales sunt omnes oculorum musculi, & <sup>d</sup> duo hi qui retrò stomachum amplexantes, in primam laryngis cartilagine desinunt; nec non ceruicis <sup>e</sup> vesicæ, ac sedis musculi. Alij ex membranis musculorum tendines obuoluentibus educuntur, vt <sup>f</sup> qui quatuor manus digitos, pollicem versus adducunt, & ipsius erectionem promouent. Quidam ex ligamenti oriuntur, vt qui <sup>g</sup> primum pollicis manus articulū flectunt; & <sup>h</sup> qui pedum digitos

Ex ortu.

a tab. xv. fig. xviii.

b cad. C.

c cad. D.

d cad. E.

e t. i. d. t. iii. a. f t. iiii. g.

a t. ix. p.

b t. xvi.

c t. vi. x.

d t. xvi. f. ii.

iii. v. l.

e cad. fig. xv.

M. f. xvii. N.

f t. vii. d.

g t. vi. aa.

h t. vi. a.

*i* ta. xvi. f. xv. digitos extrorsum agunt. Alij ex alio musculo enascuntur, <sup>i</sup> qualis est, qui ex sedis musculo productus, vesicæ collū iuxta genitale amplexatur. Quidam nulla ex parte principium fortuntur, verū membranæ aliquibus partibus carnosæ redduntur, & musculi nomē accipiunt, veluti <sup>k</sup> qui anteriore colli sedem, qui faciem, <sup>l</sup> frontemq; occupant. & <sup>m</sup> qui ex rubere, carnosusq; testium inuolucro pronascitur. Præterea eo insuper differunt, quod alijs plura ossa principium porrigunt, cuius notæ sunt hi, qui motui thoracis præstant; primus <sup>n</sup> abdominis musculus; primus & <sup>o</sup> secundus brachij motus autores. Alii ex vnicō processu, vt reliqua omnis ferè musculorū series. Atq; horum alij ex vnicō processu, sola ve parte oriuntur, vt ferè sit; Alij ex pluribus, vt <sup>p</sup> primus cubitum flectens. Alij ex ossē simul & cartilagine ortū habent, vt duo <sup>q</sup> recti abdominis. Fine musculi differunt. Quidā nanque in cartilagine desinūt, vt laryngis, palpebrarū, nasiq; foraminum musculi. Quidā in cutem, vt labororū musculi. Alij in aliquam membranā terminantur, vt oculorum musculi. Alij diuersis partibus implantantur, vt quatuor genitales, qui in ipsius corpora, & in principij meatus ynnarii finiunt, musculus item testiculorum, in <sup>r</sup> vas semen à testiculis sursum deferens, insertus; <sup>s</sup> sedis musculi, in anteriorem intestini recti tunicam implantati; colli vesicæ musculus, in penis corpora iuxta ipsius meatum desinens. Ad hæc eo etiā discrepant, quod quidam ex pluribus oborti partibus, in vnam desinūt, vt qui brachiū pectori admouet, qui attollit, qui deprimit, quiq; scapularum motus auctores existunt. <sup>t</sup> Alij cōtra ex vno educi in plura inferuntur, vt <sup>u</sup> qui ex maiore scapulæ latere productus octo prioribus costis committitur, quiq; <sup>x</sup> quatuor pedis manusq; digitos extēdunt; & qui nasi alas, & qui labiū superius diducunt, in cartilagine, cutēq; desinentes perinde, atq; <sup>y</sup> diaphragma altera sede in os, altera in cartilagine terminatur. Alii à pluribus enascūtur ossibus, & in plura desinūt, vt tertius <sup>z</sup> thoracē mouentiū, qui ex posterioribus ceruicis vertebrarū processibus ortū adipiscitur, & in aliquot posteriores costas implantatur; huc quoq; omnes scapularum motores pertinent. Varia sunt musculorū officia; quidā enim ex ossē prodeunt, & illud mouent, quod ipsi adherescit, sic tres <sup>a</sup> musculi è coxendice nascuntur, & in femur cōseruntur; huiusmodi etiā sunt, qui ex femore producti in crurā finiūt, <sup>b</sup> septimus nimirū & octauus ipsius motores. Alii ab ossē quopiā educi, minimè ipsi alligatū mouent; vt omnes cruris motus coadiutores, exceptis primo & octauo, qui, vt diximus ex ossē femoris educi tibiæ, fibulæque conferuntur. ad id quoq; genus pertinent, qui ex cubiti, crurisve ossibus exorti, digitos cient. Figura etiā differunt; quandoquidem alij lacertas pedibus captas, murem ve, aut piscem æmulantur, qualis est <sup>c</sup> primus brachialis flexor; & <sup>d</sup> sex tus qui attollendo pedi opitulatur, atq; alij complures figuram hanc quodammodo referentes, etsi nullus ad eam propriè accedit, si eos exceperis, qui <sup>e</sup> pollicē, parumq; à cæteris abducunt, eam satis appositè representantes. Ab huiusmodi figura, musculi omnes nomen, vt diximus, desumpserunt, licet eorum complures eam insigniter variam natū sint; Alii siquidem triangulares existunt, vt <sup>f</sup> primus brachiū attollens. Alii quadrati, vt <sup>g</sup> tertius scapulæ, & <sup>h</sup> primus radii, quique genarum <sup>i</sup> motui primi famulantur. Sunt qui lateribus quinque efformantur, vt secundus brachij motus <sup>k</sup> auctor, & thoracem mouentiū <sup>l</sup> secundus, qui licet quadrilaterus videatur, si tamē insertionem perpendas, tot sunt latera, quot digiti, quibus implatur. Eandem met figurā adeptus est, <sup>m</sup> primi abdominis exortus; at longè plura <sup>n</sup> musculo volæ manus tendinē producenti, latera obtigerunt, alijsq; omnibus in plures tēdines desinentibus. Mira quoq; intuentibus offertur, <sup>o</sup> quarti dorsi musculi forma, cuius quidē corpus aloes radicem, tendines verò, pubem ipsius æmulantur: Perinde quoq; se habet, <sup>p</sup> vndecimus isq; longissimus dorsum mouentiū musculus. Haud secus, obseruatione digna est <sup>q</sup> Diaphragmatis figura, proximè ad Raiam piscē accessura, si bifidā is caudā gereret. Sunt & qui teretē specie præ ferant, vt sedis, vt colli vesicæ musculi. Alii in mucronem acuntur, alijq; alias exhibent formas, quibus recensendis, ne sim prolixior, superfedebō, donec eos sigillatim prosequar. Illud hoc loco sit intellexisse satis, aliorū latum esse principij, finē verò angustū; alios cōtra se habere; alios tenues esse ac longos, alios latos & breues; Alijs angustū adesse principij, alijs amplū; quof-

E. fac.

Ex manere.

Musculorum in figura discrimē.

In situ.

Fibrarum in mus-  
culis usus.Alia musculorum  
differentie.Musculorum in  
corpore discri-  
minu.

In tendinibus.

In usu.

dam peruios esse, quosdam minimè. Omnibus porrò communis ferè color est, nisi quodd vbi excarnes sunt, neruorū instar albicant; vbi carne opplètur, ipsius colorem induunt, quamuis aliquod neruoforū filamentorū, per eos repentiū, vestigiū semper appareat. Et licet ipsorum aliqui liuidi, plumbei' ve videantur, re vera tamē tales minimè sunt; sed hoc fit, quia membrana vsq; adeo crassā obtegentur, vt musculum perspicuo videri non sinat, vnde color ex albo nigroq; permixtus confurgit. A situ quoq; musculorum differentia petitur. Siquidē alij extrorsum magis consistunt, alij verò introrsum; Alij oblique in priora descendunt, alij oblique in priora similiter ascendunt; quidā recti feruntur, quidā transuersim, orbiculatim' ve contendunt. Omnes tamen eundem semper cū fibrīs ductum seruant, quæ secundū musculi longitudinē, à principio ad finem perreptāt, præter labiorū, & r. tiliij. AMN genarum musculos, quibus multiplex fibrarū genus inter se cōplicatarum obtigisse videtur. Pro harū fibrarum varietate, singuli musculi diuersos vsus obtinēt, atque ideo qui pluribus præsumt motibus, vt lingæ, labiorum, & maxillarum, plura obtinent fibrarū genera, adeo inuicē intertexta, vt summa cū difficultate distingui queant. Cæteri, quibus vnū duntaxat fibrarum genus adesse diximus, nō æquē omni ex parte collectas æqualesq; obtinēt, qui enim angusto principio, & lato fine sunt, fibras sortiuntur in medio sui corporis tenuiores magisq; sciunctas quàm in principio aut fine; quibus latum caput est, cauda verò tenuis, ij fibras in principio magis quàm in fine disinctas adipiscuntur; qui ab extremis tenuiores existunt quàm in medio, in his fibræ opposito modo se habent. Aequalibus, æquales quoque sunt fibræ. Verū musculi vnico principio, duplicique corpore præditi, duplicis quoque generis fibras sibi vendicant; operanturque ac si gemini essent musculi alius post alium, acuto capite ac rotundo tendine præditi. Aliæ insuper cōplures musculorum differentie habentur; alij enim crassi sunt, alij tenues, alij carnosī, & fibris quibusdam interfuncti. Alij neruei in ortu sunt, ac dein carnei euadunt, Alij tales sunt quoquo versus, Alij vnum, alij duos habent exortus; Hisq; ortus aut neruei ambo, aut ambo carnei sunt, aut alter nerueus, carnosus alter existit. Differunt quoque musculi corporibus; (corpus eam musculi partem appello, in qua fibræ disitæ magis cōsistunt, & caro copiosior interiecta est) interdum enim musculi corpus ad principium consistit, nonnunquā verò ad finem; Aliās in medio est, quandoque autē vniuersus musculus, corpus existit, quandoque duas in partes finditur, interdū albas quasdā nerueasq; impressiones in medio adipiscitur, quæ varia in ipso corpora ostēdunt. Variant præterea tendinibus. Alijs enim lati sunt, alijs teretes, alijs breues, alijs longi, quibusdam in multos dirempti, quibusdam non, imò ex plurimum musculorum tendinibus vnus cōsurgit. Accedit & aliud ex munere discriminē; Alii siquidem rectis, obliquis alii motibus opitulantur, alii ambos præstant huiusce modi motus. His hūc in modum vniuersim positos, operæ precium erit eorū vnumquemque figillatim prosequi, ducto à faciei musculis exordio, in quibus eum obseruabimus ordinem, vt vno in corpore inspicere omnes possint.

## De Musculis frontis. Cap. 5.

Faciei musculi  
confusi.Frons duobus  
prædita muscu-  
lis.

Ipsorum fibre.

Musculorum faciei tanta est confusio, atque implicatio, vt magnam inter Anatomēs professores controuersiam pepererit, adeo vt nec Vesalio cum Galeno, nec Realdo cum Vesalio conueniat. Realdum ipse hac in parte sequar, qui omnium rectissimè eos serunxisse mihi visus est, vti periculum multoties feci. Dico igitur fronti\* duos adesse musculos, qui ex membrana carnosa, vt diximus, enascuntur; a. t. i. A. quinimod potius partes ipsius existunt, hacque in parte membrana hæc ita cuti affigitur, vt eam plerique ipsius partem esse crediderint; at sedulò inuestiganti, facile discrimen innotescet. Horum musculorum vterlibet à suo latere à capillorum principio exoritur, & in arcum versus internum oculi angulum descendit, vbi amplo inseritur extremo, per omnem superciliorum longitudinem diffuso, & suæ vtri- que adsunt fibræ, oblique in orbem ferè à summo ad imum, versus priora repentes, quem in medio longitudinis musculi, carnosiores, quàm alibi existunt. Estque

Estque horum musculorum munus, supercilia sursum adducere, oculorumque aper-  
tioni opitulari. Duo hi musculi, eiusdem membranæ carnosæ auxilio, in media fron-  
te copulatur, vsque adeo distinctè, vt nesciam quomodo id Vesalijs oculos effugerit,  
præsertim cum id euentus quotidie commonstret, in his qui vulnus aliquod in fron-  
te acceperunt, quandoquidem si solus ipsis musculus transuersim dissectus fuerit, ne-  
queunt ab eo latere oculum diducere, alterum interim prorsus expeditum habentes.  
Quinetiam citra vulnus, id in quibusdam secundum naturam cõspicitur; quod qui-  
dem solo existente musculo, esse nequaquam possit. Ac propterea chirurgi summo-  
perè caueant oportet, ne in eorum errorem incidant, qui aliquem oculorum affe-  
ctum è medio tollere volentes, transuersas fibrarum horum musculorum sectiones  
moliuntur, efficiuntque vt oculos in posterum diducere nequeant.

La fronte cauep-  
da est transuersa  
incisio.

De Musculis Palpebrarum. Cap. 6.

Palpebrarum vtraque, tam superior quàm inferior, ex membrana efformatur cal-  
uariam obtegente, dicta vulgo Pericranio, (quæ vnum idemque cum alba siue ad-  
hærente dicta oculi tunica, corpus constituit) atque ex carnosâ mēbrana, cuti pariter  
adiuncta, licet ea minimè ratione, vt ex ambabus vnū idem confurgat. Tria hæc cor-  
pora, ad palpebrarum oras coalescunt, vbi cartilago reponitur, quam <sup>a</sup> τὰρσὺς vocari  
diximus, ex qua oculorum pili ita enascuntur, vt ex quatuor horū corporum conge-  
stione, palpebrarum corpus extruatur vnicum, ita vt ceterarū corporis partium nulla  
illi assimiletur. Per reliquam omnem palpebrarū regionem, ea in qua pili nascuntur  
excepta, membrana carnosâ cuti adhærescit, nullo interim, præter vnctuosum quen-  
dam humorē, ipsis interiecto. Carnosâ huiusmodi membranā tū in superiore, tū in-  
feriore palpebra, carnosâ quasdam fibras adipiscitur, ex quibus duo inter hæc atque al-  
bam seu adhærentem membranam, musculi educuntur, tenues, lati, & æquales, suum  
quique oculi angulum occupantes. Qui ad <sup>b</sup> maiore consistit, ex medio palpebræ infe-  
rioris enascitur, & per lachrymalem deferitur, ibique ad sui etiam lateris supercilio prin-  
cipium assumit, atque inde ad medium vsque palpebram superiorem contendit. Huius  
finis <sup>c</sup> amplius, vt reliquū ipsius omne, in dimidiâ sui lateris cartilaginē, ex qua pi-  
li oculi producuntur, inseritur. Alter <sup>d</sup> musculus, minore angulum vniuersū occupat,  
priori æqualis, à medio enim inferioris palpebræ exortus, per dictum angulū circū-  
ducitur, ad dimidium vsque superioris ipsius sedis, vbi <sup>e</sup> priori ita committitur, vt nisi  
varijs operibus, eundem tamen in finē directis, distinguerentur (secundus enim mus-  
culus externum angulum occupans, versus suum principium trahit, quæ dimidia est  
inferioris palpebræ sedes, prior itidem versus suum principium adducit, quæ reliqua  
est eiusdē palpebræ medietas) vterque vnus videretur; tanta est fibrarum similitudo,  
tam congrua ipsorum adhæsiō, & coitus. Horum musculorum munus est, superio-  
res palpebras occludere, quæ solæ homini motu ciuntur, cum inferiores immobiles  
perstent. Præter duos hosce musculos, <sup>f</sup> alium pariter sibi palpebra vendicat, suæ  
apertionis coadiutorem, de quo mox verba faciam,

Palpebra ex  
quo constituitur.

Primus palpe-  
brarum muscu-  
lus.

Secundus.

Ipso munus;

Tertius.

De Musculis Oculorum. Cap. 7.

Musculorum in oculis consistentium numerus, à Vesalio assignatus, non nihil  
mihi suspectam ipsius diligentiam reddit; imò cuiusvis potius cæterorum ani-  
mantium, quàm hominis oculos, eū pertrastasse, hinc apertè conijcio. Nam præter-  
quam quod neruum visorij in medio posterioris oculi sedis è regione pupillæ cõ-  
mitti negat, musculū præterea quendam cõminiscitur, quem totū hunc neruum cõ-  
plecti asserit; qui quidē in bobus, in veruecibus, alijsque brutis semper occurrit, in homi-  
ne nunquā mihi eū videre contigit, vt neque Realdo, quemadmodū ex eius met ore  
accepi. Propterea, quanuis interdū etiā reperiretur, (quod vt dixi, nunquā mihi hæ-  
cenus visum est) monuissē saltem debuit, eū vt plurimū non inueniri. Aliū præterea  
musculū <sup>a</sup> inter oculi motores reponit, qui mehercule nihil minus quā ipsū mouet,

Oculo quinque  
tantum adijunt  
musculi.

Anat. Val.

G ij Ex

Oculo quinque  
tantum adsumi  
musculi.  
Quatuor oculi  
musculi.

Ex membrana enim carnosa enascitur, non procul à fine musculi frontis, & in superiore palpebram definit, oculo prorsus intacto; imò attollendæ palpebræ deferuit, in quam inferitur, cum oculum diducimus, ideoque musculus is tertius erit palpebrarum, ad quas referendus venit. Oculus autem quinque duntaxat sibi musculos vendicat, ex quibus<sup>b</sup> quatuor in interna oculi orbita enascuntur, ex dura matre vi-

<sup>b</sup> cad. si. xlii. HILM.

forium neruum obuolvente principium ducentes, & in oculi medium terminantur, cum circum ambientes, singuli equaliter; atque ex simul omnibus tenuis membrana pellucens constatur, album ipsius omne obtegens, quod, oculo suam sedem tenente, conspicitur. Hi omnes musculi tenues admodum sunt, duo suprâ, duo infra positi, ad suum vnusquisque latus; cunctique angusto principio enascuntur, postea verò sensim, ac sensim ampliantur, donec ad oculi medium perueniant, qui circulus est maioris ipsius rotunditatis, ita vt eorum vnusquisque triangularem figuram ostendat. Musculi hi præterquam quòd oculo intra cranium vinculo detinendo auxiliantur, ei etiam mouendo deferuiunt, singuli versus suum principium trahentes. Atque ideo vbi eorū aliquis forsum operatur, versus illud latus oculum flectimus, sursum deorsum ve magis, prout superiorem inferiorem ve agimus; vbi duo alterius lateris operantur, rectâ oculum, versus illud latus, conuertimus; vbi simul omnes in opere sunt, si quætrahât, rectum firmumq; oculum detinemus; si alius post alium, oculum quoquo versus ducimus, citra vllam alterius musculi opem, secus quàm existimauerit Vesalius. Quintus à membrana etiâ carnosa exoritur, & in inferiori oculi sedem sese inferit; & versus suum principium trahens (vt alius quiuis musculus solet) oculum, (inquit Vesalius) sursum agit, musculus hic etsi eū, quem affert Vesalius, situm obtinet, nulla tamen ratione oculū sursum agere potest, cum in humiliorē sedem inferatur.

Ipsorum munus.

Quintus musculus.

### De Musculis Nasi. Cap. 3.

Nasi musculi  
quatuor.  
Primus & secundus.

Tertius et quartus.

Duo musculi à  
Vesalio propo-  
siti.

Am diximus ex nasi ossibus duas prodire cartilagine, ex quibus duæ insuper educuntur, Alæ nuncupatæ, nasi foramina constituentes. Scire igitur oportet cartilagine hasce siue alas à quatuor cieri musculis, quorum duæ priores, à suo vterque latere, à nasi principio iuxta lachrymalem originē sumunt, perque latera ipsius deorsum feruntur, quousque in sui lateris cartilaginem inferantur, quam nasi fenestras constituere diximus. Duo hi musculi adeo evidentes in homine occurrunt, vt quantumuis exigui tenuesque, nesciam, quomodo Vesalius latuerint. Nasus adhæc, duos alios adipiscitur musculos, quorum vterque e genere summo enascitur, & in externum foraminis nasi latus, à suo latere inferitur. Tum huiusmodi superiores duo, aliis nasi eas attollant; hi verò versus suum principium trahendo, ipsas diducant. Vesalius adhæc duos quoque alios in interna narium amplitudine musculos constituit, nullatenus à membrana carnosa seiunctos, qui duarum instar membranarum sunt, & nasi alis, vt ipse refert, occludendis inferuiunt. Sed, præterquam quod hac in parte, nihil excepta cute, ac membrana carnosa consistit, nasus musculorum ad vtrumque superioris labij latus consistentium ope occluditur, nullo interim alio ad id requisito. Itaque licet huiusmodi musculi quatuor sint, (vt Vesalius prodidit) minimè tamen ij sunt, quos ipse descripsit, vt facile vnique, paulò diligentius id inquirenti perspicuum fiet.

a. i. D. t. i. c.

b. i. H. t. i.

### De Musculis Genarum. Cap. 9.

Musculi quatuor generis moventes.  
Primus & secundus.

Genarum motores musculi quatuor sunt, quorum<sup>a</sup> primus & secundus, in suo vterque latere consistentes, tenues, nervosiq; sunt, atque insigniter lati, exordiantur enim nō iuxta mamillares ossium temporū processus, vt inquit Vesalius, ibi nanq; membrana nondum in musculū abiit, sed iuxta malarum apicem; atque inde ad scapulas vsque descendunt, & supra claviculas deducti, ad os pectoris pertingunt, ibiq; inuicem cōmittuntur, eiusdem carnosæ membranæ beneficio; & per colli mediū ad labium vsq; superius perreptant; indeq; transuerso per mediam faciem ductū supra imum rursus exterioremq; genarū musculi apicem feruntur, quem molitorem vocari

b. i. i. r.

*image  
not  
available*



Horum musculorum manus

Haud secus quoque duo alij inferiùs consistunt, vtrinque vnus, nonnihil breuiores, sed latiores, prodeuntque ex humiliori maxillæ inferioris regione, ad interna ferè maxillarium latera, ac inde in priora obliquè ascendunt, donec lato sine in medium omnes sui lateris labrum conserantur. Sunt itaque quatuor omnes lati, videnturque singuli duplici principio insigniti, ob fibrarum varietatem, quæ initio paululum se iunguntur, postea verò sensim ità committuntur, vt vbi ad labrum perueniunt, sibi ipsis inuicem incumbant, labrorum cuti còmixtæ atque implicatæ. Quatuor horum musculorum ope labra duodecim motibus aguntur, quatuor obliquis, vtrinque labrum duobus; & rectis octo, labrum vtrinque quatuor. Recti quidem fiunt, quando vociferamur, cumq; os occludimus, & cum labra intrò adigimus, vel extrorsum abducimus; licet ab internis horum musculorum fibris, motus introrsum efficiatur, extrorsum verò, ab externis. Quatuor obliqui motus, vnico duntaxat laborate musculo, altero vero cedente, celebrantur. Si enim dexter, sinistro remisso, laboret, dextram labij partem obliquo, sinistram verò pendente motu attollimus. Hac eadem ratione reliqui tres motus absoluuntur. Verùm quò validiore motu superius labrum ageretur, torusque aliquo musculo refertus euaderet, in eum illius musculi caput vnum, vtrinque inferitur, quem ex Male summitate prodire diximus, & in nasi alam sui lateris, extrinsecus recondi, nasique alis diducendis, sursum trahendis conferre.

### De Musculis Maxillæ inferioris.

Cap. I I.

Primus maxillæ inferioris musculus.

**P**Roditum antea est, in homine, cæterisque omnibus animantibus, præterquam in Crocodillo ac Psitaco, inferiorem maxillam, immota interim superiore, moueri. Nunc scire oportet, trifariâ huiusmodi motum absolui, aut sursum scilicet, quemadmodum vbi os occludimus, aus deorsum, vt quum ipsum aperimus, aut extrorsum, introrsumque ac in latera, vti cum mandimus. Motus hosce, musculi octo peragunt, qui à diuersis quos edunt, motibus (videntur enim circum vndique maxillam agere) Masseteres græcis, hoc est Molitores dicti sunt; nec solû musculos hosce hoc nomine designarunt, sed eos etiam omnes, qui quoquo modo ad mandendum còferunt; Ipse autem obscuritatis euitandæ gratia, cum duntaxat Molitorem appellabo, qui præcipuus est huiusce operis adiutor, reliquos à sedibus, quas singuli occupant, nuncupabo. Est igitur Masseter seu <sup>a</sup> Molitor, primus maxillæ huius musculus, qui iuxta lineam in malæ medio conspicuam exoritur, amplo nerueoque principio è tota inferiori ossis <sup>b</sup> iugalis fede, toto sui ductu ad aurem vsque pronato, quemadmodum vnique licet, digitis in seipso percipere. Si quis enim pollicem inter aurem ac inferiorem maxillam collocet, medium verò digitum genæ admoveat, prematque, velut in os eum adactus, inter vnum, alterumque digitum, liquidò musculum perferat, potissimum si dentes comprimat, tunc enim veluti contractus durior occurrit. Verùm aduertere oportet, quemadmodum originis musculi huius principium nerueum est, tale quoque ipsius reliquum existere, quod ab inferiori ossis iugalis sede introrsum nascitur. Pars verò ab externo eiusdem ossis iugalis latere pronata, longè carnosior est, vt reliquus quoque musculus vniuersus; ast musculus hoc enatus principio, deorsum tendit, donec posteriorem omnem inferioris maxillæ partem extrinsecus, capite partim carneo, partim nerueo comprehendens, totæ huic parti validissimè inferatur, ac potissimum tuberculis quibusdam, quæ in imo huius maxillæ consistere diximus, hacque in parte coangustatus, in apicem veluti obtusi trianguli definit; imò musculus ipse vniuersus ferè triangularis est, cuius primum latus, totum ipsius principium occupat, quæ vniuersa est ossis iugalis longitudo, secundum à malæ summitate, ad dictam vsque inferioris maxillæ asperitatem porrigitur, tertium ab aure ad finem vsque secundi protenditur, cui adiungitur angulum ita obtusum còstitues, vt aliud latus videatur. Sicque musculus is quatuor latera obtineret, tria grandia, vnum verò exiguum, in quod fibræ ipsius omnes terminantur, quæ amplo principio prodeunt, sensimque omnes inuicem veluti currus radij committuntur, donec ad ipsum perueniant, rectà semper à principio ad finem tendentes. Ex quo mirari subit

a. ii. C. t. iiii.  
Δ. r. v. D.

b. ii. B. tab.  
i. i. D.

subit nonnullos, qui ex eo statim varias in eodem musculo fibras haberi asserunt, quod varium sensuum iudicio ductum alias ab alijs seruare intueantur. Quod quidem minimè ita se habet, imò eandem omnes progressus ratione seruant, rectà scilicet à principio in finem; sed vti euenit latum esse principium, finem vero angustū, sic fit, vt quæ à medio principij nascuntur, rectà incedere, quæ verò à lateribus produnt, oblique deferri videantur. <sup>c</sup> Secundus musculus, in inferiorem mouens maxillam, à <sup>d</sup> verticis frontisque ac temporum sui lateris ossis producit, lato arcuatoque principio; primum à verticis frontisque ossis, digito altius, à temporum commissura exorditur, descenditque sensim ac sensim, crassior, atque carnosior redditus, sed angustior, <sup>e</sup> cavitatem inter iugale os & capitis ossa exculptam adimplens, à qua, ut nuper diximus, principium desumit. Ast vbi ad os iugale peruenit, impensè crassius euadit & angustus ac superiori quoque iugalis ossis sedi adnatus, ita molitoris principio committitur, vt haud mirum sit, si nonnulli ambos vnicū esse prodiderint. Vniuersum musculi huius corpus ad os vsque iugale, carneum existit, sed externa sede, ob membranam ipsam obtegētis crassitiem, liuidum apparet, præcipue ad sui principiū, & quā ossi committitur; interna verò sede, eiusdem cum carne coloris est, descenditque à commissuris pronatus, quas inibi capitis, & maxillæ ossa edere diximus, donec in breuem definat tendinem, sed præualidum, atque neruosum, adeoque latum, vt acutum inferioris maxillæ processum, in quem validissimè adigitur, totum complectatur. In hunc tendinem omnes musculi huius fibræ terminantur, ad quem instar peponis torulorum coeunt. Estque ipsius munus, maxillam contrahere, quod tanta vim molitur, quantum ij nobis demonstrant, qui grauissima pondera dentibus attolunt. Tertius <sup>f</sup> musculus maxillæ huius motor in ore delitescit, neruosum principium assumens ex tota <sup>g</sup> cavitatem inferiorū cuneiformis ossis processum, vespertilionum alis consimiliū; simulatque verò ab huiusmodi egreditur cavitare, amplius, carneus, & crassius efficitur, & eiusdem ferè cum molitore appellato figure, validissimè nāque in internam posterioremque inferioris maxillæ sedem, lato sine adigitur, vbi minus quàm alibi lata est, sinumque vti diximus obtinet, in quo musculus iste latitans, minus loci occupat. Estque ipsius ac duorum prædictorū munus, vnā cum suis alterius lateris cōiugibus, inferiorem maxillam claudere, quod potissimum duo priores præstant. Conferunt præterea, anterioribus ipsorum principijs operantibus, maxillæ anterioris ducendæ; posterioribus verò operantibus, eidem retrorsum agendæ: sicque motus ad mandendum requisitos obeunt, à temporum musculis quodammodo adiuti, prout has, illasque fibras remittunt, colliguntve. Horum insuper masseterum atque in ore delitescētiū musculorum opera, maxilla hæc in latera circumagitur, dextro enim masseter, & sinistro in ore latitante cōtractis, maxilla dextrorsum flectitur; reliquis verò alterius lateris operantibus, sinistrorsum agitur. <sup>h</sup> Superest vt de quarto musculo, suoque coniuge verba faciamus, quorum vterque à suo latere ab ossis temporum processu stylum scriptorium referente producit, neruo latiusculo loque principio; at protinus carnosius tenuesque fiunt, ac versus menti summum tendentes, sub ipsam inferuntur, ea in parte mutuò congregiētes, quæ aspera, & inæqualibus quibusdam exiguisque tuberculis prominens conspicitur. Duo hi musculi ori aperiendo deferuiunt, peculiare quid obtinentes, quod nulli præterea musculo, eo excepto, qui ossi hyoidi implantatur, obtigit, eorū enim vterque inter exortum atque intersectionem nerueus, tenuisque redditur, vbi faucibus committitur, in tendinem seu ligamentum abiens, ita vt eorum vteruis ex duobus confusus videatur; quod quidem non sine maxima prouidentia effectum est, quò scilicet loci minus occuparent, prout eius partis colli ratio postulat.

*Secundus maxilla inferioris musculus.*

*Musculi huius vsus.*

*Tertius musculus.*

*Musculorum istius maxillæ minus.*

*Quartus musculus.*

*Quarti partis nervorum maxillæ inferioris munus.*

*De Musculis Ossis Hyoidis. Cap. 12.*

**O**S Hyoides appellatum, laryngi superpositum consistere, ac linguae radices, fundamentique vice, super quod ea motu cietur, esse, antea prodidimus. Nunc scire oportet, huiusmodi os duodecim musculis exortum porrigere, quorum actio ipsam

*e. t. ii. A. t. iii. r. d. li. t. ii. a.*

*e. cad. A. li. i. t. v. G.*

*f. t. v. vi. D. g. lib. i. t. iii. h. vi. P. t. v. f. iii. H.*

*h. tab. v. HL. z. iii. O. t. vi. I.*

Primum pro-  
priorum osis  
hyoidis muscu-  
lorum par.

ipsum motu agunt, quatuor nequaquam, ideoque proprios illos, communes hosce appellabimus. Proprij quatuor vtrinque consistunt, paria quatuor cōstituentes. Horum <sup>a</sup> primus & validissimus ex eminentiori pectoris osis sede, interius nonnihil, <sup>a</sup> t.ii. F. t.iii. C. t.iii. S. & carnosio principio exoritur, reptatque super asperam arteriam, ac primam laryngis cartilaginem, pari semper magnitudine seruata, donec in <sup>b</sup> anteriorem istius <sup>b</sup> li. i. t. v. ff. vii. \* ABC.

Secundum par.

atque asperæ arteriæ <sup>c</sup> propugnaculi loco deseruiunt. Secundum par, primo opponitur; ambo enim ab inferiore maxilla sub summo mento enascuntur, deorsumque nonnihil feruntur, arctiores paulo redditi, donec anteriori osis huius sedi, iuxta duos priores implantentur, eodem prorsus cum illis modo. Horum munus est, os id

Tertium.

furfum modice in exteriora protrahere. <sup>d</sup> Tertij paris musculi impensè tenues tere- <sup>d</sup> t.ii. F. t.iii. B. t.iii. R. & lib. i. t.iii. ff. vi. i. f. t.iii. B.

Quartum.

ne in latera reuellatur, simulque ipsum nonnihil attollant, ac retrorsum contrahant. <sup>e</sup> Quarti paris musculi, vtrinque singuli occurrunt; longi ambo, cæterorummq; corporis musculorum tenuissimi. Vterque ipsorum nerueus in medio efficitur, quemadmodum de <sup>h</sup> quarto inferioris maxillæ musculo retulimus. Ambo a suo quisque latere <sup>i</sup> ex elatiore scapulæ sede, iuxta ipsius ceruicem, & processus anchoræ similis radicem, principium obtinent carnosum, quod sub secundo scapulæ osis musculo se recondit, ac dein <sup>k</sup> primum capitis musculum oblique subit, qui musculum hūc de quo agimus adeo comprimit, vt eum neruofum magis, tenuemque inibi reddat; simulatque autem ipsum euadit, musculus denuò carnosus vt prius efficitur, donec in eandem osis hyoidis regionem adigatur, in quam sese tertium par inseruerat. Hi

Priores duo ex  
communibus.

sunt osis hyoidis peculiare propriique <sup>l</sup> musculi. Communes quatuor existunt; <sup>l</sup> t.iii. e. quorum duo <sup>m</sup> ex humiliori huiusce osis regione producantur, ac primæ laryngis cartilaginis lateribus distēduntur, quousque ad humiliorem cartilaginis sedem perueniant, in quam secundum omnem latitudinem implantantur. Reliqui <sup>n</sup> duo, teretes propemodum gracilesque, ac ex toto carnosi, ex media interna istius osis sedi principium desumunt, & radici laryngis operculi conferuntur. Quatuor horum musculorum munus, in musculorum laryngis enarrationem reijciam; quandoquidem illi magis, quàm huic osi deseruiunt.

Reliquo duo.

## De Musculis linguam mouentibus. Cap. 13.

Lingua substā-  
tia que.

Lingua mollis quædam & fungosa caro efformat, eius magnitudinis, quam oris amplitudo postulat, tamque varijs fibrarum generibus refertam, ob multiplices quos obit motus, vt summo negotio inuicem distinguantur, quamuis ad radicem nonnihil distinctè occurrant. Lingua tota per mediā sui longitudinem <sup>a</sup> tenuissimæ membranæ ad linguæ crassitudinem latæ, interuentu dirimitur, vt facile in quouis homine conspiciatur; ita vt tota ex duobus <sup>b</sup> corporibus, ex membrana, ipsa dirimente; ex multis venis arterijs, ac neruis, atque ex binis omnia hæc integentibus membranarum, conformetur; quarum interior musculis omnibus communis est, altera verò pars illius existit, quæ totā oris amplitudinem succingit, atque alterius illius, quæ asperam arteriam omnem, & æsophagum intrinsecus ambit; in quam priuatim rami quidam <sup>c</sup> tertij neruorum cerebri paris conferuntur, à quibus gustatus facultatem adipiscitur. Sed ad linguæ musculorum distinctionem accedens, dico decem

Lingua ex qui-  
bus conficitur.

a ta. xv. fig. xvi. ii.

b eadem. KK. LL.

c li. vi. t. ff. ii. YY.

omnes

**d** ead. DD. omnes existere, quamvis Vesalius nomen tantummodo recenscat. Horum <sup>d</sup> priores duo crassius rectique sunt, atque aliquot locis, licet perobscurè, ac si plures duobus essent, discreti; qui ex <sup>e</sup> media superiori que ossis hyodis regione carnosum ac modicè fungosum principium desumunt, ac in priora porriguntur, donec in linguæ radicem inferantur. Horum munus est, linguam introrsum colligere. Tertius & <sup>f</sup> quartus ex binis ferè superioribus & ossiculis nascuntur, quæ ad ossis hyodis latera consistere, ac ad temporum usque processus stylo similes protendi retulimus. Et si nonnunquam ab <sup>h</sup> humilioribus ossis hyodis lateribus, quæ superioribus primæ laryngis cartilaginibus processibus colligantur, ortum desumunt, quum scilicet superiora ossis huius latera, cartilaginis ligamenti venaturæ participant, quod plerumque contingit præsertim in mulieribus. Ex vna istarum partium musculi præsentès educti, nonnihil oblique feruntur, ac deinde linguæ lateribus implantantur. Ipsorum munus est, ambo-  
bus simul trahentibus, intro linguam, modicè deorsum compellere; vno verò contracto, altero remisso, linguam in agentis latus pertrahere. <sup>1</sup> Quintus & sextus carnosius pariter sunt, & quodammodo crassius, contrarioque à duobus proximè commemoratis modo sese habent, nam ex ossis temporum <sup>2</sup> processibus stylum referentibus exorti, linguæ radici ad tertii quartique fines conferuntur. His id muneris conceditur, ut ubi simul agunt, linguam introrsum, modicè in superiora trahant; ubi autem alter tantum contrahitur, eam in alterum latus, sursum pariter impellant. <sup>3</sup> Septimus & octavus <sup>1</sup> ex interna laterum maxillæ inferioris parte, iuxta dentium molarium radicem producantur, lato & modicè nervoso principio; & sub linguam ad latera, secundum ipsius longitudinem inferuntur, sine usque adeo lato, ut à ligamento isad duum usque priorem insertionem protendatur. Horum musculorum munus est, ut ubi simul operantur, linguæ partem hiantem ore occurrentem deprimant; altero autem tantum contracto, eam in ageris latus coarctent. Nonus ac <sup>m</sup> decimus ex humiliori posteraque inferioris maxillæ <sup>n</sup> fede iuxta menti summum à tuberculis in ipso consistentibus enascuntur; indeque nonnihil ascendunt, versus fauces deducti, quousque in linguæ radicem, lato sine principio simili, adigantur. Musculi hi, ut inquit Vesalius, haud vno plures existunt, qui linguæ ad inferiorem maxillam contrahendæ deseruiunt, nunc rectà, nunc ad latera, prout hæ, vel illæ fibræ operi adhibentur: Mihi autem duo videntur, idque potius præstantes, ut linguam educant, quam intro ad maxillam cogant. Præter hosce musculos, complures fibrarum <sup>o</sup> differentias lingua, ut dicebamus, adipiscitur, quarum ope omnia motuum, quos in dies experimur, genera obit. Hæ autem fibræ omnes, linguæ <sup>p</sup> vinculo colligantur, fulciunturque; quod licet per quam tenue, ac membranosum sit, linguæ tamen præ molli flexuque facili spina est, prout ea postulabat.

Tertius et quartus.

Quintus et sextus.

Septimus & octavus.

Nonus & decimus.

Fibrarum lingue discrimina.

De Musculis Laryngem mouentibus. Cap. 14.

**L** Aringi <sup>a</sup> cartilagine tres, seu seuerius loquendo, quinque adesse diximus, quæ decem propriorum musculorum, octoque communium impulsu omnes mouentur. Propriorum, priores quatuor, bini <sup>b</sup> vtrinque consistunt, in priore ipsius parte versus latera repositi; suntque hi breues, lati, tenues, atque carnosius; vnusque alteri incumbit; ac ambo à parte secundæ cartilaginis, primæ subiacente carnosum principium desumunt, & in imam primæ cartilaginis sedem inferuntur. Ac superior fibræ adipiscitur, à primæ cartilaginis fine inchoantes, & oblique anteriora versus descendentes, donec in secundæ cartilaginis partem laryngis priora spectantem desinant. Inferior vero fibræ suas obtinet, sursum contrario ductu, oblique pariter in priora procedentes; adeo ut superiores vtrinque fibræ cum inferioribus <sup>+</sup> efformet. Munus horum musculorum est, primam cartilaginem secundæ necere, quò laryngis rimam tibiæ linguæ similè occludant. Quatuor hi muscoli hunc ferè in modo positi occurrunt; in nonnullis verò vnicus duntaxat, paulò crassior, vtrinque visitur. Ac in his, ut optimè Vesalius animaduertit, ex utroque duo musculi compariuntur, qui vtrinque singuli ex media linæ secundæ cartilaginis longitudine produ-

Priores quatuor laryngis musculi.

Musculus in iuuenibus occurrens.

cti,

Quartius, &  
Sexius.

Septimus, &  
Octavius.

Nonus ac deci-  
mus.

Quarti parvis  
musculus.

Duo musculi à  
Vesalio additi.

Priores duo com-  
munes laryngis  
musculi.

Ipsorum munus

Tertius, &  
quartus.

Et, oblique deorsum tendunt donec in inferiorem primæ cartilaginis <sup>c</sup> processum inferantur; deficientium suppletes defectui. Quatuor reliqui, vtrinque bini in to-  
 posteriore secundæ cartilaginis parte, secundum ipsius longitudinem, quæ æsopha-  
 go iungitur, consistunt. Eorum verò <sup>d</sup> duo priores, vterque à suo latere ab <sup>e</sup> infima  
 secundæ cartilaginis parte carnosè nascuntur, rectaq; sursum procedunt, lati ali-  
 quantisper redditi, donec in <sup>f</sup> tertiæ cartilaginis partem secundæ commissam ner-  
 uosè sine inferantur. Horum musculorum quilibet sinum in cartilagine secundum  
 ipsius longitudinem constituit, adeo profundum, vt adeptis musculis, cartilago  
 in medio vnus & alterius, instar dorsi promineat. Reliqui duo, istis <sup>g</sup> adhærescunt,  
 suntq; omnino carnei, ac à suo vterque latere, à secundæ cartilaginis sede produci-  
 tur, quæ primæ cartilaginis internam regionem respicit; & <sup>h</sup> inferiorem illius pro-  
 cessum principio carnosè excipit; indeq; sursum oblique protenditur, donec in to-  
 tam sui lateris cartilaginis sedem, à priori non comprehensam, inseratur. Ad qua-  
 tuor hosce musculos attinet, tertiæ cartilaginem ad laryngis latera retrorsum uer-  
 tere, & consequenter laryngis rimulam tibiæ linguæ similem diducere. Nonus  
 ac <sup>i</sup> decimus ad tertiæ cartilaginis finem, quæ larynx <sup>k</sup> æsophago, tertiæq; cartilago  
 secundæ committitur, sedem obtinent. Ac ipsorum vterque à suo latere ex tertiæ  
 cartilaginis basi producitur, quæ primæ appropinquatur, & per medium corporis seu  
 basis tertiæ, ad ipsius vsque medium ascendit, vbi duæ istius cartilaginis partes com-  
 mittantur; quam quidem in sedem, coniugi suo copulatus definit. Duo hi muscu-  
 li breues sunt, exteriusq; teretes instar pyri, <sup>l</sup> intus verò cartilaginis, cui connascun-  
 tur, figuræ respondent, suntq; in fine latiores crassioresq; quam in exortu: Ac ipso-  
 rum quidem interest, tertiæ cartilaginis corpus coarctare, binaq; ipsius latera inui-  
 cem adducere, & consequitione quadam commemoratam lingulam constringere.  
 Hi, liquidò cartilaginem hanc geminam esse, attestantur; secus enim neque ab his  
 duplicari occludi ue, neque à quatuor primam secundæ necentibus diduci posset.  
 Decem hisce musculis duos insuper alios Vesalius adiicit, tertiæ cartilaginem pri-  
 mæ compingentes, quos latos, carnososq; aliorum modo esse memorat; vtrinque  
 singulos reponi; vnà, ex media primæ cartilaginis sede, secundum totam ipsius in-  
 ternæ sedis longitudinem, educi; atque horum musculorum quemuis tria ostend-  
 ere principia, ac ratione distincta, vt triplex musculus esse videatur, alioqui ve-  
 ra vnicus, à principio oblique sursum ascendens, donec anteriori tertiæ cartilaginis  
 sedi à suo latere implantetur; tandemq; ipsius, simul cum suo coniuge munus esse,  
 tertiæ cartilaginis latera ita diducere, vt lingula in sui medio consistens, adeo clauda-  
 tur, vt aëri exitum præcludat. Duos hosce musculos, nec mihi vnquam, neque  
 Realdo videre licuit, quam tumuis id sæpe sapius, nec oscitanter simul indagantibus;  
 quinimò nullum omninò intra laryngem, carnis vestigium occurrit: atq; ideo nun-  
 quam in homine musculos huiuscemodi haberi asseram, ni prius eos intuear. Eos  
 tamen huc referre libuit, quò curiosis quibusdam explorandi campum porrigerem,  
 posset ne meam ipsorum sedulitas euincere. Ex reliquis hisce musculis omnibus,  
 quatuor laryngem aperiant, ij scilicet, qui secundam cartilaginem tertiæ commit-  
 tunt; ceteri siue sex, siue octo sint, eo claudendo seruiunt. Communes faucium mus-  
 culi, sic dicti quòd è larynge non educantur, octo sunt; quorum <sup>m</sup> priores duo ex  
 inferiori <sup>n</sup> osis hyoidis regione initium sumunt, lati & carnei, ac lateribus admo-  
 dum contigui; indeque deorsum protensi, & mutuo paululum abscedentes, singuli  
 in sui lateris humiliorem <sup>o</sup> primæ cartilaginis sedem adiguntur, sine, ipsorum prin-  
 cipij modo, lato & carnosò. Tota verò horum musculorum pars, deorsum per an-  
 terius primæ cartilaginis latus procedens, fibris quibusdam, quemadmodum muscu-  
 lus musculo ipsi committitur. Ac horum quidem musculorum interest, antero-  
 rem primam laryngis cartilaginem, ea non nihil sursum adducta, à posteriore seiun-  
 gere. Iuxta horum musculorum finem, duo <sup>p</sup> alij musculi in primam cartilaginem  
 inseruntur, æquè propemodum atque illi, lati; qui ex interna osis pectoris sede,  
 iuxta æsophagum, carneam angustamq; sumunt originem; atque inde supra laryn-  
 gem conscendunt, sensim ac sensim latiores redditi, donec iam dista primæ cartila-

ginis

c. li. li. vii.  
iii. lii. v. C.

d. x. vi. f. v.  
vii. P.  
e. li. li. vii.  
vi. vii. L.  
f. ead. P. Q. v.  
& vii. iugit.  
ad xv. decim.  
& vndecima  
g. x. vi. f. vi.  
viii. R.  
h. ead. f. vi.  
ix. T.

i. ead. f. vi. vi.  
viii. V.  
K. ead. fig.  
iii. v. H

l. ead. fig. v.  
vii. P.

m. ead. f. i.  
F. v. o  
n. ead. A.

o. ead. iux  
N.

p. ead. G. v.

ginis regioni implantentur. Ad hos pertinet, inferiores primæ cartilaginis sedes comprimere, ea deorsum prorata, simulque asperam arteriam modicè coarctare; quod nobis, quo minus vocem loquentes duplicemus auxilio est; ita ut larynx haud plus æquo dilatetur. Quintus & sextus, 9 transuersi situantur, & vnà ex posteriore 1 æsophagi regione dorsum spectante, eodem principio vtrinque singuli, secundum ipsius longitudinem nascuntur; ac inde transuersim in priora porriguntur, æsophago semper adhærentes, toto eo ductu, quo ipsum attingunt, & latiores, carnosioresque continuo redditi, donec in primæ cartilaginis latera, secundum ipsorum longitudinem inserantur. Musculus hîc id muneris conceditur, ut primæ cartilaginis latera retrorsum contrahant, eamque ita secundæ applicent, ut laryngis lingula coarctata, vocem foras protrudant. Septimus & 8 octauus, propemodum teretes, ex mediâ inferioris osis hyoidis regione principium sumunt, radicique laryngis 2 operculi conferuntur, quod *ἐπιλωτῆς* græcè dicitur, quod linguæ faucium superincumbat. In bobus hi, alijsque animalium nonnullis còspicui occurrunt; In homine haestens, etsi complures aperti, nunquam mihi sese obtulerunt; imò ipsummet operculum hanc ex seipso functionem obit, fibrarum quarundam neruorum quibus prædictum est, auxilio, satis ad eam absque alterius musculi ope, idonearum. Quod quidem efficit, ut de Vesalijs diligentia iterum dubitem; licet in opere vsque adeo prolixo, veniam mereatur, si quandoque somnus obrepserit. Ad rem igitur rediens, dico, laryngem peculiari vinculo destitui: tenuem enim tantummodo membranam obtinet, cartilaginum connexus amplectantem; at singulas vtrinque iuxta tertiam cartilaginem, glandulas adipiscitur, ipsum assiduò irrorantes.

De Musculis Brachium mouentibus. Cap. 15.

Quoniam scapulæ motores, multoque minus capitis & dorsi musculi, satis benè inspicere nequeunt, non ablatis brachij motoribus, ideo priùs de his agendū dixi, qui septem vniuersim sunt. 1 Primus ex mediâ 2 tota pectoris osis longitudine, (à suo terque latere vbi ferè contigui ambo sunt) principium desumit, atque ex ipsi confertis cartilaginibus, ac etiam ex 3 septimæ & octauæ costæ cartilaginibus, nec non ex 4 mediâ clauiculæ sede, pectoris os respiciente. Pars è clauiculaeducta, carnosior est, quæ à pectoris osse procedit, neruosior atque tenuior; quæ à cartilaginibus pectoris osi implantatis, omnino carnea; quæ verò à septimæ & octauæ costæ cartilaginibus, iuxta mucronatam cartilaginem nascitur, tenuis aliquousque, atque neruosa occurrit. Ab hisce principijs, musculus is, multò carnosior & crassior efficitur, sed tantisper angustatur, donec 5 amplo, forti, neruoso, & breui tendine, subtuicem capitis scæmoris implantetur in interiorè ipsius regione, nonnihil in priora, secundum ipsius longitudinem. Musculi huius fibræ haud eadem omnes occurrunt, principio scilicet admodum lato, sine verò insigniter angusto existente. Quo quidè efficitur, ut quæ à parte principij clauiculæ proxima exoriuntur, deorsum procedat, quæ autem ex septimæ, atque octauæ costæ cartilaginibus emanant, sursum ita ferantur, ut inuicè occurrantes, superæ inferis supergrediantur, & vnà cum illis 6 efformentur, quæ à pectoris osse prodocuntur, citra ascensum, descensum ve rectà transuersæ procedunt. Verum quia eundem omnes ductum seruant, à principio scilicet ad finem, nunquam diuersa fibrarum genera esse dixerim, imò vnus vice habeo. Diuersa cui sic lubet, appeller, dummodo ipsorum progressum intelligat. Posset & geminum musculum dicere, fibrarum quas obtinet differetia spectata. Musculi huius interest, brachium pectori adducere, nulla interim alterius musculi ope accedente, trium namque is vicem subit, ob tria quibus donatur principia. Vbi fibræ à clauicula prodeuntes operantur, ipsum magis sursum adducunt; vbi verò ex cartilaginibus septimæ & octauæ costæ, procedentes fibræ in opere sunt, ipsum deorsum agunt; fin quæ à pectoris osse principij sumunt còtendantur, rectà versus pectus trahitur, cum superiores vnà cū inferioribus laborant, brachiū erectū continent, còmuni omnium vi, qua fibræ omnes versus principij trahunt. Musculus hic anteriorè sede totus in finè vsque carnosus

g. xvi. fi. i. ii.  
iii. iiii. v. l.  
r. cad. fi. ii. iii.  
v. H.

Quintus et sextus.

Ipsorum muneris.

s. cad. fi. v. vi.  
l.  
r. cad. fi. ii. iii.  
iii. v. l.

Septimus, et octauus.

a. t. i. ii. iii. a.  
t. vi. l.  
b. ca. i. a. Kad  
R.  
c. cad. a. R. ad  
S.  
d. cad. ab R.  
ad L.

Primus brachij musculus.

e. t. i. iiii. Q.

Ipsius muneris.

f. t. iiii. Q.



carnatus existit, posteriore verò liuescit, neruofusq; antequam definat efficitur: Ac  
 quinque in æqualibus lateribus vniuersus efformatur, quorū § primum à media cla-  
 uicula ad elatiorem vsque ossis pectoris sedem protenditur; secundum, h os vniuer-  
 sum occupat; tertium i ex mucronatæ cartilaginis summitate, in eam vsque cui im-  
 plantatur sedem porrigitur, quod quidem latus anteriore vallis axillarum margi-  
 nem constituit, quartum secundum capitis musculi longitudinem perducitur, quin-  
 tum k à summa ad dimidiam vsque clauiculam extenditur. Secundus brachium mo-  
 uens l musculus admodum quoque carnosus est, multisq; præditus exordijs, licet ita  
 continuatis, vt vnicus musculus ex multis efformatus videatur, proditque ex medio  
 clauiculæ secundum ipsius longitudinem, versus humerum, non procul à prædicto,  
 atque ex scapulæ processu, qui humeri summum dicitur, vbi clauiculæ committitur,  
 necnon ex vniuersa scapulæ spina, principio nerueo, quod protinus carnosum, cras-  
 sum, præminensq; redditur, ac eundem in modum tantisper instar trianguli m coan-  
 gustatur, donec in n humeri os secundum ipsius longitudinem, oblique nonnihil ab  
 antica in posticam regionem, longe infra ipsius ceruicem, per quam valido tendine  
 inseratur, ex carne neruoque mixto, interius tamen quàm exterius neruofiore. Mus-  
 culus is Δ græcorum literæ imaginem æmuletur, vnde ipsum δελτοειδής nuncupa-  
 rant, Alij, ερωμίδα, quasi rem humero incumbentem dicas appellarunt, quod hu-  
 meri articulum complectatur, obtegetque. Ipse verò brachium attolentem, vel se-  
 cundum brachij motorem semper vocabo. Musculi huius latera tria sunt, quorum  
 o primum à media clauicula ad summum vsque humerum, & hinc per scapulæ spi-  
 nam, ad eius vsque basim protenditur. P secundum ex eadem clauicula deorsum ad  
 internum musculi huius insertionis latus cõtendit, cuius quidem lateris medio mus-  
 culus is primo committitur. q Tertium oblique, nonnihil in priora, e scapulæ basi,  
 vbi scapulæ huius spina educitur, ad externum capitis huiusce musculi latus progre-  
 ditur. Horum laterum primum maius est, reliqua duo minora. Præsentis autem mus-  
 culi fibræ, vt & prioris, pro sui principij ratione variant: Nam quæ à scapulæ spina de-  
 pendent, oblique in priora feruntur, quæ ab humeri summo enascuntur, rectà deor-  
 sum contendunt, quæ à clauicula prodeunt, oblique in posteriora porriguntur. vbi  
 verò ad musculi finem perueniunt, haud sese, prioris fibrarum more, interfecant, sed  
 paululum impleantur. Munus huiusce musculi est, brachium varias in partes attolle-  
 re, pro fibrarum, quas obtinet, varietate. Vbi nanque fibræ à clauicula prodeunt la-  
 borant, ipsum versus colli anteriora, & faciem attollunt, Vbi ex summo humero, &  
 clauicula ipsi adhærente nascentes operantur, rectà ipsum attollunt, sin verò quæ à  
 scapulæ spina emanant, contrahantur, ad posteriora brachium assurgit. Aduertere au-  
 tem oportet, principia hæc non ex tota prædictorum ossium amplitudine, sed ab emi-  
 nentibus eorum partibus, instar crassiusculæ lineæ pronasci. Tertius r musculus car-  
 nosus crassiusque occurrit, & præ ceteris huiusce articuli musculis, quodammodo te-  
 res, proditq; carnosus à scapulæ s basim sine, partimque etiam ex ipsa basi, licet maio-  
 rem sui exortus portionem ab anteriori latere desumat, cui dimidio tenus adhæret.  
 Ac deinde à scapula statim abscedens, sursum in priora tantisper fertur, quousque ad  
 humerum pertingat, cui valido breuique tendine implantatur, eodem prorsus mo-  
 do, quo primum inferi diximus, adeoque ipsi propinquus, licet paulo magis retror-  
 sum, vt spatium maius non intercedat, quàm quod t tendini quarti brachij musculi  
 excipiendo sit satis, quamuis interdum ossis humeri capiti nonnihil priore vicini-  
 us inseratur. Munus huic musculo conceditur, brachium ad scapulas adducendi, pri-  
 ori oppositè, qui pectori ipsum admouet. Quartus u musculus ab apicibus posteriorū  
 processuum dorsi vertebrarum, à x sexta scapularum vertebra ad sacri vsque ossis di-  
 midium, recto principio, ac membranæ instar tenui exoritur, & oblique sursum ab  
 vtriusque principij capitibus super musculos thoracem mouentes procedit, donec ad  
 costarum regionem retrorsum magis prominentem pertingat, ibique carnosus cras-  
 susq; redditur, ac deinde sensim ac sensim angustatus procedit, & externum axillæ ca-  
 uitatis latus constituens, subtus ossis humeri ceruicem, secundum ipsius longitudinē  
 in medio tendinum z primi a tertijq; musculi, valido, lato, ac breui sine, sese inserit.

Secundus bra-  
chium mouentis  
musculus.

Secundus huius  
musculi figura.

Ipsiū manus.

Tertius muscu-  
lus.

Ipsiū muscu-  
lus.

Quartus muscu-  
lus.

ti. ab L a d  
K.  
h à K. ad R.  
i ab R ad Q.

x à Q ad L.

l t.p. t.ii. M.  
t.iii. K. t.iii.  
z t.v. y. t. ix.  
l. x. a. t. xi. fi.  
ii.

m t. xi. fi. ii. D  
n t. xi. P

o t. xi. fi. ii. ab  
A. ad C. Cran-  
seundo per B.  
p ead. ab A.  
ad D  
q ead. a C ad  
D

r t. xii. S. t.  
vii. M. t. viii.  
K. t. ix. N. t.  
x. xii. R. t. xi.  
L.  
f t. xi. T. f. i.  
t. vi. fi. iii. Y.

t t. vii. O.

u t. ii. r. t. ix.  
o. t. x. xi. o.  
x t. x. a. T. ad  
S.  
y t. ii. l. m. v. q  
f. u. N.

z t. iii. Q.  
a t. vii. M.  
ita

ita vt musculus tribus inæqualibus conformetur lateribus; quorum longissimum illud est, quod obliquè ab ossè sacro in priora per apices notharum costarum, in eam vsque sedem, in quam desinere diximus sursum confcendit; post id, quod per dorsi longitudinem ab ossè sacro ad sextam vsque scapularum vertebram porrigitur: tertium minimumque illud est, quod à posteriore sextæ scapularum vertebræ processu abscedit, & super humiliorem scapulæ apicem progreditur, obliquè pariter sursum ad caput contendens. <sup>b</sup> Musculi huius fibræ inuicem variant; nam quæ ab ossè sacro confcendunt, rectiores prolixioresque sunt; reliquæ deinceps breuiores sunt, & transuersum magis procedunt, quò sublimiùs emanant. Hæc autem fibrarum differentia tum in hoc, tum in cæteris musculis, ex principij latitudine dependet. Musculus is eo munere perfungitur, vt brachium deorsum nonnihil in posteriora trahat, magis minusve, prout superiores, inferioresve fibræ laborant. <sup>c</sup> Quintus brachij motus opifex musculus, impensè carnosus occurrit; & à scapulæ basi procedens, <sup>d</sup> sinum omnem adimplet, qui inter superius scapulæ latus, & ipsius spinam consistit, qua in parte ita ossi committitur, ac si ab eo vniuerso nasceretur. Ast vbi ad elatiorem scapulæ huius cervicis regionem pertingit, in priora, sub <sup>e</sup> validissimo ligamento, scapulæ huius processum anchoræ similem summo humero colligante præcepit; ac in admodum latum, validumque tendinem, articuli huius ligamento transuersim insertum, desinit. Musculus hic oblongus est, superius gibbus, inferius vero sinui, quem implet similis; & fibris secundum sui longitudinem exporrectis præditus; estque id sui muneris vt brachium retrorsum agat, eo paululum sublatum. Sextus <sup>f</sup> musculus perquam carnosus est, ac internam scapulæ huius regionem costas respicientem occupat; & ex eius <sup>g</sup> basi principium sumens, tantisper angustatur, dum ad interiorem articuli huius sedem perueniat, in quam <sup>h</sup> lato tendine velut in semicirculum inferitur. Musculus is admodum figura responder, scapulæ; supernumque ipsius latus quinto musculo ita cohæret, vt vnicus vterque videatur, scapulam abtrorsum trahens; at si diligenter attenderis, fecus est, imò musculus hic brachij deflexionis in posteriora adiutor existit, antrosum nonnihil ipsum reflectens. <sup>i</sup> Postremus brachij motus auctor musculus, externum omnem scapulæ regionem infra spinam occupat, omnino carnosus; & ab ipsius <sup>k</sup> basi enascitur, deinde arctior pro scapulæ forma efficitur, donec extrinsecus in articuli huius ligamentum, <sup>l</sup> lato, breuique tendine, ac velut in semicirculum inferatur, adeo vt postremorum trium musculorum capita, articulum hunc circum vndique amplexari videantur. Estque musculi huius officium, brachium nonnihil retrorsum torquere; trium autem omnium interest ipsum quoquo versum agere,

*Ipsi musculus.*

*Quintus musculus.*

*Ipsi musculus, Sextus musculus.*

*Ipsi officium, Septimus musculus.*

*Ipsi musculus.*

De ligamentis Humerum scapulis committentibus. Cap. 16.

**H**umeri os scapulis tria validissima ligamenta colligant, præter commune vinculum, articulos omnes instar tenuis membranæ ambiens. Quod in hoc articulo velut in orbem à supercilijis cervicis scapulæ huius, exoritur, ac totum articulum ambiens, in radicem interni capitis humeri primùm inferitur, postea in externum latus vniuersum, tandemq; in dicti ossis cervicem adigitur. Ex tribus hisce vinculis priora duo instar nervorum teretia sunt, tertium verò latiusculum, <sup>a</sup> omnium <sup>a</sup> primum ex apice interioris scapulæ <sup>b</sup> processu enascitur, & <sup>c</sup> internis anterioribusque capitis humeri partibus implantatur, ipsumque complectens, <sup>d</sup> impressioni seu sinui quem in hoc capite exculpi diximus, validissimè adhærescit. <sup>e</sup> Secundum vinculum multo crassius atque validius, <sup>f</sup> ex elatiore scapulæ cervicis sede, vbi summo humero submittitur, principium assumit; & in <sup>g</sup> omnem exteriorè maioris tuberculi capitis humeri regionem inferitur, iuxta sinum, quo <sup>h</sup> externum primi cubiti flexionis <sup>i</sup> musculi caput trāsmittitur. Anterius autè ligamenti huius latus, posteriori primi ligamētī connascitur lateri, ac simul vtraq; transuersum efformant ligamentū, quod dicti huius musculi caput amplectitur. Tertium <sup>k</sup> ligamentum ex eadē quæ primum exortum regione deducitur, indeque obliquè tantisper procedit, dum in externum

*Commune articuli huius ligamentum.*

*Primum humeruli ligamentum.*

*Secundum.*

*Tertium.*

Quartum ossis  
humeri principium.

omne capitis humeri tuberculum implantetur, posteriorem articuli huius regionem ambiens, finis enim ipsius haud minorem exortu latitudinem obtinet. Præter hæc tria ligamenta, quæ potissimum humeri os, ne deorsum extrorsumve luxetur, continent, <sup>1</sup> aliud insuper adest, quod ab interiori scapulæ processu eductum, in elatioris eiusdem scapulæ processus apicem, intacto humeri osse inferitur; & ne humerus eam in partem labatur, prohibet. Cui etiam suppetias fert, neruosum primi cubitum flectentis musculi principium, quod uti dicemus, ab elatiori scapulæ cervicis regione natum, inter hæc ligamenta deferitur, per impressionem in humeri capite consistentem, deorsum, cubitum versus procedens, <sup>l. t. v. c. inter a & b.</sup>

### De Musculis scapulas mouentibus. Cap. 17.

Primus scapulæ  
musculus.

Scapula ipsidem quibus & brachium motibus cietur, præterquam quod quoquo Suerum minimè agitur: motus autem ipsius omnes musculi quatuor absoluunt. Quorum <sup>a</sup> primus à secunda, tertia, quarta & quinta, sextaque interdum costa, a t. v. r. priusquam in cartilagine abeant, exoritur, lato <sup>b</sup> principio, ac in plures veluti vngues digitosve dirempit, quorum vnusquisque costæ suæ affigitur. & inde retrorsum tendit, angustior semper redditus, & crassior, donec in latum <sup>c</sup> tendit, ead. l. nem partim nerueum, partimque carneum desinat, quod interiori sedi scapulæ huius processus, anchoræ similis implantatur. Ibi autem neruosior efficitur, unde (ab istius processus appendice) <sup>d</sup> nerueum principium internæ partis musculi, cui primum inter cubiti flexores locum assignabimus, educitur. Musculus is totus carneus est, præterquam sui initio, suasque fibras obtinet, quæ à principio ad finem nusquam intersectæ feruntur. Atque id ei muneris concreditum est, ut scapulam pectori adducat, sursum deorsumve, prout fibræ superiores inferioresve operantur; rectâ verò, vbi fibræ simul omnes in opere sunt. Secundus <sup>e</sup> musculus ex ea linea educitur, quam occipitij os transuersam obtinere diximus, ab ipsius medio ad aurem vsque porrectam; externum cuius latus, ab auris pinna æquè distat, atque ab occipitij sinu: itaque si occipitij ossis regionem ab ipsius sinu ad aurem vsque porrectam in duas æquales portiones diuidas, conspicuum fiet, musculi huius principium dimidium illud versus fossiculum occupare, & in ipsius medio coniungi suo copulatum, vtrunque per posteriorum dorsi processuum apices, ad octauam vsque scapularum vertebram descendere. Vnicuique horum musculorum quatuor adsunt latera; quorum vnum transuersim secundum occiput fertur, æqualis cum sui principio latitudinis, quod licet tenuè, carnosum tamen existit; Alterum <sup>f</sup> per medios apices posteriorum cervicis vertebrarum processuum, ad octauam vsque scapularum vertebram deorsum tendit. Tertium <sup>g</sup> à fine primi iuxta occipitij sinum, exoritur, & obliquè versus posteriora tantisper descendit, dum ad apicem posterioris octauæ scapularum vertebræ processus perueniat, qua in parte neruosus paululum redditus, coniungi suo committitur, amboque apicem monachorum cucullæ similem constituunt; imò duo hi simul musculi dictæ cucullæ similes admodum existunt; ac eorum uterque iuxta insertionem, inter nerueum carnosumque mediat. <sup>h</sup> Quartum à scapulæ ceruice, iuxta clauiculam ad octauam vsque thoracis vertebram protenditur, modicè arcuatum & membranæ instar tenue; quod quidem ideo effectum est, quo minùs pondere grauaret, & consequenter impedimenti minùs incommodique musculis afferret, externam scapularum regionem occupantibus, quos supergreditur. Duo hi musculi carnosissimi vsquequaue occurrunt, nisi qua dorsi apicibus committuntur, suntque vniuersi tenues, si eam duntaxat sedem exceperis, quæ humeri summo, & latiori clauiculæ sedi validissimè implantatur. <sup>i</sup> Fibræ musculi huius non eundem omnes ductum seruant, tanta est principij latitudo; imò quæ ab occipitio & ceruice manant, obliquè ad humeros descendunt, donec ad scapulæ spinam, ad humeri summum, & ad clauiculæ caput perueniant, eo magis transuersæ quo humiliorè exortum

Ipsius munus.

Secundus musculus.

Primum horum  
musculorum laterus.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Secundi musculi fibræ.

t. ix. tab. ii.  
l. K. tab. iii.  
G. iiii. b.

f. t. ix. ab l. ad  
G. trāscundo  
per K.  
g. ead. ab l.  
ad H. transcūdo per r.

h. ead. ab H.  
ad G.

i. t. ix. a.

tum nāciscuntur, idque ad ceruicis vsque radicem, qua in parte, æquē transuersim situantur. Quæ autem à scapularum vertebra enascuntur, obliquē itidem ad humeros ascendunt, eo magis transuersæ, quò altius ad ceruicem feruntur, donec æquē ac postremæ, quas per ceruicem descendere diximus, transuersum situm acquirant. Fibræ huiusmodi vniuscuiusque musculi officium esse commonstrant, non modo scapulam sursum adducere, sed deorsum etiam & ad dorsum velere, pro ipsorum differentijs; adeo vt motus obeant contrarios, nullam interim partitionis notam præ se ferentes, ex qua plures esse duobus colligere possumus. Si quis tamen quatuor esse contenderet, quemadmodum de superiorum palpebrarum musculis prodidimus, functionum duntaxat pugnantia ductus, haud mihi, longè aberrare videretur, tuncque ipsorum <sup>k</sup> diuisio à summo humero ad primam thoracis vertebra haberetur. <sup>l</sup> Tertius scapulam mouens musculus ex transuerso primæ, tertiæ, quartæ, & quintæ vertebrarum ceruicis processu ita nascitur, vt duobus principijs secunda vertebra seiunctis, præditus esse videatur; quamuis interdum etiam, ex transuerso secunda vertebra processu exortus sui portionem assumat. Principia hæc simulatque ex reliquis vertebra ceruicis amplexantibus musculis emergunt, vnā coeunt, & tenuem ualidumque musculum efformant, latiore paulò, minusque crassum; qui lato & carnosio fine, in internam superioris anguli scapulæ basis sedem inseritur, eamque sursum versus anteriora, & ceruicis latera trahit. <sup>m</sup> Quartus musculus, latus tenuisque, ac omni ex parte carneus existit, & ex quinta, sexta, & septima ceruicis vertebra, nec non ex posterioribus trium priorum thoracis vertebrarum processibus nascitur, & <sup>n</sup> toti propemodum scapulæ basi carneus, ac æquē atque in exortu latus, implantatur, fibras obtinens, obliquē à thoracis vertebra ad scapulæ vsque basim porrectas. Musculus is illi proximè assidet, quem monachorum cucullæ similem esse diximus; & detracta cute, in scapulis, ad inferiora prædicti musculi latera, humiliores musculi huius, sui que coniugis apices sese offerunt; Quorum munus est, scapulam in posteriora, nonnihil sursum attrahere,

Munus.

Tertius musculus.

Ipsi munus. Quartus musculus.

*De Musculis Caput mouentibus. Cap. 18.*

**A**gentes de prima & secunda ceruicis vertebra, Caput per se solum, & ad ceruicis motum agi diximus; proprio quidem motu antrosum, retrorsumque agitur; motu autem ceruicis, ad latera cietur, vt cuius in seipso experiri licet. Ambos hosce motus musculi plures absoluant; quos nunc aggredimur, ab his inchoantes, qui priuatis capitis motibus præfunt, qui quatuordecim sunt, vtrinque septeni. Primus & <sup>a</sup> secundus vtrinque singuli ex apicibus posteriorum processuum quintæ, quartæ, tertiæ, ac primæ thoracis vertebrarum longo principio erumpunt, quod simulatque à quinta vertebra emergit, acutum efficitur, sensimque ac sensim ita diffusum progreditur, vt ad tertiam <sup>b</sup> secundamque thoracis vertebra porrectum, ad lateralium harum vertebrarum processuum latitudinem accedat; hancque eandem latitudinem seruans ascendit, ex posterioribus postremarum quinque colli vertebrarum apicibus, leuem exortum assuens. Simulatque autem tertiam vertebra excedunt, sensim ac sensim vtri que inuicem abscedunt, donec occipitis ossi ambo implantentur, sine <sup>c</sup> transuerso ac lato, quantæ spatij inter externum alterius horum musculorum latus, & aurem, latitudo, quantaque inter internum eius latus, & occipiti sinum: adeo vt tanta sit insertio nis vtriusque musculi amplitudo, quantum inter vtranque aurem spatij relinquunt; estque ipsorum recessus forma <sup>d</sup> triangularis. Haud secus ambo hi musculi eandem quodammodo <sup>e</sup> figuram æmulantur, etsi latera insigniter inæqualia sunt: primū nanque prægrande visitur, & per dorsi medium procedit; secundum primo æquale, per latus externum fertur; Tertium perquam exiguum occurrit, estque transuersum illud caput, quo in occiput inseruntur. Fibræ horum musculorum obliquē sursum perreptant, ab apicibus posteriorum processuum,

Primus & secundus capitis musculi.

Anat. Val.

H ij inferio-

Secundū caput  
monentium mu-  
sculorum par.

inferiorum vertebrarum inchoantes, & ad transuersos superiorum vertebrarum processus feruntur, dum simul omnes in occipitium desinant; transuersis enim processibus modicè admodum, vel nihil omnino affiguntur. Tertius & <sup>f</sup> quartus musculi acuto principio ex medio lateralium quartæ, ac quintæ thoracis vertebræ processuum emanant, carnosum obtinentes exortum & lacertam imagine referentem. Ast ubi ad <sup>g</sup> cervicis initium pertingunt, ambo in teretem abeunt tendinem; postea verò carnosè exemplo redeunt, donec in occipitis medium adigantur. tenuous in medio redditī, perinde atque <sup>h</sup> musculum inferioris maxillæ motorem effici tradidimus. Vtrique horum musculorum ante insertionem alius adiungitur, qui ex posteriore septimæ colli vertebræ processu, nerueo teretique principio deductus, carnosus in ascensu efficitur, & simul cum prædicto in occipitis medium inseritur, dextris sinistrisque lateribus, in fine inuicem <sup>i</sup> coeuntibus. Hac quoque in parte duo præterea musculi, <sup>k</sup> vtrinque singuli occurrunt, qui ex apicibus lateralium secundæ, ac primæ thoracis vertebræ processuum partim carnei, partim neruei erumpunt, sursumque nonnihil in priora, carnosiores, latioresque redditī porriguntur, dum radici mammillaris ossis temporum processus implantantur. <sup>l</sup> Musculis hisce ingens carnea moles vtrinque subiacet, quæ à lateralibus colli vertebrarum processibus enata, obliquè sursum ad posteriores processus tendit, donec occipitis ossi conscratur; quæ quidem caro fibras adipiscitur, obliquè ab exterioribus introrsum ascendentes. Quatuor hi musculi omnes conspicuo seiuncti visuntur, portio tamen secundi paris videntur, quòd eandem obeant functionem, caput nimirum & ceruicem quodammodo attollendi: Vbi nanque lateris vtriufque musculi vnà contrahuntur, capiti rectà extrorsum flectendo auxiliantur; sin-

f t. x. xi. Bra.  
xii. FF. t. xiii.  
A. t. v. r.

g t. xiii. A.

h t. v. H. I.

Alius muscu-  
lus.

i t. xiii. à C  
ad D.  
k t. xiii. FF.

Duo ali.

Caro musculis  
hijce subiecta.

l t. xiii. GG.

Tertium capitis  
musculorum par.

m t. xiii. AB  
n t. xiii. ff. ii.  
E.

Quartum.

o ead. FG.

Quintum.

p l. i. t. a. v. ff.  
vi. M.

Sextum.

q t. xiii. H. L.

r ead. D.

s ead. KL.

t ead. iuxta E.

u t. xiii. AH  
K. B. L. I.

Septimum manus.

Septimum capi-  
tis musculorum  
par.

x t. iii. F. t. v.  
l. t. iii. O. L. V.  
K.

enu.

y t.iii.x.  
z cad.y.

enumerandi nobis supersunt, qui duo duntaxat sunt, & vtrique <sup>y</sup> singuli à media superiore ossis pectoris sede, nec non ab <sup>z</sup> ea clauiculæ regione, quæ huic eidem ossi, lato, & neruoso ex ortu prodeunt; etsi verò longè neruosior principij huiusce pars existit, quæ à pectoris osse, quàm quæ à clauicula sumit originem; non ideo tamen continuum esse definit, principium vniuersum, & quorsum oblique procedente, latior paulò quàm crassius educitur musculus, qui carnosus, & crasso sine, in mammillarem sui lateris, temporis ossis processum infertur, quem vndique amplexatur. Verùm aduertere oportet, inter partem à clauicula productam, & eam quæ ab osse pectoris emanat, <sup>a</sup> sinulum instar trianguli exculpi, citra cutis detractionem in quouis homine conspicuum; imò verò is principium alterum ab altero seducere videtur <sup>b</sup> adusque musculi ferè dimidium, quæ ex vtroque principio corpus assurgit, in eum quem diximus modum definens. Principia hæc siue duo, siue vnum sint, parum omnino interest, quemadmodum etiam & illud, leue est, an ex hisce musculis vnusquisque in plures vno partiatur, vt multi existimant. Sat est intelligere, qualis eorum structura sit, quale munus, contrarium scilicet octo primorum muneris, caput retrorsum trahentiū. Et propterea ambobus vnà contractis, caput demittitur, quemadmodum vbi annuimus, siue rigida, siue inclinata ceruice; altero autem duntaxat laborante, ad trahentis latus inclinamus; vbi verò vicissim nunc hic, nunc ille trahit, caput circumagitur, vti cum renuimus, multò euidentius, quàm in vilo ex prædictis. <sup>c</sup> Musculis hisce quatuordecim, alii pariter accedunt, sub æsophago delitescentes, qui ex corporibus priorum quatuor thoracis vertebrarum, omniumque ceruicis exoriuntur, quibus in transitu inniuntur, ac deinde occipitis ossi iuxta <sup>d</sup> anteriorem nuçæ foraminis regionem subobscurè implantantur. Verùm de hisce musculis copiosius, de dorso motoribus agentes, verba faciemus; elatiorem namque ipsius regionem, immoto prorsus capite inflectunt. <sup>e</sup> Quatuor insuper habentur musculorum paria, vtrique bina, ad verticis latera consuetia, quorum etiam tractationem in caput reicio, verticis motoribus dedicandum, quod sit illud præcipuum ipsorum munus,

Horum musculorum munus.

Musculi duo ceruicis flexores.

Quatuor alij.

De Vinculis Capitis, & priorum duarum Ceruicis Vertebrarum. Cap. 19.

Diximus superiore libro, Caput primæ ceruicis vertebræ, & hanc secundæ, & secundam rursus capiti committi. Superest vt de vinculis ossa huiusmodi colligantibus agamus. <sup>a</sup> Quorum primum perquam validum est, & articulum am-  
bit vniuersum, inter primam ceruicis vertebram & caput, nihil præterea peculiare obtinens. <sup>b</sup> Secundum, caput secundæ vertebræ deuincit, estque teres, perquam validum & cartilaginis naturæ compos; ex dentis <sup>c</sup> apice, quo secundam hanc vertebram insigniri diximus, deductum, & occipitis ossi, iuxta foraminis nuçæ <sup>d</sup> anteriora confertum. Ligamentum hoc præterquam quod secundam colli vertebram, occipitis ossi alligat, prædicti dentis ope adiutum, veluti axem pariter efformat, super quem caput circumagitur. <sup>e</sup> Tertium illud est, quod primæ ceruicis vertebræ ab vno in alterum latus transuersim obtendi, & posteriorem dentis secundæ vertebræ regionem amplexari diximus; insigniter quidem validum, neruosum, & cartilaginis naturæ particeps; inter spinalem medullam & secundæ vertebræ dentem repositum: estque sui muneris, dentem hunc fortiter continere, in vehementioribus ad posteriora capitis motibus; ne scilicet luxetur, & spinali medullæ officiat, quod absque insigni noxa nequaquam contingeret. Quartum <sup>f</sup> secundam colli vertebram primæ colligat, membranæ instar tenue, communemque cum cæteris cuiuscunque articuli ligamentis naturam, commune munus adeptum.

Ligamentum quo prima colli vertebra caput alligatur.

Secundum ligamentum.

Tertium.

Quartum.



**E**ti muscutorum capitis tractationi, minimè satisappositè abdominis musculo-  
rum explicatio subnectitur, sic tamen ipse progrediar, vt à Vesàlio quò minùs  
potero recedam; & si cui molestiam istud afferet, capita eo, qui magis arriserit, ordi-  
ne percurrat; quandoquidem id citra graue negotium licet, paginis aliquot transa-  
ctis . Musculi ergo Abdominis octo vniuersim sunt, quatuor paria constituentes .

Primum abdo-  
minis musculo-  
rum par .

Quorum <sup>a</sup> primus omnibus incumbit, proditq; carnofo exortu ex <sup>b</sup> sexta, septima, <sup>a</sup> c. i. e. t. iiii.  
octaua & nona costis, priusquam in cartilaginem abeant, iuxta <sup>c</sup> secundum, moto- <sup>O</sup> t. ix. P.  
rem thoracis musculum, cui pectinatim inferitur; ille siquidem quosdam veluti vn <sup>b</sup> t. ii. iii. pp  
gues digitos ve porrigit, hic verò media vnguium interualla occupat; post nonam <sup>c</sup> t. i. s. 6. 7. 8.  
autem costam, eisi eodem modo à reliquis costis enascitur, prædicto tamen musculo <sup>t. ii. iii. ooo.</sup>  
haud mutuo ingressu committitur, sed illi duntaxat, cui quintum inter thoracis mo- <sup>d</sup> t. xi. a.  
tores locum assignabimus. Principiū id, tenue carnosumque est, atq; inde in priora <sup>e</sup> t. i. ab R ad  
deorsum fertur, sensim ac sensim crassius euadens, & posterioribus lumborum <sup>f</sup> t. i. t. i. ii.  
<sup>e</sup> membranea tenuitate in abdominis medio coeuntes, spatium omne inter costas & <sup>iii. a. 2. 13. 14.</sup>  
os ilium, descendentes obtegunt, dum neruo extremo, in <sup>g</sup> t. i. e.  
totam Appendicem in- <sup>h</sup> t. viii. ea.  
ferantur, quæ ossium coxæ dicis elatiorem sedem occupat, spina latinis dicta. Estque  
illud animaduertendum, carnosam horum muscutorum partem posteriùs exortam  
ad <sup>g</sup> rectum duntaxat sui lateris musculum peruenire, ibiq; in tenuem, neruosamq;  
membranam conuerti, quæ membranas supergreditur, quibus secundum par præ-  
ditum esse dicemus, in eam vsque sedem, in qua eos inuicem committi diximus; &  
in elatiore Ilium & Pubis ossium regiones totas inferitur, præter eam quam <sup>b</sup> sex-  
tus, & septimus semur flectentes musculi progredientes integunt . Musculi hi fibras  
suas obliquè in priora, eodem cum ipsis modo, porrectas obtinent, ideoque obliqui  
descendentes dicti sunt . <sup>i</sup> t. iiii. . t. v.  
<sup>at</sup> x. i. a. b.

Secundū & ter-  
tium .

Secundum par priori substernitur, proditque neruoso te-  
nuisque principio, ab ossis ilium summitate, cui appendicem obtendi diximus; nec  
non ex posterioribus sacri ossis processibus, lumborumque vertebrais; post exortum  
verò, carneis quibusdam fibris ipsi additis augetur. Duo hi musculi obliquè sursum  
feruntur, dum quatuor infimarum costarum apicibus implantentur, Vbi verò in ab-  
dominis medium pertingunt, ad suū quisque latus recto <sup>k</sup> musculo assidens, in ner-  
ueam tenuemque membranam abeunt, minimè quidem simplicem, vt ait Vesalius,  
sed in duas diremptam, quæ medium recti sui lateris musculi occupant, ac deinde  
superiùs quidem mucronatæ pectoris cartilagini, inferiùs verò pubis ossi figuntur,  
& secundum mediam abdominis longitudinem, ita, quemadmodum & priores duo, <sup>l</sup> t. iiii. pp.  
committuntur, vt nisi & diuisionem & fibrarum discrimē accuratissimè inspicias,  
vnum omnes videantur, quamuis in abdominis medio, hoc est inter vnum & alte-  
rum rectorum muscutorum, crassiores paulò reddantur . Iuxta externum rectorum  
muscutorum latus, secundum ipsorum longitudinem, à costis ad os vsque pubis,  
duum horum muscutorum membranz, quarti paris neruorum membranis, nec non  
mēbranæ, quæ intestina & coctionis organa obtegit, Peritoneum dicta, valide adeo  
connascuntur, vt in eum locum definere videantur; at si sedulò attenderis, præ-  
tergredi eas obseruabis. Fibræ horum muscutorum obliquè sursum porriguntur,  
cum priorum duorum, ipsis incumbentium fibris sese implicant, vnde musculi  
obliqui ascendentes dicti sunt. Inter duas hæc membranas quas duo ij secundi mu-  
sculi possident, <sup>m</sup> musculus alter reponitur, & vtrique tertium abdomen mouentiū  
muscutorum par constituunt, ac vtrique singuli ex media ossis pubis regione, du-  
plici principio nascuntur, <sup>n</sup> altero superiore interioreque, <sup>o</sup> altero inferiore ac exte-  
riore, quæ licet disiuncta minimè sint, substantia tamen variant. Superiùs nanque in-  
trorsum vergens, carneum omnino est, ac superiùs latum & obliquè deorsum in ex-  
teriora fertur, in apicem, antequam ad mediam pectinis regionem perueniat, defi-  
niens . Inter musculi huius & sui coniugis oppositi lateris principium, veluti trian-  
gulus

a c. i. e. t. iiii.  
O t. ix. P.  
b t. ii. iii. pp  
c t. i. s. 6. 7. 8.  
t. ii. iii. ooo.

d t. xi. a.

e t. i. ab R ad

f t. i. t. i. ii.

g t. i. e.

h t. viii. ea.

i t. iiii. . t. v.

at x. i. a. b.

k t. v. x. t. vi. b

l t. iiii. pp.

m t. v. x. t. vi.

b.

n t. iiii. n. r. v.

A.

o t. v. o.

p cad. n.

gulus efformatur. Inferius autem principium extrorsum nonnihil porrectum nerueum vsquequaque est, & sursum reptans, sensim ac sensim ampliatur, dum omnem musculi huius latitudinem producat, qui duobus hisce principijs enatus, sursum per abdominis medium coniugi suo alterius lateris adhærens, ad vmbilicum vsque porrigitur; iuxta quem nonnihil inuicem <sup>1</sup> abscedentes, & latiores paululum effecti procedunt, donec lato & carneo extremo supra mucronatam cartilagineam ad ossis pectoris latera, in cartilagine septimæ octauæque costæ inserantur. In hisce museulis <sup>2</sup> impressiones quædam habentur, transuersim per ipsorum latitudinem ductæ, quarum duæ ferè supra vmbilicum visuntur, altera infra, nonnunquam verò tres supra vmbilicum consistunt. Omnes autem ad digiti latitudinem accedunt, suntque albæ ac carnosæ, musculis hisce, vti dicemus, abdomen versus collectis continendis inferuients. Horum musculorum fibræ, per ipsorum longitudinem nequaquâ porriguntur, sed in dictas hasce impressiones terminantur, ita inuicem complicatæ, vt aliæ ab alijs produci videantur. Cunctis hisce musculis, <sup>3</sup> alij duo subiacent, vtrinque singuli, qui abdomen vniuersum transuersim amplexantur, dicti ob id transuersales, atque ex transuersis lumborum vertebrarum processibus, nec non ex musculis dorsum mouentibus principio partim nerueo partim carnosio, instar membranæ tenui, enascuntur; ac dein carnis quibusdam fibris, quæ ipsis iunguntur, adaucti, ex eminentiori quoque ossis ilium regione, & spuriarum costarum apicibus principium defumunt. Ast vbi à suo quisque latere ad externum rectorum <sup>4</sup> musculorum latus pertingunt, sub ipsis nonnihil, neruosi tenuesque rursus efficiuntur, ac tenuem membranam producentes, inuicem in medio abdomine committuntur, ipsumque vniuersum complexi, medio pubis ossi, & mucronatæ cartilagini conseruntur. Musculis his <sup>5</sup> ea subest membrana, quæ chartæ pergamænæ modo, intestinis, omnibusque coctioni famulantibus organis obtenditur, cui prædictorum musculorum membrana, secundum externi rectorum musculorum lateris longitudinem ita coheret, vt difficili negotio illaceri diuellantur. Reliquum horum musculorum, quæ vniuersa est eorum carnosæ pars, dictæ membranæ affigitur, eundem prorsus in modum, quo musculi sibi ipsis adherent. Omnes hi musculi, præterquâ quod abdominis calorem fouent, coctionique opitulatur, thoraci quoque mouendo deferuiunt, cum spiritu ducimus; simulque ad faciliorem fœcum expulsionem, spiritus retentione, ac intestinorum cõpressionem conferunt, hacque de causa, quò minus fœces ad ventriculū deferantur, prohibent; nec non etiam parientibus auxilio sunt, vti perspicuum euadet, vbi de Diaphragmate verba faciemus.

Quantum par.

De Testium Musculis. Cap. 21.

**V**Trique testiculo tenuis adest musculus, <sup>1</sup> ex ea productus membrana, quæ à Peritonæo exorta, vasis semen ad testes deferentibus obtenditur. Hæc in posteribus partibus, simulatque à peritonæo abscedit, carnis quibusdā fibris ipsi commissis adaucta, in binos hosce musculos abit; qui membranæ testes succingenti semper hærentes, deorsum prorumpunt, dum vnâ cum membrana, iuxta <sup>2</sup> inam testium regionem in <sup>3</sup> eas illud inferantur, per quod semen à testibus in genitale profunditur. Aduertere oportet, membranam hanc, nulla in parte testibus, nec seminarijs ductibus connasci, præterquam in ista, ideoque musculi hi testem nullatenus attingunt, imò his proportionem respondent, quos à membrana carnosâ prodire diximus. Musculis hisce id muneri demandatum est, vt sursum nonnihil testes adducant, licet vsque adeo obscure, vt ferè non percipiatur, vtque ipsis sustinendis opitulentur, ne feminis vasa, à quibus itidem pendent, onere nimio reddant imbecillia. Mulieres quoque <sup>4</sup> binos & ipsæ musculos his non absumiles adeptæ sunt, quos vti alia sua generationis organa intus reconditos gerunt. Ea siquidem peritonæi <sup>5</sup> pars, quæ vtrinque à lateribus vtero connascitur, pluresque ad eum & venas & arterias, veluti Mesenterium ad intestina, deducit, ac primam illius tunicam procreat, crassior pariter efficitur, carnosarum quarundam fibrarum accessione, obliquè deorsum ab ilium regionibus

Duo virilium testium musculi.

Ipsorum munus.

Duo mulierum testiculorum musculi.

q cad.q.

r cad.uuu.

s t.v.y.t.vi.a.

t xxi.x.

u li.iii.ti.fi.i.  
BCD.

a li.iii. t.iiii.  
fi.xxi.v.

b cad.i.  
c cad. fi.xxi.  
xxiii.x.θ.

d li.iii. ta.v.  
fi.xxv.N.

e lib. iii. t.v.  
fi. xxv. P. fig.  
xxvii.EE.

regionibus ad vteri vsque latera tendentium, adeo vt duo hi musculi non minus sunt & one, quàm specie ac substantia illis similes reddantur, quos viris adesse retulimus,

*De musculis Thoracem mouentibus. Cap. 22.*

**M**Vsculi Thoracis motuum autores, octo etiam abdominis musculis connumeratis, octuaginta nouem sunt, vtrunque quatuor & quadraginta, paria totidem constituentia, atque vnus lateri vtrique communis. <sup>a</sup> Primus musculus ex inferiori, <sup>a</sup> t.iii.d. t.v. Z, interiorique clauiculæ regione secundum ipsius longitudinem, quæ primam respicit costam, carnosum principium assumit; ac eodem modo anteriori eiusdem costæ regioni, iuxta ipsius cum pectoris osse connexum, carneus inseritur, estque impensè breuis, sed admodum latus, tenuisque ac omnino carneus; fibras adeptus oblique ac ferè transuersim à clauicula in priora repentes, dum superiori primæ costæ regioni, eique pectoris ossis sedi applantetur, quæ huius costæ cartilaginem admittit. Ad hunc pertinet primam costam sursum nonnihil versus exteriora retrahere, & consequenter Thoracem dilatare. <sup>b</sup> Secundus musculus grandis est, & carneo principio ex interiore scapulæ basi erumpit, atque inde supra costas exporrectus, latiorque, sed paulò tenuior redditus procedit, donec secundæ, tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, septimæ, octauæ, interdumque nonæ costæ inseratur, in singularum interuallis, secundum longitudinem, paulò ante cartilaginum exortum, in apices quosdam ceu digitos, vnguesve discretus, qui in sex inferioribus costis cum <sup>c</sup> primo abdominis musculo pectinatum inseruntur; secundus enim hic musculus super singulas costas exporrigitur, primus verò abdominis, ipsarum mediis iniicitur. Reliquum musculi huius costis, perinde ac mutuo solent musculi, committitur; estque ipsius munus, costas extorsum reuellere & consequenter Thoracem explicare. <sup>d</sup> Tertius musculus ex posterioribus trium postremarum colli vertebrarum, eodemque posteriori primæ Thoracis vertebræ processu, neruoso, tenui, latoque principio erumpit, & inde in priora <sup>e</sup> primo caput mouentium musculorum pari, <sup>f</sup> nonnullisque aliis dorsum, Thoracemque mouentibus instratus, deorsum porrigitur, carneus semper & latus euadens, vbi ex commemorato primo caput mouentium musculorum pari emerfit. Vbi verò primam Thoracis costam contingit, nonnihil versus latera porrigitur, in tres veluti digitos discretus, in quatuor primarum costarum interualla exporrectus, illisque implantatos. Musculi huius est, Thoracem dilatare. <sup>g</sup> Quartus vnà cum <sup>h</sup> longissimo dorsum mouentium musculo ex posteriori ossis sacri regione, & interiori ossis coxendicis parte, quæ extra sacrum os prominent, exoritur; & illinc transuersis lumborum vertebrarum processibus affixus, vnà cum <sup>i</sup> duodecimo dorsum mouente musculo sursum deducitur, cui ita affigitur, vt non immerito partem ipsius esse multi pròdiderint. Quum primum verò ad duodecimam thoracis vertebram pertingit, tanto interuallo ab ea seiungitur, vt hinc ipsum oriri complures sibi persuaserint. Indè obliquus nonnihil extorsum conscendit, & quosdam tendines propemodum teretes effundit, tuberculis illis implantatos, quæ prioribus decem costis, paulò antea quàm transuersis vertebrarum thoracis processibus inserantur, adesse retulimus. Musculus hic ad tendinum vsque initium carnosus existit, & ad primam ferè thoracis vertebram terminatur, quamuis interdum adeo conscendat, vt ipsius tendines ad transuersos septimæ ceruicis vertebræ processus pertingant, quibus perinde atque costarum tuberculis affiguntur. Verum aduerte, eum vnè decimæ, ac duodecimæ duntaxat costæ carnosum applantari; quò enim altius conscendit, eo euidentius tendines sese produunt, ipse verò musculus, quasi in eos absumptus, neruosior tenuiorque redditur. Estque id ei muneris demandatum, vt costas deorsum adducat, & consequenter thoracem arctet. <sup>k</sup> Quintus lato actenui ex ortu ex posterioribus vndecimæ ac duodecimæ, interdumque decimæ thoracis vertebrarum processibus, nec nò ex aliquibus lumborum vertebris erumpit, & <sup>l</sup> quibusdam dorsum mouentibus musculis, <sup>m</sup> quartoque thoracem agente transuersim incumbens, recta propemodum in priora contendit. At vbi predictos musculos transcendit, in costas adigitur, & carneis quibusdam

a t.iii.ooo. buſdam fibris ſibi commiſſis,adauetur, ſicq; in tres veluti <sup>a</sup> digitos diremptus defi-  
 nit,nonæ,decimæ ac vndecimæ coſtarum interuallis iniectos, ipſiſq; coſtis implan-  
 tatos multò ante,quàm cartilagineſ euadant,& cum <sup>o</sup> primo abdominiſ muſculo ſer-  
 ratam compagemeſ efficientes.Huius eſt,thoracem diſtendens;retractiſ quibus inferi-  
 tur,coſtiſ. <sup>r</sup> Sextus in thoraciſ cavitare ſedem obtinet, & per omne internum oſſiſ  
 pectoriſ latus exporrigitur,ſecundum omnium integrarum coſtarum cartilaginum  
 longitudinem,quibus uſque adeo diſſuſuſ aſſigitur, vt ad coſtaſ propemodum exter-  
 no ſuo latere pertingat.Muſculus iſ triangulo eſt aſſimiliſ,ex duobuſ prælongiſ late-  
 ribuſ,vnoq; ad modum breui efformato; eſtq; tenuiſ & omni ex parte carnoſuſ, fi-  
 braſ adeptuſ,tranſuerſim à pectoriſ oſſe ſuſum in poſteriora ductuſ.Huiuſ intereſt,  
 thoracem arcuare,cartilaginibuſ ad pectoriſ oſ attractiſ,inuicemq; collectiſ. <sup>q</sup> Muſ-  
 culum hunc alij vtrinque triginta quatuor ſubſequuntur, coſtarum ſpatia replenteſ,  
 ideoq; Intercostaſ vocati. Quorum viginti, ſpuriarum coſtarum interualla occupa-  
 pant,quaterni inter duuſ quæque coſtaſ poſiti,duo quidem externam, duo verò in-  
 ternam faciem tenenteſ. Externorum primuſ ex ima primæ coſtæ regione ſecundū  
 ipſuſ longitudinem enaſcitur, illinc, ubi à laterum thoraciſ vertebrarum proceſſibuſ  
 abſcedit,in eum uſque locum, quo in cartilaginē ruruſ abijt; & iſthinc obliquē deor-  
 ſum tendit,dum ſuperiori ſecundæ coſtæ lateri,æquali ad exortum fine inferatur. Se-  
 cunduſ ex ima etiam primæ coſtæ regione à pectoriſ oſſe ad cartilaginiſ extremum  
 prorumpit,deorſumque perinde ac primuſ fertur,à quo fibrarum tantummodo du-  
 ctu euariat;illiuſ enim fibræ obliquē in priora,huiuſ verò obliquē in poſteriora re-  
 punt. Quod quidem in eam me ſententiam adducit, vt hoſ duoſ eſſe muſculoſ exiſ-  
 timem, non autem vnum,quemadmodum ait Veſaliuſ; pro fibrarum enim varie-  
 tate,contrariuſ functioneſ obeunt, licet eundem omneſ in ſcopum directuſ. <sup>r</sup> Reli-  
 qui exterioreſ muſculi eundem proruſ cum hiſce duobuſ exortum,eandemque ter-  
 minationem adipiſcuntur. Interni vtriſque,ex elatiore inferioriſ coſtæ regione pro-  
 deunt,tantiſper aſcendēteſ,dum ima ſuperioriſ coſtæ ſedi, quæ ipſi proxima eſt,in-  
 trinſecus inferantur, carnoſi pariter ac externi,fibraſque obtinenteſ obliquē ſuſum  
 in priora protenſa,externorumque muſcuiorum fibris decuſſatim intextaſ. Super-  
 ſunt alij viginti,inter quinque illegitimaſ coſtaſ reſoſiti, duo in quolibet interual-  
 lo,qui prioribuſ integrarum coſtarum muſculiſ, & ſubruſ eoſ poſitiſ correſpondēt,  
 carnoſi pariter ac tenuiſ; thoraciſque arcuando inferuienteſ, vt ipſorum ſituſ perſpi-  
 cuè coſmoſtrat, quandoquidem oppoſitam ſibi inuicem originem ſortiuntur, &  
 inferiore ſuperiorem, ſuperiore vero inferioreſ coſtam pari conatu trahenteſ,  
 coſtæ inuicem adducuntur. Hi ſunt proprij omneſ,alteriuſ lateriſ muſculi, thoraciſ  
 motuum opificeſ,quibuſ totidem alteriuſ correſpondent. Super eſt vtriſque lateri cō-  
 muniſ <sup>s</sup> muſculus explicanduſ, qui vitalia & coctiōni famulantia organa veluti pa-  
 rieſ interiectuſ dirimit,vnde græciſ Διόφραγμα,latinuſ verò ſeptum tranſuerſum fuit  
 appellatuſ. Hic à ceteriſ omnibuſ corporiſ muſculiſ euariat; latuſ etenim eſt,& orbic-  
 ulariſ, caputque <sup>t</sup> in ſui medio gerit, qua in parte per quam tenuiſ & neruoſuſ oc-  
 currit. Ex eiuſmodi principio fibræ quædam radiorum inſtar emittuntur, quæ à  
 muſculi huiuſ centro ad ipſiuſ circunferentiam porriguntur, vnà cum muſculo de-  
 ſiſnenteſ,parſ quidem in pectoriſ oſſiſ ſummitateſ, ſubruſ mucronatam cartilaginē,  
 parſ verò in interiorem ſummarum cartilaginum, priorum quatuor ſpuriarum coſ-  
 tarum ſedem; Toti autem duodecimæ cartilagini carnoſuſ adnaſcitur,& ad inferiorum  
 coſtarum extrema,non nihil ſecundo abdominiſ muſculo, & lōgè magiſ quarto  
 coniungitur. Scire autem oportet,muſculi huiuſ fibraſ,rectā in vndecimam tho-  
 raciſ vertebram excurrenteſ,nequaquam in ipſam inferi, quòd illi <sup>a</sup> arteria magna,  
 nec non etiam ſextuſ femur mouēſ <sup>x</sup> muſculuſ obtendantur; Ac propterea fibræ hu-  
 iuſmodi hac in parte,in duoſ <sup>y</sup> tendineſ,tenuēſ & validoſ conuertuntur, qui deor-  
 ſum ad magnæ arteriæ latera non nihil protenduntur, ſenſim ac ſenſim anguſtiorēſ  
 redditi;& ſefe arteriæ ſubſiſcienteſ tantiſper porriguntur,dum in denudataſ quaſdam  
 lumborum vertebras longo capite,validiſſimè adigantur: Muſculus hic propemodum  
 orbiculariſ eſt, ſituſque modicè obliquuſ à ſuperiſ ad in ſera obinet, ſecun-  
 dum

Sextus.

Intercostales  
muſculi.

Interni interco-  
ſtaſ in egruſ  
coſtarum.  
Viginti alij ſpu-  
rii coſtiſ inter-  
rectiſ.

Septum tranſ-  
uerſum.

f t.vii. a. li. vi.  
 t. v. ſ. x. A.  
 li. iiii. t. i. ſ. i.  
 l. ſ. ii. R. R. ſ. ſ.  
 iii. H. ſ. iiii.  
 Q. ſ. v. E. ſ.  
 vi. no. ſ. xii.  
 I  
 t. t. vii. inter  
 K l m n.

n ead. q. li. iiii.  
 t. v. ſ. xvi.  
 Q  
 x t. vii. t  
 y ead. op.

Diaphragmatis  
foramina.

dum costarum, quibus supplantatur, extrema; et sic à sui medio seu centro (qua in parte vti diximus exoritur) ad sui usque dimidium nervosus, & membranæ instar tenuis; isthinc verò ad costas usque carnosus. & quemadmodum quò propius sui principio centro ve accedit, eò tenuior ac nervosior euadit; sic quò sui extremo seu circumferentiæ viciniò fit, eò crassior & carnosior efficitur: ac pars ipsius nervosa acutum angulum in priora porrigit; carnea verò deorsum fertur, extremæ reticulæ imaginem præ se ferens. Septum id vniuersum duplex tegit membrana, subter quidem quæ iecur atque omnia coctionis organa inuestit, quam Peritonæum vocari diximus; super verò, quæ cor & pulmones respicit, quæ costas succingit, *ωλενρα* ob id græcis dicta. Musculus præterea is, duplici foramine, (quod paucis alijs contigit) peruius occurrit; <sup>z</sup> altero in sui medio, nonnihil dextrorsum venam cauam transmittente, cui Diaphragma ipsum medijs duabus mēbranis, quibus obduci diximus, validissimè affigitur. <sup>a</sup> Alterum foramen paulò infra musculi medium consistit, Modicè ad læuam, quod æsophago viam præbet, vnà cum duobus sexti nervorum cerebri paris ramis ad ventriculi orificium reptantibus. Præter hæc duo foramina, <sup>b</sup> cauitas quædam in Diaphragmate adest iuxta vndecimam thoracis vertebra, à <sup>c</sup> fibris illis producta, quas in duos tendines abire prodidimus, & per eam <sup>d</sup> arteria magna & venæ sine pari extremum transmittuntur. Musculi huius officium est, mucronatam cartilagine introrsum trahere, ac spuriarum costarum extrema nonnihil sursum ad sui principium, quod in medio consistit, velle, vt duo nervorum rami, quos vtrinque in sui medium nonnihil antrosum inferi dicemus attestantur. Quum itaque musculus is in sese colligitur, notharum costarum extrema ad suum principium adducit, inferioremque ac anteriorem thoracis partem, quam spuria costæ occupant, coarctat, posteriorem vero distendit, septem postremis costis inuicem abductis, quemadmodum adhibita diligentia vnusquisque in seipso experiri poterit, manu costis admota, & spiritu valenter ducto. Neque verò hic audiendi sunt, qui Diaphragma deorsum agi, vbi aerem attrahimus, contendunt; nam qui alium vi adhibita exonerant, spiritum quandoque continent, simulque thoracem validè comprimunt, quod quidem minimè contingeret, si spiritum intrò ducentes, vnà thoracem dilatare cogeremur. Atque hi sunt respirationi deferuientis musculi, quibus octo abdominis accedunt, huius quoque functionis aliqua ex parte adiutores; primum quidem par ima thoracis parte compressa; secundum vnà cum tertio costis deorsum attractis, validè thoracem arctat; quartum costas introrsum adducit, leuiter eas comprimens. Præter hosce musculos, respirationi quoque famulantur, qui dorsi & brachiorum motibus præsent; quamuis perobscure, & vrgente duntaxat necessitate. Quam ob rem scire expedit, hisariam respirationem obiri, aut aere scilicet foras acto, aut eodem intromisso; quorum vtrunque aut naturaliter fit, cordis duntaxat euentandi, & spirituum recreandorum gratia; aut compellente necessitate, vt cum ingenti calore estuamus, aut vbi ab opere quopiam ingenti nixu administrato, desistimus. Haud secus, aerem foras protrudimus, aut naturaliter, vt cum expiramus, aut violenter, vti quum loquimur, efflamus ve. Naturalis igitur inspirationis, solum Diaphragma opifex existit; expiratio verò concidente thorace perficitur. Quod quidem ex seipso, laxato Diaphragmate, sua grauitate præstat, quemadmodum in inflato, ac soluto vtre fieri conspiciamus. Accedente autem quapiam necessitate, vt cordis calore adaucto, aut alia quauis de causa, alij deinceps suppetias ferunt, prout maior ipsius postulat necessitas.

### De vinculis Thoracis. Cap. 23.

**Q**uemadmodum plura & varia sunt Thoracis ossa, sic varia quoque ipsorum vincula esse oportuit. Præcipua verò ea sunt, quæ duodecim thoracis vertebra deuinciunt, de quibus vnà cum alijs dorsi ligamentis, verba faciemus. Quæ costas vertebra hisce colligant, communibus articularum vinculis assimilantur; quamuis tamen hac in parte ad cartilaginum duritiem accedant, potissimum inter transver-  
forum

forum processuum radices, quā vertebris costæ primū articulantur, & istorum met processuum apicem, quā iterum committuntur. Quā etiam pectoris ossi iunguntur nullum sibi peculiare ligamentum vendicant, præter communem ossibus obductam membranam, *Costarum vincula* ob id græcis appellatam, quæ pectoris ossi obtenditur, longè ac in parte robustior, & quodammodo gemina, & hanc etiam ipsæ costarum cartilagines vnā cum costarum ossibus communem obtinent, quam ideo veteres secundum membranam costas succingentem vocarunt. Aduertere autem oportet, cartilaginibus costas minimè alligari, sed in eas vti diximus abire; & proinde peculiari vinculo nequaquam donantur.

*De Musculis dorsum mouentibus. Cap. 24.*

**S**I quid est quod figuræ ossium notitiam exposcat, id profecto est horum musculorum enarratio. Iam diximus dorsum in ceruicem, scapulas, lumbos, & os sacrum, cui Coccyx articulatur, dirimi; horum quoque ossium connexus formam, structuramque tradidimus. Nunc scire conuenit, dorsum omne ad os vsque sacrū, in neutrum latus inclinans arcuatim inflecti, extendi, & in latera moueri: Ceruix etiam eisdem ex se ipsa motibus cietur; ac lumborum vertebræ eodem prope cum thoracis vertebris motu aguntur, præterquam quod illæ seorsum singulæ, Thoracis autem vertebræ omnes vnā mouentur. Diuersa hæc motuum genera, tum ex diuersis vertebrarum articulationibus, tum ex musculorum situ innotescent, qui sexdecim in totum sunt, octo paribus comprehensi. <sup>1</sup> Quorum primum à quintæ thoracis vertebræ corporis lateribus, vbi costæ ipsis articulantur, principium sumit carnosum, tenue, ac in star trianguli apicis acutum; atque inde altius à medio quartæ racis vertebræ corpore obliquè ascendit. Et fibras quasdam obtinet, eodem ductu, obliquè à posterioribus in priora ad tertiam vsque thoracis vertebrā conscendentes, quā vtriusque lateris muscoli inuicè conterminantur: Initio siquidem vniuersum vertebræ corpus ipsis interiaceret, ac deinde sensim ac sensim appropinquatur, dum ad anteriorem primæ ceruicis vertebræ regionem pertingant, vbi simul ambo, neruo, atque haste mucronis in star acuto extremo in <sup>2</sup> Tuberculum inferuntur, quo vertebram hanc ea in parte insigniri diximus; ossi etiam occipitis, <sup>3</sup> iuxta dorsalis medullæ foramen, quodammodo implanati. Duos hosce musculos alij quatuor, alij sex esse prodiderunt, ducti, aut albis quibusdam fibris, linearum modo eorum vtrunque dirimentibus; aut diuersis cuiuslibet, tum principij, tum insertionibus animam adhibentes. Verū nec fibræ definito numero comprehensæ, nec semper eadem sunt, præterquam quod longè minùs penetrant, quam vt musculi dirimant; nec duo tantummodo forent principia, sed multò plura, singulæ namque vertebræ suum haberent principium, sicque thoracis vertebrarum tres, verticis autem, muscoli septem forent: ita vt aut pro binis vti diximus, aut pro vicenis habendi sint. Præcipuum horum musculorum munus est, ceruicem & consequenter caput quodammodo inflectere; ambobus enim vnā laborantibus, rectā ceruix in priora flectitur; altero autē duntaxat in se collecto, in contracti latus inclinatur; quemadmodum ipsorum situs, figura, & fibræ lucè clariùs ostendunt. Quinetiam & trium priorum thoracis vertebrarum flexio hosce musculos efficitur, <sup>4</sup> Tertius & quartus à suo vterque latere, è superiori exteriorique primæ costæ regione, illinc vbi dorso connectitur, ad eam vsque sedem, qua in cartilaginem abit, lato & carnoso exortu prorumpunt. Huiusmodi autem principio educti, sensim ac sensim arctati descendunt, & in interiorem transuersorum processuum, omnium ceruicis vertebrarum, regionem adiunguntur; quamuis primæ difficulter affigantur, vbi enim ad ipsam perueniunt, trianguli veluti verticem efformant, quinimo vtrique trianguli seu citharæ figuram referūt; cuius primum latus ossis primæ cartilaginis vniuersam occupat longitudinem; secundum ad ceruicis longitudinem fertur; tertiū à principio cartilaginis primæ costæ, ad primam vsque ceruicis vertebram porrigitur, idque latus obliquè retrorsum tendit. Vtriusque huius musculi fibræ obliquè à superis ad infera

*Primum dorsi musculorum par.*

*Ipsius munus.*

*Secundum par.*



a. ta. vii. C. D. t. viii. AB.

b. li. i. ta. v. fi. vi. M. c. li. i. t. iiii. fi. vi. o.

d. ta. v. vi. Q. t. vii. G. tab. viii. C. tab. xiii. N.



infera instar citharæ fides deferuntur, eisdem affixæ processibus, quæ musculum inferi diximus, foramine peruium, quod iecoris venam vna cum arteria trajicere suo loco dicemus. <sup>c</sup> Quintus & sextus musculus, ad suum quoque latus singuli consistentes, ex radice transuerforum sextæ thoracis vertebræ processuum, ad posteriorum processuum exortum erumpunt, sursumq; perreptant, ex reliquis etiam quinque thoracis vertebris enascentes, sensim ac sensim validiores crassioresq; redditi, donec <sup>f</sup> in externam sedem transuerforum septimæ cervicis vertebræ processum, validè inferantur; & deinde reliquarum omnium cervicis vertebrarum transuerfis processibus ad anteriorem eorum sedem deinceps implantantur; licet in primum laxiùs quàm in aliorum vllum inferantur. Duobus hisce muscularis, ac duobus proximè enarratis vis est, in latera cervicem inclinandi, dexteris quidem laborantibus, dextrorsum, sinistris verò sinistrorsum: ita tamen ut tertio & quinto vnà trahentibus rectà flectatur; tertio trahente, quinto autem laxato, antrorsum in latera reclinetur; sin contra, retrorsum. <sup>g</sup> Septimus & octauus musculus utriusque ex posterioris processus septimæ, aliarumque omnium thoracis vertebrarum radice, quæ inuicem vertebræ articulantur, originem deducunt, & vbi ad septimam colli vertebram pertingunt, validiùs ampliori; principio ab illa, quam ab aliarum thoracis vertebrarum vlla enascuntur, præterquam quod in illius apicem fibræ à thoracis vertebris enatæ infiguntur, insertionemque in apicem posterioris septimæ istius vertebræ processum moluntur; arque hac in parte mutuo sese contangunt: sicq; vnà, posteriorum duntaxat processuum apicibus inuicem dirempti conscendunt, ex radicibus transuerforum processuum aliarum omnium cervicis vertebrarum principia semper ducentes, dum in <sup>h</sup> totam inferiorem spinæ secundæ cervicis vertebræ sedem eodem ambo sine implantentur; fibræ autem ex lateralium processuum radicibus enatæ obliquè introrsum conscendunt, donec in posteriorem superioris processuum inferantur. Et proinde horum musculorum interest, vbi simul laborant, rectà caput attollere; alterutro autem laborante, in trahentis latus nonnihil adducere. Hi sunt cervicis motu, musculi opifices, qui omnes capituli etiam motibus secundariò famulantur. <sup>i</sup> Nonus & decimus dorsi motores, carnei crassique nascuntur ex elatiori posteriorique coxendicis sede, quæ è regione superioris partis priorum transuerforum sacri ossis processu consistit; deinde ex tota etiam hac sacri ossis regione musculus hic exortitur; indeque paulò angustior redditus, sursum ad duodecimam costam protenditur, humiliori eius sedi carneo sine implantatus. Ab interno etiam latere musculus iste, transuerfis omnium lumborum vertebrarum processibus, secundum ipsarum longitudinem ab interna sede ascendens inferitur, lateribus etiam vertebrarum, iuxta foramen, unde nervi emergunt, applantatus; ita ut quatuor lateribus musculus is efformetur, <sup>k</sup> quorum primum à coxendicis ossibus ad os vsque sacrum secundum omne musculi principium porrigitur; secundum duodecimæ costæ longitudinis partem occupat; tertium omnes lumborum vertebra; quartum à duodecima costa, ad externum exortus latus producit, quod ad medium propè superioris ossis ilium sedis, quæ spina ossis huius dicitur, consistit. Musculi huius fibræ ab exterioribus obliquè introrsum ascendunt; & quæ ab offe sacro principium ducunt, in postremam lumborum vertebram terminantur, quæ verò consequuntur, deinceps in superiores desinunt. Ambo hi musculi vnà cōtracti rectam lumborum flexionem in priora moluntur; alteruter autem laborans eos in latus flectit. Ac illud quidem minimè ignorandum est, duos duntaxat hosce musculos, lumborum in priora flexionis, autores priuatim existere; thoracis autem vertebra priuatim musculum minimè adeptas esse, eiuscemodi motus opificem; quanquam duo recti abdominis musculi, thoracem deorsum trahentes, ad thoracis lumborumq; vertebra flectendas aliquid conferunt. <sup>l</sup> Vndecimus ac duodecimus reliquis corporis totius muscularis longitudine præstāt, & singuli utrinque à sacri ossis <sup>m</sup> extremo prodeuntes, in primam terè thoracis vertebram terminantur; quamvis ipse in nonnullis ad primam vsque cervicis vertebram eos descendere obseruauerim, <sup>n</sup> quarto dorsum mouenti musculo nonnihil similes, quem ab offe sacro prodire, ac in ascensu lumborum vertebris, necnon costarum

Tertium par.

Secundi &amp; tertij paris musculus.

Quartum par.

Ipsius musculus.

Quintum par.

Ipsius musculus.

Sextum par.

c. t. xiii. H

f. li. t. v. ff. vi. paulò infra tertium. H

g. t. xlii. l. t. xliii. o

h. li. t. v. ff. vi. B

i. t. vii. u. t. viii. S. t. xliii. t. xliii. P

k. Primum est inter a &amp; b; secundum inter c &amp; d. tertium inter a &amp; d. quartum inter b. &amp; c. in figura è regione posita.



l. t. xii. N. t. xlii. t. xliii. Q. R. S. m. t. xlii. l. n. t. xlii. a

rum principijs affigi diximus, vbi à transuerfis thoracis vertebrarum processibus  
abscedunt. Musculus enim is, ex totius ossis sacri spinæ summo secundum ipsius lon-  
gitudinem, atque ex omnibus lumborum spinis, neruofum, tenue, validumque  
principium desumit, quod illi, quem mox <sup>o</sup> decimum tertium appellabo, subiacer. *Sexti paris mu-  
nus.*  
*Pars autem principij huius ex interna ossis ilium fede, quæ extra sacri ossis latera*  
*retrosum prominet, eduçta; vsquequaque carnosa est, & perinde ac ea istius ossis*  
*sedes, in summo acuta. A neruosis hisce principijs musculus hic fursum ascendens,*  
*subcarneus, teres, ac læuis posteriùs efficitur, latusque ipsius <sup>q</sup> externum transuerfis*  
*lumborum vertebrarum processibus in transitu connascitur, qua in parte carnosior,*  
*rotundiorque musculus euadit. Anteriori autem fede inter crassam carnosamque*  
*ac nerueam, & tenuem ipsius partem <sup>r</sup> modicè caua, & longa impressio consistit, quæ*  
*in decimo tertio musculo, de quo mox verba facturi sumus, exculpitur. Vbi verò ad*  
*vndecimam thoracis vertebram pertingit, arctior multò redditur, sicque sensim ac*  
*sensim ad primam vsque thoracis vertebram angustatur, leuiter admodum singulis*  
*posteriorum ipsius vertebrarum, validè autem transuerforum processuum apicibus*  
*adhærescens, per <sup>s</sup> annulares quosdam tendines, qui ab anteriori eius regione dedu-  
cti in horum processuum apices inferuntur, perinde atque de <sup>t</sup> quarto thoracè mo-  
uente musculo rerulimus, quem singulis costis tendinem exporrigere diximus;*  
*quamuis illius tendines extrorsum magis conscendant, & ab externo latere produ-  
cantur, huius verò ab interna fede prorumpant, & obliquè versùs exteriora, quem-*  
*admodum & fibræ ipsius, ascendant. Hi simul ambo trahentes, thoracem ac lumbos*  
*rectè extendunt; alteruter autem, in latus. <sup>u</sup> Decimus tertius, & decimus quartus*  
*prædictis duobus substernuntur, & <sup>x</sup> ab illa ossis sacri fede principium obtinent, quæ*  
*ab ipsius spina ad eius cum ilium osse connexum pertinet. & quemadmodum sedes*  
*hæc ascendens latefcit, sic pariter musculi huiusmodi se habent dum ad transuerfos*  
*quintæ lumborum vertebræ processum pertingant, qua in parte ampliores quàm ali-*  
*bi occurrunt, atq; inde transuerfis etiam aliarum omnium lumborum vertebrarum*  
*processibus affixi ascendunt, donec ad posteriorem <sup>y</sup> vndecimæ thoracis vertebræ*  
*processum perueniant, quam in partem acuto sine inferuntur. Duo hi musculi ab*  
*initio ad finem mutuò committuntur, inter posteriorum processuum interuallum*  
*fese ambo adigentes, adeo vt nihil omnino ipsis interiaceat, quàm ligamenti ampli-*  
*tudo, quod inter vnum alterumque processum reponi sequenti capite trademus.*  
*Fibræ horum musculorum interiora versùs, ex transuerforum processuum apice,*  
*ac posteriorum processuum inferiorum vertebrarum radice, in omnem vsque supe-*  
*riorum vertebrarum spinæ amplitudinem obliquè assurgunt. His vnà laboratibus,*  
*dorsi pars, cui ab ortu ad infertionem committuntur, extenditur; altero duntaxat in*  
*se collecto; obliquè versùs trahentem agitur. <sup>z</sup> Decimus quintus, & decimus sextus*  
*ab <sup>a</sup> vndecima thoracis vertebra erumpentes ad primam vsque conscendunt, poste-*  
*rioris thoracis vertebrarum processu toto itinere amplexantes. Duo hi musculi om-*  
*ni ex parte carnei sunt, ac plurimis iisdemque præualidis fibris intertexti, & iuxta*  
*duodecimam thoracis vertebram tenues, quemadmodum etiam decimus tertius, &*  
*decimus quartus tenues ea in parte visuntur; fursum vero porrecti, sensim, ac sensim*  
*crassescunt, dum ad posteriorem quintæ thoracis vertebræ <sup>b</sup> processum pertingant,*  
*vbi crassiores iterum euadunt, & rursus assurgunt, tenues vsque adeo redditi, vt iux-*  
*ta posteriorem primæ thoracis vertebræ processum crassi æquè ac iuxta eundem met*  
*<sup>c</sup> vndecimæ processum existant. Hi quoque musculi posteriorum processuum inter-*  
*ualla opplent, inuicem inibi adherentes, nullo præterea interiecto, præter ligamen-*  
*tum, à superiori spina in inferiorem porrectû, illi simile, quod inter <sup>d</sup> cruris & <sup>e</sup> cu-*  
*biti ossa reponitur. His fibræ multò rectiores, quàm aliorum vlli dorsi musculorum*  
*obtigerunt, ac propterea recto ipsum motu, sine ulla ferè in latera flexione cient.*  
*Estque ipsorum munus vertebra, quibus affiguntur, connectere, & consequenter*  
*dorsi regionem vniuersam extendere, reliquis adiuuantibus musculis, quibus eadem*  
*functio concredita est.* *Ossium par.*  
*Ossis manus.*  
*Ossis paris*  
*minus.*

Ligamenta vertebrarum dorſi.

**Q**Uæ primam ceruicis vertebram capiti, quæ secundam primæ, ac secundam rursus capiti ligamenta deuinciant, iam enarrauimus. Superest vt de his, quæ cæteras dorſi vertebraſ annexunt, verba faciamus: ab ijs, quæ ceruicis vertebraſ alligant, exorſi. Inter secundæ ac tertię, pariterque inter reliquarum omnium ceruicis vertebrarum corpora, non cartilago, vt inquit Galenus, sed cartilagineum <sup>a</sup> ligamentum reponitur, quod vertebraſ hæſce, nullo interieſto, inuicem adducit. Caue autem ne tibi in hædi, aut vituli ſpinam incidenti, cartilago inter vertebram vnā atque alteram occurrens, imponat; quandoquidem præter hanc de qua nunc agimus, non minus in nuper natis puerulis, quàm in prædictis animantibus tenellæ adhuc ætatis, duæ cartilagineſ occurrunt, inter appendices corporis vniuſcuuiusque dorſi vertebræ conſiſtentes; in medio verò duarum appendicum, ligamentum reponitur, quod eas, nulla interim interueniente membrana colligat, vt facile quiuis explorare poterit. Quinetiam vertebræ huiusmodi validiſſimis quibuſdam ligamentis, lubrico humore oblitis, inſuper alligantur, quæ dorſi oſſibus circum vndique obuoluuntur, & licet admodum craſſa, & omni ex parte robuſta ſint, in vtriſque tamen anterioris partiſ lateribus euidentiùſ multo ſeſe produnt, quòd hac in parte craſſiora, quàm alibi exiſtant. Ligamentis hiſce id muneris concreditum eſt, vt omnes dorſi vertebraſ connectant, ſimulque prohibeant, ne dorſum plus æquo extendatur, colligatur ve, ſitque venæ cauæ, ac arteriæ ipſi aſſidentibus, ruptionis cauſa. Adſunt inſuper vertebris hiſce alia rursus ligamenta membranarum inſtar tenuia, quæ ſpatia inter tranſuerſoſ vertebrarum proceſſuſ occupant, nec non alia ſpinæ inuicem colligantia; quæ iuxta proceſſuum apiceſ magiſ craſſeſcunt, inuicemque coeuntia, ligamentum conſtituunt, cartilaginis naturæ particeps, per vniuerſam Dorſi ſpinam deductum. Alia præterea ligamenta membranarum modo tenuia, ſed perquam valida, articuloſ amplextantur, quorum interuentu ſuperiores cuiusque vertebræ proceſſuſ inferioribus copulantur. Rurſus, inter vnāquamque vertebram, ligamentum aliud priuatim reponitur, ſubrubeum, nec aliorum vlli corporiſ ligamentorum roboraſ inferiùſ, quod ex interna ſede foraminis vertebrarum ſpinalem medullam tranſmittentiſ, ad radicem poſteriorum proceſſuum, inter aſcendentes, & deſcendentes proceſſuſ exoritur, & in eandem ſequentiſ vertebræ ſedem definit: quod minime inconuenit, ſi è ſuperiori vertebra educi, & in inferiorem deſcinere dicatur; aut contra, quandoquidem æquè ab vtriſque producitur. Vnum tantummodo nobiſ ligamentum relinquitur, de quo (licet humano in corpore non occurrat) verba ſeorſum faciemus, cum ſit apud vnumquemque notiffimum. In canibus igitur ac bobuſ, cæteriſque animalibuſ ceruicem facile attollentiſ, ligamentum conſpicitur, quod ex ſeptimæ ceruicis vertebræ ſpinæ lateribuſ enaſcitur, & ad caput aſurgens, nulli præterea vertebræ connaiſcitur, quouiſque ad ſecundam ceruicis pertigerit, cuiuſ ſpinæ lateribuſ in ſummo apice inſeritur: Animantium verò nonnulliſ, vt ouibuſ, ad oſ vſque occipitiſ porrigitur. Ligamentum id perquam tenui membrana inuoluitur, geminumque apparet, ubi altam impreſſionem ipſiuſ longitudini porrectam. Eſtque ligamentum illud, quod communiter Comam appellamus, eiùſ præduritiæ proſuſ inepum: & muliereſ per iocum, ipſiuſ eſum ad capillorum ſlauitiem conciliandam, liberis commendant.

a tab. xv. fig. xxviii. 3. h. i. ca. vi. fig. 1. R.R.

Alia ligamenta.

Ipſoruſ muner.

## De Musculis Cubitum ſteſcentibuſ, &amp; dentibuſ.

## Cap. 26.

Prior cubitum ſteſcens muſculus.

**C**UBITI flexio duobuſ abſoluitur muſculiſ; quorum <sup>a</sup> prior duo perquam valide, ſeiuſcta que obtinet principia, <sup>b</sup> Alterum quidem omnino nerueum ac te-

a t. i. li. 2. ca. 2. iii. t. ca. v. 8. ca. vi. o. i. ca. vii. R. ca. ix. Q. ca. x. ca. xi. y. b. t. vi. m.

res,

c li.ta.vi.f. res, quod ex eminentiori scapulæ<sup>e</sup> ceruicis parte, iuxta sinus humerum excipien-  
 iiii.A. tis oram emergit, & inde in priora sub articuli huius<sup>d</sup> ligamento, transuerfim  
 d t.v.de.ad ipsi obducto procedit, & sinuque vehitur, quem in anteriori capitis, & ceruicis hu-  
 f vique. meri parte haberi diximus: f Alterum verò partim nerueum, partim carneum, &  
 c li.i.tvi.f. priore admodum latius. Neruea huius pars crassa est, ac propemodum teres, ex  
 f t.vi.no. apice interioris eiusdem scapulæ processus anchoram referentis eduçta: Carnea  
 g li.ta.vi.f. verò lata est ac tenuis, ex reliqua processus parte vsque ad radicem prodians. Duæ  
 iiii.E. huiusmodi partes quamuis variæ sint, non ideo tamen seiunguntur, sed vnâ hu-  
 a t.vi.P. mero nunquam affixæ descendunt, ante tranfactam ipsius ceruicem, ibique ner-  
 uofo principio committuntur, & ex vtrisque musculus confurgit. Carnosa prin-  
 i li.ta.vi.f. cipij huius pars, i asperitati, quam humeri os hac in parte obtinere tradidimus,  
 vi.D. lato & nonnihil carneo extremo infigitur; sed vsque adeo fortiter, vt ansam præ-  
 beat nonnullis existimandi, principium huiusmodi, carnosum musculum seor-  
 x.vi.vi.t.vii. sum existere, brachio attollendo famulantem. Vbi duo hæc principia inuicem  
 i. coiuerunt, vltra connexus regionem, carnosum musculi huius principium ab  
 i ead.q. humero paululum abscedit, & alterum ipsi subiacentem<sup>k</sup> musculum conscendit,  
 m t.vii.Q. teres carnosumque tantisper redditum, dum proximè ad cubitum accedat, vbi  
 articulo expansus, & subdito ipsi musculo suffultus, in<sup>m</sup> anteriorem radij appen-  
 dicis partem (nonnihil & articuli ligamento adnatus) inseritur, quam inæqua-  
 lem, latam, modicèque prominentem esse superiore libro prodidimus. Muscu-  
 lus is, ille est, quem vulgo brachij Piscem nuncupant, qui se in quouis lacertofo,  
 a t.viii.r.ta. gracilique homine conspicuum offert, & subliuidus apparet. n Secundus cubiti  
 iiii.ss.t.ii.N. flexor musculus, huic vt diximus subtenetur, exactè carnosus, & multò iuxta fi-  
 x.iii.aa.ta. nem latior, proditque<sup>o</sup> ab anteriori ossis humeri regione secundum medijs ipsius  
 x.vi.xx.t.vi.a. longitudinem, lato & caroso principio, quod ossis huius latitudini ab externo  
 x.vi.xx.t.vii. latere versus internum obtenditur, ab ea sede incipiens, in quam p primus & se-  
 p.t.ix.R.ta. cundus brachium mouentes musculi desinunt, & obliquè paulatim descendens  
 x.d.e.xi.g. versus anteriorem ossis regionem, secundum attollentis brachium musculi inser-  
 o t.viii.L.M. tionis formam dilatafecit, indeque ab exterioribus introrsum modicè ad inferiora  
 p ta.iii.g.h. declinat, donec ad internum insertionis dicti musculi latus perueniat. Deinde  
 x.xi.P. ad idem rursus eiusdem musculi latus paululum proripit, sed non adeo altè con-  
 scendit, atque iuxta externum ipsius latus enascebatur; ita vt alterum principij hu-  
 ius cornu in externo humeri habeatur latere, alterum in interno, & cauitas in an-  
 teriori sede consistat, principiumque in medio depressum, ad latera verò acumi-  
 natum existat. quod quidem complures eò adcegit, vt non vnicum, sed gemina ef-  
 fe principia contenderent; ipse obscuritatis vitandæ gratia vnus loco habeo; duo  
 cui sic lubet appeller. Ad enarrationem vt redeam, musculus hic tali enatus prin-  
 cipio, rectà deorsum protenditur, sensim ac sensim crassior & carnosior effectus,  
 humeroque semper à quo exoritur, affixus; licet eo validius quò magis deorsum  
 fertur, quousque cubiti articulum contingat, quem sua amplitudine, carneaque  
 substantia in tota anteriori sede integens, validissimè articuli ligamento, & an-  
 teriori vlnæ, ac radij sedi ampla implantatione inseritur, ea parte, quæ articulum  
 transcendit, montis imaginem representans, fibræ musculi huius, vt & primi rectà à  
 principio ad finem tendunt, ideoque idem est vtriusque officium, rectà scilicet ad  
 cubitum, nullam in partem declinans, flectere; nam mehercule, si sedulo aduer-  
 tatur, nullam prorsus in latera flexionem cubitus experitur, vti Vesalius hoc lo-  
 co luceclarius ostendit. Hacenus de musculus cubitum flectentibus egimus, nunc  
 q t.xi.f.t.iii. tempsestium est extensionis opifices prosequi. Quorum q primus, lato, valido, ner-  
 ix.xi.xii.T. uoquoque principio<sup>r</sup> ex anteriori scapulæ latere, iuxta ipsius ceruicem productur, ex  
 ta.ii.P.ta.x. sinu inibi exculpto emergens; & paulò post exortum carnosior efficitur, ac rectà  
 x.iii.b.t.iii. sinu inibi exculpto emergens; & paulò post exortum carnosior efficitur, ac rectà  
 u.v.v.t.vi.l. deorsum ad internum latus posterioris humeri sedis fertur, subtus ipsius ceruicè fir-  
 t.vii.N.ta.x. mius inibi adaçtus, vbi<sup>s</sup> quarti musculi brachiû mouëtis caput inseritur. A caroso  
 f li.i.tvi.f. musculo huiusmodi principio, rectà deorsum fertur, medio interni, & posterioris humeri  
 iiii.Q. s t.x.c.t.xj.o. lateris

Alter musculus.

Prior cubiti ex-  
 tesor musculus

lateris tantisper adnatus, dum partim carneus, partim nerueus in internum latus posterioris ulnæ <sup>t</sup> processus inferatur. Musculū hunc aliqui in duos partiuntur, vt alter qui dē à scapula, alter ex brachio nascatur, in medio coeunt, siue commixti. Alij vnicū faciunt, duplici principio insignitū quemadmodū & nos ipsi facimus, nulli tamē interdicentes, quō minus geminos, si visum fuerit, appellet. <sup>u</sup> Secundus cubitum extendens musculus à posteriori ceruicis humeri <sup>x</sup> sede ad radicem vsque capitis eiusdem humeri carnosus exoritur, & rectā deorsum per externam sedem posterioris humeri lateris, cui firmissimē adhærescit, protenditur, carnosusq; hac in parte reditus, ad osis circiter medium descendit, ibique ita <sup>y</sup> nuper dicto commiscetur, vt discerni minimē queant; quamvis interim vtriusque ipsorū fibræ nusquam implexæ ab imo ad summum rectā porrigantur, ac tertius hic musculus suum semper feruet incessum, donec in externū posterioris ulnæ <sup>z</sup> processus latus, quod cubiti summum dicitur, validissimē inferatur. Atque ita ex tribus hisce musculis vnā coeuntibus tendo confurgit, qui cubitum amplexatur vniuersum, ita tamen, vt quæ inferior ipsius sedē vniuersam, cui innititur, pars obtegat, longē neruosior, quam quæ latera, superiore <sup>v</sup> ipsius regionem integit, existat. Estque illud notatū dignum, ex trium horum musculorum congressu liuidum corpus confurgere, quod eo neruosius euadit, quō cubito propius accedit. Est autem duobus hisce musculis id munus demandatum, vt rectā cubitum, brachio in neutrum latus inclinato, extendāt.

Aist.

t. li. i. a. vi. f. vii. D.

u. t. ii. O. t. iii. e. t. ix. s. t. x. b. t. xii. V. ta. xiii. C.

x. t. x. a. y. t. xi. t. ii. o. Q.

z. t. ii. R.

## De Musculo Volæ manus membranam constituyente.

## Cap. 27.

**V**ola manus neruosam tenuemque sibi membranam vendicat, ex <sup>a</sup> muscoli tendine productam, qui <sup>b</sup> tereti, ac neruoso principio, ex interiori osis humeri capite producitur, atque ilicō carnosus crassiorque redditus, talis ad dimidiam circiter vlnam prorepat, vbi denuo gracilescit, in tenuem ac latiusculum desinens tendinem, qui sensim ac sensim ad manus vsque volam ampliatur, vbi per omnem eam porrigitur, (præterquam in musculosam pollicis substantiam, & in eam, quæ paruum respicit digitum) ad extremam vsque digitorum aciem; in quam veluti deperditus delinit, in internam cuiuslibet eorum lateris regionem. Membrana hæc adipis, aut carnis, (vt dissectionis professores communiter appellant) inter eam & cutem repositæ interuentu, cuti adnascitur. Estque illud minimē prætereundum, in hominum nonnullis musculus hunc desiderari, in quibus hæc manus membrana ex duorum musculorum brachiale flectentium tendinibus interdum producitur, qui vnā coeunt, latefcere incipiunt, antequam ad brachiale pertingant; interdum verò ex vinculo enascitur, internæ brachialis sedi transuersim obducto. Cæterum membrana hæc, vt manus vola depilis existat, vt multi existimarunt, neutiquam in causa est; siquidem & musculosa pollicis caro, & ea in manu, quæ paruo digito respondet, & digitorum latera, in quibus membrana eiusmodi deest, glabra etiam existunt. Neque verò, exquisitiorem huic parti sensum largiri, præcipuum est ipsius munus; sed tutiorem duntaxat, ac firmiorem compræhensionem manui comparat. Quam etiam ob rem, plurimis eam neruis præditam esse oportuit, à quibus exactiorem tactus sensum nancisceretur, quemadmodum copiosius suo loco disceremus. Ad externum principij huiusce membranæ latus, <sup>c</sup> exiguus admodum musculus, quadratus vt plurimum comperitur, de quo ne verbum quidem Vesalius; is ab <sup>d</sup> eo musculo, qui paruum digitum à cæteris abducit, exoritur, & in externum membranæ huius latus, ab eius exortu ad mediam circiter volam inferitur. Estque ipsius officium, membranam hanc, quum manus volam explicamus extendere,

a. t. i. x. K. t. ii.

b. t. iii. Y. ta. iii. a.

b. t. iii. Y.

Tendinis volæ manus officium.

Alter membranæ huius extensor musculus.

c. t. iii. q. d. t. iii. f.

De Carnea substantia, ad internam manus regionem  
occurrente. Cap. 28.

**A**D internam manus regionem per vniuersam quatuor digitorum longitudinem, ac secundum, tertiumq; pollicis articulum, & horum digitorum pulpas, Monticulos Chiromanticis dictas, necnon ad volæ medium, corpus quoddam reperitur, quod in ea parte, cui prædicta membrana obtenditur, inter ipsam & cutem ferè vniuersum reponitur. Id carneum exactè non est, vt musculorum corpora, sed cerebri, nervosiusq; adipis modo albicat, multis nervuorum capitibus, & venis quibusdam restructum, quæ ipsum veluti ex carne adipeq; conglomeratum videri efficiunt. Ac pavimenti stratiue instar huiusce nervis subternitur, quorum vi interior manus facies vniuersa sensu adeò exquisito pollet; In id etiam secundario deseruit, ne tendines digitorum flexionis auctores, vola nobis validè percutientibus, contundantur. Ad digitorum præterea æqualitatem comparandam, vacuis ossium repletis, non parum confert, quod quidem, ad exactionem manus contactam, plurimum habet momenti.

De musculis manus digitos, mouentibus. Cap. 29.

a. l. iij. β. t. v.  
b. iij. t. vi. ff.  
vi. s.  
c. t. iij. Y.  
d. ead. X. Z.  
e. t. iij. y. t. v.  
i. t. vi. x. ta.  
vii. Q.

f. t. v. p. t. vi. s.

g. t. iij. β.

h. id clarius  
demonstrari  
nequit, quam  
vñ videre est i  
manu ta. iij.  
t. vi. γ.

K. t. vi. z. ta.  
vii. c.  
l. t. v. o.  
m. li. t. vi. ff.  
vi. s.  
n. li. t. vi. ff.  
vii. c.

o. t. vii. v.

**M**ANUS digitorum motus musculi octo & viginti absoluunt. Quorum <sup>a</sup> primus <sup>Primus digitos mouens musculus.</sup> tereti, grandiq; ac modicè nervoso principio, <sup>b</sup> ab interna interioris capitis humeri sede producitur, sub <sup>c</sup> muscoli capite, quem volæ membranam proferre diximus, ex <sup>d</sup> duobus præterea nianum flectentibus musculis, atque ex <sup>e</sup> superiore duorum illorum, quibus radius deorsum nonnihil in priora flectitur. Atq; inde deorsum, amplior euadens, ad vlnæ radij; medium leuiter vtrisque adhærens perrepat, moxq; decliuus, exactè iam carnosus ac teres, sed in amplitudinem nonnihil depressus, ad brachiale circiter fertur. Verum multò antè quàm ad ipsum pertingat, in <sup>f</sup> quatuor carnosas partes dirimitur, quarum vnaquæque tenuior nervosiorq; redditur, dum in teretem desinat tendinem; simulq; omnes lubrica membrana inuoluuntur, ac <sup>g</sup> valido illo ligamento subrenduntur, anulo interna parte simili, quod à processu quinti ossis brachialis ad octauum processum transversum tendere diximus. Transacto brachiali, inuicem abscedunt, sicq; procedentes, secunda digitorum ossa, in quæ inferuntur, adeunt, latiores, tenuioresq; redditæ, & per omnem ipsorum longitudinem porrectæ. Dum verò primum digitorum os perrepat, transuerso inuoluuntur <sup>h</sup> ligamento, quod ab altero ossis latere productum, in alterum inferitur, ac ponticulum siue canalem effingit, sub quo tutò deducuntur, nuspiam adhærentes, vnà cum alijs <sup>i</sup> quas pariter sub ipsis ferri dicemus, in nullam partem declinantes. Tendines hi primi huiusce musculi, priusquam ad secundum digitorum os pertingant, dirimuntur, ac per ipsorum <sup>j</sup> imam sequentis musculi tendo transmittitur, Musculi huius est, secundum quatuor digitorum os recta versus brachiale flectere, vbi tendines connectuntur. Illud autem minimè ignorandum est, quod quemadmodum parui digiti os cæteris aliorum digitorum ossibus minus existit, sic quoq; tendo in ipsum insertus tenuior est, vt & <sup>k</sup> secundus musculus <sup>Secundus musculus, secundus pollicis articuli flexor.</sup> primò substernitur, <sup>l</sup> quam sui principij portionem ab <sup>m</sup> interno humeri capite sub primi principio desumit; reliquum ipsius vniuersum ex radice anterioris vlnæ <sup>n</sup> processus enascitur, cuius interuentu humero articulatur. Et vbi ex hac parte prodit, exactè carnosus, teresque vt primus efficitur, & ad brachij medium inter cubitum, ac manum perrepat, vlnæ in transitu firmiter adnatus, non procul à sede, vnde <sup>o</sup> membrana siue ligamentum exoritur, inter radium, & vlnam tota ferè longitudine consistens. Vbi autem paulò vltra medium cubiti longitudinis



pertingit, angustior nonnihil redditus, in P quatuor partes carnosas perinde p. r. vi. a.  
 ac primus, diuiditur, quæ ante brachiale in quatuor abeunt nervosos tendines, tan-  
 to primi musculi tendinibus crassiores, quanto secundus hic musculus primum  
 crassitie antecellit. Tendines hi perquam humida & lubrica membrana, cæteris-  
 que omnibus rubicundiori obuoluntur, cuius auxilio inuicem coherent; sicque  
 sub primi tendinibus, pertransuersum internæ brachialis sedis q ligamentum, in ma q. ciii. a.  
 nus volam contendunt, atque ibi æquè inuicem abscedunt, perinde ac de primi ten-  
 dinibus diximus, teretesque redditi, singuli pariter sub primi musculi tendinibus, in  
 suum digitum excurrant. Et per omnem primi ossis longitudinem, primi & secun-  
 di musculi tendines communi vinculo deuinciuntur: At priusquam ad secundum  
 os pertingant, in quod primi tendines, paulò latiores redditi adiguntur, operæpre-  
 cium fuit, ut secundi huius musculi tendinibus aditus pateret, primi tendines r. dis-  
 findi, ut diximus, mirabile prodescentes artificium, sicque per ipsorum medium secun-  
 di musculi tendines erumpunt, ad tertium digitorum os, in quod inferuntur, prope-  
 tentes. & quemadmodum in brachiali, & primo digitorum osse, sub ligamento de-  
 ducebantur, haud secus quoque qui per secundum os deferuntur, sub consimili alio  
 ligamento contendunt, quod toti internæ digitorum fedi obtenditur, tendinibus  
 nullatenus affixum, secus quam in vola manus, vbi singuli tendines propria mem-  
 brana, nervosis quibusdam fibris, ipsis connata, includuntur. Musculi huius inter est,  
 tertium quatuor digitorum articulum inflectere. <sup>s</sup> Tertius musculus, meo quidem  
 iudicio, admodum à secundo distinguitur; non ideo tamen, quin secundi pars con-  
 numeretur, cuiquam renitor; ut neque obsto, quò minus secundum hunc in quin-  
 que partes carnosas, & consequenter in quinque tendines diffusum pronuntient;  
 dummodo tertium appellare per eos mihi liceat. Prodit igitur musculus hic carnosus  
 teretique principio, ex vlnæ radio <sup>t</sup> abscedit, iuxta vlnæ sinum, in  
 quem radij caput excipitur; ac dein radio attenditur, ex vniuersa ipsius longitudine  
 semper enatus, atque ex ea potissimum sede, vbi nervosum <sup>u</sup> ligamentum secundum  
 cubiti longitudinem porrectum, ex radio incipiens, enascitur; ex quo ligamēto mus-  
 culus etiam is principij sui portionem assumit. Atque in hunc modum ad brachia-  
 le contendit, elatiori secus adi musculi lateri semper attentus, nunquam interim ali-  
 ter illi connatus (præterquam iuxta cubiti articulum) quàm musculi mutuo com-  
 mitteri soleant. Vbi autem ad brachiale pertingit, in teretem protinus abit <sup>x</sup> redinem  
 lubrica obductum membrana, ab ea dissimili, quæ inibi secundi musculi <sup>y</sup> tendines  
 inuestit. Quineriam subtransuerso <sup>z</sup> brachialis ligamento defertur, ac sub illo quod  
 ad pollicis radicem consistit; qua in parte brachiali os, pollicem sustinent, sinu ad id  
 requisito donari tradidimus, ad quem tendo reflexus, mediusque inter <sup>a</sup> tendines  
 primum pollicis os, & secundum flectentes, occultatus, ad secundum digiti os pertin-  
 git, vbi transuerso ligamento in tota secundi ossis longitudine exceptus, ad tertium  
 os accedit, cui paululum latefcens validè inferitur. Musculi huius officium est, ter-  
 tium pollicis articulum flectere. Tres hosce musculos tredecim alij subsequuntur,  
 singulis nempe primis digitorum omnium articulis bini, secundo vero pollicis ar-  
 ticulo terni deferuientes. Eorum qui primis famulantur articulis, ij quos quatuor  
 digiti sibi uendicant, <sup>b</sup> omnino carnei sunt, & rectà secundum minus longitudinē  
 tendunt, postbrachialis ossibus connascentes, donec ad digitos pertingunt, vbi pri-  
 morum in digitis ossium lateribus inferuntur. Duorum verò paruo digito inseruien-  
 tium, <sup>c</sup> alter ex elatiori sede externi lateris ossis postbrachialis eundem digitum su-  
 stinentis, carnosus principio exoritur, quo brachiali etiam nonnihil connascitur; ac  
 inde rectà carnosus semper permanens, primum adit digiti os, vbi in latiusculum  
 conuertitur tendinem, quo exteriori principij ossis lateri, paululum versus interiora  
 inferitur. <sup>d</sup> Alter ab interno eiusdē ossis latere iuxta brachiale principium desumit,  
 & hinc inter os id, ac sibi proximum, carnosus vsque permanens ad primū parui di-  
 giti os contendit, cuius interno lateri, in tenuem commutatus membranam, implan-  
 tatur, Vbi duo hi musculi æqualem præstant operam, paruus digitus rectà flectitur;  
 altero autem seorsum laborante, obliquè nonnihil in trahentis, latus adducitur. Et  
 quod

*Spiritus officium.  
Tertius muscu-  
lus.*

*x in manibus  
l.iii. & v.*

*s t. vi. a. r. v. p.  
t. vi. ob. cab.  
vi. z.*

*t. li. ra. vi. a.  
vii. lb.*

*u. l.iii. a.*

*x t. vi. a.  
y ead. z.  
z t. iii. b.*

*a t. vi. x. a. ta.  
vii. 1. 2. j.*

*Tertij musculi  
officium.  
Tredecim alij  
musculi.*

*Prior musculus  
paruo digito in-  
seruiens.*

*Alter.*

*b t. viii. iuxta  
a.*

*c l.iii. z.*

*d ead. iuxta z.*

quod de duobus hisce musculis prodidimus, idem quoque de subsequenter alijs inter postbrachialis ossa repositus, intelligi volumus; ita vt inter singula duo ossa binus musculus consistant, & <sup>e</sup> is, qui indicis interiori lateri inferitur, interno postbrachialis ossis indicem sustinentis lateri adnascatur, in volam magis quam in externam manus regionem, vt & ceteri primos articulos flectentes musculi, protuberans. Musculi huiusmodi octo sunt, & cum tribus enumeratis vnde decem; sequitur duodecimus, <sup>f</sup> qui ex superiori transuersi brachialis ligamenti sede principio carnosum exoritur, & toti primi pollicis ossis longitudini interna regione attensus. perpetuo carneus illi ferè vniuersus inferitur, perquam obscure secundo articulo cennatus. Is primi pollicis internodij flexor existit. <sup>g</sup> Tertiusdecimus huic subiicitur ipso minor, atque ex eodem transuerso brachialis ligamento, & ex brachialis quoque osse primum pollicis os sustinente producit, non vltra medium porrectus. Huius interest, digitum hunc à reliquis diducere, primumque ipse internodium flectere. Ceterum musculus is vnà cum prius enarrato, ad pollicis radicem, carnem molem constituit, quam Chiromantici montem Veneris, siue Martis appellant. <sup>h</sup> Decimus quartus, decimus quintus, & decimus sextus, magis differentem situm ab illis, qui quatuor digitorum prima ossa flectunt, quam duo pollicis ossis flexus opifices, obtinent, nam qui quatuor digitorum motui præfunt, recta secundum manus longitudinem situantur; qui verò primum pollicis os inflectunt nonnihil oblique procedunt, sed transuerso quodammodo situ locantur. Omnes enim è vola manus exoritur paululum vltra circulum, quem linea, pollicis volam ambiens, Chiromanticis Vitalis appellata, constituit. <sup>i</sup> Primus quidem ipsorum laterum, & modicè obliquum principium sortitur, ex osse postbrachialis medium digitum sustinente, paulò infra ipsius capitulum in sinulum primi eiusdem digiti ossis insertum; posteaque carnosus, & paulò angustior redditus, tantisper assurgit, dum membraneo tendine, secundi pollicis ossis lateri, indicem spectanti, paulo magis introrsum, quam extrorsum applantetur. <sup>k</sup> Secundus huic contiguus exoritur, versus brachiale properans, tenui, nervoso, latoque principio ex medio eiusdem ossis, quod primo exortum porrigit, suæ quoque originis portione aliquam ex postbrachialis osse, cui parvus innititur digitus, assumens; & hinc carnosus extemplo redditus, in medio interioris partis secundi ossis pollicis insertionem molitur. <sup>l</sup> Tertius huic assidet, ad inferius latus, & à postbrachialis ossis anularem sustentis radice, quæ brachiali coarctatur, originem pariter latiusculam desumit. & inde oblique ad pollicem tendit, dum interno lateri secundi pollicis ossis, nonnihil versus priora implâctetur. Tres isti musculi dum vnà omnes contrahuntur, secundum pollicis internodium validissimè flectunt; vbi primus duntaxat laborat, sursum nonnihil versus indicem pollex adducitur; Vbi secundus, ad medios agitur digitos; Vbi tertius, versus paruum digitum flexionem experitur: Tres ergo hi musculi vnà cum tredecim enarratis, sedecim sunt, quibus omnibus, vt diximus, digitorum flexio concedita est. <sup>m</sup> Decimus in ordine septimus, digitos verò flectentium primus, ex <sup>n</sup> eminentiori externi humeri capitis regione, principio ex carnea, nerueaque substantia mixto, & vtruncq; lato emanat; indeque gradatim, carneus, ac propemodum teres per mediam cubiti sedem, inter vnam ac radium deorsum porrigitur, dum ad finem minoris processus brachialis pertingat; vbi angustior redditus, <sup>o</sup> in tres ferè, raroque in quatuor carnosas, ac breues portiones finditur, non admodum seiunctas, communique membrana obductas, & fibris quibusdā nervosis, ac tensibus coherentes. Simulatque verò hæc à musculi ventre diducuntur, singulæ in tendinem degenerant, & simul omnes <sup>p</sup> sinum subeunt, in exteriori radij sede insculptum, iuxta ipsius cum vna articulum; qua in parte omnes hi tendines transuerso ligamento, in id priuatim parato inuoluuntur. Vbi ligamentum id perrepere, brachiali occurrunt, protinusque ampliantur, ac inuicem æquè abscedunt, sicque magis semper femoti reptantes, quatuor adeunt digitos, vbi longè ampliores, tenuioresque redditæ, in radicem primi cuiuslibet digitorum ossis implantantur, atque ita per omnem ossium longitudinem porriguntur. Ex hisce tendinibus tres vltimum tribus implantantur digitis, & perquam raro tendinem vllum, ad paruum digitum

*Musculi sex vbi  
bus digitis infer  
uientes.*

*Musculi duo pri  
mum pollicis ar  
ticulum flecten  
tes.*

*Tres secundum  
flectentes.*

*Decimus quar  
tus musculi ma  
nus digitos mo  
uens.*

*Decimus quin  
tus.*

*Decimus septi  
mus.*

q. viii. Y.

f. vi. a. t. iiii. i.

g. vi. a. t. vii. 2.

h. ta. vii. xiii. 1. 2. 3. ca. viii. Y.

i. vii. i.

k. vii. 2.

l. ead. 3.

m. tii. v. tix. a. t. x. f. o. lii. t. vi. fi. vi. P.

n. tix. b.

p. lii. ta. vi. fi. viii. 2.

digitum se conferre obseruau. Quomodo autem tendines hi in digitis, aliorum musculorum tendinibus implicentur, tunc opportunè docebimus, cum musculos, quatuor digitos à pollice deducentes prosequemur. <sup>q</sup> Decimus octauus admodum tenuis & longus est, & inferiori decimi septimi lateri, per omnem cubiti longitudinem cohaerescit, proditque ab externo humeri capite inter decimi septimi, & <sup>r</sup> alterius musculi principia, quem postbrachialis ossis, paruum digitum sustinenti <sup>s</sup> applantari, ac brachiale extendere dicemus. Musculus is, ubi ad brachiale peruenit, in duos finditur tendines, qui communi vlnæ ac radij <sup>t</sup> sinu deferuntur, ipsorumque <sup>u</sup> ligamentis inuoluuntur, donec brachiale superent, tumque illic ut plurimum seiunguntur, alterque paruum, alter anularem digitum adeunt, singuli in externum latus, primi ossis sui digiti, non nihil versus posteriora conferti, tenui ac lato instar membranæ extremo; quamuis interdum paruum digitum utrique petant. Musculo huic duos hosce digitos à reliquis amouendi officium Galenus adscribit; mihi autem secus videtur, cum rectum obtineat situm, imò ipsorum extensionis opificem esse reor. A posteriori vlnæ processu posteriori humeri sedi articulo, ad usque ferè brachiale, musculi tres continuata serie nascuntur, transuerso omnes situ positi. Eorum <sup>x</sup> primus, & <sup>t.x.ii.</sup> qui decimus nonus in ordine habetur, ex vlna educitur, post ipsius medium versus brachiale, lato & carnoso principio, deinde angustior paulò redditur, & versus radij appendicem assurgens, non procul à brachiali, in <sup>y</sup> duas carnosas portiones dirimitur, duos distinctos musculos constituentes, quarum inferior decimum nonum efformat, è superiori vigesimum primum produci dicemus. Et licet duo hi musculi indè obtineant principium, eos tamen, clarioris doctrinæ gratia distinguere libuit. Qui vnus loco enumerare volet, integrum ipsi esto. Musculus igitur hic decimus nonus, hunc in modum enatus, ad radij vsque appendicem transuersim cõscendit; priusquam verò ipsum contingat, in <sup>z</sup> duos seiungitur tendines, qui simul cohaerent, & ligamento in id comparato deuincti, sinu deferuntur in radij appendice ipso, eorum nomine priuatim exculpto. Hac transacta sede, tendines hi mutuo statim abscedunt, ac superior quidem indicem, inferior vero medium digitum adit, amboque in externum latus priorum ossium horum digitorum adiguntur, non nihil versus posteriora; interdum verò utrique tendines in indicem inferuntur. Estque illud notatu dignum, quod decimi septimi, decimi octauus, ac decimi noni musculorum tendines, quomuis ferè dictum obseruent ordinem, sæpius tamen ampliuntur, & in plures ramulos dirimuntur, dum alterius digiti tendo ramunculum vicissim in alium effundit, sese diuersimodè nullo seruato ordine implicantes. Decimo huic nono musculo muneris id conceditur est, ut pollicem ceteris digitis adducat, indicem verò, ac medium à pollice abducatur, quemadmodum transuersus ipsorum situs nec non tendinum intertextus docent. <sup>a</sup> Vigesimus admodum brevis est ac validus, & carnoso principio ex quarto postbrachialis ossis iuxta brachiale producit, sicque per externum eiusdem ossis latus non nihil versus internam volæ regionem descendit, & muris imaginem exprimit, in externum primi ossis parui digiti latus, tenuem neruofamque intersectionem molitur, paruum digitum à ceteris abducens. <sup>b</sup> Vigesimus primus, portio illa est, quam à <sup>c</sup> decimo nono seiuncta esse retulimus, proditque ex media vlnæ longitudine ad externam ipsius sedem, iuxta ligamentum membranæ ve inter vlnam ac radium consistentem, & obliquè uti diximus, radium versus properat. Sed priusquam ipsius appendicem brachiali proximam contingat, in terebrem propemodum tendinem ut plurimum degenerat, qui ligamento eo inuoluitur, quo <sup>d</sup> quarti musculi tendinem, brachiale extendentem deuinciri diximus, & eodè quo prædictus tendo, <sup>e</sup> sinu deductus, illico ampliatur, ubi ab ipso emerit, totius pollicis longitudini, ad latus indicem respiciens insertus, <sup>f</sup> Vigesimus secundus musculus lato principio ex vlna, paulo altius prædicto exoritur, & super radium obliquè descendit, § quarto musculo, quo manus mouetur, instratus. Simulatque verò prædictum contingit musculum, in <sup>h</sup> duas inæquales portiones dirimur, mutuo accumbentium muscularum ritu, inuicem hærentes. Superior pars aliquandiu carnosa permanet, ac deinde in terebrem quodammodo tendinem commutatur, in externam ossis

Decimus octauus.

ta.ii.X.ta.  
ix.θ.t.x.r.  
t.ix.a.  
s.cad.d.t.lii.ta.vi.fi.  
vii.θ.  
u.t.ii.i.

Decimus nonus.

x.t.x.ii.

t.x.op.

z.t.x.pq.

Vigesimus.

a.t.iii.q.iiii.  
a.t.ix.b.

Vigesimus primus.

b.t.ii.d.t.ii.e.  
t.ix.ft.x.θ.  
t.xi.u.  
c.t.a.p.

Vigesimus secundus.

d.t.x.i.a.i.  
e.lii.ta.vi.fi.  
viii.θ.  
f.t.x.xi.z.g.ta.xi.a.ta.  
iii.c.t.ix.c.  
h.t.ii.c.b.ta.  
x.k.i.

osis brachialis sedem, quo pollex innitur, insertum. Inferior in priora itidē non-  
 nihil proripit, inque duas carnosas<sup>1</sup> partes ilicō diffunditur, in duos abeuntes tēdi-  
 nes, qui vnā cum<sup>k</sup> superioris partis tendine, paruo<sup>l</sup> sinu deferuntur in radij appen-  
 dice insculpto, <sup>m</sup> communi omnes obducti ligamento. Transacto brachiali, alter  
 inferioris huiusce partis tendo, in primi osis pollicis radicem implantatur, ad latus  
 ipsius externum; alter verō vniuersæ pollicis longitudini attenditur, lata tenuique  
 membrana ipsi cohærens, & in internum digiti huiusce latus, à secundi osis radice,  
 ad tertij vsque extremum priuatim insertus. Huiusce duntaxat tendinis veteres me-  
 minerunt, & proinde muscūlū vnius tātum vice connumerarunt. Alij verō non-  
 nulli cū in duos ipsum tendines diffindi conspexissent, alterum brachiali, alterum  
 pollici confertum, muscūlū quoque in duos distinxere. Qua quidem ratione inte-  
 grum mihi esset, in tres ipsum partiri, quandoquidem tres sibi tendines vendicat,  
 diuersas partes diuerso tempore mouentes: verū quia sic ansum multis porrigerē,  
 digitorum musculos pro tendinum, in quos terminantur, numero, recensendi, vt  
 vnius vice referatur, quemadmodum apud priores factum est, satius esse duco, mini-  
 mē interim follicitus, si à Vesalio hac in re discessero, qui vt musculos, quibus digiti  
 sciunguntur, ab alijs distingueret, summa ratione in duos ipsum dirempsit. Præci-  
 puum musculi huius, ac vigesimi primi officium est, vt pollicem vnā laborantes ex-  
 tendant; idem & singuli seorsum contracti, præstant, sed vigesimus secundus digi-  
 tum hunc à reliquis paululum deducit, vigesimus verō primus pollicis adducit; adeo  
 vt & in digitis extendentium, & ad latera mouentium numerum referri queat. Vi-  
 gesimus secundus insuper attollendo brachiali sui tendinisui, in ipsum inserti, opi-  
 tularur, ideoq; inter ipsius etiam motores, vt inferius dicemus, connumerari posset.  
 Cæterum sex alijs lateralibus digitorum motibus famulantes enumerandi supersunt,  
 quorum duo pollicis, reliqui alijs digitis inseruiunt. Duorum<sup>n</sup> prior, vigesimus in  
 ordine tertius, ex interna osis brachialis pollicem suffulciētis regione, nerueus exor-  
 titur, & carnosus ilico effectus ad insertionem properat, quam in secundum pollicis  
 os, tenuis latæque membranæ auxilio molitur. Musculus is vnā cum<sup>o</sup> duobus pri-  
 mum pollicis internodium flectentibus, quibus iste infertur, carnosam volæ par-  
 tem efformat, quæ ad pollicis radicem consistit. Pollicem is vigesimi primi ope adiu-  
 tus, ab indice remouet: & solus inter manus cubitiq; motores, huiusce; quod ob  
 crassam admodum membranam ipsi obductā euenit. P Alter pollicis deferuiens mu-  
 sculus, vigesimo quarto loco in ordine positus, ex interna sede osis postbrachialis  
 quo index sulcitur, carnem desumit originem, secundum omnem osis longitudi-  
 nem porrectam; & carneo extremo in externum omne primi osis pollicis latus adi-  
 gitur, simulque tenuem, ac latum tendinem, secundi osis radici porrigit. Musculi  
 huius fibræ transuersæ quodammodò sunt, & à brachiali ad pollicem properant; vn-  
 de musculus hic, vigesimi primi ope accedente, pollicem indici admouet. q Vigesi-  
 mus quintus, vigesimus sextus, vigesimus septimus, & vigesimus octauus, quatuor  
 digitos pollicis adducentes, & ipsorū extensioni opitulantes, tenues & carnosi sunt,  
 singulis quatuor secundi musculi tendinibus, qui quatuor digitorum tertium os fle-  
 ctunt, singuli exporrecti, & ex membrana prædictos tendines deuinciente nati: cū  
 verò sinū perreptant, quem in interna brachialis sede insculpi diximus, sub transuer-  
 so ipsius ligamento, singuli interno horum tendinum lateri attēsi procedunt, dum  
 in internam digitorum radicem inferantur, sursum, donec tendinibus digitos exten-  
 dentibus applicentur, ascendentes. Id quoque peculiare præsentibus musculis, vt &  
 oculos mouentibus obtigit, vt ex nullo osse prodeant. Musculi ergo motus digito-  
 rum opifices, in vniuersum octo & viginti exurgunt, quorum quatuor extensionis,  
 sedecim collectionis, octo lateralis ipsorum motus auctores existunt.

*Vigesimus quartus.*

*Vigesimus tertius.*

*Vigesimus quartus.*

*Vigesimus quintus, sextus, septimus, & octauus.*

*De Musculis manum super Brachiale mouentibus. Cap. 30.*

**M**Anum, musculi quatuor motu cient. Quorum<sup>a</sup> primus inferiori<sup>b</sup> musculo-  
 rum lateri, qui à cubito exort, ad digitos flectendos proripunt, cohærescit:  
 & ab

*Primus manuum mouentium trita-  
 sculus.*

i. t. x. l. m. t. x. l.  
 q. r.  
 x. t. x. k.  
 l. l. i. t. a. v. i. f.  
 v. i. i. i.  
 m. l. i. i. i. b.

a. l. i. i. i. l. l. i. i. i.  
 p.

o. l. v. i. a. a.

p. t. i. i. d. t. a. i. x.  
 g. t. x. t. t. x. i.  
 s. t. x. i. i. n.

q. t. x. o. u. t. a.  
 v. i. i. i. v.

a. l. i. i. i. z. t. i. i.  
 a. l. i. i. i. z. t. a.  
 v. i. i. x. z.  
 b. l. i. i. i. z. t. v.  
 o.

& ab interiori humeri <sup>c</sup> capite iuxta cubitum, ex carnea neruæque substantia mixtum assumit principium; ac postea deorsum tendit, toti interno vlnæ lateri, & medio propemodum inferioris, quo scribentes innitimur, secundum vlnæ longitudinem adnatus, cui firmiter, potissimum ad superiorem partem iuxta cubitum, adhaeret. Ad vlnæ autem finem, paulò ante brachiale pertingens, in <sup>d</sup> validû & quodammodo teretem abit tendinem, qui vnâ cum carnosus quibusdam fibris ad brachiale vsq; procedit, ac dein neruus omnino redditur, <sup>e</sup> quarto brachialis & primo postbrachialis ossi validissimè implantatus. Musculi huius tendo peculiare ligamentum, quod ipsi transuersim, dum brachiale permeat, obducatur, nullum obtinet, sed communi omnium musculorum membrana inuoluitur, quam inter ligamenta cubitum inter ac manum posita recensebimus, quòd brachiale cubito valide connectat. <sup>f</sup> Secundus musculus ab interiori quoque humeri tubere cubito proximo exoritur, non procul à prædicto musculo, & g illo, quem volæ manus membranam proferre diximus: & inde subobliquo incessu, ad elatius <sup>h</sup> primi digitorum flectentis musculi latus contendit, magna ipsi ex parte subtensus & radio cohærescens. Priusquam verò brachiale contingat, in <sup>i</sup> teretem abit tendinem, qui brachiali iuxta pollicis radicem inferi videtur, quòd illi <sup>k</sup> musculus pollicem ab indice abducens, vnâ cū duobus primum pollicis internodium flectentibus, obtendatur. Musculus autem, istis ablatis, per internam brachialis regionem ad os vsque postbrachialis, indicem sustinens euidenter tendere conspicitur, in cuius radicem latior euadens, ac transuerso brachialis <sup>l</sup> vinculo firmiter, ac in parte connatus inseritur. Duobus <sup>m</sup> hisce musculis internam faciem occupantibus, totidem alij ad externâ positi respondent. Quorum prior, qui tertium in ordine tenet locum, ab exterioris humeri <sup>n</sup> tuberis radice principium desumit, iuxta eius <sup>o</sup> musculi caput, quem parui digiti extensionis autorem facimus, inter quoscumque ab hoc tubere prodeuntes musculos, proximam vlnæ sedem obtinens, vnde etiam & ex posteriori vlnæ processu, quem humeri summum dicimus, exortus portionem assumit. Hinc humiliorem exterioremque vlnæ regionem amplexatur, inter <sup>p</sup> primum brachiale mouentium, & eum qui paruum digitum extendit, vsque ad brachiale ferè porrectus; vbi in <sup>q</sup> teretem vertitur tendinè, qui sinu in vlnæ appendice insculpto deuehitur, iuxta internum sui <sup>r</sup> processus stylium referentis latus, <sup>s</sup> transuerso ligamento deuinctus, quod solum inter propria vlnæ ligamenta referemus. Quo ligamento superato, brachiale descendit, latior deinceps euadens, quousque procul admodum à brachiali, in os postbrachialis, quo paruum sulcitur digitus, inseratur. <sup>t</sup> Exterior alter, ordine quartus, latiusculo <sup>u</sup> principio ex humeri osse prorumpit, paulò supra exterius eiusdem ossis tuberculo cubito proximum, vbi acuta <sup>x</sup> linea humerum prominere diximus. Atque hinc carnosus euadens, radioque attentus, ad medium ferè ipsius contendit: vbi validum in tendinem degenerat, qui protinus <sup>y</sup> in duos alios partitur tendines, nonnihil tamen latiores quam profundus, qui haud effatu digno intervallo inuicem dissiit, recto tramite radio exporriguntur, ad ipsius appendicem brachiali proximam contententes, qua in parte, paulò magis inuicem abscedentes, <sup>z</sup> sinu ambo deferuntur, hoc nomine in dicta appendice insculpto, sub eo ligamento quod musculû pariter amplexatur, <sup>a</sup> quo pollex versus indicem adigitur. Vbi vinculum id superarunt, paulò magis distantes, alter in postbrachialis os, quo index inniuitur; alter ei quod medium sustinet, insertionem moliantur. Præcipuum quatuor horum musculorum munus est, nò, vt Vesalius inquit, brachiale præfertim extendere, flectereque, quandoquidem in ipsum minimè desinunt; sed priores duo, manus potissimum, in quam inferuntur, & consequenter brachialis flexioni famulantur; posteriores autem duo extensioni; rectè quidem si æquè ambo laborent; sin verò singuli seorsum contrahantur, idem quoque præstant, sed in trahentis latus magis agunt. Huic quoque superpetas fert, ea <sup>b</sup> vigesimi tertij musculi digitos mouentium pars, quam brachialis ossi pollicem sustinenti applantari diximus. Quinetiam quatuor istdem musculis, manus & brachiale laterali quoque motu cidentur. Si enim interior musculus & exterior pollicem respiciens, reliquis duobus laxatis contrahantur, manus inrorsum agitur; at si his laxatis alij

Secundus manus flexor musculus.

Tertius.

Quartus.

Ipsorum manus.

c. li. l. vii. f.

vi. s.

d. lii. f.

e. li. l. vi. f.

viii. 4.

f. t. i. a. t. ii. g.

t. iii. x. t. iii. e.

g. t. iii. y.

h. t. iii. f.

i. t. iii. s.

x. ead. i.

l. t. iii. f.

m. t. ii. y. t. ix.

n. t. x. q.

o. li. l. vi. f.

p. t. ix. e.

q. t. x. xii. a.

r. t. ix. d.

s. li. l. vi. f.

t. vii. R.

u. t. ii. z.

t. t. i. c. t. ii. T.

t. iii. b. t. ix. y.

t. x. f. t. xi. a.

t. xii. o.

u. t. xi. i.

x. li. l. vi. f.

vi. Q.

y. t. i. K.

z. li. l. vi. f.

vi. s. z.

a. t. x. o.

b. t. ii. b. t. x. K.



alii duo, qui minimum respiciunt digitum, in se colligantur, extrorsum manus refle-  
ctitur. Hi præterea muscoli, manū quoque, (quamuis inficias eat Vefalius) in pro-  
num ac supinum agunt, alius post alium seriatim contracti, quemadmodum de  
oculi musculus retulimus.

*De Musculis Radium sursum, deorsumq; agenibus. Cap. 31.*

**C** Vi, radij ad humerum articulationis ratio, <sup>a</sup> superiore libro tradita, non ex-  
cidit, is facile intelligit, qua ratione radius, vlna interim atque humero quie-  
scentibus, in pronom supinumque circunducatur, vtque ad ipsius motum manusto-  
ria moueatur. Hos ergo radii motus musculi quatuor absolunt, duo quidem supe-  
riori extremo iuxta cubitum, duo autem inferiori iuxta brachiale inferuientes; at-  
que ex omnibus duo internam, duo externam cubiti sedem occupant; interiores  
cam in pronom, exteriores in supinum agunt. Interiorum <sup>b</sup> prior, iuxta brachiale *Primus*.  
positus, carnosus omnino est, & ad externum vlnæ latus secundum ipsius longitu-  
dinem lato principio enascitur, in internum radij latus transuersim porrectus, cui  
fine principio simili conferitur. Præteris musculus quadratus est, æqualia obtinens  
latera, in medio, quam lateribus paulò crassior, & puluinaris instar transcendentibus  
ad flectendos digitos <sup>c</sup> tendinibus substratus. Ipsiūs fibræ à principio ad finem  
rectà cõtendunt, & proinde ad eas attinet, radij parte, quæ brachiale spectat, intror-  
sum retracta, radium ipsum in pronom adigere. Exteriorum <sup>d</sup> prior, & radium mo-  
uentium secundus, à priore differt situ, figura, & magnitudine: ab externo enim  
humeri latere, paulò superius <sup>e</sup> quarto manum extendente, ad quartam ferè ossis  
partem, lato & carnosio principio enascitur; atque inde latior, & validior euadens,  
deorsum fertur, externo lateri prædicti quarti musculi brachiale extendentis adhæ-  
rens. Simul atque autem ad radij extremum iuxta brachiale processit, <sup>f</sup> in tendinem  
abit membranæ instar latum, cuius interuentu radij appendicis <sup>g</sup> superiori regioni  
appantatur, introrsum nonnihil porrectus. Huius est, humiliores radij partem  
brachiali proximam extrorsum trahere, & cõsequenter radium vniuersum conuel-  
lere. Superiorum <sup>h</sup> secundus, ordine tertius, ex interioris humeri tuberi radice, & *Tertius*.  
ex interiori vlnæ latere, quæ radio articulat, valido & carnosio <sup>i</sup> principio exori-  
tur, & hinc admodum <sup>k</sup> obliquè internum radij latus conscendens, carnea pariter  
insertione ipsi configitur, paulò ante ipsius medium. A carnosio huiusmodi extre-  
mo, neruosus aliud principium, ad medium vsque radij longitudinis porrectum  
educitur, radijque superiori regioni valdissimè inseritur, peculiarem inibi in radio  
asperitatem, cui firmetur, sibi vendicans. Musculus is radium introrsum ducens,  
ipsum in pronom vertit. <sup>m</sup> Quartus musculus, exteriorem sedem occupans, situque  
ac figura prædicto ferè assimili, ab <sup>n</sup> exteriori ligamenti regione cubiti articulum  
eiusdemque summitatem ambientis enascitur; & hinc in priora conscendit, dum  
radio <sup>o</sup> iuxta tertij finem, minùs neruosus latusque quam tertius inseratur. Ac duo  
quidem hi musculi, vt & primus, præ breuitate in tendinè minimè desinunt. *Quarto*  
huic musculo id muneris demandatum est, vt superiorem radij partem extror-  
sum obliquè conuellens, ipsum in supinum agat; adeo vt interiores sursum, exte-  
riores deorsum, ipsum ducant.

*De Vlnæ, Radij, ac Manus ligamentis. Cap. 32.*

**E**X cubiti ossium, & manus ligamentis, alia os ossi colligant; alia subditis corpo-  
ribus propugnaculi vice, & musculis quos obuincunt, pro amicti sunt; alia ten-  
dines amplexantur, atque ita ossibus committunt, vt nullo quantumuis ingenti co-  
nato, è loco dimoueri queant. De membranis quidem tendines obuincuntibus,  
cum musculos manuum motus opifices prosequeremur, seorsum egimus. <sup>a</sup> Quæ ve-  
rò ligamenta, obstaculi instar tendines intra suos fines continent, transuersim om-  
nia situantur, suntque copiosissima. Ac vnum quidem ipforū, interiorem omnem  
quatuor

*Varia ligamen-  
torum genera.*

*Quæ musculo-  
rum tendines am-  
plexantur.*

<sup>a</sup> multa ex hi  
sce vinculis  
prætenita  
in figuris  
conspici ne-  
queunt.



quatuor digitorum faciem occupat; & aliud huic simile, secundo pollicis interno-  
dio, & quasi etiam tertio exporrigitur. <sup>b</sup> In interna etiam brachialis regione aliud <sup>b</sup> t.iii.f.  
occurrit, à quarto ipsius ossis transuersum ad quintum porrectum, quod omnes mu-  
sculorum tendines amplexatur, atque hoc latum est, & ceterorum omnium validis-  
simum, sed nec cubitum, nec postbrachiale contingit. Huiusce generis transuersa  
sex ligamenta, in externa brachialis sede conspiciuntur, quibus tanquam anulis <sup>c</sup> omnia no-  
muntur in ta.  
ii. & iii. his  
numeris. 1. 2.  
3. 4. 5. 6.  
musculorum tendines digitos extendentes transmittuntur. Ligamenta hæc vniuersa,  
externa facie vnicum esse videntur, longum quidem illud, & totius cubiti longitu-  
dini expansum; at sedulo enumerata, sex veluti anuli sese offerunt, prædictis tendi-  
nibus continendis deferuentes, quo minus à sinibus, quibus deferuntur, aberrent.  
Horum primum ex vlna in radium procedit, & sinui utrisque <sup>d</sup> communi obrendi-  
tur, quo ut diximus, musculi tendines paruum digitum <sup>e</sup> extendentes vehuntur. Se-  
cundum ad externum primi lateris confistit; sed nihil præter vlnam occupat, ac ten-  
dinem <sup>f</sup> quarti musculi deserit, qui brachialis extensionis auctor existit. Tertium ad  
internum primi lateris repositum, radij duntaxat latitudinem occupat, eosque am-  
plectitur & tendines, qui trium digitorum extensionem moliuntur. Quartum ad in-  
ternum tertij lateris habetur, angustissimum efformans anulum, qui <sup>h</sup> tendinem tran-  
smittit, quo index, mediusque à pollice abducuntur. Quintum bicorni <sup>i</sup> tēdini quo  
manus extenditur, & <sup>k</sup> illi qui pollicem indici adducit, aditum præbet, quamvis in-  
terdum pollicis musculus peculiare ligamentum sibi vendicit, tumque ligamenta hæc  
septem exurgunt. Sextum <sup>l</sup> tribus tendinibus viam largitur, quorum primus brachia-  
lis ossi pollicem sustinenti, secundus primo pollicis ossi, tertius secundo & tertio in-  
feritur: Quin & tendines interdum hi, sua ligamenta singuli adipiscuntur. Præter  
hæc ligamenta, per vniuersam cubiti longitudinem, valida musculus obnascitur mem-  
brana, eos inuicem committens, atque ne sua sede dimoueantur, aut inter sese impli-  
centur continens, cuiusmodi etiam in crure aliam haberi dicemus, licet adeo præ il-  
la tenuem, ut à propria membrana musculus omnibus obducta, minimè distincta vi-  
deatur. Alia pariter habentur instar membranæ tenuia ligamenta, quæ articulos cir-  
cum circa complectuntur, communem naturam cum cæteris ligamentis quemvis  
articulum vincientibus adepta; atque omnia manus ossa colligant, quamvis nonni-  
hil inter ea discriminis intercedat; Quæ nanque digitorum ossa connectunt, tenuio-  
ra sunt, & articulum duntaxat amplexantur. Quæ verò postbrachiale brachiali col-  
ligant, validiora sunt, & penitus ab articulo ossa coarctant. Quæ postbrachialis ossa  
inuicem committunt, cartilaginis naturam sapiunt, nec ossa duntaxat orbiculatim  
ambiunt, verum etiam inter ossa atque os adiguntur. Quæ brachialis ossa copulant,  
per quam robusta sunt, & cartilaginis pariter naturam referunt, ac ossibus vndique  
obtenduntur, præterquam nonnullis, quibus media intercedunt, potissimum secun-  
di ordinis ossibus, quibus committuntur. Quæ vlnam radiumque brachiali iungunt,  
membranæ reliquorum articulorum ligamenti assimulantur; etsi ligamentum id,  
sub apicem processus styli imitantis, paulò durius efficitur; imò peculiare vide-  
tur ligamentum, propemodum teres, & in brachiali os, ipsi è regione positum in-  
feritur. Ligamenti huius usus, in hoc duntaxat articulo deinceps est. Quæ vlnam  
& radium, tum propter cubitum, tum propter brachiale inuicem committunt, ad-  
modum valida sunt, & ossium capita vndique amplexantur. <sup>m</sup> Ea etiam cum cartila-  
go nobis enumeranda relinquitur, quam à radio procedentem, inter ipsum & brachia-  
le reponi tradidimus, quæ ligamenti etiam functionem obit radium brachiali  
colligans. Superest & ligamentum, <sup>n</sup> quod spatium inter acutam vlnam ac radij lineam  
intercedens, opplet, validum quidem illud, tenue, atque neruosum, & fibras quas-  
dam obtinens, à radio in vlnam oblique deorsum reptantes. Id, præterquam quod  
interiores brachij musculos ab exterioribus dirimit, vlnam etiam & radium mutuo  
alligat, simulque <sup>o</sup> principij aliquot musculorum robur, ut diximus, adiungit. Huc  
quoque ligamentum pertinet, externo humeri ossis capiti radium committens, quod  
validum est, sed perinde ac ceterorum articulorum ligamenta, instar membranæ te-  
nuæ. Huc demum referenda veniunt ligamenta, eidem humero vlnam copulantis,  
quanuis

Quæ musculos  
operiunt.

Quæ ossa colligant.

Ligamentorum  
cubiti ossa colligantium discrimen.

d li. i. t. vi. f.  
vii. d.

e t. ii. X. t. ix.

f t. ii. Y. t. ix.

g t. ii. V. t. ix.

h t. x. p.

i t. xi. K.

k t. x. o.

l cad. K. l. m.

m li. i. t. vi. f.

vii. T.

n t. vii. V. t. a.

xiii. K.

o t. vi. Z. a. t. a.

X. lli.

quauis enim tutissimus sit vlnæ cum humero articulus, non ideo tamen suis destituitur ligamentis, eisque admodum robustis, ossa circum ambientibus. Hæc sunt omnia inter manum cubitumque occurrentia ligamenta, præter quæ nulla insuper comperias, nisi & in horum numerum ea, quæ musculorum constitutionem ingrediuntur, & proprias cuiusvis eorum membranas efformant referre velis; quæ in tantam interdum crassitiem assurgunt, vt liuorem quandam musculo inducant; cuius generis illud est ligamentum, quod musculo pollicem à reliquis digitis *P* abducente obtenditur, & quod *q* primo ac tertio cubitum mouentibus obducitur.

*De Musculis penis. Cap. 33.*

**G**enitale, vt tertio libro fusiùs explicabimus, grandia duo corpora efformant, *Genitale ex quibus consistit.* foris quidem neruea, intus verò spongiosa: quorum dexterum à dextero pubis offe, paulò inferiùs quam vbi ab altero alterius partis abscedere incipit, originem funit; & versus sinistram latustantisper porrigitur, dum coniugi suo associetur. Atque hinc simul ambo ad glandem vsque contendunt. Duobus hisce corporibus inter vnum & alterum, vrinarius *a* meatus subnascitur, quo semen quoque perducitur. His igitur sic in genere positis, quæ ad dicendorum intelligentiam abundè sufficiunt; Sciendum est membro huic, quatuor adesse musculos ipsum mouentes: *Priores duo penis musculus.* Quorum *b* duo ex anteriori sedis *c* musculi partem nascuntur, illis consimiles, quos à pectoris offe ad os hyoides exporrigi monuimus; ambo nanque inuicem assident, & internis lateribus mutuò committuntur, sicque in priora sursum ad dicti meatus in superiora reflexum tendentes, inferiori prædictorum corporum sedi in meatus latera implantantur, nonnihil inuicem abscedentes, & digitis veluti quibusdam ea comprehendentes. Duo *d* alij vtrique singuli ab appendice ossis coxendicis, paulò inferiùs quam penis corpora exoriri diximus, carnosum ac tenue principium desumunt; atque inde obliquè carnosum semper ascendunt, dum penis corpori sui lateris, non procul à suo exortu inferantur. Quatuor horum musculorum vi, penis radicem, arbitrato nostro mouemus, propensione interim, quam insitam penis ipse obtinet, accedente. Et si musculi duo priores ad vrinam, ac seminis emissionem plurimum quoque conferunt, communem vtrique meatum veluti digitis quibusdam aperientes, ne in inflexu, quem penis molitur, detinerentur, præsertimque semen quod rectà, & citra moræ tantillum, impetuque veluti è syringa ciaculari oportet, ne in itinere refrigescat, euanescent ve ipsius spiritus, aut extra vterum remaneat.

*De Colli vesicæ musculo. Cap. 34.*

**A**D ceruicis vesicæ initium, corpus quoddam veluti ex glandulis efformatum consistit, vt prolixius tercio libro docebimus, inter quod & reflexum, quem superiori capite penem moliri diximus *a*, musculus reponitur, instar anuli, orbicularis, superius quàm inferiùs nonnihil crassior, qui sedem hanc vniuersam circum ambit, & fibris quibusdam totus circundatur. Præcipuum ipsius munus est, ne vrinam præter voluntatem nostram prodire sinat: Quin etiam relaxatus ad vrinæ quodammodo exitum deservit: quauis vsus hunc magis præstent transversæ in vesica fibræ, abdominis septique musculorum opera interdum adiuta: quod septum in spiritus retentione abdomen deorsum comprimit. *b* Haud secus quoque mulieres suo & ipsæ musculo donantur, eandem cum isto functionem obeunte; sed cum hæc vesicæ collum breuius quàm viri nascæ sint, glanduloso eo corpore minimè opus habuerunt, ideoque musculus is vesicæ ceruicem vndique amplexatur, qui vt sequenti libro dicemus, à vesicæ corpore in superiorem vteri ceruicis regionem, cui applantatur, non procul à vulua exporrigitur. Musculus is quantò virorum muscuium longitudine superat, tantò tenuior existit; & quo vesicæ collum breuius, eo crassius ipsis obtigit.

Ani motores  
musculi.

**A** No musculi tres eam mouentes obtigerunt : quorum <sup>a</sup> vnus eam in sæcum aut flatus expulsiōne foras educit, duo verò educit in trō adigunt, simulque prohibent, quo minus præter voluntatem nostram fæces erumpant. Duo <sup>b</sup> hi musculi lati sunt, & tenues, non admodū carnosī, neq; rubentes, non ex offe quopiam, sed ex ligamentis duntaxat ab offe sacro prodeuntibus, enati, nec non ex pubis, & coxendicis, ac inferioris peritonæi sedis ligamenti. Atque inde ad suum quisque latus deorsum protensi, <sup>c</sup> rectum intestinum amplexantur, extimæ ipsius tunicæ inferi. Præsentium muscularum tanta est latitudo, vt præterquam quod dicto intestino obtenduntur, implantanturque, ipsorum etiā <sup>d</sup> portio genitilis radici viris, mulieribus verò vteri collo adnascatur. Quod quidem nonnullos in eam sententiam adduxit, vt huiusmodi musculos tres esse arbitrentur. Verum duos ne appelles an tres, parum omnino interest, quandoquidem vna eademque est omnium eorum functio, sedem scilicet ilicō ab excretionē sursum allicere. Duobus hisce musculis, alij nequaquam opponuntur sedem foras propellentes, quum id satis superque præstent abdominis musculi, septum transuersum, & musculi thoracis omnes. Cæterum ab horum muscularum extremo <sup>e</sup> tertius enascitur musculus, instar anuli orbicularis, qui extremum recti intestini ad extimam vsque cutem amplexatur. Musculus is, prædictis minus carnosus est, etsi principium crassius sine ne obtinet, qui cuti in quam inseritur, est similis, sed vinctuoso humore totus obliniunt, fibrasque obtinet orbiculares, quarum interuentu <sup>f</sup> vteri collo in mulieribus iuxta pudendum coheret, in viris autem vesicæ ceruici, & genitali pariter committitur, medijs prioribus <sup>g</sup> duobus musculis, ex quibus enascitur. Posteriore sui regione coccygis ossi, ad latera verò vinculis quibusdam à sacro offe in coxendicem transuersim porrectis, connectitur. <sup>h</sup> Musculus hic non adeo atque aliqui existimant, brevis est; quinimo duos altè digitos adigitur, vt liquidū in illis conspicitur, quibus aut ob fistulam, aut ob aliud ægritudinis genus, ipsius principium fuit abscissum: quamuis enim ij fæces maiori negotio quàm prius contineant, minime tamen ipsis nolentibus excidunt, vt vniuerso musculo discisso, contingeret, nam penes ipsum duntaxat est, anum ita occludere, vt eo non permittente nulli prorsus rei pateat egressus.

Tertius ani  
motor  
musculus.

Primus cruris  
motor muscu-  
lus.

**V**niuersum crus infra genū, recto extensionis flexionisque motu, (vt cuius licet in seipso periculum facere) citra vllum in latera motum agitur, idque decem muscularum vi. <sup>a</sup> Quorum primus <sup>b</sup> ab anteriori ossis ilium spinæ sede principium neruofum magis, quàm carnosum assumit: at paulò post exortum, carneus omnino euadit, & latior quàm ab initio, ita vt ipsius latitudo crassitiem duplo superet. Atque ita oblique versus interiora descendit, internam femoris regionem ad mediū vsque longitudinis ipsius occupans; ac dein rectà procedens ad internum femoris caput iuxta genu pertingit, vbi extrorsum nonnihil reflexus, in <sup>c</sup> principium prioris tibiæ lineæ implantatur, teretis ac rotundi tendinis interuentu, quem antrosum vergere incipiens educit. Musculi huius beneficio, crus sursum ad alterius cruris inguina ducitur, muscularum ope accedente, qui femoris & cruris motibus præfunt, quibus potissimū motus huiuscemodi acceptus referri debet. Im- <sup>d</sup> moto enim genu facile vnusquisq; potest crus alterum alteri sedens superponere, & nisi suis musculis crus flecteretur, femurq; suorum muscularū ope sursum in interiora attolleretur, vsque adeo tenuis musculus solus huic functioni edendæ impar foret. <sup>e</sup> Secundus musculus lato & prorsus neruo principio ex <sup>f</sup> medio pubis ossiū enascitur, secundū <sup>g</sup> cartilaginis longitudinē, qua illa inuicē cōmitti diximus, qua in parte

Secundus.

cum

cum secundo musculo alterius cruris motore coit, & ilico ab exortu angustus, crassus, atque carnosus ita efficitur, ut ipsius latitudinem crassities paulo superet, & teres propemodum existat. Sicque deorsum per femoris interiora procedit, sensim, ac sensim ita gracilescens, ut internum femoris caput propter genu continens, in § absolutæ rotunditatis tendinem abeat, qui iuxta primi extremum inferitur, posterius ipsi connatus. Musculus is in parum obasis mulieribus nervi cuiusdam ligamenti, & nervi modo duri asperique speciem exhibet, eo quod ex carnis sit; & paucio adipe obiectus, oram supra carnem efformat. Musculi huius interest, crus cruri adducere, ut cum ea decussatim intorquamus, adiuvantibus interrim musculis crus inflectentibus, femurque intorsum agentibus. <sup>h</sup> Tertius musculus vnâ cum alijs quibusdam ex ima coxendicis <sup>i</sup> appendice, qua sedentes nititur, nervosum ac tenue principium desumit, & oblique deorsum protensus, carnosus extemplo euadit, ac propemodum teres, & longè quam in exortu crassior. Sicque per femoris posteriora nonnihil oblique, ac per finem, quem in <sup>k</sup> quinto crus mouentium musculo effici dicemus, contendit, dum ad posteriorem sedem interni femoris capitis non procul à genu pertingat; Vbi tenuior redditus, ac teres, in tere tem abit tendinem, qui paululum in anteriora reflexus, iuxta duos nuper commemoratos musculos inferitur, in posteriora magis quam vllus ipsorum ductus. Musculi autem huius tendo anteriori tibiæ sedi ad internum acutè illius linæ latus hærens, ad medium vsque longitudinis tibiæ prorepat, secus quàm aliorum vllus. Huius est, crus nonnihil intorsum flectere. <sup>l</sup> Quartus ex eadem coxendicis appendice, angustior quàm tertius principio, sed robustior, ac durior enascitur; quod ad externum latus capitis <sup>m</sup> noni musculi enatum, nonnihil sub ipso occultatur, deinde deorsum perrepat, & carnosum ilico euadens, exacti musculi formam multo melius tertio representat; atque ita per femoris posteriora paululum versus exteriora ad ipsius longitudinis medium descendit; vbi tenuior protinus fieri incipit, & externa facie nervosus, velut in tendinem abiturus. Interius vero carnis <sup>n</sup> portio ipsi adnascitur, ex interna femoris regione pronata, ac si alius hinc oriretur musculus. Atque ex ambobus, crassior efformatur musculus, qui deorsum protensus insigni tendine in acutum apicem inferitur, quem huius gratia, elationis fibulæ appendicis processui adesse diximus. Musculus is ille est, quem Galenus secundo de Administ. anatom. celerrimo cursori abscissum fuisse commemorat. estque ipsius officium cruris flexionem absque vllò in latera deflexu moliri, cum alioqui tamen obliquum situm obtineat. <sup>o</sup> Quintus musculus, & ipse à dicta coxendicis appendice inter <sup>p</sup> tertij, & quarti capita neruoso principio exoritur, talis ad medium ferè sui ductum permanens, vbi carneus omnino euadit, & per femoris posteriora deorsum repit, versus posteriorem interioris ipsius capitis regionem iuxta genu reflexus; quam vbi euasit, in <sup>q</sup> teretem ilico abit tendinem, qui interno lateri anterioris tibiæ regionis versus posteriora implantatur, iuxta eam sedem in quam primi, secundi, ac tertij musculorum tendines inferi prodidimus; quantum interim tendo hic minimè adeo ac tertij tendo declius feratur; quinimo tibiæ appendicem, vix ut plurimum transcendit, non nunquam etiam infra subsistens. Musculus is <sup>r</sup> finem per omnem sui longitudinem porrectum obtinet, vsqueaque liuidum, & tertio cruris motori musculo viam præbentem; estque ipsius musculus, crus tertij modo inflectere, quo cum situm obtinet asimilem. <sup>s</sup> Sextus ad externum capitis <sup>t</sup> primi musculi latus ab ilium osis spina producitur; interna facie <sup>u</sup> angustum carneumque caput obtinens, quod lacertæ in morem ilico latefcens, deorsum, versus femoris cum coxendice articulum fertur, vbi denuo angustus efficitur. Et priusquam maiorem femoris <sup>x</sup> processum contingat, <sup>y</sup> in tenuem neruosam, & impensè latam abit membranam, quæ primùm musculis coxendicis articulum amplexantibus aliquousque obtenditur, deinde femur vniuersum ad sedem vsque, quæ sub genu est, cutis modo integit, vbi exteriori tibiæ appendicis regioni applantatur. Præsentis membranæ pars anteriori internæque femoris sedi obducta tenuissima est, eoque magis quo interiori femoris regioni pro-

*Tertius.*

*Quartus.*

*Quintus.*

*Sextus.*

pius accedit. Pars verò ipsius exterior, euidenter crassior validiorque occurrit, & cæterorum musculorum tendini simillima. Huius fibræ recto tramite à superioribus in inferiora tendunt: & membranæ ipsius extremura musculorum aliquot crus extendentium tendinibus copulatur; quanquam membrana hæc cunctis etiam femur perperantibus musculus amplexandis inseruit, & quo minus è sua exiliant sede cōtinendis, membranæ illius ritu, qua musculos omnes à cubito ad manum porrectos obuinciri tradidimus.<sup>2</sup> Septimus lato ac neruoso exortu ab externi femoris processus radice prodit, quam vndique in orbem amplexatur; statimque ab exortu carnosus crassusque redditur, & ab osse abscedens, octauum supergreditur musculum, externum omne femoris latus, magnamque anterioris, ac posterioris partem occupans. Hic toto ferè descensu cernosus visitur, paulò supra genu<sup>a</sup> patellam in amplum desinentem tendinem, qui vnà cum<sup>b</sup> octauo, & noni musculi tendinibus patellam amplexatur, in anteriorem tibiæ regionem sese inferens. Quin & sexti etiam musculi tendo cum septimi tendine permiscetur, imò externam ipsius faciem præ cæteris omnibus integrit: posteriori fedi quartus, anteriori verò nonus attenditur.<sup>c</sup> Octauus musculus vniuersam propè femoris amplitudinē obcingit. In posteriori enim duntaxat sede iuxta femoris longitudinis medium nudam relinquit<sup>d</sup> lineam, cui quintum femur mouentium<sup>e</sup> musculum inferi dicemus; Dein ad radicem quoque inferiorum femoris capitum posteriorem femoris amplitudinem non integrit octauus hic musculus, quia à femoris ossis<sup>f</sup> ceruice, neruoso principio enascitur. Ante quam vero ad minorem ossis processum pertingat, carnosus efficitur, & ab hoc processu originis suæ portionem ita desumit, vt duo principia obtinere videatur, à quibus deorsum tendit, ita os comprehendens, vt duo ipsius latera in posteriori femoris regione, propemodū copulentur; Quò autem magis descendit, eò carnosior crassiorque efficitur, donec proximè ad genu patellam accedat, vbi nonnihil prominet, & veluti carnosum productū<sup>g</sup> semicirculum, ex quo latus enascitur tendo, patellam vti dicemus, integrens. Cæterum musculus is sui longitudine è directo illius semicirculi carnosior crassiorque redditur, quàm quā septimo substernitur, quanuis inibi etiam carnosus occurrat. Quando itaque secundum femoris longitudinem in interno ipsius latere octauus iste musculus protuberat; & septimus itidem secundum exterioris femoris sedis longitudinem exporrigitur, <sup>h</sup> sinus inter vtrunque relinquitur longus & liuidus, quem<sup>i</sup> nonus adimplet musculus. Qui ex ilium ossis tuberculo super coxendicis acetabulum, in quod femur excipitur, prominente, neruoso tenuisque affumit<sup>k</sup> principium; & hinc rectà decliuis fertur, piscis lacertæve imaginem induens, vnde illum nonnulli cruris Piscem appellarunt. In anteriora postea descendens, paulò ante mediam<sup>l</sup> femoris longitudinem paululum dilatescit, statimque gracilescere incipit, & multò supra genu in<sup>m</sup> latam tenuemque abit membranam, quæ patellam supergressa, denuo dilatatur<sup>n</sup> septimi & octauo musculi tendinibus permixta, licet minùs quam septimi & octauo tendines inuicem connascentur. Sed vtrunque se res habeat, ex tribus hisce musculis latus constatur tendo, cui<sup>o</sup> patella exteriori facie ita cohæret, vt ex eo nasci videatur. Porro interna tendinis huius, siue membranæ superficies, quæ rotulæ non obtenditur, vinctuoso & pingui humore oppletur, quo efficitur vt femoris ossi non adhærescat: Patellam verò transcendens, protinus angustatur, in anteriorem tibiæ appendicis regionem sese indens. Huic autem musculo, & duobus præcedentibus, recta cruris extensio demandata est. <sup>p</sup> Decimus cruris motus opifex musculus, perexiguus, carnosusque situm habet in poplite, à musculis carnosam cruris molem efformantibus, qui ab inferioribus femoris capitibus enascuntur obiectus; vnde summa ratione musculus in poplite delitescens fuit appellatus. <sup>q</sup> Prodit is ex posteriori parte crassi cuiusdam validique ligamenti, ex eorum numero, quæ femur tibiæ committunt, ad externum genu latus repositi, lato vsque adeo exortu, vt posteriorem genu articuli sedē integat. Statimque productus, carnosus fieri incipit, ac talis deorsus versus interiora ab ossis latere defertur, musculū efformans paulò longiorē, quā latū, qui posteriori tibiæ fedi, paulò infra elatiorē ipsius appendicem, <sup>r</sup> extremo æquē ac musculus ipse lato inferitur;

Septimus.

Octauus.

Nonus.

Decimus.

z. t.v. a. t.iii.  
t.ii. t.c.iii.  
o. t.vi. o. t.ix.  
t. t. x. a. t.xi.  
t. xii. b.a. t.v. j.  
b. t.viii. g. h.c. t.v. vi. ii. ta.  
vii. ta. iii. c.  
t.ii. a. t. ix. β.  
ta. iii. v. ta.  
viii. l. t. x. xi.  
t. ta. xii. a. ta.  
xiii. β. ta.  
xv. fi. xvi. Q.  
d. t. xiii. a.  
e. cad. β. xii.  
f. t. vi. c.

g. cad. v.

h. t. ii. n.  
i. t. iii. e. a. v.  
c. t. i. a. ta. iii.  
t. t. ix. v. t. xv.  
fi. vi. p.  
k. t. iii. o.  
l. cad. o.m. cad. b.  
n. tab. viii. g.  
h. i.

o. cad. K.

p. t. xiii. a. ta.  
xiii. r.

q. t. xiii. r.

r. cad. i.



ritur; & obliquè etiam reflexus definit à posteriori tibiæ sedis externo latere versus internum procedens; ita ut minima huiusce musculi pars genu ligamenti, maxima verò tibiæ committatur, nusquam interim femoris os attingens. Musculi huius officium minimè quidem illud est, quod Galenus protulit, tum quod præ sui paruitate, cruri sursum vellendo impar omnino esset; tum quod obliquè positus recto motui præesse nequaquam potuit; Atamen minimè prorsus aspernandi usus censi debet, ut in sua enarratione prodit Vesalius; Imo verò cruri nonnihil extorsus flectendo auxiliatur, ut unicuique in seipso experiri licet; femur enim manibus fortiter comprehendens, tibiam si volet, immoto femore inflectet: Quod huic tantum musculo acceptum referri potest, quandoquidem cæteri omnes ex femoris coxendicis ve osse sumunt originem.

De Musculis femur mouentibus. Cap. 37.

Q Voniam femoris musculi cruris musculis substernuntur, ideo de his primum egimus, illos modò explicaturi. Musculi ergo femoris motuum opifices, quatuordecim ad summum, decem ad minimum existunt, quorum impulsu femur extenditur, flectitur, in latera & in orbem agitur. <sup>a</sup> Qui primum inter extensores locum obtinet, statim sub cute consistit, sui crassitie alteram ex natibus vniuersam efformans. Prodit autem lato & admodum carnosio principio ex tota spinæ oſis ilium posteriori <sup>b</sup> parte, quæ versus os sacrum magis eminet; deinde etià spinæ superioris regionis portionem suo quoque exortu apprehendit; suæ quoque originis portionem ex ima sacri oſis regione assumit, nonnunquam etiam, licet perquam raro, ex coccyge, inibique musculis suo alterius lateri coniugi <sup>c</sup> contiguus affidet. Ex his igitur sedibus velut ex semicirculo pronatus, obliquè deorsum prorepat, & femoris cum coxendice <sup>d</sup> articulum supergreditur; ubi gracilior angustiorq; tantisper efficitur, donec in <sup>e</sup> latum ac validum abeat tendinem, quo exteriori <sup>f</sup> magni femoris processui parti secundum ipsius longitudinem inseritur; Principium enim insertionis paulò subtus apicem nonnihil versus anteriora molitur, & modicè in posteriora descendens, in posteriorem omnem ipsius partem <sup>g</sup> longa linea secundum femoris posteriora ex porrecta etiam inseritur. Fibras is obliquè in priora descendentes obtinet. <sup>h</sup> Secundus non procul à primo exoritur, lato & carnosio principio per totam ferè ilium oſis spinæ sedem porrecto, vnde primus non educitur; & semicirculum perinde ac primus efformat; verum posterior capitis secundi huius musculi pars à primo integitur. Ab hoc principio deorsum in priora se confert, arctior sensim redditus, minimè tamen vniuersus subter primum adacijs, ut vult Vesalius, pars enim ipsius ferè dimidia liquidò <sup>i</sup> denudata conspicitur. Descendens igitur, articulum quoque coxendicis vniuersum, quemadmodum & primus, integit, & in <sup>k</sup> validam tenuem, latamque membranam sese conuertens, elatiori magni femoris processui parti transversim, (si cum primo conferatur) inseritur, anteriorem quoque ipsius regionem aliquatenus comprehendens. Cæterum musculus is admodum liuidus conspicitur, præsertim verò in carnosissimis hominibus, & fibras adipiscitur recto ductu deorsum protensas, quæ priusquam definant, prioris musculi fibris decussatim implicantur. Adhæc nullibi carnosior occurrit, quàm ubi, post exortum, à coxendicis osse abscedit, & tertium musculum supergreditur. <sup>l</sup> Tertius hic musculus tanto minor secundo est, quanto secundus primo, & secundo totus subijcitur; <sup>m</sup> prodit enim ex posteriori demissiorique oſis ilium sede, lato, crasso & carnosio, ac veluti semicirculari principio; & inde obliquè in priora descendit, coxendicis articuli hærens ligamenti, sensimq; ac sensim arctior euadens, dū in <sup>n</sup> validū & latum abeat tendinem, qui maiorem femoris processum amplexatus, anteriori ipsius parti, atque adeo apici conferitur. Musculus hic liuidus in cunctis apparer, multoque magis in musculosis, in quibus pariter secundi musculi partem huic tertio incumbentem liuere monuimus; membrana enim admodum crassa obducitur, cuius interuentu superiori primi musculi lateri validè connascitur, arque in huiusmo-

Musculi femoris motores.

Primus.

Secundus.

Tertius.



di hominibus primus etiam liuidus occurrit, secus quam in obæsis; quinimo tertius hic musculus fibras quasdam obtinet neruofas, per vniuersum ipsius corpus disseminatas, quæ in mulieribus adipe inuoluuntur, imò fibræ adipem æmulantur carneis fibris commixtum. <sup>o</sup> Quartus musculus, magna etiam ex parte liuidus, & exactè propemodum teres, à P lateribus & interiori inferiorum sacri ossis vertebrarum fedes, quæ coxendicis ossibus non coarctatur, crassum carnosumque sumit principium, & vsque adeo laturum, vt alterius lateris principium ipsi correspondens ferè contingat. Ab hoc principio ad maiorem femoris processum transfuersim properat, carneus aliquosque permanens; & sensim artior euadens, priusquam femoris os cōtingat, in <sup>q</sup> teretem abit tendinem, posteriori <sup>r</sup> maioris femoris processus regioni iuxta ipsius apicem implantatur. <sup>s</sup> Quintus musculus ab inferioris ossis coxendicis apice, à <sup>r</sup> tertij, quarti, & quinti musculorum capitibus, sub quibus enascitur, non occupata, ad finem vsque pubis ossium articuli, quæ coniugi suo iungitur, principium ducit laturum, & omni ex parte carnosum, præterquam subius superque dicta principia, <sup>u</sup> vbi foris neruofus, intus verò carnosus existit, quemadmodum & musculus ipse vniuersus. Ab huiusmodi principio decliuus fertur, statimque minoris femoris <sup>x</sup> processus posteriorem sedem amplectitur, & paulò inferius, in acutam <sup>y</sup> asperamque ac longam inseritur lineam, quam in posteriori femoris sede secundu ipsius longitudinem, deorsum à parui huius processus radice protendi retulimus. Quemadmodum autem musculi huius principij continuus est ortus, ita quoque continua eiusdem visitur insertio, si postremam <sup>z</sup> ipsius partem exceperis, quæ se in minoris femoris processus radicem inserit: hæc enim à coxendicis appendice principio vt diximus carnosòeducta, musculus veluti per se constituit, qui in insignem amplitudinem dilatatus, deorsum rectà per femoris posteriorem fertur, donec denuò gracilescens, teretem educat tendinem, <sup>a</sup> interno femoris capiti iuxta genu applantatum, vsque adeo distinctè, vt nisi <sup>b</sup> quinti musculi extremum istius principio adnascetur, non iniuria peculiaris musculi vice haberi posset. At cum misceantur, minimè inconuenit, aut vnum, vt nos facimus, appellare, aut in duos distinguere, vt scilicet pars hæc vnus ex ipsis constituitur, alter verò ea, quæ in asperam illam quam diximus lineam inseritur: etsi non video quid muneris præstare posset qui ex minori femoris processu enascitur, in idem os implantatus. Nec desunt etiam, qui musculus hunc <sup>c</sup> triplicem faciant. Pars enim ipsius anterior, quæ ab anteriori appendicis ossis coxendicis sede nascitur, quæ ab inferiori pubis ossium parte, quæ ossa inuicem se iungunt, ad infimam vsque coxendicis regionem pertinet, ab <sup>d</sup> anteriori altera musculi huius portione, quæ à reliqua appendicis sede, vsque ad posterioris partis musculi totius anteriorem regionem pronascitur, inscriptione quadam dirimitur. Non solum autem anteriores hæc duæ partes, huiusmodi nota distinguuntur, verum etiam fibrarum insertionumque varietate: qua etiam ratione posterior omnis musculi huius pars ab anteriore se iungitur. Pars namque pubis ossium commissuræ proxima, fibras ferè transfuersas adepta est, quæ à sui exortu ad radicem parui femoris processus contendunt, & elatiore in parte acutæ femoris <sup>e</sup> lineæ conferuntur. Altera verò pars ad infimam ossis coxendicis regionem consistens, obliquas quidem adipiscitur fibras, sed propemodum rectas, & in imam asperæ prominentisque femoris lineæ sedem inseritur. Hunc igitur in modum musculus iste triplex constituitur; sicque hæcenus septem in vniuersum exurgunt. Quorum præcipuum munus est, femur ipsum extendere, & laterali etiam circumactionisque ipsius motui famulari, hunc quidem in modum. Primus sese vniuersum colligans rectam femoris extensionem sine vlla in latus flexione molitur; sin verò superam inferamve sui principij partem contrahat, ipsum quidem extendit, sed in hoc vel illud latus agens, prout hanc illamve partem colligit. Secundus extensionis quoque femoris auctor est, extrorsum pariter trahens, & femur in coxendicis acetabulum adigens. Tertius & quartus modicè fursum trahentes, ipsum extendunt. Præterea quartus ipsum nonnihil extrorsum vertit, tertius magis retrorsum agit: ambo autem ipsum in gyrum agunt, verum multò infirmius quam musculi, quibus huiusmodi functio

Quartus.

Quintus.

Quintus musculus  
latus in tres diuidatur.

Trium horum musculorum munus.

Priorum quatuor musculorum munus.

o. ta. xi. o. ta.  
xii. u.  
p. li. ta. vi. fi.  
ii. DEF.

q. t. xi. g.  
r. lib. i. ta. i. ii.  
iii. T.  
s. ta. xii. xiii.  
Σ. ta. ii. a.  
t. v. a. ta. vi. c.  
t. vii. g. t. viii.  
e. c. t. ix. x. ta.  
x. p. t. xi.  
t. t. xia. u. v.  
u. t. xii. d.  
x. li. i. t. iii. v.  
y. ead. iuxta A.

z. t. xii. x.

a. lib. i. ta. iii.  
i. g.  
b. vti coeunt  
abo ad c. in  
t. viii.

c. ta. xii. xiii.  
Σ. ta.

d. ead. xii.

e. li. i. t. iii. iux  
ta A.

Etio peculiariter demandata est, vt mox subiiciam. Quinti autem musculi posterior pars, rectis donata fibris, crus rectum stabilit, & pedem solo affigens, femur extendit. Posterius verò anterioris partis huiusce musculi latus, præterquam quod idem cum posteriore sede munus præstat, femur etiam nonnihil introrsum flectit, Eminentiores autem fibræ, pubis, osium commissuræ proximæ, in anteriore musculi huius principio, femur introrsum agunt, nonnihil ipsum colligentes. Atque hi sunt musculi, femur introrsum extendentes, quibus tres alij respondent flexionis opifices, sextus nimirum, septimus, & octauus. <sup>f</sup> Sextus ex vndecimæ ac duodecimæ thor-

Sextus.

racis vertebrarum, primæ verò ac secundæ lumborum corporibus, <sup>g</sup> principium sumit carnosum, quod statim enatum, teres efficitur, & oblique versus exteriora descendit, ac per coxendicis interiora procedit, carneum semper <sup>h</sup> consueque permanens, vbi pubis os coxendicis iam appellationem subire incipit, ibique in validum ac teretem abit tendinem, qui deorsum tantisper properat, dum in elatiorem minoris coxendicis <sup>i</sup> processus regionem adigatur. Verum aduertere oportet, musculi huius gratia, finum in pubis osse insculpi nerueo ligamento, ex eodemmet osse pronato obductum, super quod tanquam pauimentum procurrit; cum enim os inibi acutum, tendo autè durus occurrat, facile fiet, vt ab osse detritus noxæ aliquid incurreret; <sup>Quin</sup> & ne à sede deuiet auxilio ipsi est. <sup>k</sup> Septimus ex tota interiori ossis ilium re-

Septimus.

gionem, tanquam ex <sup>l</sup> femicirculo, carnosam sumit originē, tumque sensim ac sensim angustatur & crassior euadit, dum teres omnino reddatur; sicque per elatiorem ossis coxendicis regionem defertur, carnosus semper ad <sup>m</sup> minorem vsque femoris processum permanens, vbi teretem educit tendinem, qui humiliori huius processus parti, non procul à sexti fine inseritur. Porro quā hic musculus super coxendicis elatiora tendit, ne aberret, finum in osse constituit. Octauus <sup>n</sup> musculus <sup>o</sup> quinti quo-

Octauus.

dammodo portio, ni sedulo animum attēdas, apparet, & ex tota ossis pubis linea ab anteriori coxendicis ossis acetabuli sede, ad osium vsque pubis commissuram extuberante, <sup>p</sup> lato & carnosio principio exoritur; & ad posteriora oblique admodum descendens, eandem tantisper naturam seruat, dum in interius femoris latus, è regione parui eius processus inferatur, amplo & breui tendine oblique deorsum in posteriora ad <sup>q</sup> ipsius vsque dimidium porrecto. Musculus hic liuidus sefe offert, & vnā cum duobus proximè explicatis femur contrahit, ipsum alteri nonnihil admo- uens. Sextus enim sursum validè femur attrahit, flectitque; introrsum ipsum adigens, Septimus eandem & ipse obit functionem, sed femur magis quam sextus introrsum agit. Octauus remissam molitur cruris flexionem, & magis quam septimus in interiora vellit; adeo vt musculi extensionis flexionisque cruris opifices, ipsi quoque introrsum, extrorsumque agendo famulentur. Quinetiam ad femoris flexionē <sup>r</sup> no-

nus quoque tibiam mouentium adiutor accedit; cum enim ex coxendicis ossis tuberculo enascatur, & rectā subtus genu delabatur, vbi suam molitur insertionem, dum versus suum principium adducit, femur necessariò inflectat oportet; quod omnes etiam tibiæ musculi secundariò præstant, qui ex pubis coxendicisve osse producti, subtus genu desinunt. <sup>s</sup> Nonus musculus vsquequaque liuidus & carneus, deorsumque oblique porrectus, vniuerso pubis ossis foramini extrinsecus obtenditur; ac deinde per exteriorē omnem ceruicis femoris regionem deorsum fertur, in validum & lauiusculum degenerans tendinem, qui in maioris femoris processus finū inferitur, qui è regione femoris ceruicis capitisque in coxendicis acetabulum adacti consistit. Huius est, femur versus interiora circumagere. <sup>t</sup> Decimus internam dicti

Nonus.

Decimus.

nuper coxendicis foraminis sedem obturans, nonum robore superat, magis etiam estatu dignus; prodit enim ex tota linea, quæ ab interna iliū ossis sede, vbi transuerso primæ sacri ossis vertebræ processui cohærescit, per coxendicis interiora, ad pubis vsque osium commissuram pertinet. Principium hoc tribus veluti lineis seu infcr iptionibus insignitur, estque omnino carnosum, quemadmodum & omnia ferè articuli huius musculorum capita; ac internam omnem coxendicis, & pubis ossis regionem occupat, & liuidum rursus euadens, sensim ac sensim ita <sup>u</sup> coarctatur, vt ipsius amplitudo coxendicis interuallum minimè superet <sup>x</sup>, quod inter acutum ip-

sius

f. e. viii. o. ta.  
iii. u. ta. v. x.  
t. vi. o. t. vii.  
i. xiii. o. ta.  
xiii. c. t. xv.  
f. xvi. x.  
g. t. viii. a.  
h. ead. b.  
i. li. i. t. li. i. li. i.

x. t. viii. a. ta.  
xiii. y. t. lii. i.  
c. x. v. o. v. i. o.  
ta. vii. x. ta.  
xiii. d.  
l. t. viii. o. o. o.  
m. t. xiii. y.  
n. t. viii. x. t. a.  
p. t. xiii. m. ta.  
iii. u. t. v. p.  
t. vi. p. t. v. x.  
o. t. viii. o.  
p. ead. inter  
c. & b.

q. ead. f.

r. ta. iii. o. ta.  
iii. f.

s. t. viii. y. ta.  
xiii. a. t. xiii. c.

t. x. x. a. t. x. i. o.  
t. xii. a. t. xiii. i.  
t. x. v. f. x. vi.  
F. G. H.

u. t. x. v. f. x. vi.  
H.  
x. li. i. t. ii. in.  
ter 14 & 15.

sius processum & posteriorem eiusdem appendicis sedem habetur. Per huiusmodi spatium, ceu per cavitatem quandam, musculus hic foras erumpit, in exitum quantum par est, reflexus, & quâ os contangit neruosis effectus, ac in tres veluti rotundos tendines diremptus, seriatim ad sinum reflexus. Tendines hi, antequam ad sinum appulerint, lati occurrunt, vbi verò ad ipsum pertingunt, angustiores sunt, tribus deducti finis in dicta cavitare occurrentibus, quos duæ prominentes lineæ in ipso consistentes circumscribunt. Tres hi tendines vbi sinum superarunt, protinus in vnum abeunt tendinem in magni femoris processum <sup>y</sup> sinum, iuxta noni musculi finem insertum. Estque animaduersione dignum, inter os & commemoratos tendines, crassam validamque membranam consistere, vntuoso humore oblitam, quæ musculo veluti pavimentum subternitur, efficitque vt supra os facilius circumagatur. Musculi huius, & noni officium est, femur in gyrum agere, huius quidem extorsor, illius verò intorsor. Præter commemoratos, duo insuper alij habentur musculi, carnosus, quorum alter à superiori dicti sinus, seu cavitatis regione, alter ab inferiori educitur, & simul ambo decimum musculum ita complectuntur, vt à fede ipsum exilire non sinant. <sup>z</sup> Prior ipsorum ab acuto coxendicis processu exoritur, superiori decimi musculi lateri ad ipsius vsque insertionem adhærens. <sup>a</sup> Alter ex eiusdem processu apice, similiter carnosus existens, erumpit, inferiori eiusdem decimi musculi lateri ad extremum vsque connatus; ambo enim in sinum magni femoris processum, quemadmodum & decimus, inseruntur. <sup>b</sup> Ab interna quin etiam coxendicis osis regione, vbi decimus musculus obliquari desinens ad femur vsque protenditur, carnis portio enascitur, in quam tres decimi musculi tendines tanquam in marsupium immittuntur, sicque in maiorem processum inseruntur. Commemorati duo musculi femori retrorsum agendo auxiliantur, & tanquam decimi pars vt plurimum connumerantur, atque ita decem tantummodo femoris motores haberentur. Si autem hi seorsum numerentur, & duo illi, quinto copulati, quatuordecim exurgent. Sed hoc nean illo modo, numeres parum interest, modo rem, prout se habet, intelligas,

*Carnæ quæda  
portiones supe  
riori adiunctæ.*

*t. xii. inter  
x & x.*

*z. t. xi. a. t. xii.  
β. t. xiii. x. ta.  
xiii. f.  
a. t. xii. β.*

*b. t. xiii. xyz.*

### De Musculis pedem mouentibus.

Cap. 38.

*Primus pedis  
motor muscu  
lus.*

**P**Edem, perinde ac manum, sursum, deorsumque, ac in latera licet obscure, no-  
uem musculorum ope agimus. Quorum <sup>a</sup> primus <sup>b</sup> ab interioris femoris capi-  
tis radice producitur, qui licet continuatione ipsius spectata vnicus videatur, sub-  
stantiæ tamen varietate inspecta, duas in partes dirimitur, alteram quidem superio-  
riorem, interioremq; femoris medium versus; alteram verò inferiorem, exterio-  
remque, non secus ac rectorum abdominis musculorum capita. Superior enim mus-  
culi huius pars lata est & carnosæ, & deorsum protensa paulò sub genu articulo cum  
altera initij parte confunditur, quæ prorsus carnosæ, & liuida occurrit; & inde deor-  
sum fertur, in valde carneum crassumque musculum euadens, exactissimam muscu-  
li formam exprimentem. Priusquam verò ad medium tibiæ longitudinis pertingat,  
simulatque carnosam ipsius molem euadit, angustior redditus, in <sup>c</sup> latum abit ten-  
dinem, ad cuius medium nonnihil carnis initio conspicitur. Musculus hic inter-  
nam occupat suræ partem. <sup>d</sup> Secundus in externo consistit, & ab externo femoris  
capite principium sumens, deorsum ad crus, perinde ac primus, deferitur, externam  
suræ molem efformans. Duo hi musculi paulò post exortum <sup>e</sup> copulantur, neruosis  
quibusdam fibris inuicem hærentes, quibus eo magis confunduntur, quo decliui-  
ores ad suræ vsque extremum feruntur, vbi ex vtriusque <sup>f</sup> tendo confluit; quamuis  
primus paulò inferius secundo, carnosus esse desinat, vt in multis lacertosis homini-  
bus integra curæ conspicitur. <sup>g</sup> Tendo hic statim ab exortu subiecti musculi, qui  
<sup>h</sup> quartus pedem mouentum est, tendini pertinaciter adeo connascitur, vt nulla  
ratione ad calcem vsque ab eo diuelli queat; quinimo ex hoc, & quarti musculi ten-  
dine vnus re vera produci videtur, in posteriorem calcis regionem insertus. <sup>i</sup> Ter-  
tius ab exteriori femoris capite iuxta genu principium assumit teres, carnosum ac  
tenue,

*a. t. xii. e. t. i. p.  
t. ii. μ. t. iii. β.  
t. viii. p. t. ix.  
t. xii. γ. ta.  
t. iii. o. t. xv. f.  
xvi. a.  
b. l. i. t. iii. a. 6.*

*c. t. xii. v.  
d. t. xii. γ. ta.  
t. iii. a. ta. ii. μ.  
ta. iii. 16. ta.  
vii. 9. t. ix. ζ.  
ta. xiii. γ. ta.  
xiii. o. t. xv.  
f. xvi. b.  
e. t. xii. γ.  
f. cad. u.  
g. t. xiii. x.  
h. t. xiii. j.  
i. t. iii. i. t. i. v.  
t. i. γ. t. viii. f.  
t. ix. μ. ta. xii.  
o. t. xiii. γ. ta.  
xiii. a. t. xv.  
f. xvi. c.*

*Secundus.*

*Tertius.*

tenuē, quod iam iam ab exortu dilatescit, propriam musculi faciem præ se ferens; at mox sub poplite rursus <sup>k</sup> gracilescit, in perquam tenuem mutatus tendinem, qui quemadmodum & musculus ipse sub duobus prioribus descendit, & quartum supergrediens non nihil oblique deorsum prorepit, dum ad internum prædictorum musculorum tendinis latus elabatur, <sup>l</sup> ubi cum quarti tendine coire incipiunt: & hinc deorsum ad internam vsque calcis regionem, ipsi applantatur fertur. <sup>m</sup> Quartus om

Quartus, nium infra genu consistentium, maximus, <sup>n</sup> ex posteriore tibiæ, fibulæque articuli sede, neruoso & valido principio enascitur, & deorsum non nihil tendens, in eam assurgit latitudinem quæ <sup>o</sup> tibiæ, ac fibulæ latitudinem superet, verum non aquè adeo crassus, atque latus existit: atque ita magis latescens ad suræ vsque dimidium procedit; ibique sensim, ac sensim rursus angustatur, & paulò supra calcis regionē, in <sup>p</sup> validissimum & crassum degenerat tendinem, non solum ab ipso, sed etiam à primi & secundi musculi tendinis concursu formatum, qui posteriori calcis regionis applantatur, quæ, vt priore libro monuimus, aspera & depressa est, quò firmitus tendo ipsi adhærescat. At quia calcis os extra tibiæ fibulamque protuberat, & quartus hic musculus ipsis incumbit, tendinem paulò ante insertionem procul ab osse abscedere oportuit, & in medio triangulare interuallum efformari, cuius basis est latitudo calcis extra tibiæ fibulamque prominentis; alia verò duo latera constituuntur, vnum quidem tendinis ipsius <sup>q</sup> anteriori sede, alterum autem posteriori regione illorum musculorum, qui sub quarto, vt diximus, reconditi posteriore tibiæ regionem occupant. In horum laterum medio foramen consistit, quo lanij macatos boues suspendunt, quo etiam Pelides, apud Homerum, alligatum HecTOR circum Troiæ mœnia raptasse fertur. Sed vt ad rem redeam, quartus musculus exteriori sede, qua priores duos contangit, admodum liuidus est, quemadmodum & primus quoque ac secundus, ubi quarto conterminantur. Interna vero sede quartus non admodum liuet, & ipsius tēdines carneis quibusdam fibris intextuntur, longius anteriori sede, quàm posteriori exporrectis. Illinc enim ubi tendo is omnino nerueus existit, vsque ad calcem, interuallum haud effatu dignum intercedit. <sup>r</sup> Quintus musculus, in sura etiam consistit, sub <sup>s</sup> duobus muscis, quos pedis digitos mouere dicemus, <sup>t</sup> membranæ adhærescens, quæ ab imo ad summū, tibiæ fibulamque copulat; & ab vtrisque ubi inuicē dehiscere incipiunt, exoritur, statimque ab exortu carneus, & latus efficitur, talisque ad inferiorem vsque fibulæ appendicem delabitur, posterius omne tibiæ latus sua latitudine occupans; & ligamento nonnunquā ac interno fibulæ lateri connatus, exortus sui robur ab ipso acciscit: ubi autem ad inferiorem fibulæ pertingit appendicem, ab interna sui regione <sup>u</sup> teretem profert tendinem, qui paulò superius iam sese in eodem musculo prodebat: Is ubi neruosus manifestò euadit, deorsum fertur <sup>x</sup> sinui incumbēs, quem in posteriori sede tibiæ processus, quem interiorum malleolum vocamus, inculpi diximus. In hoc sinu <sup>y</sup> transversum ligamentum tendini obducitur, ne dilabatur. Et hinc oblique versus pedis iuxta ossa contendit, donec in imam tarsi <sup>z</sup> ossis regionem inferatur, quod tesseram imitanti ossi proximum est, quodque cunei formam appositissimè exprimere, ac præsentis musculi gratia, processu donari <sup>a</sup> tradidimus. Musculus hic laniorum cultro confimilis est; nulla enim carnis portione deperdita, secundum latitudinem, ab altero laterum teretem educit <sup>b</sup> tendinem, sinu eo delatum, qui interiori malleolo ex tribus, quos inter calcem ac malleolum haberi diximus, proximior est, & sub transverso ligamento sinum hunc obtegente. <sup>c</sup> Sextus pedem mouentium, in anteriori cruris regione, cæteris omnibus eminentior consistens, & exacti musculi faciem præ se ferens, nascitur <sup>d</sup> ab anteriori sede coartulationis fibulæ cum tibiæ, ex vtriusque ossibus & communi eorum ligamento, exortum assumens, qui acuto incipit angulo, & ilico dilatatus musculi ventrem constituit latum paulò magis quàm profundum. Priusquam verò medium longitudinis superet, gracilescere incipit, donec multò supra tarsum in <sup>e</sup> teretem euadat tendinem, qui transversum ligamentum à tibia in fibulam pronatum iuxta tarsum subiens, ad pedis interiora descendit, exiguo sinu, in tarsi ossium cum Nautiformi ligamento impresso, tantisper

Quintus,

Sextus,

per

z. xlii. g.

l. t. i. v. t. xv.

fi. xvi. c.

m. t. xlii. j. t.

z. t. ii. f. t.

iii. z. t. viii. t.

t. xlii. g.

t. xlii. d.

o. l. i. v. t. vi. fi.

nix. v.

p. t. xlii. a. fi.

ex duobus

or & ex j.

q. t. xlii. x.

r. ta. xv. fi. xv.

DEC. ta. iii.

p. t. ii. z. t. i. g.

ta. viii. x. ta.

xlii. x. tab.

xvi. fi. xvi. f.

s. t. xlii. a. z.

t. t. xv. fi. xvi.

T.

u. t. xv. fi. xv.

E.

x. li. ta. vi. fi.

ix. m.

y. t. xv. fi. xvi.

d.

w. li. ta. vi. fi.

x. j.

a. li. i. t. xxxi.

b. t. xv. fi. xvi.

E.

c. t. i. v. t. ii. o.

t. iii. z. t. iii.

4. tab. xv. fi.

xvi. g.

d. t. i. d.

e. cad. x.

per euectus, quousque ad internam pedij ossis regionem pertingat; quo pollex innititur, valida implantatione non quidem in processum, vt ait Vesalius, sed in finem insertus, qui in hac ossis huius parte ad ipsius initium conspicitur, (nec video quid ipsum eo compulerit, vt os istud peculiari processu inibi donari assereret) & duum primorum pedij ossium cum tarso commissuram apprehendens. Musculus hic latere suo interiore lateri externo committitur acutæ tibie ossis lineæ, quæ externum excarnis tibie fedis latus constituit, quæque introsum obliquatur, vt sexto huic musculo, & ijs, qui sub eo reponi dicuntur, sedem exhibeat: externo autem latere, toto à principio ad finem progressu, musculo committitur, pedem mouentium <sup>f</sup> septimo. Qui angusto, tenui & neruoso principio ab externo fibulæ appendicis latere, & ex ligamentis ossa hic connectentibus exoritur, vnde § quartum quousque pedem mouentium musculum enasci retulimus; & hinc deorsum iuxta fibulam prorepat, modicè dilatescens, & muris imaginem assumens. At paulo post sui exortum ab osse abscedit, & <sup>h</sup> octauum pedem mouentium musculum supergreditur, toto eo intervallo, quo à fibula abscedit, ad medium vsque longitudinis ipsius, carnosus & rubicundus interna facie redditus, externa verò & ad latera liuidus atque carnosus, <sup>i</sup> validum in medio procreans tendinem; qui licet interius carne obducatur, vbi tamen infra medium fibulæ longitudinis descendit, nerueus omnino euadit, & <sup>k</sup> teretem proferens tendinem, obliquè nonnihil in posteriora descendit, denudatum relinquens <sup>l</sup> malleolum, & sinu transmissus, quem in id posteriori inferioris fibulæ appendicis parti exculpi diximus, transuerso ligamento obductum quod à fibula in talum calcemque procedit: & hinc deorsum in priora, in pedium vsque tendit, transuersumque per ipsum ductus, mediocri sinu transmittitur, vnde quoque humore, tenuique membrana obducto in inferiori sede tarsi ossis tesseram imitantis insculpto: ac in radicem pedij ossis pollicem sustententis contendit, <sup>m</sup> asperitati appendicis, quæ in exteriori ipsius sede in id parata habetur: nonnunquam verò in radicem pedij ossis, quo medius fulcitur digitus, insertionem molitur. Dum autem prædicto tarsi ossis sinu tendo is deuehitur, durior efficitur, & cartilaginis naturæ participes. <sup>n</sup> Octauus musculus, qui septimo, præter anteriorem tendinis partem, totus subternitur, ab anteriori fibulæ sede nonnihil versus anteriora, paulò infra superiorem appendicem, principio carnosus enascitur; talisque semper permanens, ac fibulæ semper attensus, deorsum prorepat, dum longitudinis ipsius mediū transcendat. Tumque in teretem abit tendinem, qui anteriori sedi tendinis septimi musculi attensus, versus malleoli posteriora reflectitur; & sinui etiam in postrema fibulæ appendicis sede insculpto incumbens, & transuerso ligamento circumdatus, in priora descendit, in ramulos duos, paulò ante insertionem diremptus, qui processui pedij ossis paruum digitum sustententis inferuntur. <sup>o</sup> Nonus musculus iuxta cruris mediū ad externum latus, principio carnosus enascitur ex <sup>p</sup> quarto musculo, qui in anteriori tibie sede locatus, quatuor pedis digitos extendit; mò verò musculus is nihil præterea est, quàm carnis portio, quæ deorsum versus tarsum ducta, in tendinem abit, qui transuersum tarsi ligamentum subit, & in superiore pedis regione subiectis ipsi musculus, neruosarum fibrarum interuentu commixtus, in duas postmodum partes dirimitur; quæ in superiorem pedij ossis paruum digitum sustententis regionem inferitur, non procul ab ea sede, qua ossi tesseram referenti articulatur. Musculum hunc aliqui partem illius faciunt, qui digitorum extensioni præest, quod ab eo exoritur, & in eum desinat. Ego autem cum in nullum digitorum os adigatur, eum inter pedem attollentes, reducentesque connumerabo. Hi sunt musculi omnes, pedis motuum opifices; Quorum primus, secundus, & quartus posteriorem cruris regionem occupant, & vnà omnes tendinem producant: & calcem sursum in posteriora trahentes, pedis reliquum fortiter solo firmant, à quinto nonnihil adiuti; qui calcem attollens, vt summis etiam digitis nitamur, auxilio est. Tertius eodem munere fungitur, quamuis admodum obscure. Sextus, septimus, octauus & nonus, vbi æquè laborant, sunt contrariæ functionis opifices; summum namque pedem versus genu attollentes, vt calci nitamur, efficiunt. Si verò pedis

exten-

Septimus.

f. t. vi. a. ta. i. a.  
t. ii. x. t. ii. g.  
t. iii. 7. t. viii.  
t. ta. ix. a. ta.  
xiii. K. t. xv.  
fi. xv. V.  
g. ta. vi. x. ta.  
xiii. b.  
h. ead. f.  
i. ead. g.

x. ead. j.  
l. ead. a.

m. lib. i. ta. vi.  
fi. x. a.

Octauus.

n. t. ii. iii. f. ta.  
iii. j. s. t. v. g.  
t. vi. x. t. ix. b.  
ta. xiii. v. ta.  
xiii. l. m. ta.  
x. vi. x. v. a.

Nonus.

o. t. iii. a. ta.  
iii. g. t. ii. iux  
ta a. ta. v. &  
t. ix. a.  
p. t. iii. x.

Ipsorum musculus.

extensores omnes, flexionisque auctores alternatim contrahantur, ad latera pedem agimus.

*De Musculis pedis digitos mouentibus.*

Cap. 39.

**P**edis digiti omnes, vno excepto pollice, eodemmet modo, quo & manus digiti, motu cientur; & proinde isdem propemodum musculis donantur. Quorum <sup>Primus musculus pedis digitos mouens.</sup> primus ille est, qui secundos quatuor digitorum flectit articulos, pedis apice, quoad eius fieri potest, calci adducto. Is à manus <sup>b</sup> musculo in hoc euariat, quod breuior est & latior; & præ sui magnitudine tenuis, quoddam non ex tibia, quemadmodum ille à cubito enascitur, sed ab ima calcis ossis <sup>b</sup> regione, ex anteriore ipsius tuberculi parte, quam solo figimus, principium partim nerueum, partim carnosum defumit; & ilico ab exortu, exactè carnosus efficitur, sensumque ac sensim dilatescens, in maiorem latitudinem quam profunditatem assurgit. Mediam verò pedis longitudinem prætergressus, in <sup>c</sup> quatuor carnosas portiones dirimitur, quarum vnaquæque tendinem educit, qui ad secundi ossis digiti, sibi præpositi radicem rectà in eam se adactus excurrit, ac postmodum dilatescens, ossi vniuerso attenditur. Tendines hi in singulos digitos per totam primi ossis longitudinem sub transuerso ligamento contendunt, illi consimili, quod in primis digitorum ossibus haberi monuimus, quousque diuisi, quemadmodum & manus tendines, singuli subiecto sibi tendini viam præbent. <sup>Secundus.</sup> Secundus & <sup>c</sup> tertius musculus, tertij quatuor digitorum, & secundi pollicis articuli flexus opifices, quarto tibiam mouentium musculo substernuntur, quinto verò incumbunt, cui figura & mole correspondent, prædeuntque <sup>f</sup> secundus quidem principio carnosus à posteriori sede connexus fibulæ ad tibiam, iuxta genu; sicque deorsum fibulæ attensus procedit ipsi aliquandiu connatus. Postmodum tertium musculum qui sequitur, conscendit nonnihil dilatescens; & sub <sup>g</sup> maximo furam efformante musculo ad infimam vsque tibiam sedem descendit; ibique ab interna sede teretem promit <sup>h</sup> tendinem, qui superius nonnihil in conspectum venire incipit; ac deinde sub transuerso ligamento per <sup>i</sup> sinum deducitur, quem huius gratia ad internum calcis latus, quo talus excipitur, insculpi diximus. Sinu hoc & ligamento transacto, statim pedis inferiora obliquè subit, inter musculorum <sup>k</sup> tendines, qui prima digitorum flectunt internodia, & eos <sup>l</sup> quibus quatuor digitos pollicis adduci tradidimus; & vltius prorsus, sub quodam ligamento per omne primum pollicis os deferitur, dum in secundum eiusdem digiti articulum adigatur. <sup>m</sup> In plantæ autem medio tendo is <sup>m</sup> ramulum diffundit, qui tendinibus aliquot tertij sequentis musculi commiscetur, & vnà cum illis ad tertij pollicis, & medij digiti articulum flectendum opitulatur. <sup>n</sup> Tertius musculus quinto pedem mouentium, <sup>Terminus.</sup> insternitur, vti diximus, cui perinde, ac secundus assimilatur, & vnà cum secundo per posteriorem tibiam sedem porrigitur, licet introsum magis quam ille, magis enim tibiam ossi quam fibulæ attenditur, latus permanens. Proximè verò ad calcem perductus, ab interna etiam sede <sup>o</sup> teretem depromit tendinem, qui sub transuerso ligamento, per <sup>p</sup> sinum deducitur, qui huius occasione in medio duorum sinuum inibi consistentium exculpitur; & hinc deorsum ad plantam subtus secundi musculi <sup>q</sup> tendinem fertur, bisurcatus quodammodo redditus. Secundi enim musculi tendo ab exterioribus introsum in anteriora reptat; tertij autem tendo ab interioribus nonnihil extrorsum fertur, modicè coarctatus, & in alios <sup>r</sup> quatuor tendines diremptus, qui ad tertium præpositi digiti os, singuli conferuntur, tendines primi musculi parientes, non aliter quam in <sup>s</sup> manus digitis fieri prodidimus. Huius musculo tertia digitorum internodia flectendi munus conceditum est; Adeo, vt primus secundum quatuor digitorum flectat articulum; secundus verò & tertius tertij quatuor digitorum, secundi autem pollicis articuli flexionem moliantur. <sup>t</sup> Hos musculi decem consequuntur illis respondentes <sup>u</sup> qui in manu inter postbrachialis ossa reponuntur; quamuis enim hi non ita exactè vt illi distinguantur, imò carnea quadam moles cuncti videntur, quæ fibris secundum pedij longitudinè interstincta, ossium opplet

*Decem alij musculi.*



opplet interualla, ac digitorum radici vtrinque, nonnihil versus interiora conferitur; attamen quia aliquod distinctionis vestigium commonstrant, & ob rationem nos ad id impellentem, præstabit in decem eos partes sejungere, binos musculos inter duo quolibet ossa collocantes, primis digitorum articulis inflectendis deseruien-  
 tes. \* Decimus quartus igitur, in anteriore cruris regione sub <sup>y</sup> sexto pedem mouen-  
 tiū musculo consistit, & ex tibiæ ossē, quā id fibulæ sub genu articulatur, <sup>z</sup> neruoso  
 principio enascitur; à quo statim carnosus efficitur, ad medium vsque <sup>z</sup> tibiæ longi-  
 tudinis descendens, vbi <sup>b</sup> carneam portionem educit, ex qua nonum pedem mouen-  
 tium musculum efformari docuimus: ac deinde per cruris anteriora, ad <sup>c</sup> transuer-  
 sum ligamentum proximè descendit, quod in tarso haberi dictum est, vbi in tendi-  
 nem abit, qui per id ligamentum veluti per anulum deducitur. Priusquam verò to-  
 tus euadat, in <sup>d</sup> quatuor alios tēdines diffinditur, qui ampliores redditi, rectā in qua-  
 tuor digitos excurrunt, toti eorum longitudini sese inferentes. Estque munus ip-  
 sorum digitos in quos terminantur, extendere. \* Decimus quintus in anteriori tibiæ  
 sede collocatus, partim nuper commemorato subijcitur, partim interno ipsius lateri  
 superiacet; Et <sup>f</sup> ab externo tibiæ ossis latere, vbi <sup>g</sup> membrana exoritur, tibiā fi-  
 bulamque colligans, caroso principio educitur; & hinc eidem membranæ adhæ-  
 rescens per spatij longitudinem, quod inter tibiā, fibulamque intercedit, nonni-  
 hil extrorsum obliquatus, deorsum fertur, ac in <sup>h</sup> tendinē postea desinens, sub tran-  
 sverso <sup>i</sup> ligamento in tarso consistente ducitur, rectā tantisper prorsus, dum in to-  
 tam pollicis longitudinem adigatur. Huius beneficio pollex in neutrum vergens la-  
 tus extenditur. \* Sextus decimus pedio infernitur, & ex ligamento, quæ os tessera  
 referens calci committunt, iuxta externum ipsius ossis latus, caroso <sup>l</sup> principio ena-  
 scitur, (imò totus ipse musculus carneam molē præ se fert) & oblique in priora ver-  
 sus digitorum radices properans, in quatuor carnosas portiones diffinditur, ex qua-  
 rum singulis tendo efformatur. Horum verò tendinum primus interiori pollicis fe-  
 di in superiora paululum inseritur, secundus in indicem infigitur, sicque deinceps  
 in suos alij digitos inseruntur, ad paruum vsque digitum, cui ferè tendo nullus ex-  
 porrigitur, præterquam vbi musculus quinque adipiscitur tendines, quod perquam  
 rarò euenit. Musculus is etsi paulo seuerius loquendo, in plures distingui posset;  
 confusione tamen euitandæ gratia, vnus eum loco connumerabo, cuius interest,  
 digitos extrorsum reuellere. <sup>m</sup> Decimus septimus in externo pedis latere consistit, &  
 ab externo calcis latere, ex tuberculo quod inibi haberi reuolimus, neruosam trahit  
 originem. Verum paulò post carnosus efficitur, & exactam musculi speciem subit,  
 sicque proximè ad paruum excurrit digitum, vbi in tendinem conuertitur, qui se  
 in externum primi ossis digiti huius latus indit. Musculi huius vi, paruus digitus à  
 cæteris abducitur, & quinti tendinis defectui suppletur, qui in decimo septimo mu-  
 sculo vt plurimum desideratur; quemadmodum etiam in manu fieri monuimus.  
<sup>n</sup> Decimus octauus interno pedis lateri secundum totam ipsius longitudinem pro-  
 tenditur, & peculiarem adhuc musculi seruat imaginem, ex calcis, & tali vinculis  
 principium desumens carnosum. Ac postmodum sese diffundens procedit ad me-  
 diam ferè vsque pedis regionem, vbi denuò angustatur in teretem finiens tendinem  
 qui externo lateri primi pollicis articuli applantatur. Huius est, pollicem à cæteris  
 digitis deducere. <sup>o</sup> Quatuor insuper alij supersunt musculi nobis enarrandi, <sup>p</sup> qua-  
 tuor digitos introrsum flectentes, qui non secus, atque in manu tendinibus qua-  
 tuor adhærescunt, qui tertium digitorum flectunt internodium. Sed in hoc hi ab  
 illis euariant, quòd non à tendinum inuolucris vt illi, sed ab externa ligamentorum  
 fede nascantur, tarfi, & plantæ ossa colligantium; & in quatuor postmodum exiles  
 musculos dirimuntur, qui singuli in internam digiti sibi è directo positi radicem  
 conferuntur. Sunt igitur in vniuersum, qui pedis digitorum motibus præfunt mu-  
 sculi, duo & viginti.

Decimus quar-  
tus.Decimus quin-  
tus.Decimus sex-  
tus.Decimus septi-  
mus.Decimus octau-  
us.x. t.iii. x. t.i.  
v. t.ii. o. t.iii.  
a. t.v. n.  
y. t. v.  
z. t.iii. n. z.  
a. ead. n.  
b. ead. n.  
c. t.iii. d.

d. t.iii. z.

e. t. v. o. t. i. p.  
t.ii. o. t. a. iii.  
y. t. a. iii. 14.  
t. v. 7.  
f. l. i. t. a. vi. fi.  
ix. g.  
g. t. xv. f. i. xv.  
T.  
h. t. v. 7.  
i. t. iii. d.x. t. v. p. t. vi.  
n. t. vii. d.  
l. l. i. t. vi. f. i. x.  
4. cum a.m. t. i. n. t. i. x.  
a. t. x. i. l. s.p. t. i. i. l. i. t. i. i.  
n. t. a. vi. x. t. a.  
v. i. a. t. x. i. i. p.  
t. x. i. i. i. p.o. t. a. x. i. i. i. a. p.  
t. x. v. f. i. x. v. H.  
p. t. x. i. i. i. 6.

*De Coxendicis, & genu articularum, deq; reliquis omnibus,  
tum in crure, tum in pede positis ligamentis.*

Cap. 40.

**L**igamēta ob tenuitatem in figuris designari non possunt, sed iam antea dictum est; characteres igitur, ipsorum duntaxat locū de- notabunt.

a t. xlii. o.  
b t. x. d.  
c t. xliii. b.

d pro isto & sequentibus vide. t. xv. ff. xvii.

Ligamentum quo ilium os sacro ossi connectitur, impensè validum est, latum, & membranae in modum tenue, atque articulum circum vndique amplexatur. Portio autem ipsius sese inter os atque os inferens, crassa vsque adeo & dura euadit, vt cartilago ferè videatur, cuius vi & alterius cartilaginis interuentu, duo hæc ossa inter se perinde ac pubis ossa, validissimè committuntur. Aliud insuper ossi sacro teres<sup>a</sup> ligamentum obtigit, ex latere connexus quinti ossis sacri cum sexto enatum, & in acutum coxendicis processum desinens: nec non<sup>b</sup> aliud ex eodem sacri ossis latere productum, & in coxendicis appendicem insertum; Quæ præterquam quod ossa hæc firmitus colligant, sedem etiam, ac ipsius musculos suffulciunt. Ad hæc, c Membrana in pubis ossis foramine visitur, illi similis quæ vlnam ac radium secundum ipsum longitudinem connectit, & exteriores musculos ab interioribus dirimit. Membranae huius fibrae, oblique extrorsum descendunt. d Præcipua ligamenta femur coxendicis ossi copulantiā, duo censentur. Vnum circum circa articulum amplexatur, vt in quouis alio articulo fieri conspicitur. Sed ligamentum id reliqua omnia totius corporis ligamenta robore, atque crassitie longè superat; prout connexus huiusmodi postulat, quippe quo moles corporis vniuersa firmatur, stabiliturque. Tantique exitit momenti, vt eiusdem articuli appellatione donatum sit. Quinetiam præter insignem ipsius duritiem crassitiemque, aliud insuper peculiare ipsi obtigit, quod nec femoris capiti, neque acetabuli ossis coxendicis supercilio connascitur, nec ab ipsis educitur; quinimo ceruicem femoris vniuersam ambit, illi nassquam, quàm ad magni femoris processum radicem orbiculatim circumnatum: ossi etiam coxendicis, paulò supra ipsius acetabuli supercilium affigitur. Quod quidem facilius femoris capitis motus gratia effectum est, quod interdum è sede pro- filit, vt cum vnus pedis calcem alterius pedis cauo adhibemus. Ligamentum id præterquam quod sinum adauget, confert etiam ne in vehementioribus motibus, sinus supercilium vsque adeo faciliè dimoueat. Alterum ligamentum intra articulum consistens, ex medio capitis femoris ab exiguo eo foramine, quod inibi haberi diximus, enascitur, & in acetabuli medium inferitur, nonnihil inferius, vbi adipis paululum visitur. Id teres est, mediæ inter neruum & cartilaginem duritiæ, & ne femur superius luxetur, cum graui pondera attolimus, prohibet. Genu articulus, præter commune ligamentum, alia insuper admodum robusta sibi vendicat. Quo- rum primum, quod perquam validum est, & sub poplite reponitur, ex media poste- riori tibia regione pronascitur, & rectà sursum fertur, duo educens capita, quæ in posteriorem vtrorumque femoris caput sedem inserit, quæ maximè hæc inuicem abscedunt. Secundum in articuli medio consistens, validissimum est & cartilaginis naturæ compos, & totum ex paruo colle inter duos tibiae sinus reposito enatum, in posteriorem femoris partem, quæ capita inter se maximè distant, non procul à nuper commemorato applantatur. Præter hoc ligamentum, aliud etiam nonnunquam in articuli medio ligamentum occurrit, lubricum ac tenue, ad anteriorem prædicti regionem, quod pariter à tibia in femur excurrit. Tertium exteriori genu regioni adnatum teres, ac validum est, & tibiam fibulamque femori deuincit, parsque ip- sius humilior<sup>e</sup> septimi musculi capiti substernitur, quem pedis motus auctor em fecimus. Quartum ligamentum interiorem genu sedem occupans, tenuius est, ac mollius secundo, quandoquidem inibi haud valido insigniter opus est ligamento; & ab interno femoris latere ortum, versus quartum ligamentum exterius confi- stens, in priora contendit. Anterior genu sedes, licet peculiari vinculo destituarur, molæ tamen ac tendinibus, quibus obuincitur, firmiter admodum colligatur, qui arti- culum ita constringunt, vt neq; peculiari, neq; cōmuni ligamento sit opus. f Præter

*Ligamenta fe-  
mur coxendicis  
ossi colligantia.*

*Primum genu  
ligamentum.*

*Secundum.*

*Tertium.*

*Quartum.*

*Anat. Val.*

L

hæc

*Tibia ac fibula  
ligamentum.*

hæc autem commemorata ligamenta, peculiaris etiam cartilago in genu habetur, nervo non nihil durior, cartilagine verò mollior; quæ quantum momenti ad articuli huius robur habeat, superiore libro demonstraui. Ex huiusce cartilaginis labijs ligamina quædam circum enascuntur, eam tibiæ, ac femori colligantia. § Ti- g tab.xv.fig. xvii.r.  
bia etiam fibulaque superiori sede valido admodum vinculo connectuntur, quod ossa hæc, quemadmodum aliud quoduis ligamentum solet, vndique circûdat extrinsecus. Quæ verò tibia fibulaque inuicem distant per ipsorum longitudinem<sup>h</sup> tenue<sup>h</sup> ac latum habetur ligamentum, illi simile, quod inter vnam ac radium exporrigi tradidimus; quod à tibia in fibulam contendit, fibris quibusdâ donatum, oblique deorsum à tibia in fibulam excurrentibus. Ligamenti huius munus est, tibiâ fibulamque colligare, & anteriores musculos à posterioribus dirimere, ac musculis à crure nascentibus maius robur addere. Pedis ligamenta nonnulla iam recensuimus, transuersa nimirum; sub quibus aliquot musculorum tendines deferuntur; quorum aliqua pedis quoque ossium commissuræ conferunt; quædam verò tendinibus duntaxat custodiendis deducendisque vsu præstant. i i.iii. f. ii. A.  
Primum igitur ex transuersis ligamentis in tarso consistit, & tibiâ fibulæ connectit, præterquam quod plurimos transmittit tendines. \* Secundum ab interiore malleolo proficiscitur, & in calcem inferitur, ossium quoque colligationem adiuuans. Id quamvis vnicum videatur, si tamen sedulo attenderis, tria tibi occurrunt, veluti anuli tres; quorum vnumquodque priuatum obtegit sinum, quo tendo hunc in modum deducitur. Calci proximus,<sup>i</sup> musculus tendinem transmittit, qui secundum pollicis internodium flectit. i i.iii. f. A. m cad. d.  
Secundus primo assidens<sup>m</sup> tædini viam præbet tertios quatuor digitorum articulos flectenti. Per tertium, <sup>n</sup> quinti musculi tendo defertur, pedê mouentis. ° Tertium transuersum ligamentum, à fibula in calcem porrigitur, & duo hæc ossa colligat: vbi verò duobus in hoc osse insculptis sinibus obtenditur, hoc tantummodo præstat, vt<sup>p</sup> septimi & octauî musculi pedem mouentium tendines, qui per eos deducuntur, quò minus elabantur continet. q Hæc etiam in inferna pedis digitorum regione transuersa ligamenta consistunt, illorum instar, quæ in manus digitis haberi narrauimus, & præter hæc alia etiam complura. In primis vnum à tibia in fibulam procedens, vtranque inferius colligans, latum ac tenue perinde, ac reliqua articulorum ligamenta existens. Aliud quod tibiâ fibulamque talo connectit, communibus articulis amplexantibus ligamentis consimile, & quatuor quæ quatuor tali ossis latera quatuor illis ossibus copulant, quæ illi committi retulimus. Ex hisce autem quatuor ligamentis quædam os circum circa comprehendunt, quædam inter os, atque os adiguntur. Primum ipsorum ab externo tali latere proficiscitur, & in internum tibiæ processus latus innascitur, duo hæc ossa colligas. Secundum externam sedem occupat, primo consimile. Tertium præualidum & cartilaginis naturæ compos, ab inferiore tali sede, iuxta ipsius ceruicis radicem, quæ calci committitur, exortum adipiscitur, & eidem ossi inter duo latera, quibus talo coarticulatur, inferitur. Quartum tali os nauiformi connectit, ex tali ceruicis radice natum, & prædicto ossi consertum, vniuersumque ambiens articulum. Præter quatuor hæc, membraneum aliud ligamentum omni ex parte calcis cum talo ambit connexum; & validum quoque aliud ex tali ceruice, vsque ad os tesseram referens contendit. Aliud insuper adest, quo calci os ossi huic tesseram imitanti colligatur, quod robustum quoque est, & cartilaginis naturæ particeps, sed articulum duntaxat amplexatur. Tarsi ossa quemadmodum & brachialis, duris & cartilagineis quibusdam vinculis tum inter sese, tum etiam nauiformi committuntur. Præter quæ, in inferiori tarsi regione validum & peculiare consistit ligamentum, quod non solum ossa ipsius vincit, verum etiam inter ossa inditur, ea inuicem firmiter connectens. Superfunt nobis recensenda pedij, ac digitorum ligamenta, quibus enarrandis, cum manus ligamentis sint consimilia, super sedeo.

*Aliud pedis of-  
sui ligamentum.*

De Musculorum Numero. Cap. 41.

**M**usculorum omnium catalogum maiori qua potui breuitate recensui, quorum numerus difficili negotio sciri potest, non quod enumerari non possint, sed quod variae de hoc habeantur sententiae. Alij siquidem musculum, quo brachium pectori abducitur, vnius loco recensent, vti nos facimus, continuationi ipsius attendentes. Alij duplicem statuerunt, fibrarum varietatem spectantes, siue forsan triplicem. Eodem modo nos secundum musculum scapulas mouentem vnius vice habemus; Alij vero, animum vario muneri attendentes, duplicem faciunt. Idem euenit de musculo brachium attollente, nec non de musculis omnibus triangularibus, semur mouentibus. Nonnulli etiam singulis costarum intervalis quaternos assignant musculos, functionum spectantes varietatem, vti ipsi facimus; alij verò binos. Sic alij insuper complures in musculorum numero constituendo, variae rationes habentur: attamen si diuisioni, quam nos in eorum historia institui mus, attenderis, nouem supra quadringetos in vniuersum exurgunt. Horum verò sciendum est, duos frontem mouere; tres vtranque palpebram; quinque vnumquemque oculum; quatuor nasum; totidem labia; quatuor malas; octo inferiorem maxillam; totidem os hyoidis, decem linguam, octodecim laryngem, decem quidem proprios, octo autem communes. Capitis motus musculi quatuordecim absoluunt; Dorsi sexdecim, brachiorum quatuordecim, scapularum octo, thoracis nouem & octoginta, ex quibus octo abdomini deferuiunt. Vnae vtriusque motibus decem praesunt; octo vtriusque radij, sex & quinquaginta manus digitorum, quatuor genitalis, duo testium, tum in maribus tum in foeminis, vnus colli vesicae, tres ani, viginti femoris, totidem crurum, octodecim pedum, quatuor & quadraginta pedis digitorum. Sicque musculorum historiam absoluimus.

De Membrana, quae ossibus circumdantur *Ἐπίσσω* dicta.

Cap. 42. *ἔστω* ultimum.

**P**ro libri huius absolutione, de membrana duntaxat nobis agendum superest, quae ossa extrinsecus obuincit, graecis ob id *Ἐπίσσω* dicta. Haec vna est ex spermaticeis corporis nostri partibus, vna cum ipsis, nec tamen ex ipsis priuatim genita. Constat autem ex tenui tunica, & sensu admodum exquisito pollet, cui id peculiariter muneris concediturum est, vt sensus in ossibus defectui suppleat. Egimus igitur de Cuticula, Cute, Adipe, Membrana carnosa, de Musculis, & Periostio, quae sunt omnes ossa vestientes, & obtegentes partes.

# PRIMAE MVSCVL ORVM TABVLAE

## CHARACTERVM INDEX.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>P</b> <i>PRIMA hac tabula refert figuram hominis, cui cutis cum sua adipe ac venis, totaq; membrana carnea adempta sunt; ea tantum parte carnea membrana excepta, quæ musculi naturam induit. Verum lector monendus est, hanc differre à Vesalii figura, quod in hac carnis fibrarum ductus, quo modo singule inferantur in suos musculos, apertius demonstretur.</i></p> |   |
| A   | Musculus frontis.   |
| B   | Musculus temporalis.  |
| CC  | Claudentes superiorem palpebram.  |
| D   | Alas nasi aperiens.   |
| G   | Pars anterior ossis iugalis.  |
| H   | Musculus labii superioris, quadam sui parte nasum petens.   |
| I   | Principium masseteris.  |
| T   | Latus musculus carnosus constans membrana, & præcipuus buccarum labiorumque, & anterioris colli cutis motuum. Quod autem ad præsentis musculi fibrarum progressum attinet, K ad Lvsque, notat musculi principium, è regione ossis pectoris ac mediæ claviculæ sedis ossi pectoris proximæ incipiens, cuius fibræ recto tramite fursu ad M, exporriguntur. Et ab L, ad N, notatur principium, quod oritur ab altera medietate claviculæ, & à summo humero: Inde per obliquum ascendit versus partem anteriorem. Notandum autem est, hunc musculum ut plurimum non habere eam latitudinem, quam ei Vesalius tribuit in tertia musculorum tabula: sed neque vnus musculus iungitur alteri, sine interuentu membranæ carnosæ, quam hic secumimus, quo liberos musculos relinqueremus. |
| MN  |   |
| P   | Musculus brachium attollens, cuius in hac figura dimidium tantum conspicitur, in sequenti reliquum apparebit infigitum M.   |
| Δ   | Musculus brachium pectori adducens, qui in quarta tabula à pectore diuulsus notabitur eodem caractere.  |
| R   | Membrana pars huius musculi, quæ nervosæ tenuitati primi abdominis musculi iungitur.  |
| S   | Carnea eiusdem portio, quæ nascitur ex sexta, & septima costa.  |
| Q   | Præsentis musculi insertio, quæ clarius apparebit tabula proxima.   |
| V   | Musculus brachium deorsum trahens.  |
| 5.6.  | 7.8. His numeris insertiones musculi thoracem mouentium secundi notantur.   |
| Θ   | Abdominis musculus oblique descendens, qui cum suo coniuge vniuersam abdominis sedem cooperit. Exortus præsentis musculi numeris indicatur, quibus secundi thoracem mouentis musculi insertiones significatur, linea verò in medio ventris conspicua ab R ad X ostendit quo loco hi musculi concurrant.   |
| X   | Penis sua cute preputio liberatus.  |
| Y   | Vasa feminina.  |
| E   | Testes obuoluti membrana carnosâ.   |
| Z   | Musculus anterior cubitum flectentium.  |
| aa  | Posterior cubitum flectentium musculus.   |
| b   | Musculus cubitum extendens, qui ab humiliori scapulæ costa principium sumit.  |
| c   | Musculus bicorni tendine brachiale extendens.   |
| d   | Musculus radius in superum ducens.  |
| e   | Superior radius in pronum mouentium musculus.   |
| A   | Secundus brachium flectentium musculus: huius initium ostendit f, & h, tendinem.  |
| Π   | Musculus latus summæ manus producens tendinem, cuius principium indicatur i, tendinis verò principium x.  |
| ix  |   |

TABVLA I LIBRI II





|      |   |
|------|---|
| n    | Portio musculorum, quorū alter brachiali, alter verò pollicis tendines offert.  |
| o    | Excarnis primi pollicis internodij sedes.   |
| p q  | Duo musculi hac parte vidētur, quorum qui notatur p, inferitur in brachiale, & qui q, in duos secatur tendines, ex quibus vnus in pollicis primum articulum inferitur, alter verò in eiusdem pollicis sequentes articulos se recipit. |
| Σ    | In dextro crure primus notatur motus opifex, cuius initium f, insignitur, tendo autem t: u verò ipsius insertio.  |
| ft u |   |
| 2    | Finis secundi crus mouentium musculi. Finis tertij.   |
| 3    |   |
| Φ    | Sextus tibiā mouētium musculus, cuius principiu notat x: y verò sedem vbi carnosus esse definit, mēbranæque modo totū femur obuestrit, hæc sæpe in vulneribus femoris periculum adfert.   |
| xy   |   |
| a    | Musculus tibiā mouentiū nonus.  |
| β    | Octauus.  |
| γ    | Portio sexti & septimi musculorum femur mouentium. Inguinū præterea glandulæ.   |
| δ    | Octauus femur mouentium.  |
| ε    | Secundus tibiā mouentium.   |
| ζ η  | Excarnis tibiæ ossis pars. η vero internum malleolum.   |
| ↓ θ  | Sextus musculus mouentium pedē: huius ortum indicat θ. ipsius verò tendinis initium notat x, & finem eiusdem ζ.   |
| z    |   |
| λ    | Septimus ex pedem mouentibus.   |
| μ    | Tendo musculi pollicem erigentis.   |
| ν    | Musculus quatuor digitos extēdēs.   |
| ξ    | Qui pollicem in latum internum à ceteris digitis abducit.   |
| ο    | Ligamen trāuersum in collo pedis, quod in alterū latum sectione reflexum est.   |
| ω    | Tendo noni musculi pedem mouentium.   |
| ρ    | Primus pedem mouens.  |
| ς    | Quartus.  |
| τ    | Tēdo tertij musculi lōgus ac gracilis.  |
| υ    | Musculus tertiu quatuor digitorum os flectens.  |
| φ    | Pedem mouentium quintus.  |

## T A B V L A I I.

**F**IGVRA hæc nihil quo ad sectionis rationem differens, oculis in latum versa exhibetur: in hoc à Vesalij tabula diffentiens, quod in hac appareant musculi faciei, quodq, mēbrana sexti musculi tibiā mouentium diuisa sit, quo manifestiores sint musculi.

|    |  |
|----|--|
| a  | Vnus ex musculis frontis.  |
| b  | Primus musculus palpebre supioris.   |
| c  | Qui narium alas ducit.   |
| d  | Vnus musculorum labij superioris.  |
| A  | Temporalis musculus.   |
| B  | Os iugale: foramen illud ad ossis huius terminum, meatus auditorius est.   |
| C  | Musculus manfor, seu masseter.   |
| D  | Musculus buccarum motibus subseruiēs, & ex vna maxilla in alteram pronatus.  |
| E  | Musculus ab inferiori maxilla in os hyoides productus.   |
| F  | Musculus à pectoris osse in os hyoides insertus.   |
| G  | Tertius musculorum laryngi cōmuniū, qui ex elatiore ossis pectoris sede enatus, finitur in primam laryngis cartilaginē.                          |
| H  | Quædam glandulæ retro auriculam.   |
| I  | Primus capitis musculus.   |
| KL | Dimidia pars musculi mouentis humeri scapulā, quæ in noua tabula ostenditur sub Γ & Δ.   |
| M  | Musculus brachium mouentiū primus. Idem manifestior erit in tab. 4. nota E, & in decima Δ.   |
| N  | Secundus cubitum flectentium.  |
| O  | Cubitum extēdēs musculus ex ima scapulæ parte enatus.  |
| P  | Hic quoque cubitum extendit, nascitur autem ex summa scapulæ parte.  |
| Q  | Hac in parte duo prædicti musculi cubitū extendētes coeunt. Quod autem insignis protuberat, tertius musculus extēdēs sub eo latus, in causa est. |
| R  | Cubiti apex in quem inferuntur musculi extendentes cubitum.  |

TABVLA II · LIBRI II ·



|               |   |            |  |  |   |
|---------------|---|------------|--|--|---|
| S             | Musculus radium sursum ducens.  |            |  |  | infertiones, quæ in medium octo costarum instar octo digitorum inferuntur.  |
| T             | Extendens carpum in geminum tendinem definens.  |            |  |  |   |
| V             | Musculus indicem, medium, & annularem extendens.  | ppp        |  |  | Abdominis musculi obliquè descenditis exortus.  |
| X             | Minimum præcipuè extendens.   | q          |  |  | Primus tibiam mouētium musculus qui in proxima figura notabitur cum o.  |
| Y             | Carpum extendentium infimus.  | r          |  |  | Sextus tibiam mouētium musculus.  |
| a             | Musculus flectentium brachiale inferior.  | f          |  |  | Pars musculi noni tibiæ mouentiū, qui in quarta tabula sub $\Phi$ cōspicius erit.   |
| b c           | Duo hic notātur musculi, quorū superior b, insignitus, carpo inferitur, inferior autē cui c, inscriptū est, in duos secatur tendines, vnū primo pollicis nodo inferens, alterum eiusdem duobus superioribus nodis.  | t          |  |  | Septimus tibiam mouentium.  |
| 1.2. 3.4.5.6. | His numeris notatur transuersum ligamentum in exteriori fede cubiti repositū: quod in tot rursus annulos diuiditur, quod numeris insignitur, quanquā ibidem non satis manifesti sint.   | u          |  |  | Primus musculus femur mouentiū.   |
| d             | Musculus pollicem indici iungens.   | x          |  |  | Maior processus ossis femoris.  |
| e             | Musculi pollicem indici applicantis tendo. Verū post hac obseruandi erunt characteres brachij sinistri, in eoque spectandi, tum qui in dextro conspicui sunt, tum præter eos plures alij. Idē igitur significant N P S T a b c d e. Item numeri 4. 5. 6. in manu sinistra atq; in dextra. At priuatæ dextræ manus notæ sunt hæ. | y          |  |  | Conspicua secundi femur mouentis musculi pars: reliqua tegitur musculo primo mouente femur, & cum sexto tibiæ motore.   |
| Z             | Anterior cubitum flectentium musculus.  | a          |  |  | Quartus tibiam mouens.  |
| f             | Musculus superior radium in pronum mouentium.   | $\beta$    |  |  | Tertius.  |
| g             | Musculus superior brachiale flectentium.  | $\gamma$   |  |  | Secundus.   |
| h             | Musculus latum in vola producens tendinem.  | $\delta$   |  |  | Quintus.  |
| i             | Musculus gibbam scapulæ sedē occupans, extrorsum brachium circumuertens.  | $\epsilon$ |  |  | Quartus mouens femur, cuius extimam partem notat e, anteriorem verò $\zeta$ . Idem musculus visitur septima tabula sub $\beta$ , & in octaua sub $\Phi$ , & c. & i duodecima $\Xi$ & $\Sigma$ . |
| k             | Musculi huius ope brachiū retrorsum flectitur ad superiora nonnihil vergens.  | $\eta$     |  |  | Octauus tibiam mouens.  |
| l m n         | Musculus brachium sursum trahēs, cuius inferius tabula nona indicium erit O, & in decima $\Theta$ .   | $\theta$   |  |  | Excarnis tibiæ ossis pars, verū interior malleolus priuatim $\kappa$ notat.   |
| $\Delta$      | Musculus qui brachium ad pectus applicat.   | $\lambda$  |  |  | In vtroque crure suram constituens musculus, qui mouentium pedem primus est.  |
| ooo           | Extremæ musculi pectus mouentis   | $\mu$      |  |  | Pedem mouētū musculus secundus.   |
|               |   | $\nu$      |  |  | Gracillimus totius corporis tēdo enatus à musculo, qui pedem mouentium tertius est.   |
|               |   | $\xi$      |  |  | Maximus inter suram constituentes musculus, qui pedem mouentium quartus est.  |
|               |   | $\omega$   |  |  | Tertium articulum quatuor digitorum flectens.   |
|               |   | $\rho$     |  |  | Pars quinti musculi pedem mouentium.  |
|               |   | $\sigma$   |  |  | Transuersum ligamentum ab interno malleolo in calcem pronatū.   |
|               |   | $\tau$     |  |  | Pollicem à reliquis digitis introrsū deducens.  |
|               |   | $\upsilon$ |  |  | Ligamentum musculo flectendi secundos articulos quatuor digitorum obnatum, & lati manus tendinis vicem in planta gerens.  |

- u Ligamentum musculo flectendi secundos articulos quatuor digitorum obnatum, & lati manus tendini vicem in planta gerens.  
 φ Sextus musculus mouentium pedē.  
 χ Septimus.  
 ψ Octauus, huius itemque septimi tendo inferius notatur Σ.  
 ω Extendens quatuor digitos musculus, cuius finis in duos diuisus tendines, cum in hac, tum in quarta figura signatur Ω.  
 A Δ Transuersum ligamentum tibiæ ossi, & fibulæ commune.  
 Θ Tendo musculi pollicis extendētis.  
 Ξ Inferior fibulæ articulatio, malleolū externum constituens.  
 Σ Transuersum ligamentum à fibula in calcem pertinens.  
 Π Musculus minimum digitum à reliquis abducens.

## T A B V L A I I I.

**P**RÆSENS tabula anteriore corporis faciem magna ex parte notans corpus exprimit, à quo cutis cum adipe carneq. membrana, venis cutem transmeantibus, & quibusdā musculis inter de glubendum (ut ferè fit) auulsis, sublata sunt: quandoquidem hanc tabulam in pictorum gratiam imprimis posui, quos relictū in membrana carnosā musculi valdè turbassent, quanquam his sanè non sat sit musculos in superficie positos ad admissim tenere, immò præter ossiū accuratissimam cognitionem, summa diligentia cuiusque musculi munus perspectum ipsis esse debet, quo sciant quando musculum aliquem aut breuiorem, aut longiorem, aut compressum magis, aut protuberantem depingere debeant, hoc axioma perpetuò ob oculos habentes, musculum dum os mouet, idq. ut sic dicam, ad suum ventrem retrahit, breuiorem, multoq. prominentiorem fieri, & ad ipsius ventris medium colligi: cum autem è conuerso musculos os dimittit, ipsūq. os aliā agitur, quam ab eo musculo duceretur, musculi ventrem (cui duntaxat illi artifices animum

*accommodant) produci ac subsidere minimumq. protuberare, quæ ratione sepe accidit, ut contactus alteri subiacēs musculi superiorem faciat protuberare; pictores autē, quoniam hunc agere existimant, non sine turpi errore contractionem depingunt.*

- A Glandulæ plurimæ sitæ sub aurium radice.  
 B Musculus natus à summo mento in os v imaginem referens insertus.  
 C Musculus eiusdem ossis natus ex altissima ossis pectoris parte.  
 D Musculus eiusdem ossis à superiori scapulæ costa in os hyoides insertus, hic in sequenti figura notabitur VV. in quinta cum R & S, sedes quæ vtrinque ad D literæ visitur latera, neruos continet sexti paris neruorum cerebri internis iugularibus venis, & arterijs soporalibus comitatos.  
 F Musculus septimus mouentium caput, à pectoris osse, & clauicula i mamillarē processū implantatus.  
 G Portio musculi scapulam mouentium secundi, apparebit autem torus in nona figura sub Γ & Δ, & in proxima dimidius sub K & L.  
 H Hac parte meant venę iugulares, sub quib. apparet musculus ossis hyoidis notatus D: est autē ille quem ostendemus in figura octaua notatum C.  
 I Clauiculæ anterior sedes, quæ excarnis occurrit.  
 K Musculus brachium mouentium primus.  
 L Secundum brachium mouentium.  
 M Os pectoris.  
 NN Musculi tertij brachium mouentium pars, superiori tabula notatur Γ.  
 OO Capita musculi mouentis pectus. Idē in octaua tabula notabitur F.  
 PP Præfens digitorum effigies, exortus est musculi primi abdominis oblique descendētis.  
 A Δ Musculi recti qui apparent sub abdominis primo, & secundo musculis.  
 Q Anterior cubitum flectentium musculus.

|     |   |    |  |
|-----|---|----|--|
| R R | Musculi iam dicti interioris capitis carnosâ pars, integri musculi ritu protuberans.  | r  | Septimus tibiam mouens.  |
| SS  | Secundus musculus brachiû flectēs.  | f  | Nonus.   |
| T   | Musculus extendentium brachium primus.  | t  | Octauus.   |
| V   | Superior musculus eorum qui radiû in pronum agunt.  | u  | Tendo quarti tibiam mouentiû musculi.  |
| X   | Musculus ad indicem post brachiale subiens, idque flectens.   | xy | Tibiæ os, nullo obiectum musculo.  |
| Y   | Musculus latum tendinem in manu producens: ab huius latere conspiciatur musculus, flexionis secundi quatuor digitorû articuli auctor, quem quintæ tabulæ Θ indicat.           | z  | Sextus inter pedem mouentes musculus.  |
| Z   | Musculus brachiale flectens.  | a  | Quatuor pedis digitos extendens.   |
| a   | Radium in supinû ducēs musculus.  | β  | Nonus mouentium pedem.   |
| b   | Musculus bicorni tendine brachiale extendens.   | γ  | Tendo musculi pollicē extendētis.  |
| c   | Duo musculi, quorum vnus tendinem brachialis ossi pollicem sustinenti præmittit: alter in binos diuisus tendines, vnum primo pollicis ossi; alterum secundo & tertio infigit. | δ  | Ligamentum ex transuerso ceruici pedis incumbens; subtrus autem transeunt quorundam musculorum tendines ad pedem.                        |
| d   | Tendo musculi pollicem indici applicantis.  | e  | Exterior, seu fibulæ malleolus excarnis.   |
| e   | Tendines in exteriorem indicis faciem exporrecti.   | ζ  | Septimus musculus mouentiû pedē.   |
| 3.  | 4-5-6. Copulæ transuersæ, quæ in externa carpi facie cōspiciunt, quas tamen ægrè pictor exprimat.   | η  | Secundus pedem mouens.   |
| h   | Musculus pollicē indici cōiungens.  | θ  | Primus musculus pedem mouentiû.  |
| i   | Musculus ab indice pollicē abducēs, cuius à latere positus est musculus primû pollicis articulum flectens.  | κ  | Tertij musculi pedē mouentis tendo.  |
| qj  | Musculus tendinem membranēum volæ adiuuans.   | ι  | Tendo quarti musculi pedis.  |
| k   | Membrana carnosâ testes obuelans.   | λ  | Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.  |
| l   | Glandulæ inguinû cavitati infartæ.  | μ  | Portiuncula quinti pedem mouentium: verum hæc, vt & reliqui apparentes in tibia sinistra, manifestius conspiciuntur in tabula superiore. |
| m   | Octauus mouentium femur. tabula octaua notabitur Σ.   | ν  | Transuersum ligamen à talo ad calcaneum pertinens.   |
| n   | Origosexti femur mouentium musculi, tabula octaua notatus Θ.  | ξ  | Musculus pollicē introrsû curuans.   |
| o   | Primus tibiæ musculus, ex ilium ossibus pronatus.   | ω  | Musculus cæteris digitis applicans pollicem.   |
| p   | Secundus tibiæ musculus à pubis ossium cōmissura originem ducēs.  |    |  |
| q   | Musculus inter tibiam mouentēs sextus: huius elatior pars carnosâ est; eiusq; sublata est membrana, quo melius conspiciantur musculi.   |    |  |
| p   | Secundus coxam mouens, qui deci-  |    |  |

ma tabula notatur Σ.

Septimus tibiam mouens.

Nonus.

Octauus.

Tendo quarti tibiam mouentiû musculi.

Tibiæ os, nullo obiectum musculo.

Sextus inter pedem mouentes musculus.

Quatuor pedis digitos extendens.

Nonus mouentium pedem.

Tendo musculi pollicē extendētis.

Ligamentum ex transuerso ceruici pedis incumbens; subtrus autem transeunt quorundam musculorum tendines ad pedem.

Exterior, seu fibulæ malleolus excarnis.

Septimus musculus mouentiû pedē.

Secundus pedem mouens.

Primus musculus pedem mouentiû.

Tertij musculi pedē mouentis tendo.

Tendo quarti musculi pedis.

Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.

Portiuncula quinti pedem mouentium: verum hæc, vt &amp; reliqui apparentes in tibia sinistra, manifestius conspiciuntur in tabula superiore.

Transuersum ligamen à talo ad calcaneum pertinens.

Musculus pollicē introrsû curuans.

Musculus cæteris digitis applicans pollicem.


## T A B U L A I I I I.

**P**RÆSENS. tabula quamplurimos præcedentis tabulæ musculos sectionis serie ademptos commonstrat, & deinde plerosque, qui prioribus figuris nondum in conspectum venire videndos offert: quod omnes ad octauam usque musculorum tabulam subsequētes tatisper præstabunt, dum ossa anteriori facie nuda conspiciantur.

**R** Musculus temporalis, cuius principiu semicirculo non absumile A, B & C circumscribitur.

**D** Ossis iugalis externa sedes, quæ excarnis est.


TABVLA III · LIBRI · II ·





|     |   |       |   |
|-----|---|-------|---|
| Δ   | Malleter qui inter musculos inferiorem maxillam mouentes secundus describitur. Huius musculi principium à mala exortum. F principij ipsius portio auri proxima. Ceterum ab E ad F, torus ipsius principij ductus secundum iugalis ossis longitudinem metitur. | Y     | notatum sumit, deinde alia principij partem Y indicatam, à clauiculæ fede pectoris ossi proxima obtinet. Ceterum Z infertionē ipsius insinuat, qua vniuersū mammillarem capitis processum amplexatur.   |
| E   |   | Z     | a Clauicula magna ex parte anteriori ipsius fede excarnis.  |
| F   |   |       | b Musculi scapulam mouentium secundū in latiore clauiculæ partem, & summum humerum infertio.  |
| G   | Infima musculi infertionis sedes notatur. Porro si triangulo hunc as- similem lubet, E, F, & G, tres angulos tibi proponere finges.   | c     | Musculorum hic magnam obscuritatē pariunt vasa caput adeuntia, & nerui in brachium excurrētes.  |
| H   | Nervulus minoris radices tertij paris nervorum cerebri, hac frōtis musculosam compagem, & elatiorē palpebram petens.  | d     | Musculus à clauicula in primam thoracis costam infertus, ac thoracem mouentium primus.  |
| I   | Nervulus dictæ modò radices ad superius labrum, & externā alæ nasi sedem propagatus.  | E     | Musculi brachii attollentis anterior pars, posteriorem decima ostendit tabula adhuc in sua sede repositam, ac Δ præcipuè insignitam. Proximè autē sequens tabula anteriorem hanc partem ab exortu liberam reflexamque, ac γ notatā commonstrat.   |
| K   | Cartilago in quam sinistrum nasi os definit.  | e f g | Porro in præsentī figura e, f, & g, cōspiciam hic musculi brachii attollentis partem, triāguli ritu describunt.   |
| L   | Ala nasi dextra dictæ modò cartilaginis extremo alligata incūbēsq;. Inter K & L, narium cute iā ablata cum quibusdam membranis ligamentis, in conspectum venit anterior alæ nasi musculus nimisquam tenuis.   | h     | Musculi brachium pectori adducētis infertio, quam in sinistro brachio Q, & T notavi, & ipsi musculo Δ quòque imposui, quo hi characteres ad præcedentis tabulæ notas referātur, ad quam quoque K, L, & R, spectant.   |
| M   | Musculus à superiori maxilla in inferiorem infertus, ac buccas mouentium secundus.  | KL R  | i Pectoris os liberum ab initijs musculorū brachia pectori adducētium.  |
| N   | Musculus dexter inferiori labro peculiaris.   | 234   | Secunda, tertia & quarta thoracis costæ, ad quas reliquæ seriatiim subsequuntur, atque in harum intervallis exteriores musculi intercostales sunt obuij. Lineæ autem in costis ductæ, atque ad characterū sinistrum consistentes, ossa costarum ab earundem cartilaginibus determinant: sunt enim illæ notæ cartilaginibus inscriptæ. |
| O   | Vix cōspicua est huius musculi portio, qui inferiorem maxillā deorsum vellit.   | QT Δ  | x Musculus scapulā mouētium primus.   |
| P   | Hac sede os reponitur v imaginem referens.  |       | l Musculus thoracem mouentium secundus.   |
| Q   | Musculus à temporum ossis processu styli formam imitante enatus, ac ossi v simili infertus.   | KLR   | m In sinistra axilla m latitat, musculus  |
| R   | Musculus dexter ab inferiori maxilla in os v referens, infertionē tentans, cuius cōiunx nonnihil quoq; hic se spectandum præbet.  | i     |   |
| ST  | Dexter & sinister ossis v imaginem experimentis musculi, à pectoris ossis summo pronati.  | 234   |   |
| V V | Musculus gracilis & longus, qui à superiori scapulæ costa ossi v referēti implantatur.  |       |   |
| Θ   | Musculus capitis motib⁹ subseruiēs.   |       |   |
| X   | qui ob osse pectoris principium X   |       |   |

TABVLA · IIII · LIBRI · II ·



|     |  |      |   |
|-----|--|------|---|
|     | notans quo brachiū deorsum trahitur, idque mouentium quartus habebitur.  |      | gitum à reliquis in extremum latus abducens.  |
| n   | Sinistri lateris rectus abdominis musculus, hic altius quàm obliquè ascendēris musculi neruosa tenuitas conscendens.   | θ    | Transuersum ligamē in interna brachialis sede obuū, tēdinibusq; hac repentibus obductum.  |
| o   | Abdominis musculus obliquè descendens, quem hic in posteriora ab abdomine reflexum finximus.   | ι    | Musculus maior, primum pollicis os flectentium.   |
| π   | Abdominis musculus obliquè ascendens, ac totam, vti conspicias, sui lateris abdominis sedē amplectens, quem quodammodo circumscribunt o, n.  | κ    | Propendet hic ab insertione musculi, cuius beneficio pollicē ab indice maximè remouemus.  |
| pp  | Portio obliquorum abdominis musculorum descendētiū, quæ ad albam in abdomine apparentem lineam est relicta. Ceterum p inferius significat penis cōstructionē, qui ad pubis os, quā primum flaccidus, deorsum denuò propēdet, dissectus est. Duo itaque velut insigniores circuli, duo ipsius sunt corpora: circulus autem sub illis consistens, meatus est vrinæ feminique communis. | λ    | Latus manus tendo vnā cum ipsius tendine; à summis quatuor digitorū aciebus in sinistra manu dependens. Præterea hic in vtriusq; manus vola tēdines occurrūt mucosis membranis induti, atque ad digitos quo illos flectūt, protensi.  |
| q   | Os brachij.  | μ    | Secūds femur mouentiū musculus.   |
| r   | Vasa feminaria, quæ hic priuatim enarrare non proposui, quemadmodum etiam neque testis musculus, cui vt à vasis distinguetur, f ascripti.  | ν    | Primus femur mouentiū musculus.   |
| ∫   | Musculus cubitū flectentiū anterior.   | ξ    | Os is sacri ossis sinistro lateri commissi sedes, à qua primum & sextum tibiā mouentes rescuimus.   |
| z   | Musculus cubitum extēdens, cui ab humiliori scapulæ costa principiū præbetur.  | &    | Charactere & sedes insignit maioris exteriorisque femoris processus.  |
| u   | Musculus cubitum flectentium musculus.   | φ    | Nonus tibiā mouentiū musculus, cuius initū supra coxēdici articulū incipiens e notatur, π verò tendinis ipsius principiū, ρ sedes indicatur, quæ præsentis musculi tēdo subditis cōnascitur tēdinibus.  |
| xx  | Posterior cubitum flectentium musculus.  | o ω  | Musculus femur mouentiū septimus.   |
| y   | Musculus superior radium in primum ducentium.  | σ    | Musculus femur mouentium sextus, suo tēdine cum septimo hac prorepens.  |
| a   | Radium in supinū agentū longior.   | τ    | Musculus femur mouentium septimus, suo tēdine cum septimo hac prorepens.  |
| β   | Musculus quatuor digitorum secundos flectens articulos.  | υ    | In sinistro femore musculus υ insignitur, femur mouentiū octauus.   |
| Σ   | Musculus ab interiori humeri tubere exortus, vlnæ exporrectus, & brachiale flectēs: γ ipsius caput, δ ipsius insertionem denotat.  | φ    | Quinti femoris motui seruientium musculi anterior portio.   |
| γ δ | Musculus alter brachiale flectēs, hicque deorsum dependens.  | χ    | Secundus tibiā mouentium.   |
| ζ   | Musculus primū parui digiti internodium versus exteriora flectēs.  | ψ    | Octauus tibiā mouentium.  |
| n   | Hic musculus propendet parū digi-  | ω    | Septimus tibiā mouentiū musculus.   |
|     |  | 23   | Primus tibiā mouentiū musculus,   |
|     |  | 3    | 4 Sextus tibiā mouentiū, 4 Sextus pedem mouentiū musculus, vnā vt duo præcedentes, ab insertionē pēdens. Ceterum in dextro crure etiam obseruatur primi tibiā mouentium, & huius sexti pedem mouentiū insertionis portio, huius quidē insertioni in caractere 6. illius verò 5 insignito. |
|     |  | 5.6. | Septimus pedem mouentium musculus.  |
|     |  | 7    |   |

- 89 Excarnis tibie ossis pars, à cuius externo latere sextus pedem mouentiū musculus ablatuſ est. Verūm 9 priuatim interiorem notat maleolum.
- Ψ Musculus quatuor pedis extrēdēs digitos: 10 ipsius exortus insignitur: 11 verò ipsius sedes, qua portionē suā emittit, quam noni pedem mouentis musculi loco numerabimus, & hic Ω notauimus.
- Ω Musculi Ψ insigniti fedes, quatuor tēdines, quibus quatuor digiti extenduntur, pullulans. Ω vii & iam paulò antē scripsi, musculus notatur inter pedis motores nonus, qui bicorni tendine insertionem 13 notatum tentat.
- 14 Musculus pollicem extendens.
- 15 Musculus pedē mouentiū octauus.
- 16 Musculus pedē mouentiū secundus.

T A B V L A V.

**H**Æc à Vesalij Tabula differt, quod in hac musculi in humano solum corpore inuenti depingantur, in illius verò tum simiarū, tum aliorum brutorum.

- A Foramen quo neruulus tertij paris neruorum cerebri, frontis & superioris palpebræ musculosam petit substantiam.
- B Temporalis musculus.
- C Hic magna ossis iugalis portio execta est, vt temporalis cum massetere, quem D insigniuimus, coitus in conspectū veniret. D autem est secundus inferiorem maxillā mouentium.
- E Foramē quo furculus tertij paris neruorum cerebri, ad superius labrū, & alam nasi deducitur.
- F Amplus musculus à superiori maxilla in inferiore productus, ac buccarū motibus seruiens secundus.
- G Nerui vtrinque ad hunc characterē occurrētes, labro inferiori exporriguntur. Cæterum superior characteris sedes, fungosam laborū substantiam insinuat ad vtrūque labrum conspicuam.

- HI Musculus inferiorem maxillā deorsum trahens. Singuli characteres singulos eius musculi ventres notant, in quorum medio excarnis teresque musculi pars consistit.
- K Portio musculi caput mouentis, ac à pectoris ossē & clauicula enatus, toti mamillari processui insertus.
- L Os v imaginem referens, à quo primum, secundum & tertium par eorum, qui id mouent musculorum rescuimus.
- M Primus & secundus lingue musculi, ab ossē hyoide pronati.
- N Laryngis cartilago scutum referens, & iam narrandis musculis adhuc obiecta.
- Θ Dexter duorum musculorum ab ossē referentē, in cartilaginē scuto similem inferorum.
- P Dexter musculorum, qui à pectoris ossē scutum imitanti laryngis cartilagini inferuntur. Ad huius musculi exterius latūs, congeries visitur soporariæ arteriæ, interioris venæ iugularis, & sexti cerebri neruorum paris, ad notam \*
- Q Asperæ arteriæ anterior sedes.
- RS Musculus ossi v imaginē exprimentiproprius, & à scapulæ superiori costa enatus.
- T Portio musculorum secūdi paris caput mouentium.
- V Tercius scapulam mouentium musculus.
- X Tercius spinā mouentiū musculus.
- Y Dextri lateris clauiculā hic à pectoris ossē auulsiimus, adhuc summo humero connexam, & sibi adhuc musculum seruantem, qui thoracis motorū primus numerabitur, hicque Z insignitur.
- a Summus humerus, seu scapulæ elatior processus.
- b Interior demissiorue scapulæ processus.
- c Ligamentum brachij ossis ad scapulam articuli peculiarium quartū, ab anteriori scapulæ processu sumum humerū petens.
- d Ligamentum teres ab apice interioris scapulæ processus, in anteriore sedem externi capitis humeri in-

|       |   |     |  |
|-------|---|-----|--|
|       | sertum, ac huius articuli primum, post membraneum omnibus articulis commune.  |     | bi adeo valide committitur, vt inter dissectandum nisi relicto eius modi signo, à transuerso liberari nequeat.   |
| e     | Aliud teres ligamentum, ex eminensissima scapulæ acetabuli sede, ad externum quoque humeri caput procedens, atque huius articuli ligamentorum peculiariū secundū.   | y   | Transuersus abdominis musculus.  |
| f     | Hac sede duo ligamenta d & e insignita, suis lateribus vniuntur, & velut transuersum efformant ligamentum, transmittens caput externum musculi cubitum flectentium anterioris, ac mox ζ notadi.   | α   | Oblique ascendens abdominis musculus ab abdomine reflexus.   |
| g     | Pectoris os, cui septem superiorū costarum cartilagine vtrinq; conneſtuntur.  | β   | Vasorum feminalium portio. Ceterum tres illi quodammodo circulari ad rectorum musculorum radicem, seu iuxta n & o, ac p cōspicui idem notant, quod in mox præcedente tabula, abieci nimirum penis constructionem ac naturam.   |
| h     | Prima thoracis costa, reliquæ dein etiam vnā cum ipsarum intervallicis citra characterum opem sunt conspicuæ.   | γ   | Reuerſa est musculi brachium attolentis anterior pars.   |
| Γ     | Musculus scapulam mouentium primus. i & κ huius musculi principium notant.  | δ   | In dextro brachio insertionis pars adhuc reliqua est musculi brachii attolentis.   |
| ix    | Musculus qui à scapulæ basi pronatus, octo superioribus thoracis costis inseritur.  | ε   | Excarnis humeri pars, inter duo capita apparens musculi cubitum flectentium anterioris.  |
| m     | Musculus qui à scapulæ basi pronatus, octo superioribus thoracis costis inseritur.  | ζ   | Cubitū flectētū musculus anterior.   |
| Δ     | Sinister rectorum abdominis musculorū, n carneum recti abdominis musculi principii triangulo non abſimile. o principium eiusdem musculi nerueum, penē vniuerſū efformans musculus notat. Toto intervallo à p ad q pertinente, recti abdominis musculi internis suis lateribus inuicem contingūt. Tota autē sede supra q, aut supra vmbilicum consistente, tanto magis musculi mutuo ſeunguntur, quanto altius conſcendunt. Ceterum q notabit etiam obliquorum abdominis musculorum neruoſæ tenuitatis, ad transuersum abdominis musculus hac in parte ad pectoris vsque ſedem connexum. | η   | Cubitū flectētū musculus posterior.  |
| n     |   | ι   | Superior musculus eorum, qui radiū in pronom agunt.  |
| o     |   | κ   | Radiū mouentū longiſſimus, cuius auxilio radius in ſupinū ducitur.   |
| p q   |   | θ   | Quatuor digitorum ſecūdum os flectens musculus. λ ipſius principii sub musculo radio peculiari, & μ notato, recōditum. μ musculi huius in quatuor carneas partes diſtributio, quæ poſtmodū in ſingulos tendines degenerant, indicat.   |
| u u u | Inſcriptiones, seu neruea delineamēta, transuerſim recto musculo impreſſa, quibus oblique aſcēdentis musculi neruoſa exitas pertinaciſſimē connaſcitur.   | λ   |  |
| x f   | Linea hæc portiunculam notat oblique aſcēdentis musculi, qua iſtā transuerſo abdominis musculo ini-   | μ   |  |
|       |   | ν ξ | Transuerſum interioris brachialis ſedis ligamentum, lōga ſeſione diuiſum, & vtrinque in latus reflexum. Verūm præterea ν musculus priorem primū pollicis os flectentium commonſtrat: ξ autem musculus, cuius ope primū parui digiti internodium extrorſum ſectitur. Porro quod ad quatuor tendinum, ſecūdum quatuor digitorum os flectentium ſeriem attinet, omnia ſūt cōſpicua, quamuis interim tēdinibus indicem & paruum digitum petentibus o inſcripſerim. |



TABVLA · V ·

LIBRI · II ·





- ω Nonnihil hic sese offert musculus, quatuor digitorū tertiū flectēs os.  
 ρ Portio musculi tertiū pollicis os flectentis, qui in sinistro cubito est conspectus.  
 \* Musculus vlnę exporrectus, quo brachiale flectitur.  
 σ Secundus femur mouentiū musculus.  
 τ Apparet hic obscurē femoris caput coxendicis ossis sinum subiens, & ligamento obductū, sed τ in hoc præcipuē adhibetur, vt ceruix, seu collum femoris hic indicaretur.  
 υ Femoris magnus exterior ue processus.  
 φ Femur mouentium septimus.  
 χ Femur mouentium sextus.  
 ψ Femur mouentium octauus.  
 ω Quintus femur mouentiū musculus.  
 Δ Septimus tibiam mouentiū musculus caractere 2 ipsius amplū principiū à radice magni femoris processus enatum. 3 hic in tendinem latum definit, cum octauī & noni musculorum tibiam mouentium tēdinibus commixtum vnitumque. 4 hæc linea illū in anteriori femoris sede terminat, vbi octauus musculus ipsi primū subijci incipit.  
 Ξ Octauus tibiam mouentium musculus.  
 Π Octauum quoq; tibiam mouentiū musculum indicat, sed priuatim sinum ostendit, cui nonus tibiam mouentium musculus infidebat, qui hic propendens σ insignitur. Maximam itaque sinus sedē octauus musculus cōstituit, verū septimus eius tantam portionē efformat, quanta à linea 4 insignita, ad vmbra septimi musculi vsq; protenditur, ita sanē, vt ab vtriusq; musculis sinus iste confurgat.  
 5 Hoc caractere musculus insignitur tibiam mouentium nonus, qui à suo exortu liberatus, à genu pendet, vbi septimi & octauī tibiam mouentium musculorum tendinibus commiscetur.  
 σ Hic propendet musculus tibiā mouentium secundus.  
 Σ In hac tibia, tibiæ os anteriori sede

- prorsus excarne cernit. Superest enim hic duntaxat ex omnibus musculis illi adnatis, musculus pedis pollicem extendens, & modò insignitus, cuius tendini 7 inscriptum conspicias.  
 φ Septimus pedem mouentium musculus.  
 7 Octauus pedem mouentium.  
 8 Charnea moles in superiori pedis sede reposita, quæ in quatuor carneas partes digesta, quatuor educit tēdines, & pollicem, & tres ipsi proximōs digitos in latum externum mouet.  
 Ω Hic prosternitur musculus quatuor extendens digitos, vnā cum ipsius portione, quam noni pedem mouentiū musculi vice recēsuimus, ac cui iam, & characterem inscriptum cernis.


## T A B V L A VI.

SEXTÆ tabule caput in posteriora reflexum est, & maxillam inferiorem in summo mento diuisam, & vtrinque in latera deductam refert. Hic iugalis ossis portionem exequi.

- A Verūm A præterea insinuat temporalis musculi in acutum inferioris maxillæ processum insertionem.  
 B Acutus maxillæ inferioris processus.  
 C Sinistra maxillæ inferioris pars.  
 D Musculus in ore delitescens, qui internæ inferioris maxillæ sedi, vbi latissima est, inseritur, eamq; mouentium tertius habetur.  
 E Gurgulio à palati sine propendens.  
 F Glandula sinistra amygdalæ nō absmilis, ac eminentissimē laryngis sedi apposita.  
 G Lingua, verūm superior characteris pars, laryngis operculo est contenta.  
 H Hac sede plures capitis, & ceruicis musculi confunduntur.  
 I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens, hic ab exortu pendet.  
 K Tertius hominis scapulam mouentium.

TABVLA - VI -

LIBRI - II -



|     |   |            |   |
|-----|---|------------|---|
| L   | Glandula sinistro laryngis radicis lateri adnata & insigniter carnea.   | l          | Interior scapulæ processus, anchoræ imaginem referens.  |
| M   | Aspera arteria incumbētibus musculis libera.  | ⊙          | Musculus anterior cubitum flectentium, cuius exterius caput, quod à scapulæ acetabuli supercilio nascitur, <i>m</i> notat: <i>n</i> verò indicat internum caput ab interiori scapulæ processu enatum, Quo tamē huius capitis nerueam partē à carnea exquisitiū discernas, huius tabulæ finistrum, brachium spectabis, in quo <i>n</i> nerueam partem denotat; <i>o</i> autem carneam. At non hæc duntaxat tabula eas commōstrat partes, imò priores ad vnum omnes. Cæterum <i>p</i> duorum capitum coitum indicat, <i>q</i> verò tendinis quem musculus hic educit, principium. |
| N   | Hæc congeries, est vasorum & nervorū lateribus asperæ arteriæ exporrectorum: quanquam & musculi dorsum mouentium primi aliqua ex parte se ostendant.  | <i>m</i>   |   |
|     |   | <i>n</i>   |   |
| O   | Tertius spinā mouentiū musculus.  | <i>o</i>   |   |
| P   | Primus.   | <i>p q</i> |   |
| Q   | Secundus.   | <i>r r</i> | Musculus posterior cubitū flectentiū.   |
| R   | Musculus à scapulæ basi principium ducens, thoracemq; mouentium secundus. S significat tertiæ costę os; T tertiæ costę cartilaginem; V musculum exteriorem intercostalium, in tertiæ & secundæ costarum intervallo repositum, cuius fibræ deorsum in priora feruntur, X verò denotabit exteriorem intercostalium musculum, inter secundæ, & tertiæ costarum cartilagine conspicuum, cuius fibræ sursum in anteriora prorrepunt. | f          | Musculus cubiti extensionis auctor, cuius principii ab humiliori scapulæ costa enascitur.   |
| STV |   | A          | Musculus radium mouentium longissimus, cuius altissimam partē, quæ hic oculis subijci potest, <i>t</i> indicat; <i>u</i> autem præsentis musculi insertionem notat, quam in inferiorem radij appendicē molitur.   |
|     |   | <i>x</i>   | Musculus superior duorum, qui radium in prouum ducunt.  |
| X   | Arteria & vena, sub pectoris ossē deorsum ad abdominis superiora propagatæ.   | ≡          | Musculus tertium quatuor digitorum os flectens, & <i>a</i> quidem huius musculi caput insinuat; <i>β</i> autem sedem indicat, qua musculus in quatuor partes carneas discinditur, qui singulos postmodū porrigunt tendines. Porro qua ratione ad tertium vsque digitorū internodium tendines huius musculi porrigantur, & incumbētis musculi tēdines trāseant, hic in vtraque manu est conspicuum.  |
| a   | Transuersus abdominis musculus.   | <i>a β</i> |   |
| b   | <i>b</i> sedem notat, qua obliquè ascendentis musculi tendo abdominis trāuerso musculo pertinacissimè adnascitur, priusquam rectum cōscendat. <i>c</i> autem indicat asperitatem, quam musculorum obliquè ductorum cum trāuersis musculis connexus inibi molitur.   | <i>γ δ</i> | Sic tamen doctrinæ gratia, tēdo tertium medij digiti os accedens; <i>δ</i> autē tendo, qui secundū os flectit.  |
| c   | Foramen vasī seminarij virorū viam præbens.   | †          | Musculus secundum quatuor digitorum flectens articulum.   |
| e   | Vena & arteria, in rectos abdominis musculos, cōterminasq; sedes sursum excurrentes, à magna vasorū crura subeuntium distributione.   | ζ ζ        | Hos characteres referre oportet ad quatuor musculos, quorū beneficio quatuor digiti adducuntur pollici, atq; hi interno lateri tendinū tertiū os flectentiū exporrigunt.  |
| f   | Hic dextri lateris rectus abdominis musculus, & à pubis ossē depēdet.   |            |   |
| g   | Spina ossis ilium, carnosus partibus duorum obliquorum abdominis musculorum liberata.   |            |   |
| h   | Superiorem notat scapulæ angulū, cui musculus K insignitus inserit.   |            |   |
| i   | Summus humerus, seu scapulæ elatior processus.  |            |   |
| K   | Musculus brachii mouentiū quintus.  |            |   |

|     |   |    |  |
|-----|---|----|--|
| α θ | Musculus tertium pollicis os flectens<br>α notatur. θ autem ipsius tendinē<br>proponit, inter musculos primū<br>pollicis os flectētes, & eos qui se-<br>cundum pollicis os flectunt, pro-<br>repentem.  |    | biz ossis latus cōspicuum est. Cæ-<br>terum 2 priuatim notat ligamen-<br>tum tibiae, os & fibulam, quā hæc<br>inuicem dehiscunt intercedens.   |
| κ   | Musculus maior primum pollicis os<br>flectentium, hic ab infertione de-<br>pendet.  | ω  | ω autem externū notat malleolū,<br>& partem fibulae ex carnem.   |
| λ   | Musculus minor primū pollicis os<br>flectentium, qui sub maiori K in-<br>dicato recondebatur. Inter λ ve-<br>rō & κ, primū pollicis os nudum<br>ex carneque apparet.  | φ  | Musculus pedem mouentium septi-<br>mus. 2 charācter ipsius exortū in-<br>dicat. 3. tēdinis principium, quod<br>anteriori & posteriori parte, ac<br>dein interiūs, quā fibulā spectat<br>carne adnuitur. 4 itaque partem<br>notat anteriorem carnem: 3 ve-<br>rō posteriorem. |
| μ   | Musculus primū parui digiti os ver-<br>sus exteriora flectēs, tuberculum<br>verō ante huius musculi initium<br>apparens, vlnæ est sedes, qua vali-<br>diorem ligamenti exporrigit por-<br>tionē brachiale cubito colligātis.  | 25 | ↓  |
| ν   | Tertius femur mouentiū musculus.  | 4  | ↓  |
| ξ   | Magnus femoris ossis processus.   | 3  | ↓  |
| ο   | Musculus femur mouentiū septimus.   | 6  | ↓  |
| π   | Musculus femur mouentiū sextus.   | Ω  | ↓  |
| ρ   | Musculus femur mouentiū octauus.  | 7  | ↓  |
| σ   | Quintus femur mouentiū musculus.  | 8  | ↓  |
| π   | Octauus tibiae mouentium muscu-<br>lus, vniuersum femoris os quodā<br>modo amplectens. τ insinuat am-<br>plum huius musculi principium,<br>à radice magni femoris proces-<br>sus, & ipsius collo enatum. De in-<br>de π priuatim indicat sinus illius<br>portionem, quo nonus tibiae mo-<br>uentium musculus cōtinetur, at-<br>que hic sinus in sinistro crure est<br>conspiciuus, quemadmodū & car-<br>nosæ musculi partis terminus, qui<br>ν instar semiglobi extuberans hic<br>ν insignitur. | 9  | ↓  |
| τ   | Dependet hic musculus tibiae mo-<br>uentium septimus.   | χ  | ↓  |
| χ ↓ | Hæc sedes ad vndecimam musculo-<br>rum tabulam potissimum refer-<br>tur, quæ ostendit portionē quarti<br>tibiae mouētis musculi ex femo-<br>ris osse pronatam, atque hic χ no-<br>tat quarti musculi sedē ipsius in-<br>sertioni proximam, ↓ autē eam<br>partem abscctam ostendit, cui<br>coxendicis ossis appendix princi-<br>pium præbet.   |    |  |
| Σ   | In sinistra tibia totum externum ti-  |    |  |

T A B U L A . VII.

*SEPTIMA musculorum tabula cor-  
Spus laxato fume, à quo inter pingen-  
dum pendebat, in posteriora tantum  
prociat, quantum vidēdo septo tran-  
suerfo sufficit.*

- A Gurgulio indicatur à palati termi-  
no propendens, inferiori interim  
maxilla proflus amota.
- B Aliquot cervicis vertebularum corpo-  
ra, anteriora parte.
- CD Primum par dorsum mouentiū mu-  
sculorum.
- E Stomachi seu gulæ pars sub aspera  
latians arteria, quam F notauim-  
us. Cæterum, vasa quæ vtrinque  
ad huius latera habentur, sopora-  
les efficiunt, arterias cum internis  
iugularibus, venis, & sexto ner-  
uorum cerebri coniugio.


|      |  |      |   |
|------|--|------|---|
| G    | Musculus alter secūdi paris dorsum mouentium.  | h    | pollici adducentis. h infertionem musculi secundum os flectentis.   |
| H    | Scapulam mouentium tertius.  | i    | i infertionem eius tendinis, qui tertij ossis flexioni præficitur.  |
| I    | Musculus brachiū mouetiū quintus.  | Δ    | Septum trāuersum, cuius membraneus circulus in septo extra corp <sup>9</sup> expanso circumscribitur.   |
| K    | Musculus brachium mouentiū sextus, cuius infertio K insignitur, reliquaque ipsius forma ex scapulę imagine deprehenditur.  | klmn | klmn. Quod verò exteriū hos characteres ambit, atque foris (vt ita dicam) existit, fibrisque interstingitur, carneam septi partem esse putato. o p Duoligamenta, seu tendines septi, vertebrarū in lum  |
| LL   | Musculus thoracem mouentium secundus, octo superioribus costis manus modo infertus.  | op   | bis consistentium corporibus inferti. q Septi scissura, qua septum vertebrarum incūbit corporibus, ac magnam arteriam, venamque coniugis expertem trāsmittit, aut illis cedit, quarū orificia q in corpore huius tabulę positum indicat, quemadmodum & arteriæ ramos in septum excurrentes. |
| M    | Brachium agentium tertius.   | q    | r Foramen stomacho viam præbens, qui etiā r in corpore insignitur. f Foramen venę caux caudici paratum, qui in corpore f notatus conspicitur.   |
| NN   | Musculus cubitum extendentium, cuius initiū superiori N insignitur. à scapula educitur.  | r    | t Musculus femur mouetiū sextus.  |
| O    | Portio tendinis musculi, brachium mouentium quarti.  | f    | u Musculus dorsū mouentiū nonus.  |
| P    | Cubitum flectentium posterior.   | x    | y Femur mouentium septimus.   |
| Q    | Radium in pronom constituentium superior.  | y    | Sacrum os hic insignitur, neruique aliquor ab ipsius medullaeducti, obuij sunt.   |
| RR   | Anterior cubitum flectentium.  | a    | a Femur mouentium octauus.  |
| S    | Radius.  | β    | β Quintus femur mouentium.  |
| T    | Vlna.  | γ    | γ Tibiam mouentium octauus.   |
| V    | Ligamentum inter radium & vlnā, quā inuicē dehiscunt intercedēs.   | ε    | ε Musculus pollicem à cæteris digitis amouens.  |
| X    | Radium in pronom mouentium inferior musculus.  | δ    | δ Dependet & hic quoq; ab infertione musculosa moles, pollicem & tres ipsi proximos digitos in externum latus ducens.   |
| YY   | A sinistro radio dependet, longior radium in supinum ducentium musculus.   |      |   |
| a    | Minor primū pollicis os flectentiū.  |      |   |
| 1.2. | 3. Tribus his characteribus musculi notantur secundum pollicis os flectentes.  |      |   |
| b    | Dependet musculus tertium pollicis internodium flectens.   |      |   |
| c    | Musculus tertij quatuor digitorum ossis flexus auctor, quem sedulo intuebere, quod illius tendinibus musculi attendantur, quatuor digitos pollicis adducentes, quorum is qui indicem mouet d insignitur, perinde ac reliqui tres, ab infertione hærens. Quinetiam tendinum secūdum quatuor digitorum os flectentis musculi portiones adhuc seruantur, ac portioni quidem indici proprię e inscripsi, tendini autem tertium indicis os flectenti f. Cæterū in sinistra manu dictorum musculorum conspiciuntur infertiones, ac g in indice infertionē indicat musculi indicē |      |   |
| d    |  |      |   |
| e    |  |      |   |
| f    |  |      |   |
| g    |  |      |   |

## T A B V L A VIII.

**H**Æc tabularum anteriorem corporis faciem exprimentium postrema est, musculos adhuc in anteriori hac sede obuios, exsectionisq; serie reliquos proponens. Vt verò interiores intercostalium ostēderet musculos, & eos qui in interna thoracis sede pectoris ossis attenduntur lateribus;




TABVLA VII · LIBRI · II ·





|     |   |              |   |
|-----|---|--------------|---|
|     | <i>ribus, os illud una cum costarum cartilaginibus exectum, ad dextri cruris latus euersum, atque sub dextra manus indice propositum cernis.</i>  |              |   |
| A B | Musculi collum, superioremue dorsipartem flectentes, dorsumq; mouentium primum coniugium.   | ⊖            | Sextus femur mouētū musculus, cuius initū ē vertebrarum procedēs corporibus <i>a</i> insignit: <i>b</i> verò ipsi <sup>9</sup> sedes, vbi tēdinē educere incipit.   |
| C   | Musculus à prima enatus costa, ac secundi dorsū mouētū paris alter.   | Λ            | Septimus femur mouētū musculus.   |
| D D | Exteriores musculi intercostales, in costarum interuallis conspicui.  | Σ            | Octauus.  |
| E E | Interiores musculi intercostales, in costarum interuallis obuij.  | Ξ            | Musculus dorsum mouentū nonus.  |
| F F | Musculus octo thoracis costis insertus, ipsiusque motorum secundus.   | Π            | Sacrum os, ex cuius anterioribus foraminibus nerui profilire hic videntur.  |
| G   | Vtrinque scapula modò sectionis serie nuda excarnisq; est, ac sua fede dimota.  | Φ            | Quintus femur mouentium musculus. Verum Φ priuatim huius musculi partē notat posteriorem, <i>c</i> autem anteriorem.  |
| H   | Musculus dependet, brachium antrosum circumuertens, scapulęq; cauum occupans.   | <i>c</i>     |   |
| I   | Musculus superiori scapulę basis angulo insertus, ipsamq; agentium tertius.   | <i>e</i>     | Pubis ossis anterior sedes, hoc latere ex sectionis serie carne denudata.   |
| r   | Posterior cubitum flectētium, cuius principij elatior exteriorque pars  | Ψ            | Musculus femur mouētum nonus, anteriorem pubis ossis foraminis fedem occupans.  |
| L   | L insignitur: demissior verò interiorque pars M. & N.   | Ω            | In dextro genu tendines, septimi tibiæ mouentium musculi <i>g</i> insigniti, & octauī <i>h</i> indicati, & noni <i>i</i> notati à genu reflexi sunt, ac patellam ipsis innatam ac <i>κ</i> insignitam oculis subijciunt. In sinistro autem crure octauus tibiæ mouentium musculus, solus ab insertione ac integer dependet, <i>l</i> notatus, & patellam sibi innatam seruans, cui <i>κ</i> inscripsimus. |
| M N | M. Insertio autem præsentis musculi N indicatur.  | <i>h g i</i> |   |
| O   | Radius.   | <i>κ</i>     |   |
| P   | Vlna.   | <i>m</i>     | Tibiæ ossis anterior sedes, omni præp musculo libera.   |
| Q   | Tendinis musculi pars cubitum flectentium anterioris.   | <i>n</i>     | Fibulæ etiam anterior sedes, ex diffecionis serie musculis omnib <sup>9</sup> denudata.   |
| R   | Musculus ab insertione dependet, radium in prorum mouentium superior.   | <i>o</i>     | Ligamentum notatur inter tibiæ os, & fibulam inibi repositum, vbi hæc ossa inuicem dehiscunt.   |
| S   | Musculus ab vlna dependet, radium in prorum ducentium inferior.   | <i>*</i>     | Qui hic spectatur musculi, illi sunt, quos sexta musculorū tabula expressit literis Φ & Ψ septimus nimirū & octauus pedē mouentū.   |
| T   | Sede T insignita ligamentum, brachiale ad cubitum necēs, crassius apparet, vt etiam sede V notata.  | <i>p q</i>   | Notant primum ac secundum pedē mouentium à quarto eiusdē motus auctore musculo, <i>t</i> insignito, ad characterē <i>f</i> propendētes, quo priuatim notatur tendo tertij pedem mouentis musculi, qui inter <i>f</i> & <i>u</i> deducitur.  |
| V   |   | <i>f</i>     |   |
| X   | Musculi ab insertione propendent, secundum pollicis internodium flectentes.   | <i>u</i>     | Musculi pars hic occurrit, quatuor digitorum tertium articulum flectentis.  |
| Δ   | In postbrachiali dilucidius exprimi nequērūt octo musculi; quatuor digitorū primos articulos flectentes. Cæterum sinistra manus in latus picta est, vt musculus Y insignitum offerret, qui primum in- |              |   |
| Y   |   |              |   |

TABVLA · VIII · LIBRI · II ·



|        |   |   |
|--------|---|---|
| x<br>α | Hic obscure se offert pedem mouentium quintus.<br>Pectoris ossis posterior, seu cor spectans sedes.   | K Locus, ubi thoracis vertebrae summæ cum imis colli committuntur.<br>L Musculus brachium attollens, eiusque motorum secundus.  |
| 1234   | 567. His characteribus septem verarum costarum indicatur cartilagine, reliquæ autem quatuor cartilagines, octauæ, nonæ, decimæ, & vndecimæ costarum cartilagines sunt.  | M Musculus gibbam scapulæ sedē occupans, brachiumque mouentium quintus.   |
| β      | Musculus humanum thoracem mouentium sextus.   | N Musculus brachij motus opificū tertius.   |
|        |   | O Musculus brachium agentium quartus, sequenti tabula ⊕ insigniendus.   |
|        |   | P Portio abdominis musculi, quæ obliquè descendente vocamus.  |
|        |   | Q Nonnihil occurrit, anterior cubiti flectentium musculus.  |
|        |   | R Posterior cubiti flectentium musculus.  |
|        |   | S Musculus cubiti extensionis auctorum, cuius principium ab humeri pendet ceruice.  |
|        |   | T Musculus cubiti extendentium, cuius principium ab humiliori scapulæ costa pronascitur.  |
|        |   | V Vlnæ fedes triangula, nullis obtecta musculis, excarnisve, ac præcipuè infertionem excipiens nervosæ cubiti extendentiū musculorum infertionis.   |
| A      | Temporalis musculus.  | X Musculus radium in supinum agentium, qui in inferiorem radij appendicem inferitur.  |
| B      | Os iugale.  | Y Musculus bicorni tendine brachiale extendens.   |
| C      | Masseter, inter musculos inferiorem maxillam mouentes secundus. Auris verò foramen, cum ipsi subiectis glandulis, citra characterum subsidium est obuium.   | Z Musculum Z insignitum, auctorem extensionis indicis, medij ac annularis recensebimus, cuius initium   |
| D      | Musculus caput mouentium primus, à pectoris osse, & clauicula enatus, in mamillarem capitis processum inferitur.  | a indicatur: sedes verò, qua carneus esse definit, b insignitur.  |
| Γ Δ    | Musculus secundo loco inter scapulam mouentes recensendus. Atque huius principium ab occipitij osse pronatum, E ac F insignitur, E verò vsque ad G musculi principium ab occipite, ad octauæ vsque thoracis vertebrae spinā, à mediarum vertebrarū apicibus quodammodo enatū. H I infertio, quam musculus in scapulæ spinam, & summum humerum, latiusculamque clauiculæ sedē molit. | ⊕ Musculus qui nobis extensionis auctor parui digiti recensebit. Commixtionem tendinum musculi Z insigniti, ac musculi ⊕ indicati, quæ ad digitorum fit radicem, ita hic delineauimus, quemadmodum crebrius nobis occurrit. |
| EFG    |   | A Musculus brachiale extendentium, cui principium offertur ab humero c insignitum. Infertionem verò d indicatam, in postbrachialis os, paruum sustinens digitum molit.  |
| HI     |   | c d   |
|        |   | E In utroque cubito E insignitur musculus, brachiale flectens, quartoque brachialis ossi insertus, ac in nulla  |
| *      | * Hac sede præfens musculus, quasi membraneū semicirculū obtinet.   |   |

TABVLA · IX ·

LIBRI · II ·





TABVLA · X ·

LIBRI · II ·





|            |   |           |  |
|------------|---|-----------|--|
| NOP        | gnoeris. P namque ac N & O trianguli modo dictam muscoli partem terminant.  |           | quæ tendinem brachialis ossi, pollicem proximè sustinenti offert. / verò inferiorē insinuat portionem, quæ dein bipartita, vnâ partem, quæ <i>m</i> inscribitur, primo pollicis ossi inferit: alteram <i>n</i> indicatam, in secundum & tertium pollicis internodium implantat. Porro tertium principium, <i>Π</i> insignitū, illud demū est, quod in duas quoque partes, <i>o</i> & <i>p</i> indicatas disscinditur, quarum superior <i>o</i> notata, tribus pollicis ossibus inferitur. Inferior verò <i>p</i> indicata, indicem, ac medium à pollice adducere creditur. |
| Q          | Brachium mouentium septimus musculus.   | <i>m</i>  |  |
| R          | Musculus brachium mouentium tertius.  | <i>n</i>  |  |
| ♂          | Hac sede aliquot dorsum mouentes musculi exporriguntur, vna cum humanum thoracem mouētium quarto.   | <i>op</i> |  |
| Θ          | Brachium mouentium quartus.   |           |  |
| S TS       | & T, Musculi huius principij indicant longitudinem, partem ipsius insertioni proximam: X autem musculi latus ea sede indicat, vbi ab illo offe non amplius enascitur.   | <i>q</i>  | Propendet ab insertione musculus, brachiale vnico tēdine extendēs. Dein præcipuus extensionis parui digiti auctor <i>r</i> insignitus, quem admodū & musculus indicis medium ac annularem potissimū extendens, ac <i>s</i> indicatus.  |
| X          |   | <i>r</i>  |  |
| Y          |   | <i>s</i>  |  |
| Z          | Obliquè descēdētis abdominis musculi portio.  | <i>t</i>  | Musculus pollicem indicis proximè adducens.  |
| <i>a</i>   | Musculus ab humiliori scapulæ costa principium ducens, & cubiti extensionis opifex.   | <i>Σ</i>  | Secundus femur mouētium musculus, cuius exortū, semicirculi formæ quodam modo respondentē, <i>u</i> & <i>x</i> notant.   |
| <i>b</i>   | Musculus à ceruice capitis humeri iuxta scapulam originem ducens, ac cubiti extensionis auctor.   | <i>y</i>  | Cæterum <i>y</i> huius musculi indicat insertionem.  |
| <i>c</i>   | Portio anterioris cubitū flectentium musculi.   | <i>a</i>  | Magnus exteriorque femoris processus.  |
| <i>d</i>   | Portio posterioris cubitum flectentium musculi.   | <i>β</i>  | Quartus femur mouentiū musculus.   |
| <i>e</i>   | Musculus radium in supinum agentium longissimus.  | <i>γ</i>  | Ligamentum à trāuerso quinti ossis sacri ossis processū, in acutum coxendicis ossis processum pertinens.   |
| <i>f</i>   | Musculus bicorni tendine brachiale extendens.   | <i>δ</i>  | Ligamentum à dicta nuper sacri ossis sede in posteriōrē elatioremq; appendicis ossis coxēdicis sedem infernum.   |
| <i>g</i>   | Hac sede ligamentū conspicitur membraneum, superiorē radij partem humero colligans.   | <i>ε</i>  | Musculus femur mouentium decimus, qui hac à posteriori pubis ossis sede reflexus, aliū veluti musculum suprà infraque ipsi attentum monstrat.  |
| <i>h h</i> | Hac sede vna carne omni, musculisque libera cernitur.   | <i>ζ</i>  | Quartus musculus, qui ad crus exporrigitur, in poplite duos in ramos diuisus, quorum   |
| <i>i</i>   | Musculus brachiale flectentium, qui quarto brachialis ossi inferitur.   | <i>η</i>  | Maiorem.   |
| Λ Π        | Tres isti characteres, tria notant musculorum principia ab vna prona ta. Primum <i>Λ</i> insignitū illud est, quod radio ante mediū illius longitudinis infernum, musculū cōstituit, radium in supinum agentium breuiorem. Secundum <i>Σ</i> indicatū, illud est, quod in duas portiones, <i>κ</i> & <i>l</i> notatas dirimitur: <i>κ</i> enim eam significat portionē, | <i>θ</i>  | Minorem notat.   |
| <i>κ l</i> |   | <i>z</i>  | z. Primus femur mouentiū musculus.   |

|     |   |    |  |
|-----|---|----|--|
| λ   | Hac parte musculus hic membranæ ritu infertionem facit.   |    | bus suis constans figuram eam refert, quæ prope pedes depicta cernitur <i>Ab c.</i> principium D finem eius monstrat. P idem musculus ab infertione sua dependens.   |
| μ   | Septimus tibiam mouentium musculus, non amplius membraneo sexti musculi tendine obiectus.   | R  | Musculus dorsum mouentium vndecimus.   |
| ν   | Tertius tibiam mouentium musculus cuius caput ν insignitur, sedes verò tendinem primum educens.   | S  | Dorsum mouentium decimus quintus, seu octauus dorsum mouentium pariter alter.  |
| ξ   | ξ Infertionem autè tertia musculorum tabula proponerebat, characterè 3 insignitam.  | TT | Characteribus T, T duas costas earum, quæ iam sectionis serie deteguntur, insigniuimus. V verò earundem costarum interuallum, vt intercostaliū hic musculorū exterior obseruaretur.  |
| ϕ   | Quartus tibiā mouentiū musculus.  | V  |  |
| ω π | Quintus tibiam mouentium.   | X  | Musculus thoracem mouentium secundus.  |
| ρ   | Quinti femur mouētis musculi portio.  | Δ  | Humanum thoracem mouentium quintus.  |
| σ   | Secundus tibiam mouentium.  | ab | Obscurum impēseque membrancū musculi obliquè ascendentis abdominis initium, à spinarum apicibus inter a, ac b pronatum.  |
| τ   | Portio octauus tibiam mouentis musculi resecto iam interim primo tibiam mouēti, qui aliàs hic in orbe occurreret. Quod verò ad musculos in tibia pedēque repositos attinet, omnia præcedenti conueniunt tabulæ, vt & duodecimæ, quæ inibi characteribus primum occupabimus. | c  | Musculus ab infertione hic dependet, brachium mouentiū quartus.  |
|     |   | Θ  | Musculus cubitum extendens, cuius initium d insignitur, à ceruice capitis humeri educitur, quod scapulæ articulatur. e autem sedē indicat, qua præsens musculus ab altero cubitum extendētium, mox f indicando, amplius distinguinequit. |
|     |   | d  |  |
|     |   | e  |  |
|     |   | f  | Cubitum extendentium musculus, ab humiliori scapulæ costa pronatus ac cum musculo Θ insignito coiens.  |
|     |   | g  | Musculus cubitum flectentium posterior.  |
|     |   | bb | Longior musculus radium in supinum ducentium.  |
|     |   | Δ  | Musculus bicorni tendine brachiale extendēs, cuius initium i insignitur, sedes verò, qua tendinē educit x; tendinū autē ipsius infertio, l notatur.  |
|     |   | ik |  |
|     |   | l  |  |
|     |   | m  | Musculus radium in supinum ducētium breuior.   |
|     |   | n  | Radius.  |
|     |   | o  | Vlna. Atque in horū ossium medio ligamentum occurrit, tota sede illa ossa intercedens cōmittensque   |
|     |   |    | qua  |

T A B V L A X I.

|    |  |
|----|--|
| AA | Sinister primi caput mouentium paris musculus.   |
| B  | Secundum par musculorū caput mouentium, in sinistro tantum latere characteribus insignitum.  |
| *  | Musculus hic obscure occurrit, cuius beneficio inferiorē maxillā deorsum agimus.   |
| C  | Musculus scapulam mouentiū tertius.  |
| D  | Claucula.  |
| E  | Pender hic musculus à scapula, ossi u referenti infertus.  |
| F  | Humanū thoracē mouentiū tertius.   |
| G  | Brachium mouentium quintus.  |
| T  | Musculus scapulæ gibbum sub illius spina occupans, ac brachium mouentium septimus, cuius initium ab Had I metitur, infertionis verò sedes K indicatur. |
| H  |  |
| IK |  |
| L  | Musculus ab humiliori scapulæ costa initium ducens, brachiumque mouentium tertius.   |
| MN | O. Secundus cuius medietas posterior antrorsum eleuata partem ostēdit internam: omnibus autem parti-   |

|       |                                       |     |                                       |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|       | qua inuicem dehiscunt.                |     | Ω. Subsequent i tabula musculum expli |
| Ξ     | Secundum principium trium prin-       |     | cabo, quem femur mouētū quin          |
| p     | cipiorum, quæ ab vlna originem        |     | tū recensemus, characteribus Ξ Ξ      |
| q     | feriatim sumunt. Ac p quidē eius      |     | & Π inibi indicādum. In præsen        |
| r     | principij pars est, quæ tendinem      | ωζ  | ti autem idē musculus, caracte        |
|       | brachiali offert: q autem tēdo, pri   | Ω   | ribus ζ, τū ζ ac Ω insignitur, sin    |
|       | mo pollicis osi insertus: r verò is   |     | gulisque peculiaris musculi pars      |
|       | tendo, qui secundo & tertio pol-      |     | indicatur; ζ, posteriorem notat       |
|       | licis inseritur osibus.               |     | musculi partem; ζ verò & Ω an         |
| ς     | Musculus pollicem indici proximè      |     | teriorē. Cæterum ζ priuatim in        |
|       | admouens.                             |     | dicat eius anterioris partis anterio  |
| Π     | Tertium principium eorū, quæ ab       |     | rem portionem: Ω autem poste          |
| t     | vlna pronascuntur, hic quoq; ab       |     | riorem significat portionem an        |
| u     | infertione pēdens. Ac t quidē no      | π   | terioris partis.                      |
|       | tat eius principij portionem, quæ     |     | Quartus tibiā mouentium muscu         |
|       | indici ac medio tribuitur; u verò     | p   | lus hic ab ipsius parte, quæ femo     |
|       | eam, quæ pollicis est peculiaris.     | ρ   | ris os educit, ac ρ insignit, pendet. |
| Σ     | Tertius femur mouentiū musculus,      | σ   | Musculus tibiā mouentiū tertius,      |
| x y z | cuius initium x y z circumscribitur.  | τ   | ab infertione pendens.                |
|       | Quod verò ad horum chara-             |     | Musculi tibiā mouentium octau         |
|       | cterum latera, superiusq; spectat-    |     | portio.                               |
|       | ur, ilium osis dorsum est, primo      |     |                                       |
|       | secundoq; femur mouētibus mu-         |     |                                       |
|       | sculis liberum.                       |     |                                       |
| α     | Cæterum α tertij illius musculi inser |     |                                       |
|       | tionem proponit.                      |     |                                       |
| Φ     | Quartus femur mouentium muscu-        | ABC | S INISTER primi caput. mouentiū       |
|       | lus, à tribus humilioribus sacri of-  |     | musculorū paris musculus, cuius       |
|       | sis osibus initium ducens, & illic    | D   | principium A notat, B verò & C        |
| β     | primū tendinem educens, vbi           |     | infertionē, quam in occipitis os      |
|       | β conspicitur, infertio quoq; ip-     | E   | molitur. D autem sedem indicat,       |
|       | sus sub α consistit.                  |     | qua dexter musculus à sinistro pri    |
| γ     | Magnus femoris processus.             |     | mum abscedit. Postremo E insi         |
| δ     | Secundus femur mouens musculus.       |     | nuat internum infertionis dextri      |
| ε     | Septimus tibiā mouentiū musculus.     |     | musculi latus. Quare si illū mu       |
| η     | Ligamentū ab osse sacro, in coxēdi-   |     | sculum in trianguli formam age        |
|       | cis osis acutū pertinēs processum.    |     | re visum fuerit, illum circumscri     |
| θ     | Musculus decimus femur mouētū,        |     | bes lineis, A B, A C, B C. Quine      |
|       | hac ab anteriori pubis osis sede      |     | tiam si interuallum inter dextrū      |
|       | reflexus, ac veluti inter duos mu-    |     | musculum & sinistrū consistens,       |
| ι z   | sculos, & z insignitos prorpens.      |     | quoque trianguli modo spectare        |
| λ     | Caput tertij tibiā mouentium mu-      | FF  | volueris, circumscribes id, à B ad    |
|       | sculi.                                |     | E, dein à B ad D, & ab E ad D.        |
| ϕ     | Musculus, quem quinti tibiā mo-       |     | Sinistri lateris musculus secundi pa  |
|       | uētū loco habemus, cuius initū        | G   | ris caput mouentium.                  |
| ψ     | y insignitur, quod tertium eorum      | HH  | Scapulam mouentium tertius.           |
|       | capitum habetur, hinc à coxēdi-       | I   | Brachium mouentium quintus.           |
| ξ     | cis osse ductorum. ξ verò præsen      |     | Sūmus humerus à connatis ipsi mu      |
|       | tis musculi ostendit sinū, cui ter    |     | sculis liber. Cæterum neque co        |
| ο     | tius tibiā mouentium alioquin         |     | stas, neque earundem interualla       |
|       | insidet. ο hic quintus musculus, in   |     | characteribus insigniuimus, quod      |
|       | tendinem definit, anteriori tibiæ     |     | hæ eadem, vt in præcedenti tabu       |
|       | osis sedi implantandum.               | Δ   | la, ad TTV sit ratio.                 |
|       |                                       | KL  | Humani thoracis motorum quartus,      |
|       |                                       |     | cuius initū K insignitur. L verò      |

## T A B V L A XII.

fedes,


TABVLA · XI · LIBRI · II



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | sedes, qua primum à longissimo dorsum mouētium musculorum N mox notando, non ampliùs pertinaciter (quemadmodum infer. us à K ad L vsque) adnascitur. Tendines autem præsentis musculi aliquot, M M indicantur.            |   |   |
| MM | N Dorsum mouentium vndecimus, seu sexti paris dexter.   | m | P ostbrachialis os annulare suffulciens digitū, quod ideo priuatim notauimus, vt ossa postbrachialis ab ipsorum interuallis, musculisq; illa occupantibus intertingueres.   |
| O  | Dorsum mouētū decimus quintus.  | n | Hic musculus reponitur, pollicē indici proximè adducens.  |
| P  | Scapulę gibbum musculo liberatum cernitur, qui brachiū mouentium sextus habetur, hicq; ab infertione propendens Q insignitur.   | o | Musculus bicorni tendine brachiale extendens, in sinistra manu ab infertione propendit.   |
| Q  | Musculus brachiū mouentū tertius.   | p | Hic bona transuersi abdominis musculi pars occurrit.  |
| R  | Secundus thoracem mouentium.  | q | Ilium ossis dorsum nunc prorsus ex carne spectatur.   |
| S  | Musculus prior cubitū extendentium, qui ab humiliori scapulę costæ initium ducit.   | r | Femoris caput, coxendicis ossis acetabulū subiens, ipsum ve ligamentum præsentem ambiēs articulū.   |
| T  | In sinistro brachio musculus, cubitū extēdentium exterior ab ea sede propendit, quæ cū interiori T notato impense commiscetur.  | s | Ligamentum à sacro osse in acutum coxendicis ossis processū desinēs.  |
| V  | Hæc sede ab humero carnea exortitur portio, quam secundi musculorum cubitū extendentium loco habemus, sequentiq; tabula d notabimus.  | t | Dependet hic tertius femur mouentium musculus, t notatus, vnā cū quarto, qui u insignitur.  |
| X  | Musculus cubitum flectentium posterior.   | u | Magnus exterior uē femoris processus.   |
| Y  | Musculus radium in supinū ducens, qui ab humero multo superiùs, quàm externum illius consistit tuberculū, inibi exoritur, vbi a ascripsimus, ipsius infertionē, quā in humiliorem radij appendicem molitur, b indicantes. | x | Decimus femur mouentium musculus, cuius præcipuam partem F notandam, ex decima sexta tabula opportune petes ad characteres F G H. Præfens autem tabula eā musculi partem cōmonstrat, quæ ad peculiarem ipsi in coxendicis osse cēlatum sinum reflexa, ad magis femoris ducitur processum.   |
| ⊖  | Musculus alter, cuius ope radius in supinum agitur, atque huius initium c indicatur, infertio autē d insignitur.  | a | Musculus gracilis, ab acuto coxendicis ossis enatus processu, elatiori q; musculi a insigniti sedi exporrectus.   |
| a  | Neruea portio, seu infertionis terminus musculi superioris radium in pronum agentium.   | β | Musculus similiter gracilis, à coxendicis etiam osse pronatus, inferiori exporrectus parti eius musculi, quem a notauimus.  |
| b  | Radius.   | γ | Musculus femur mouentium quintus. Verūm γ priuatim notat posteriorem huius musculi partem, cuius caput partim nerueum, ac δ insignitum; & partim carneum, ε notatum, à coxendicis ossis appendice enascitur, hincq; prodeuntium capitum, numero quartū censetur. ζ Hæc sede posterior hæc quinti femur mouentis musculi pars, admodum carnea est, |
| c  | Vlna.   | δ |   |
| d  | Ligamentum, radiū, vlnamq; quæ inuicem dehiscunt, committens.   | ε |   |
| e  | Hæc sede est sinuum vehendis musculis paratorum, & cartilaginis vlnam à brachiali dirimentis.   | ζ |   |
| f  | Hæc sede musculis tendinibusque libera, aliter ligamenta, quibus ossa   |   |   |

TABVLA · XII ·

LIBRI · II ·






|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     | veri muris, vt ita dicam, effigiem præ se ferens.   |    | sculus secundi paris, acuto principio ex transuersis quinta, & quarta thoracis vertebrarum processibus enatus. B musculi huius sedes, qua carneus esse desinit, ac velut in tendinem degenerat. Porro B quoque musculum significare debet, qui à septimæ ceruicis vertebræ spina nascitur, & cum musculo A insignito cômiscetur; congressus autē sedi, C inscriptū est, quod non modò congressum vtriusq; musculi notabit, verū etiam vbi vterque exactē carneus efficitur. D vtriusq; musculi insertionem notat. E secundi paristertius in altero latere musculus indicatur, cuius etiam principium in alto latitat, insertione interim ipsius ad F conspicua. Postremo G ac G, secundi paris carnea moles insignitur. |
| nn  | Hic posterior quinti musculi pars, in tendinem degenerat, interiorita pitum femoris insertum.   | H  | Musculus dorsū mouentiū quintus.  |
| Σ Π | Π & Σ, anteriore quinti femur mouentium musculi indicant partē, ac Π quidem eius partis posteriorem portionem, Σ verò anteriorem. Quo autem hæc non admodum sanè obuia promptius percipias, eosdem illos Græcorū maiusculos characteres in sequenti tabula repositurus sum, illic dependentes musculi partes notans.  | I  | Portio musculi dorsum mouentium sexti.  |
| θ   | Musculus tibiā mouentiū septimus.   | K  | Decimus quintus dorsum mouentium, seu eorum musculorū octauiparis alter.  |
| xx  | Musculus tibiā mouentiū octauus.  | I  | Vndecimus dorsum agentium musculus, cuius principium à sacro offe pendens L insignitur, ipsius verò ansulē tēdinesve MM. Atq; ita clatissimū M, præsentis musculi superiorem significat terminū.  |
| λ   | Ampla depressaque femoris ossis sedes, supra radicem inferiorum ipsius capitum, posteriori in sede consistens.  | L  |   |
| μν  | Quartus tibiā mouentium musculus, hic ab insertione in sinistro crure pendens. ac μ quidem partem illius indicat, a coxæ dicis offe enatam; ν verò partem, cui femur principium præbet.   | MM |   |
| Σ Φ | Tibiā mouentiū quintus musculus. Primus pedem mouentiū musculus.  | z  | Character loco N positus, musculū dorsum mouentium nonū indicat, seu quinti paris alterum.  |
| Ψ   | Secundus pedem mouentium musculus. Ceterum huius musculi (vt & primi) principium partim carneū, ac π insignitū visitur; partim nerueum, ac ρ indicatum. τ autem sedes significat, vbi primum duo isti primi pedem mouentium musculi contigui sunt. σ Hæc tenus musculi illi in sura extuberant, hicq; carnei esse desinunt; verū hæc tubera nona tabula etiam accuratè exprimuntur. | OO | Musculus hic ab exortu propendit, thoracem hominis mouentium quartus.   |
| ω   | Tendinis, qui è duobus præsentibus musculis educitur, principium.   | PP | Hæc costarum asperitates, earum tubercula referunt, in quæ quartus thoracem mouentium musculus inferebatur. Quod autē ad costas, earundemque interualla attinet, eadem hic atque in aliquot præcedentibus tabulis est ratio.  |
| ϖ   | Initium musculi pedem mouentiū tertij, cuius tendinē proponit character ϖ, in sinistra positus tibia.   | Q  | Scapulam mouentium tertius.   |
| ϗ   |   | R  | Scapula posteriori parte prorsus excarnis.  |
|     |   | S  | Brachium mouentium tertius.   |
|     |   | T  | Thoracem mouentium secundus.  |
|     |   | V  | Tertium ligamentum peculiare ar-  |

## T A B V L A XIII.

ABC DEFG. Dextra portio secundi caput mouentiū paris, in quo singuli characteres aliquid priuatim insinuant. A enim indicatur mu-

uculi

TABVLA XIII · LIBRI · II ·



|               |  |                    |  |  |   |
|---------------|--|--------------------|--|--|---|
|               | ticuli humeri.   |                    |  |  | $\beta$ quidem infertionē indicat $\mu$ sculi femur mouentiū sexti, $\gamma$ autē musculi femur agentii septimi.  |
| X             | Dependet musculus brachium mouentium quintus.  |                    |  |  |   |
| Y             | In utroque brachio posterior humeri pars, excarnis prorsus, musculisquelibera cernitur.  | $\delta\delta$     |  |  | Musculus tibiæ mouentium octauus, vniuersum femur propemodum ambiens.   |
| a             | Posterior cubitū flectentiū musculus.  | $\epsilon\epsilon$ |  |  | Aspera femoris indicatur linea, cui quintus femur mouentiū musculus inseritur.  |
| b c d         | Musculi cubitum extendentes. Ac $b$ is insignitur, qui ab humiliore scapulæ costa initii ducit; $c$ ille, qui ab humeri capitis ceruice exoritur: $d$ autem carnosa pars, quæ ab humero, ad medium ferè longitudinis eius originem sumit.        | $\Xi\Pi\Sigma$     |  |  | Quintus femur mouens musculus, ab interno femoris capite propèdet, in quo $\Xi$ posteriorem ipsius notat partem, $\Pi$ verò & $\Sigma$ anteriorem. atque hic rursus priuatim $\Pi$ posteriorem indicat portionem partis anterioris: $\Sigma$ verò anteriorem partis anterioris portionem. |
| e             | Radius.  | $\Phi$             |  |  | Musculus in pedem mouentiū classe tertius enumeratus, ac principii $\Phi$ indicatū à femoris externo ducens capite, tendinem autem illic educens, ubi $\zeta$ insignitur.   |
| f g           | Musculus radium in prouum ductum superior, cuius infertionem priuatim $g$ insinuat.  | $\zeta$            |  |  | Musculus quem in poplite latitantem vocamus.  |
| h             | Dependet hic musculus, radiū in supinum mouentium breuior.   | $\eta\eta$         |  |  | Quartus pedem mouentium musculus, cuius initii $\theta$ indicatur, ipsius autem sedem qua tendo duorum primorum pedem mouentiū musculorum illi primum pertinacissimè adnascitur, $\kappa$ notauimus.  |
| i k           | Vlna. radium autem $e$ superius notauit. $k$ autem, ligamētū in utroque cubito indicat, radium vlnæ tota ea sede colligans, qua hæc ossa inuicem dehiscunt.  | $\lambda\lambda$   |  |  | Verò tēdinis insignitur infertio, qui è duobus illis primis pedem mouentibus & tertio confurgit.  |
| l             | Musculus primū indicis os introrsū flectens, hic priuatim $l$ indicatur.   | $\mu$              |  |  | Hac sede tibiæ os excarne conspiciatur, quemadmodū & magna portio exterioris capitis duorum humiliorum femoris capitum.   |
| m             | Illium ossis dorsum, quemadmodū & coxēdicis ossis exterior sedes, prorsus excarne occurrit.  | $\nu$              |  |  | Tēdo musculi pedē mouentiū octauus.   |
| n             | Coccyx quoque os excarnes; seu musculis ipsi adnatis liberū cernitur.  | $\xi$              |  |  | Tendo septimi pedem mouentium.  |
| o             | Ligamentum à sacro osse, coxendicis acuto processui infertum.  | $\Omega$           |  |  | Præsenti charactere indicatam volui figurā, ad dextrū integri hominis hac decima tertia tabula expressi crus repositam, lapidi que innitentem, quo tandem inferior pedis sedes oculis subiiciatur, & sectionis seriē musculi in hac apparentes, sensim in sequentibus tabulis proponatur. |
| p             | Femoris caput.   | $\omega$           |  |  | Significetur itaque primum $\omega$ ligamentum, seu membranea subliatia, primo digitos mouentiū musculo obnata, latique tendinis vicem in planta subiens.   |
| q             | Magnus exteriorq; femoris processus.   |                    |  |  |   |
| r             | Hic ab infertione propendet decimus femur mouentium, internā ipsius sedē, quæ ossibus vndique attenditur, commōstrans. Atque ita $st$ huius musculi tēdinis notat, qui ad coxēdicis os reflectunt.   |                    |  |  |   |
| st u          | Tribus his characteribus, carnosa indicatur pars, vaginæ quasi modo decimum femur mouentium musculum inibi deducens, qua ad coxendicis os reflectitur. Atque ita $x$ huius carnosæ partis supremam indicat sedem, $y$ mediam, $z$ autem infimam. |                    |  |  |   |
| xyz           |  |                    |  |  |   |
| a             | Portio femur mouentium noni.   |                    |  |  |   |
| $\beta\gamma$ | Dux musculorū infertiones, in paruum femoris factę processum. Ac   |                    |  |  |   |

|              |  |    |   |
|--------------|--|----|---|
| $\rho$       | Musculus pollicem à cæteris digitis introrsum abducens.  | FG | Quantum caput mouentium musculorum par, à prima ceruicis vertebra occipiti insertum.  |
| $\sigma$     | Musculus abductionis parui digiti à cæteris opifex.  | HI | In ceruice integrioris figure in sinuatur quintum par musculorum caput mouentiū, quod ab occipitio in transfuersos primæ ceruicis vertebrae processus implantatur.  |
| $\tau\tau$   | Primus secundusque pedē mouentium musculi, in integro quidem homine à quarto pedē mouentiū propendētes, in illa autem figura, quā $\Omega$ pponit, sua sede repositi.  | KL | Sextum musculorū caput mouentiū par, à spina secundæ vertebrae, transfuersis primæ processibus insertum.  |
| $\upsilon$   | Tendo tertij pedē mouentiū musculi, qui $\zeta$ in integro hoīe notabatur.   | M  | Musculi scapulam mouentium tertij pars, illic cōspicua, vbi à transfuersis aliquot ceruicis vertebrarum processibus prodit.   |
| $\phi$       | Portio quarti pedem mouentiū musculi, quem in integro homine $\phi$ insignitum cernis.   | N  | Dorsū mouentiū musculorū tertius.   |
| $\chi$       | Tendo ex primo, secundo & quarto pedem mouentium musculis cōflatus, calcique insertus: quāquam $\chi$ hic priuatim cavitatem proponat, inter anteriore præsentis tendinis partē, & posteriorem sedē aliorum musculorum conspicuā, qui hanc tibix sedem occupant. | O  | Dorsum mouentiū septimus musculus.  |
| $\psi\omega$ | Excarnis nullisq; musculis, vel ante sectionem obiecta tibix ossis pars.   | P  | Character P in lūbis reponit, notans nonū dorsū mouentiū musculū.   |
| $\ast$       | Hic portiones occurrunt musculorum, qui posteriore tibix sedē sibi vendicant, præter tres primos pedem mouentium musculos.   | Q  | Vndecimus dorsum mouentiū musculus, hic ab vltima ipsius insertionē pendens, ac finū R insignitum ostendens, quo decimotertio dorsum mouentium musculo cedit, ipsius autem principium S indicatur.  |
|              |  | R  | Decimus tertius dorsum mouentiū musculus, cuius principium V notatur; finis verò X: quod etiā principium decimiquinti dorsum mouentium musculi indicat.   |
|              |  | S  | Decimus quintus dorsum mouentiū, cuius superius extremum a insignitū, sub septimo dorsum agentium reconditur. Hanc tabulam, propter thoracis formam costarumq; ductū sedulo intueri operæpretium erit, quom costarum ductum appositissimè ostendat. |
|              |  | T  | In pubis ossē b occurrit, mēbranam indicans in pubis ossis foramine obuiam.   |
|              |  | VX | Musculus sextus femur mouentium, ab insertionē propendens.  |
|              |  | Y  | Musculi septimus femur mouentiū, ab insertionē quoq; propendens.  |
|              |  | a  | Hic musculus propendet femur mouentium nonus.   |
|              |  | b  | Carnea pars, seu, si voles, priuati musculi, decimū femur mouentem musculum deducentes, atqui hic ab insertionē pendentes.  |
|              |  | c  |   |
|              |  | d  |   |
|              |  | e  |   |
|              |  | fg |   |

TABULA XIII.

**H**æctabularum posteriorem corporis faciem exprimentium vltima est, scapulis & brachijs carens & genua flectens, ut plamam altero crure spectandam proponeret. Ad genua verò ne alia quæpiā integra delineanda esset tabula, caput unā cum duabus primis ceruicis vertebrae reponitur, quantum musculorum caput mouentium par ostensurum.


- AB Tertium musculorum caput mouentiu coniugiu, à secundæ ceruicis vertebrae spina occipiti insertum.
- C Mamillaris temporū ossis processus, tā in integra figura, quā illa quæ ad genua spectatur, conspicuus.
- D Hic character cū aliquot sub sequentibus, figuræ ad genua locatæ proprius est, transfuersum primæ vertebrae ceruicis indicans processū.
- E Spina secundæ ceruicis vertebrae, atque ita iam E secundam ceruicis denotat vertebram.

|      |  |     |   |
|------|--|-----|---|
| Γ    | Musculus quē in poplite latitare dicimus, cuiq; Galenus serē totum poplitis flectendi munus perperā cōcredidit. <i>h</i> ipsius ab externo femoris capite exortus, <i>i</i> insertio eiusdem in tibiæ os insignitur.   |     | ficio primū pollicis internodiū flectitur, atq; hæc eodem β indicata, in figura illa depēdet, quam Δ insigniui.   |
| hi   |  | AAA | Musculus secundum pollicis os flectēs γ in dextera tibia huius musculi notatur principiū. δ hac fēde præfens musculus, ab interno ipsius latere tēdinē educit, qui in carnea ipsius substantia aliquouſq; inceperat, iuxta charactērem ε. Deinde utraque figura plantam referens, tendinem hunc quoque δ notatum habet, quā pollicis iam est proximus.  |
| KK   | Septimus pedē mouentiū musculus.   | γδ  |   |
| l    | Tendo octauī pedem mouentis musculi, cuius insertio in pedij os paruum sustinens facta, <i>m</i> insignitur.   | ε   |   |
| m    |  | ΞΞ  | Ξ. Musculus quatuor digitorū tertium os flectēs, ζ ipsius principiū aliquānsper altius adhuc, sub musculo in poplite latitante, ac Γ notato η tēdo illius, ab interno etiā latere carnosæ suæ substantiæ enatus, atque in pedis planta in quatuor alios tendines inibi, vbi θ occurrit, diuisus, qui quatuor digitis postmodum offeruntur.  |
| nopq | A dextri pedis calce quatuor humi prostrati pendent musculi, pedis motorū opifices. <i>n</i> enim & <i>o</i> duos primos pedē mouentes insinuat. <i>p</i> autem tertium, <i>q</i> verō quartū. Cæterum <i>r</i> ad dextri calcis internum latus repositum, tendinis illius insertio ē priuatiū indicat.  | ζ   |   |
| r    |  | η   |   |
| ΔΔ   | Figurā notat externo lateri integrioris figuræ dextri pedis hic appositam, quæ sectionis serie dextrum integrioris figuræ pedē subsequitur, qui succedit figuræ, quam in præcedēti musculorum tabula Ω indicabamus.  | μ   | Hic sese ostēdit portio musculi, quē inter pedis moteres quantum numeramus.   |
| ς    | Ligamentum seu membrana pedis, à digitorū terminis pendet, quod musculo secundos quatuor digitorum articulos flectenti, Θ hic notato obnatum fuerat, latiq; in extremæ manus vola tendinis vicem gerebat.  | λ   | Musculosa caro, quæ in quatuor portiones diducta, tendinibus exoritur, qui tertium quatuor digitorum os flectunt. Est autem musculosa hæc caro, cuius opera quatuor pedis digiti ad pollicē ducuntur. Vt verō & tēdines illos, & portiones has musculosæ substantiæ accuratiū cognoscas, tendinem tertium indicis os flectentē, ν notatum cōspicis, musculum autem μ indicem pollicis adducentem μ. |
| z    | Dependet musculus, pollicem à cæteris digitis abducens.  | ν   |   |
| u    | Musculus hic à sua insertionē dependet, qui minimum digitum à reliquis in externum latus abducit.  | μ   |   |
| Θ    | Musculus secundū quatuor digitorū os flectens, x ipsius principium à calce enatū, α illius in quatuor tēdines partitiō. Cæterum qua ratione huius musculi tēdines diuidantur, subitōsq; trāsmittāt tēdines, in hoc dextro maioris figuræ pede expressū habes, ut tamē sese hæc offerant, attentissimis oculis internam quatuor digitorum fedem intubere; quanquam & figura Δ notata, hæc etiā commonſtret, in qua musculus ille ab insertionē propendens, ⊙ quoque insignitur. |     |   |
| x, α |  |     |   |
| β    | Carnea hæc moles illa est, cuius bene-   |     |   |

## TABULA XV. FIGURA XV.

**D**Væ præsentis tabulæ figuræ characterē xv. notatæ in ea effigie seruantur, in qua dextera tibia simul cum pede decimæ quartæ tabulæ, sese exhibuerunt. Atque prior figuræ in sectionis serie figuram subsequitur, quam præcedens tabula Δ notatam ostēderat. Posterior autem huius tabulæ figuræ, succedit priori. Note autem harum figurarū ita se habent.

TABVLA · XIII · LIBRI · II ·






- A 1. Tibiæ os.  
 B 1. Fibula.  
 C 1. Musculus depēdet à tibiæ offe qui in poplite latitat.  
 D E 1. Musculus quintus pedē mouētū, ac D quidem ipsius notat principium, E verò tendinem, ab interno musculi latere pronatum.  
 F 1. Sinus cui tendo insidet, secundi pollicis internodij flexiōis opifex.  
 G 1. Sinus quo tēdo vehit musculi, tertū quatuor digitorū os flectētis.  
 H 1. Musculus pedē mouētū septim⁹.  
 I 1. Musculus pedē mouētū octauus.  
 K 1. Insetio sexti pedē mouētis muscu.  
 L 1. Musculosa congeries, primū quatuor digitorum os flectens.  
 M 1. Osicula ad primum pollicis internodium reposita, quæ à sesami seminis imagine nomē inuenerūt, quæque ab Arabibus dimidiati ciceris formæ assimilantur.  
 N 1. Pendet hic musculosa substantia, quæ singulis quatuor digitorū internis lateribus portionem exporrigit, digitos pollicis adducentem.  
 O 1. Musculus pollicis secundum os flectens.  
 P Musculus tertium quatuor digitorū os flectens.  
 Q 1. Portio tendinis, secundum pollicis internodium flectentis, illi tēdini commixta, qui in indicis tertū internodium flectit. Sequentes modo characteres, sinistræ figure hac ratione peculiare sunt.  
 R 2. Tibiæ os.  
 S 2. Fibula.  
 T 2. Ligamentum membraneum, fibulam tibiæ osi illic committens, ubi hæc ossa inuicem dehiscunt.  
 V 2. Musculus pedem mouētū septimus. X hac septimi musculi tendo, sub offe cubum testēram ve imitante reflectit, & latescit quoque, Y tendinis huius in os pedij pollicem sustinens insetio.  
 a 2. Musculus sub septima osiculatus, & pedem mouētū octauus, cuius insetionem b notat, quæ in pedij os paruum sufficiens digitum perficitur.  
 b  
 123. Tribus his characteribus in postero

- ri c sinistræ ve figura, tres sinus indicantur, musculis à posteriori tibiæ sede inferiora pedis subeuntibus exsculpti. Atque 1 sinū notat, quo quinti pedem mouentis musculi tendo vehitur. 2 sinum tendini tertium, quatuor digitorum os flectenti insinuat. 3 verò sinum indicat nomine tēdinis celatum, cuius beneficio secundus pollicis articulus flectitur.  
 c 2. Musculus dependet humi quintus pedē mouētū, in priori figura D & E notatur, ac in secunda figura ad insetionem d insignitus.  
 d  
 e 2. Musculosa moles, primū quatuor digitorum os flectens, hic pendet à pedij osibus, quæ iam nuda ex carneaque spectantur.

## FIGURA XVI.

- A Os sacrum.  
 B Os sacri latus, cui sinistrū illū os committebatur.  
 C Ligamentū à sacro offe, in coxendicis ossis appendicem pertinet.  
 D Sinistri pubis ossis pars, quæ sinistro pubis ossi committebatur.  
 E Notatur quartus femur subiens nervus.  
 F Decimus femur mouentium musculus, cuius tres veluti partes, E F G insignitæ, inscriptionibus quodammodo distinguuntur, quibus ab interna pubis ossis sede, & interna quoque coxendicis ossis regione, musculus iste carneus pronascitur. Ad sedem verò H indicatam, musculus arctior redditur, & ad sinum sibi in coxendicis offe insculptum reflexus, ad magnum femoris proferat processum.  
 I Conspicua est portio, septimi femur mouentis musculi.  
 K Portio sexti femur mouētis muscu.  
 L Primus tibiæ mouentium musculus, cuius sedes, qua iuxta internū femoris caput in tēdinem cessat, M indicatur.  
 M  
 Δ Secundus tibiæ mouētium musculus. N & O musculi huius principium ab ossis pubis commissura

TABVLA XV. LIBRI II.  
FIG. XV



|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
|    | pronatum, M quoque & si in primo ponatur musculo, huius secundi musculi etiā sedem notat, qua in tendinem desinit.                                   | F  | Eminens superioris appendicis tibiæ ossis processus, qui sinū subingreditur, quæ duo humiliora femoris ossis capita efficiunt, & qui ligamentū mox X insinuādū educit.  |
| P  | Nonus musculus tibiā mouentiū, parua ipsius portione hic cōspicius.  | G  | Sinus inferioris appendicis tibiæ ossis, quo cōplures vehuntur tendines eorum musculorum, qui anteriorem tibiæ sedem occupant.  |
| Q  | Octauus tibiā mouentiū musculus.   | H  | Interior malleolus.   |
| R  | Tertius tibiā mouentiū musculus, cuius tendo, quemadmodū & primi & secūdi, tibiā mouentiū musculorū quoq; M indicari potest.                         | IK | Fibula, verūm K exterior malleolus priuatim insignitur.   |
| ST | Quintus femur mouentiū musculus, verūm S posteriorē eius musculi partem notat, T autem eius musculi anterioris partis posteriorem indicat portionem. | LM | Musculus notatur in fura maximus pedemq; mouentiū quartus, atq; inter reliquos corporis musculos intensissimè liuēs. Verūm M huius musculi tendinem, calcis ossi insertum, particulatim indicat. N autem portūculam tendinis primi, & secūdi pedem mouentium musculorum ostendit. |
| VV | Quintus tibiā mouentiū musculus.   | N  |   |
| XY | Excarnis tibiæ ossis pars, verūm Y interiorem notat malleolum.   | O  | Teres ligamentum, femoris os coxendicis ossi iungens.   |
| a  | Primus pedē mouentiū musculus.   | PP | Ligamentū orbiculatim femoris cū coxēdicis osse articulū amplectēs.   |
| b  | sub poplite character b secūdum pedē mouentiū musculū denotat.   | Q  | Ligamentorum portiones, ex magno externoq; femoris p̄cessu in musculorū substantiā absūptæ, ac potissimū in tibiā mouentiū septimi.   |
| c  | Tendo tenuissimus, idemque summe gracilis qui a tertio pedis musculo educitur.   | R  | Portiunculæ ligamentorū quoque, à radice interioris minorisq; processus femoris pronatæ, & in octauum tibiā mouentem musculum præcipue degenerantes.  |
| d  | Musculus surā constituentū maximus, pedemq; mouentiū quartus.  | SS | Membraneum ligamentū, reliquis etiam omnibus articulis commune, quod vniuersum genu articulum ambit, ea tantū parte excepta; cui mola præponitur.   |
| e  | Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.  | T  | Ligamentū genu articulo proprium quod externo ipsius lateri artēdit.  |
| f  | Portio musculi inter pedem mouentium quinti.   | V  | Ligamentum hoc etiam genu articulo peculiare censetur atque externo ipsius lateri attentum visitur.   |
| g  | Tendo sexti pedem mouentium musculi.   | X  | Ligamentum ex tibiæ ossis processu F notato, in femoris os insertum.  |
| h  | Tendines digitos extendentes.  | Y  | Ligamentum superiorem fibulæ partem tibiæ ossi connectens.  |
| i  | Musculus pollicem a cæteris digitis introrsum abducens.  | Z  | Ligamentum inferiorem fibulæ partem tibiæ alligans.   |
|    |  | a  | Membraneum ligamentum, fibulā tibiæ ossi toto ductu, quo inuicem hæc ossa dehiscunt, committens.  |

## FIGURA XVII.

**F**IGURA musculorum XVII. de ligamentis, omnem propemodum ligamenti differentia semel commanstrans, vniuersum femoris os exprimit, vnā cum tibiæ osse & fibula, quibus ea ligamenta adhuc connataherent.

|     |   |
|-----|---|
| ABC | D. Femoris os.  |
| B   | Femoris ossis caput sinum coxendicis ossis suū biens.   |
| CD  | Femoris ossis humiliora capita, quæ tibiæ articulantur. |
| EFG | H. Tibiæ os.  |

- b c* Hic ligamentum notatur, tendines an nuli ritu amplectens, qui à tibie anteriori sede in pedis superiora porriguntur. Vt verò ipsius natura exactius oculis subijceretur, id sectione secundum longitudinem ducta diuisum, atque vna parte in latus reflexum finimus.
- d* Ligamentū à tibie offe ad calcē infertum, & tendines hac ad pedis inferiora descendentes continēs.
- e* Ligamentum à fibula ad calcem porrectum, & tendinibus hac pedis inferiora petentibus obductum.
- f* Ligamentum cartilagineū, ab interno malleolo in tali internum latus infertum.
- g* Ligamentum quoque cartilagineū, fibulam talo colligans.

FIGURA XVIII.

- P*RESENTI figura musculi structura ratio, qua omnes ferè dissectionis proceres musculum formari tradunt, utcumque exprimitur.
- Φ Ω* Quod enim inter *Φ* & *Ω* continetur, nervi cuiusdā est portio suprà infraq; obtruncata: verum hac characterum indice opportunius explicabuntur.
- A* Nervi in plures furculos, distribuenti portio.
- B* Nervi *A* notati soboles, musculi cōstitutionem subiens.
- C* Ligamentum quod ab offe ad musculum constituendum pronascitur.
- D* Ligamēti & nervi ad musculū efformandū congressus, ac prima in fibras distributio, musculiq; caput.
- E* Sedes qua fibrarū maxima est diuisio, & qua musculi venter cōsistit.
- F* Diuisionis fibrarū concursus cōmixtioque, & tēdinis musculi initiū.
- G* Tēdinis pars, q̄ mouēdo ossi inferit.

FIGURA XIX.

*XIX. Figura musculorum humeri seu brachij os, & cubiti ossa, et extremam summam manus sedem ambientium fibras à carne liberas commoustrat, vnā cum quarto brachium aduentium nervo, ut hic quā fieri posset commodissimè musculi fabrica natura oculis subijceretur.*

- H* Humeri ossis caput, quod scapulæ articulatur.
- I* Quartus brachium petens nervus.
- K* Principium musculi cubitum extendentis, qui ab humeri capitis radice exoritur.
- L* Principium alterius cubitum extendentis musculi, qui ab humiliori scapulæ costa pronascitur.
- M* Sedes qua quartus brachiū accedens nervus, duobus cubitū extendentibus musculis propagines offert.
- N* Cubitum extendentium musculorū finis, seu eorundē in posteriorem vlnæ processum infertio.
- O* Posterioris vlnæ processus pars, quæ excarnis perpetuò cernitur.
- P* Quartus brachiū petens nervus inibi cōspiciuus, quā posteriori sedi exterioris tuberculi humeri innitit, ac musculus hinc ab humero principium ducentibus ramos offert.
- Q* Initium est cubitum flectentium musculorum posterioris.
- R* Caput oblongi musculi, qui radij appendicij iuxta brachiale infertus, radium in pronum ducit.
- S* Musculus bicorni tendine brachiale extendens.
- T* Musculus brachiale extendentiū alter, qui è regione minimi digiti postbrachiali implantatur.
- V* Musculus vlnæ exporrectus, & brachiale flectens.
- X* Musculus indicem, medium, & annularem extendens.
- Y* Musculus quo minimus digitus præcipuè extenditur.
- Z* Carnea pars eius musculi, qui in tres deductus tendines, vnū brachialis ossi pollicem sustinenti inserit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis ossi & tertio.
- a* Musculus cuius beneficio pollex indici adducitur.

FIGURA XX.

*Q*VAMVIS tertia musculorum tabula ad characteres, *CDE* hos musculos utcumque exprimit, hic tamen istam peculiarem locauimus figuram.

- A Maior canthus.  
 B Tertius musculus palpebræ attollens.  
 C Par primi palpebræ mouentium musculi à principio ciliorum exorietur.  
 D Oculi canthus externus.  
 EF Principium duorum palpebræ musculorum, mutuus autem illorum connexus notatur.

## FIGURA XXI. XXII. XXIII.

**T**RES hæc figura simul oculi musculos demonstrant, vigesima prima oculus cum musculus in sede sua adhuc manentibus delineatur, vigesima secunda aures, tantumque ab insertione pendentes exhibet, adipe qui inter eos circa opticum erat, sublato. vigesima tertia ostenditur eius facies anterior, vir aque palpebra cum musculus suis ablata, quo melius conspiciatur musculorum oculi situs.

- A 1. 2. Anterior oculi sedes.  
 B 1. 2. Nervi visorius quem opticum vocant.  
 CDE 1. Duo oculi musculi, siti sua in sede.  
 FG 1. Adeps interuallum musculorum oprensus.  
 HI 2. 3. Duo infimi oculorum musculi.  
 LM 2. 3. Altissimi.  
 N 2. Quintus oculi musculus qui eleuando oculo, ut placet Vesalio, succurrit.

## FIGURA XXIIII. XXV. XXVI.

**V**IGESIMA quarta figura linguam unam cum ipsius musculus à reliquo separatam corpore commonstrat. Eodem modo vigesima quinta linguam eiusque musculos oculis subiicit: tertium autem & septimum sursum refleximus, ut primus & nonus magis conspiciui essent: vigesima sexta apparet lingua diuisa, sublatis ab ea omnibus musculis.

- AA A, 1, 2, 3. Linguae portio ante confectiorem in hiantem ore conspicua, & tunica adhuc obtecta ipsi, actoti ori, & stomacho, item & arteriæ arteriæ communi.  
 BB 1. Hæc linea dicitur nuper tunice partem notat, secundum inferioris maxillæ latera ab ore dissectam. Linguae enim portio supra lineam

consistens, illa adhuc obtegitur tunica: quæ autem sub linea cernitur, hic (ut etiam nunquam) illa tunica non succingitur.

- C 1. Iam dictæ prius tunicæ portio, quæ hic à palati intimo una cum lingua præscidimus.  
 DD 1. 2. Primus linguae musculus.  
 E 1. 2. Tertius linguae musculus.  
 F 1. 2. Quintus linguae musculus.  
 G 1. 2. Septimus linguae musculus.  
 H 1. 2. Nonus linguae musculus.  
 I 3. Linguae ligamentum, cui linguae corporum fibre continentur.  
 KK 3. Dexter linguae corporis fibrarum species.  
 LL 3. Sinistri linguae corporis fibrarum species.

## FIGURA XXVII.

**P**RÆSENS figura, primam secundamque, cervicis exprimit vertebrae, posteriori sede delineatas, una cum earundem ligamentis. Characteres autem figurae inscripti ita habent.

- AEC Prima cervicis vertebra secundæ connexa. Verum A priuatim dexter primæ vertebrae sinus, qui dextrum occipitis ossis caput suscipit, indicatur. B autem sinister sinus, cui sinistrum occipitis ossis caput infidet. C verò primæ vertebrae sedes, ubi in spinam aliam terminantur.  
 DD GH. Secunda cervicis vertebra.  
 EE E. Ligamentum membraneum, primam cervicis vertebrae occipitis ossi necens.  
 FF Ligamentum membraneum primam cervicis vertebrae secundæ necens vertebrae.  
 G Corpus secundæ vertebrae dentem producens.  
 H Dens, acutus secundæ cervicis vertebrae processus.  
 I Teres ligamentum, à dente in occipitij os insertum.  
 K Transuersum ligamentum, dentem in sinu continens, qui dentis gratia in prima vertebra calatur.

## FIGURA XXVIII.

**V**IGESIMA octava figura duas à thorace vertebrae, anteriores facie

facie ex puerili corpore depictas exhibet. In quibus 1 notat superioris vertebra cartilaginem, sui corporis inferiorem appendicem, ipsumq; corpus interuenientem, 2 eiusdem vertebrae humiliorem appendicem, 3 cartilagineum ligamentum, superioris inferiorisq; vertebrae appendices intercedēs, 4 superiorem inferioris vertebrae appendicem, 5 cartilaginem, dictam modò appendicem suae vertebrae copulantem.

## FIGURA XXIX.

- A REcti intestini portio cū suis musculis à corpore resecta: quā dū reliqua eximimus intestina, i corpore adhuc relinquere solemus.
- BC Duo musculi, intestinum post egestionem sursum trahentes.
- D Musculosa substantia penis radici adnata, in mulieribus porro ad infimam pudendi partem commissa. Insuper D sedes notatur, à qua in penem musculi duo pronascuntur.
- E Circularis musculus, ne prater arbitriū excrementa deiciantur præcauens.

QVATVORDECIM FIGURARUM laryngis characterum index.

PRIMA figura ossis v imaginem referentis, et hic suis musculis omnibus liberati anterior facies exprimitur, vnà cum anteriori laryngis, et asperæ arteriæ caudicis (qui in collo consistit) sede, nullo interim laryngis musculo resecto. Qui verò musculi hic sint cōspicui characterum index, dilucide explicabit. Secunda figura eadem quæ prima ex dextro latere commonstrat, quanquam hic non tantam asperæ arteriæ caudicis portionē asseruauerimus, dein etiam hinc superiora ossis, v referentis latera resecimus.

Tertia secunde penitus responder, nisi quòd hac ex posteriori facie eadē, quæ illa ex latere commonstrat, verum & hic quoque ex industria superiora ossis hyodis latera perinde ac in prima delineantur.

Quarta anteriorem laryngis faciem, cum portione caudicis asperæ arteriæ proponit, resecto iam hyoide osse, cum musculis ab illo, & à pectoris osse laryngi oblatis. Seruantur itaque adhuc ex communibus laryngis musculis quintus & sextus, ac dein musculi laryngis operculo proprii.

Quinta figura à quarta sectionis ordine nihil variat, eadem quæ quarta, ex sinistro latere eleganter spectanda offerens.

Sexta laryngem à reliquo asperæ arteriæ caudicis liberatam, ita posteriori facie exprimit, vt neque stomachi, neque communis alicuius musculi portionem adhuc reliquerim, interea tamē nullam laryngis cartilaginum sua sede dimouimus.

Septima laryngem ex dextro latere ita expressam continet, vt ipsius operculum iam resectum sit, vnà cum musculis prima cartilagini secundæ nectētibus. Dein prima cartilaginis in hoc latere inferior processus, à secunda liberatus est, ipsaq; prima antrosum, atque à secunda sic reflexa occurrit, vt media prima cartilaginis sedes, in posteriori regione nuda cernatur.

Octaua à septima in hoc differt, quòd hic resectos musculos illorum quatuor, qui tertiam cartilaginem secundæ nectunt, resecimus, ipsaq; secundæ cartilago magis detecta appareat. Nona rursus ab octaua in hoc variat, quòd præter musculos nuper dictos, etiam quatuor tertiam secundæ iungentium obliquos, & dein duos in tertia cartilaginis basi positos abstulimus, seruatis dumtaxat cum tribus cartilaginibus illis musculis, qui tertiam primæ alligant.

Decima ex anteriori laryngis sede se spectandam præbet, ablata iam prima cartilagine, & dumtaxat cum secunda & tertia apparentibus musculis, tertiam primæ cōmittentibus.

Vndecima laryngis musculis ostendendis non seruit, verim hanc, vt et duas sequentes, ostendende laryngis lingua gratia delineauimus. Exprimitur itaque hic larynx, à reliquo

asperæ



*aspera arteria trunco, & suis communibus musculis libera, quæ asseruato adhuc ipsius operculo, posteriori suæ sedî incumbit, superioremq; faciem commonstrat.*

*Duodecima in hoc ab undecima differt, quod hæc inferiorem laryngis sedem delineatam contineat.*

*Decimatertia hoc à duodecima habet peculiare, quod laryngis rimam seu lingulam, magis coarctatam occlusamue representet. Cæterum characterum index erit eiusmodi.*

A In prima 2, & 3, figuris hyoidis notatur os, nō prorsus suis membranulis liberum.

B In prima 2, & 3, humilioris hyoidis ossis latus, superiori scutiformis cartilaginis alligatum processui, qui C in 2, 3, & 4 indicatur.

C In prima & tertia superius notatur hyoidis ossis latus, à secunda figura inibi resectū, ubi E adscriptum cernis.

E In prima & tertia superius notatur hyoidis ossis latus, à secunda figura inibi resectū, ubi E adscriptum cernis.

F Musculus ab hyoidis ossis inferiori sede enatus, ac humiliori primæ cartilaginis sedî insertus.

In prima figura dexter & sinister est conspicuus, in secunda dexter duntaxat.

G Musculus ex posterioris ossis summo, ad humiliorem primæ cartilaginis sedē deductus. Prima dextrum & sinistrum quoque exprimit; at secunda dextrum tantummodo portionem.

H Gula, seu stomachus, in 2, 3 & 5 conspicuus.

I Musculus ex posteriori sede stomachi, cartilaginis primæ lateri insertus. Ac tertia dextrum & læuum ferè vniuersum ostendit, & potissimum vtriusque initium. Secunda dextrum & minimam sinistri portionem: Quinta verò, sinistri insertionem exprimit, vt etiam prima & quarta vtriusque insertionem proponit.

K Duo musculi ab osse u referente enati, ac in laryngis operculi radicem inserti, hi occurrunt in secunda figura & tertia & quarta.

L *Ἐπιγλωττις*, seu (vt nos vocamus)

laryngis operculum, in secunda figura, & dein in 3, 4, 5, 6, & 11, conspicuum.

M Glândula laryngis radici, ad asperæ arteriæ latera adnexa in 2, 3, 4, & 5.

N Musculus à prima cartilagine ad secundam protensus, exteriorue primæ cartilaginem secundæ iungentiū. Dextri musculi & sinistri pars in prima videtur, vterque autem integer in quarta apparet.

O Musculus à secunda cartilagine in primam protensus, alteriusve lateris interior, secundam cartilaginem primæ connectentium, in quinta solus sinister exprimitur.

P Musculus ab infima secundæ cartilaginis sede, posteriori in parte principium ducens, & tertiæ cartilagini insertus. Sexta dextrum & sinistrum ostendit: septima dextrum, & quodammodo sinistrum.

Q Sedes iam dicti musculi, in octaua & nona.

R Musculus à latere secundæ cartilaginis, in tertiā cartilaginem insertus. Septima & octaua dextrum duntaxat ostendunt.


S Sinus secundæ cartilaginis, in octaua & nona notatur, cui inferior primæ cartilaginis processus, T in octaua & nona insignitus cōnascit.

T Musculus in basi tertiæ cartilaginis situm obtinens, Sexta vtriusq; lateris musculū representat. Septima dextrum, & sinistri portiunculam. Octaua etiam dextrum.

X In nona figura sinus indicat, cui musculus insidet, tertiæ cartilaginis basim in altero latere occupas, ac V caractere iam expressus.

a Musculus ex tota primæ cartilaginis longitudine enatus, ac tertiæ inferius, aut musculis primæ cartilaginis tertiā copulās. Decima dextrum & sinistrum & sinistrum b insignitum indicat, ablata interim prima cartilagine.

Septima verò, octaua & nona, integrum dextrum lateris musculū a notatum exprimunt, & elatiore sinistri sedē, quam ob hoc quoq; b latera in illis figuris notauimus.



- c Lingua seu rima, in medio laryngis obuiæ superior sedes in vndecima figura conspicitur.
- d Inferior facies lingula, quam in decimatertia magis, quam duodecim apertam expressimus.
- ee Duo sinus, vtrinque vnus, qui clausa lingula seu rima in humiliori ipsius sede ad latera euadunt conspicui in duodecima, & decimatertia.
- f Callus in medio rimæ apparens, vbi ipsa potissimum conniuet, in decimatertia exprimitur.
- g Ne fortasse aliquid obscuritatis cartilagine literis non insignitæ adferant, illas quoque adnotabimus. g itaque prima est cartilago, in anteriori parte se offerens, in 1 figura, dein in 2. 4. 5. 12. 13.
- h Prima cartilago, in tertia figura & 6. 7. 8. 9. posteriori facie se offerens.
- i Secunda cartilago anteriori facie conspicua, in 1. 2. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 13.
- x Secunda cartilago posteriori facie spectatur, in sexta. 7. 8. 9. 11. 12. 13.
- l Tertia cartilago occurrit in secunda, 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

**T A B V L A E D E P E N I S**  
*musculis Characterum index.*

xiiii. Itaque figura corporis in mensa proni, & oculo ad perinæum seu interfemineum directo, ostendit se mora in latera admodum distensa, & penis corpus vniuerso interim scorto cum testibus, cute, adipe, venis, nervis, & arterijs vndique absectis.

xv. Figura nuda quodammodo comonstrat ossa, quæ sacri ossis lateribus committuntur, ac iliū, & coxendicū, & pubis ossa appellatur. His femorum ossium portiones adhuc appendent, vnā cum ani & penis musculis: quos ideo ab ipsorum exortu dependere finximus, vt penis corporū origo vrinæque & semini communis meatus inibi in conspectu esset, quā sursum sub pubis ossibus fleatitur.

xvi. Penem transuersum dissectū in hoc ostendit, vt penis corporū substantia, & coalitus, & cum vrinæ meatu connexus oculis subijcerentur.

xvii. Figura integrum commonstrat penem, vnā cum vesicæ hic exporrectum, vt proprius vesicæ cervicis musculus intueri possit.

xviii. Ostendit penis diuisum canalem ad vesicæ introitum, glādu las item quibus conseruatur semen.

xix. Penis corpus per longitudinem dissectum monstrat, quo melius appareat arteria, quæ per ipsum distribuitur.

- AB 1. 2. 3. 4. Duo penis corpora penem quodāmodo vniuersū cōstituētia.
- CC 2. 4. Duorum penis corporū exortus.
- D 1. 2. 3. 4. Penis glans, quam alij preputiū nuncupant: eo noīe cutē, quæ penis obtegitur, non dignantes.
- EE 3. Fungosa rubraq; penis corporum substantia.
- F 3. Mutuus penis corporum cōnex & neruea eorundem substantia, quæ orbiculatim fungosā substantiam complectitur.
- G 1. 2. 3. Vesicæ meatus, vrinæ seminiq; genitali communis.
- HI 1. 2. Duo primi penis musculi, in prima quidem figura suam seruantes sedem: in secunda autem ab eorundem principio dependentes.
- KL 1. 2. Duo posteriores penis musculi, seu tertius & quartus, qui prima figura integri, in secunda vtrō ab infertione pēdentes conspiciunt.
- M 1. 2. Musculus orbiculatim recti intestini finem ambiens, faciumq; excretionis præfectus.
- N 4. Vesicæ cervicis musculus, vrinam, ne præter nostrum arbitrium defluat, cohibens.
- OO 2. Membrana pubis ossium foramina occupans.
- P 2. Teres ligamentū, à coxēdicis ossē in rotūdū femoris caput insertū.
- Q 4. Vesicæ corpus.
- R 4. Glandosum corpus, vasorū semen deferentiū infertionē excipiens.
- SS 4. Portiuncule sunt meatū, quibus vrina ē renibus in vesicā ducitur.
- TT 4. Portiuncule sunt meatuum, semē in vesicæ cervicē ciugulantium.
- V 5. 6. Arteria, quæ per vniū latus penis distribuitur, & per alterum eodē prorsus modo alio distribuitur.




Ræter consuetas Valuerdi Figuras, cùm sequentes quatuor musculorum iconas recens naçti essemus, ea vtpote non inelegantes, & ab alijs differentes, ad absolutionem operis perfectionem addendos duximus, postremum hunc ipsis locum, ne vetus numerorum ordo turbaretur, assignantes.






















# IOANNIS VALVERDI

## Medici de Humani Corporis Anatome.

### LIBER TERTIVS,

In quo de Nutritionis, Generationisque instrumentis agitur.

*De Membrana, quæ omnibus hisce membris obtenditur  
περιτόναιον dicta. Cap. I.*



**M**EMBRANÆ fabricæ basim & propugnaculum, ossa nimirum & cartilagines, primus liber edocuit. Secundus vincula & ornatum ipsius enarrauit. Tertium hunc, organis ad nutritionem requisitis consequenter dicabimus, & ob partium viciniam, de generationis quoque instrumentis agemus, sermonis initium à Membrana ducentes, quam, quod horum omnium organorum cōmune sit inuolucrum, græci περιτόναιον appellarunt, Arabes autem Siphac. Membrana hæc corpus

est simplex siue simile, omni fibrarum genere, quales in venarum tunicis haberi scripsimus, destitutum: estque totius corporis membranarum, si carnosam exceperis, maxima. Ac omnem in primis cauitatem interna facie succingit, quæ à septo transuerso ad ossa usque pubis illium, & Coccygis habetur; omnia quæ inibi continentur instrumenta obuinciens, ventriculum scilicet, iecur, cystum fellis, lienem, omentum, mesereon, intestina, renes, vesicam, vterum, & testes. externa sede abdominis musculis adhærescit, ex ligamentis enim lumborum vertebrae, & illium ossa sacro ossi connectentibus vtrinque nascitur, principio admodum tenuis; ac deinde <sup>a</sup> musculos lumborum vertebrae affixos, nec non internam ossium coxendicis regionem occupantes supergreditur, fibrarum interuentu, quæ musculos inuicem committunt, ipsi adhærens;

<sup>b</sup> Transuersis verò abdominis musculis subtenditur, inferiori diaphragmatis sedi, illisque omnibus, ac potissimum nervosis ipsorum partibus cohærescens, & musculis instar inuolucri obducta. Adeo ut vini virem, peritonæum imagine referat; intus quidem læue ac lubrico humore oblitum, adipisque interdum aliquid sibi adnatum habens, licet non æque vndeque; sedes enim ipsius, quæ venter & lumbos respicit, longè copiosorem obtinet adipem, quam quæ vmbilicum pertinet, exterius autem asperum, quò musculis firmitus adhæreret, nec intestinis officeret. Ab interna peritonæi regione aliæ quædam nascuntur membranæ, membris in huiusmodi cauitate contentis obductæ, & singula instar tunice obtegentes, præter peculiare membranas, quas nonnulla, siue maior ipsorum pars adipiscuntur. Atque hæc ob causam complures, ijs organis quæ duabus duntaxat donantur tunicis, quemadmodum ventriculus & intestina, ternas adesse crediderunt, peritoneos membranam vnus vice connumerantes; ijs autem, quæ vnicam duntaxat peculiarem tunicam obtinent, quemadmodum vterus, vesica, cystis fellis, binas adscripserunt; ijs demum quæ nullam adeptæ sunt, ex quorum numero sunt lien & iecur, vnicam assignarunt, peritonæi scilicet partem. Ceterum peritonæum non parem ubique seruat crassitiem; pars enim ipsius lumborum vertebrarum vinculis connata, admodum crassa est, quemadmodum & quæ lumborum musculis incumbit; anterior verò à mucronata pectoris cartilagine subtus vmbilicum pertinens, tenuis insigniter occurrit; atque hinc etiam tenue deorsum fertur peritonæum, sed geminum, & inter vnâ alteramque membranam vmbilicales arteriæ, nec non vniarius meatus deferuntur, uti suis locis doce-

Figure.

Membrane à peritonæo eductæ.

Peritonæi hanc pars est ubique crassities.

Peritonæum quoque locis peritoniæ.

a. li. ii. ca. vii.  
cux.

b. li. iii. ca. vi. a.



docebimus, etsi Vesalius id minimè aduertit. Adhæc Peritonæum in viris iuxta pubis ossa, ad latera capitum rectorum musculorum, <sup>c</sup> singula vtrique ostendit foramina, per quæ ad testes seminaria vasa deferuntur. Quod tamen haud ita accipiendum est, vt Peritonæum hac in parte peruium sit, nullibi enim disruptum, vnà cum seminarijs ductibus ad testes elabitur, omnibus ipsis obductum. Quà etià Diaphragmati subtenditur duo pariter obtinet <sup>d</sup> foramina, instar illorum, quæ in illo haberi diximus, quæ minùs etià prædictis foramina dici merentur. Vbi nanque peritonæum, ad venam cauam, ad arteriam magnam, & ad œsophagum, quæ septum traicere diximus, pertingit, ea circum circa complectitur, & omnibus ipsis adhærēs descendit, <sup>e</sup> <sup>f</sup> <sup>g</sup> <sup>h</sup> venam cauam & œsophagum <sup>f</sup> circum vndique, arteriam verò <sup>g</sup> antèriùs duntaxat ambiens. Alia quin etià fortitur foramina, quibus <sup>h</sup> vmbilicalia vasa, ceruix vesicæ, anus, & venæ complures, arteriæ, ac nerui, ad crus tendentes, musculi etià aliquot dorsi, nec non multæ <sup>i</sup> venarum, neruorum, arteriarumque propagines transmittuntur, quæ à vasis lumborum vertebri incumbentibus prodeunt, & proximis sibi musculis, cutemque ac Peritonæum quoque ad eunt, quod non solum furculos hosce suscipit, verum etià & illos, qui septum transuersum permeant, vnde mihi haud omnino sensus expers videtur, vt multi existimarunt. In mulieribus priuato foramine donatur, quo vteri ceruix viam sibi parat. Peritonæo id muneris demandatum est, vt prædicta membra priuatim contegat, & omnia quo minus a sedibus suis aberrant, cōtineat, quod potissimum in abdomine ac lumbis præstat, quibus in locis si forte fortuna disruptitur, intestina protinus erumpunt, & veluti herniam efficiunt, neque verò transuersi abdominis musculi ipsis quò minus exiliant continendis sufficiunt, quâ uis Vesalio secus videatur.

Peritonæi muni.

### De Aesophago, siue Stomacho. Cap. 11.

Gula situs.

**S**tomachum appellamus <sup>a</sup> intestinum illud, à palati finibus exortum, quod lingue radici hærens, tonsillas utrasque attingit, & <sup>b</sup> deorsum per asperæ arteriæ posteriora ad quartam vsque thoracis vertebram protenditur, ac dein iuxta quintam, vt magnæ arteriæ cedat, non nihil dextrorsum deuiat, ipsique adherens ad nonam vsque thoracis vertebram procedit, vbi iecoris occasione ad læuam obliquatur, & paululum à dorso abscedens c neruosam Diaphragmatis regionem sinistrorsum supergreditur, & <sup>d</sup> intra ventriculum ad igitur. Via hæc græcis οἰσόφωρος, latinis stomachus, id est os, dicta est, per eam namque veluti per os esculenta omnia peculentur, ingeruntur, præter potus tantillum, quod laryngem ingreditur, eamque irrorans efficit vt melius diduci & arctari queat. Alii Gulam siue Meri appellarunt. Hispanis Tragadero, siue Herbero, seu Gargante dicitur, Italici verò Gola, siue Canna della Gola. Constat autem ex neruosis quibusdam tunicis, quo facilius dilatetur colligaturque. Interna eius facies læuis & lubrica est, externa verò aspera. Binas sibi peculiares tunicas vendicat, præter communem peritonæi, substantia, duritiæ, crassitiæ ac fibrarum specie varias. Interior enim neruosior est ac durior, tenuiorque, totius oris & palati tunicæ continua, & fibris secundum longitudinem porrectis donatur, quibus veluti manibus ingestos cibos attrahit, & vomitu reiecit, licet motus is ad ventriculum magis quàm ad gulam pertineat. Exterior tunica crassior est ac mollior, & musculi modo, paulò carnosior, & transuersas, circularesue fibras nanciscitur, quæ ci bis in deglutitione deorsum trudendis, eisdemque in vomitu foras propellendis opitulantur. Tertia stomachi tunica fibris omnino destituta est, proditque à ligamentis vertebrarum thoracis, iuxta nonam vertebram, cui sedi œsophagus ipse committitur, fitque ex membranis, quæ à thoracis vertebrarum ligamenti infra nonam vertebram enascuntur, & vertebrarum corporibus stomachum deuinciunt. Membranam huic nihil fibrarum obtigit, nihil muneris conceditum est, præterquam vt secundam integat, quemadmodum peritonæum, ea membra quibus obtenditur. Præter cōmemoratas fibras faciliorem ciborum deglutitionem reddentes, quatuor in stomacho

Gula quot ex tunicis constet.

Tertia gule tunica.

a fl. xiii. xiii. b fl. iii. xvi. fl. ii. iii. v. H. ta. vii. F. trasi: super B, & sub F

c fl. iii. vii. d fl. xi. iuxta. R

c fl. i. G. li. ii. t. iii. x. t. i. Y

d li. ii. c. vii. r. f.

e ead. f. f ead. r g ead. q h fl. iii. FK I

i fl. xix. m. m a

cho glandulæ habentur, quæ ipsum continuò humefcentem & lubricum feruât. Ha-  
e. xiii. E. F. rum <sup>a</sup> duæ in faucibus, stomachi orificio affidentes, ac tonſillæ nobis appellatæ, laryn-  
f. xiii. E. F. gi etiam irrande inferiunt. Duæ <sup>f</sup> aliæ in medio stomachi ductu cōſiſtunt, poſte-  
riori eius ſedi magis innixæ, atque illis, quæ ad initium cœuicis veſicæ occurrunt, tum  
forma, tum officio ſimiles.

De Ventriculo. Cap. III.

**A** Esophago <sup>a</sup> ventriculus eſt continuus, ſub Diaphragmate inter vmbilicum &  
mucronatam pectoris cartilaginem ſitus, à læua in dexteram ſecundum  
longitudinem ex porrectus. Elatiore anterioreque ſui ſede in ſiniſtro latere  
Diaphragmati cohæret; In dextro latere iecoris concavo ſubſtenditur; humiliori  
autem ſede omento atque inteſtino colo attenditur; à ſiniſtris lien inſpuitur, atque  
in hoc latere maior ipſius pars totam regionem inter iecur & lienem interſitam oc-  
cupat, in qua ſuperius oriſcium ſepto adhæret paulò elatius inferiore, quod ad læ-  
uam iecori ſubſternitur, ſed vtrunque oriſcium in medio corporis cōſiſtit, non q-  
dem longitudine, ſed profunditate corporis dimetiſta. Reliquum ventriculi in ante-  
riora pertinens ei parti ſubiaceat, quam os ventriculi vulgo appellant, hinc ſanè dece-  
pti, quòd parte hac frigefcente incaleſcenteue, ventriculi os dolere, ſeu reſocillari p  
varia ipſius diſpoſitione animaduertant. At huius proſectò ratio nulla alia eſt, quàm  
quòd ventriculi corpore calidior, ſeu frigidior reddito, protinus ipſus ori, conti-  
nuo ſcilicet, alteratio communicatur. Vnde in medicorum quorundam ſententiâ  
conſuere nequeo, qui ventriculi ſitu adducti, remedia ventriculi os iuuatura, dorſo  
applicat ad coſtarum extrema, non nihil ad læuam; non enim video qui per tantam  
oſſis craſſitiem, carniſque molem medicamentorum facultati facilis pateat aditus.  
Sed vt eò vnde digreſſa eſt noſtra redeat oratio. Ventriculus forma eſt rotundus &  
oblongus, & principio latus, ac ſenſim verſus finem in anguſtum coactus, ſuperiore  
ſede, quæ à ſummo ad imum pertinet, ſtrictior anguſtiorq; inferior autè amplior;  
eſtque totus æqualis ac terſus; poſterior interim ſinum commoſtrat, quem in ſui me-  
dio tranſuerſim efformant dorſi vertebrarum corpora, nec non vena atque arteria ip-  
ſis ſuperuectæ. Sinum hunc ventriculus non niſi in corpore cōſiſtens oſtendit, ideo-  
que benè in ſtatu, vetriculi quo clyſteres parantur formâ, quodammodo reſert. Duo  
etiam ſortitur ora, alterum quo cibum excipit; quod *ὀσφυαλός* i. e. ſt os, græcis appella-  
tur, cui æſophagus iungitur in ſiniſtro latere, ſub Diaphragmate, modicè verſus me-  
diam corporis regionem; alterum quo cibis conſectus foras extruditur, ac proinde  
*πύλωρος* græcis, Ianitor nobis dicitur, qui ſedem in dextro habet latere, è regione  
propemodum alterius, adeo vt cibûs ad abſolutam vſque ipſius elaborationem faci-  
lè in ventriculo contineri poſſit, nulla interim vrgente neceſſitate, qua inferius ori-  
ficium arcè adeo, vt quidam exiſtimant, occludi oporteat, ex duobus hiſce oriſcijs  
ſupernum amplius inferno eſt, quò ſcilicet cibos facilius deglutire, deglutitoſq; mi-  
nori negotio continere poſſimus. Quanta ſit etiam inferioris oriſcij amplitudo, ex  
his diſcere poſſimus, qui aut imprudenter, aut etiam conſultò, anulum, apremu-  
ſcutatum, vel quid ſimile deporant. Neque verò glandula illa quæ inteſtino, Ianito-  
ri contigua ſecundum ipſius longitudinem adnaſcitur, ad exactiorem oriſcij huius  
cōſtrictionem opitularur, ſed venæ portæ ramos, inibi ſeuimòs ſuſſulcit. Cæterum  
oriſcij vtriuſq; membrana, reliquò ventriculi corpore paulò craſſiores exiſtunt,  
vt illis intra digitos compreſſis, multoque magis inuato ventriculo, conſpicuum eua-  
diſſiquidò enim orbiculatim prominere deprehenduntur, idq; perſpicuum fit quæ  
ſtomachus, & duodenum inteſtinum, ille quidem ſuperiori, hoc vero inferiori ven-  
triculi oriſcio iunguntur. ex hiſce autem prominentijs, vtraque ventriculi ora lon-  
ge maius ſibi ipſis robur aſciſcunt. Reliquum omne ventriculi corpus, c interna ſa-  
cie læue eſt ac planum, perinde ac exteriore, ſi duas tamen prædiſtas ſedes exceperis,  
quæ, ventriculo inſigniter conſtrictò, rugas quaſdam oſtendunt; ac huiusmodi quidè

Vnctiones pro  
ventriculo ubi  
non faciende.

Ventriculi ſig-  
ra.

Duo ventriculi  
oriſcia.

Inſtrius ventri-  
culi oriſcium  
non admodum  
anguſtum.

Ventriculi mem-  
brana ubi craſ-  
ſiores.

Ventriculus magnitudo.

Ventriculus duplici constat tunica.

Ventriculi fibrae.

Secunda tunica.

Alia tunica.

Ventriculi mucus.

partes albæ minus quàm reliquum ventriculi corpus occurrunt, præsertim verò intrinsecus vbi modice rubent. Interdum etiam ingens adipis copia in ventriculi fundo reperta est. Neque vna vbiq; est eademque ventriculi magnitudo, nam præterquam quòd alijs maior, alijs minor obgit, in vnoquoque pro assumptorum ratione, maior minor uel redditur, nam vesicæ instar ita turgescit cogiturque, vt quantumlibet exiguum, multum uel sit quod continet, totum id æque complectatur, nihil interim vacui relinquens. Cui quidem actioni apprimè ipsius substantia congruit, quippe quæ neruosa est, & citra omne periculum ampliari colligique potest. Constat autem duabus tunicis, latis atque tenuibus, sibiq; inuicem iunctis, sed nonnihil varijs. <sup>d</sup> Interior enim perinde ac stomachi neruosa est, ac stomachi, pa- <sup>d</sup> f. xvi. m. lati, laborum, vti & intestinorum interiori tunica continua, stomachi tamen & pa- lati tunica paulò mollior, ne in asperioris cibi molitione, ac deglutitione hæc abra- deretur; ac proinde hæc oris tunica, ad ventriculi vsque fundum, mollior deinceps efficitur, Tunica hæc vnum duntaxat sortita est fibrarum genus, obliquè scilicet ex- currentium, quæ quidem in re à stomacho differt, qui fibris quam plurimis, rectæque ab imo ad summum porrectis donatur, quibus veluti manibus cibos deorsum alli- cit. Ventriculus autem rectis fibris minimè opus habuit, cum munus ipsi cibos attra- hendi concreditum non sit, sed dum conficiantur duntaxat retinendi, confectosque foras propellendi, quorum illud obliquis, hoc transuersis secunda tunica fibris molitur. <sup>e</sup> Exterior tunica crassior est quam interior, atque ideo mollior, & lenta <sup>e</sup> ead. L. magis, externæ stomachi tunica continua, & transuersis, perinde atque illa fibris <sup>f</sup> ead. K. intexta, quæ interioris tunica fibris tessellatim complicantur. <sup>f</sup> Tunica huic alia circumducitur ex peritonæo, quæ id septi partem stomacho iter præbentem integit, pronata, ipsique circûdata, vbi crassior quàm alibi occurrit, externæ omenti tunicæ, vt inferius docebimus, principium porrigens. Ventriculi autem partes sunt, cibum conficere, ac in suam naturam conuertere, ac proinde qualis ipse est, albû ipsum red- dit, quem vbi elaborauit eoque potitus est, (sive ipso reficiatur, seu nutriatur) quod reliquum est transuersis fibris per pyloron extrudit, quæ ventriculum (vt mu- lieres intestina solent, cum in sitia parant) comprimentes foras propellunt. In eo ita- que velut in lebate, cibus vniuerso corpori coquitur, ideoque inter tot membra ip- sum excalefacientia fuit repositus.

### De Intestinis. Cap. 4.

Intestina omnia sunt.

Prima intesti-  
norum diuisio.  
Tenuia intesti-  
na.

Intestina cras-  
sa.

Ventriculi fundo <sup>a</sup> intestinum iungitur, quod in anfractus plurimos reuolutum <sup>a</sup> f. liiii. v. f. x. ad anum vsque procedit. Idque etsi re vera vnicum est, varia tamen & à vete- ribus, & à recentioribus nomina, ob substantiæ functionisque varietatem accepit. Primum namque in tenuia, & crassa diuiduntur. Tenuia <sup>b</sup> ex ventriculi fundo prin- <sup>b</sup> f. xi. s. f. vi. cipium sumunt, & retrorsum contorta sub postica ventriculi sede ad dexterum cor- porum vertebrarum dorsum, deorsum tendunt, in gyros nusquam circumflexa. Quum primum verò imam ventriculi regionem contingunt, sub <sup>c</sup> intestino colo, <sup>c</sup> f. v. v. cui ventriculum incumbere dicemus, occultantur, ad læuam defleſcentia; ac dein in flexuosos gyros complures sursum deorsumque incerta serie numeroque acta, se- dem vniuersam, quæ inter ventriculum ac pubis ossa, & ilia habetur, implent, ea ex- cepta quam colon intestinum, vt inferius trademus, occupat, eandem semper crassi- tiem ac latitudinem seruans, quamuis interdum iuxta ventriculum paulò latius oc- currat. Intestinum id figura teres ac læue est, substantia nerueum ac tenue, & ex dua- bus <sup>d</sup> tunicis conflatum, quarum interior dura est ac neruea, interiore tamen ventri- <sup>d</sup> f. viii. h. culi tunica mollior; exterior autem minus neruosa est, ambæ verò perquam tennes existunt, & transuersis duntaxat fibris intertextæ; quamuis exteriori paulo ante quæ ad cœcum pertingat, rectæ aliquot fibræ obtingant. Duabus hisce tunicis <sup>e</sup> alia ex <sup>e</sup> ead. K. peritonæo procedens accedit. Tenuibus intestinis <sup>f</sup> crassa cohærent, sub dextri re- <sup>f</sup> f. v. vi. f. ix. NPQ. f. s. T. Y. a. nis regione, nonnihil versus ilium; hincque superiora rursus petunt, tenuibus inte- stinis

stinis circumdata, & reflexa, per icoris caua feruntur, propè cystum fellis, vbi nonni-  
hil flauescunt. Inde à s dextris in sinistra sub inferiore ventriculi sede contendunt,  
& ad h lienem pertingunt, vbi flexus quosdam edunt, & hinc paulatim supra fini-  
strum renem peritonæo incumbencia ad os vsque i pubis delabuntur, vbi veluti vm-  
bilicum k adeuntia, introrsum flectuntur; ast ilicò in orbem acta remeant, & sacro  
ossi attenduntur, indeque ad anum vsque recta i deorsum excurrunt. Is est intesti-  
norum ductus, vlnas viginti mensurales longitudine superans. Duabus omnia ex-  
truuunt tunics, præter communem: tenuia verò cibum in se continent, vbi is à  
ventriculo prodit, ab ipsisque id omne seiungitur, quod in sanguinem vrinamue  
abiturum est; reliquum autem omne in fœces commutatum crassius excipitur. Vtra-  
que verò tres in partes dirimuntur, quarum prima à ventriculi fundo ad anfractum  
initium pertinet. Intestinum hoc veteres duodenum appellantur, quod duodecim  
digitorum longitudinem ferè non excedat; quæ semper nomine nobis vocabitur,  
quæstionibus cunctis posthabitis, à quibusdam inutiliter agitis, num duodenum  
an verò *ἔκδυσις*, hoc est processus, seu exortus dicendum veniat: Vocent ipsi, vt sa-  
tius visum fuerit, mihi duodenum semper appellabitur. In huius extremum u me-  
tus quidam vt dicemus à bilis folliculo profectus ingreditur. Secundum o intesti-  
num à primi termino emergit, illic vbi primùm in orbes, ac gyros conuoluitur, di-  
citurque vulgato nomine ieiunum, quod perpetuò ferè exinanitum occurrat, afflu-  
tis nimirum bilis acrimonia lacepsitum, quæ per foramen illud, quod ad duodeni fi-  
nem haberi prodidimus, in ipsum influens, vt promptius fœces extrudantur, efficit.  
Huic tertium adnectitur, omnium tenuissimum, ac propterea *ἰλεὸν* appellatum;  
est perobscurus est ipsum coitus, tum quod nulla diuisionis nota sese offerat,  
tum quod rarò aut nunquam ita inane duodenum occurrat, quin aliquid sæpè  
excrementorum contineat. Sic tamen ipse statuerem, vbi venæ, quas in mesente-  
rio hisce intestinis hærente haberi dicemus, crassiores esse incipiunt, intestina verò  
magis resecta, ieiunum definire, terue vero inchoare, quod flexuosum tãtis per pro-  
cedit, dum in crassorum intestinorum initium desinat. Quæ tripartita itidem exi-  
stunt; in Cœcum videlicet, Crassum cui nomen Colo, & rectum. P Cœcum non-  
nulli sacculum eum esse aiunt, quem coli efformat initium, (Cœcum nobis appel-  
latum) ac Cœcum propterea dici, quòd vno duntaxat donetur orificio. Alij parui-  
lum illud intestinum esse contendunt, sacculi huius extremo appendicis instar  
appensum, lumbrico simile, quod ita in homine occluditur, vt nullus in ipsum  
aditus fœcibus pateat, vnde Cœcum nuncuparunt, quæ etiam ratione secundum ac  
tertium ossis temporum foramen, cæcà quòd minimè transpareant appellantur.  
Alij verò per Cœcum intestinum sacculum vnà cum lumbrico intelligi volunt.  
Verùm h'ne, an illi rectius sentiant parum interest; integrum esto vnicuique quod-  
cunque videbitur nomen imponere, modò tamen nec historiam ipsius, nec suum  
ignoret, què in sub rene dextro, vt retulimus, versus exteriora propter peritonæum  
obtinet. Crassum intestinum longè omnium capacissimum, ideoque vt arbitror  
Colon hoc est venter græcis pariter ac latinis appellatur, ad facti vsque ossis ini-  
tium pertinet. Id minimè ad amussim teres, sed tum superius, tum inferius leuiter  
depressum est, ad latera verò in quasdam veluti cellulas totum adaptatur; est quò  
propius recto intestino accedit, eo minus in gyros conuoluitur, crassioresque ip-  
sius tunice redduntur. Porro interior tum huius, tum cæci tunica transuersus or-  
bicularibusque fibris, ipsdemque frequentissimis interitur: Coli autem exterior  
transuersas quidem paucas, rectas verò quàm plurimas adipiscitur, non quidem  
per omnem intestini ambitum protensas, sed supera duntaxat inferaque ipsius re-  
gione, quas paulò depressiores esse monuimus. Ad latera enim fibræ secundum  
intestini impressiones recta procedunt, robur ipsius insigniter inibi adaugentes;  
Quarum impressionem quælibet, duobus constringitur ligamentis, vtrinque  
singulis, desuper in inferna tendentibus. Intestinum rectum ab osse sacro in po-  
dicem porrigitur, teres ac leue, nullumque in orbem actum, vnde nomen ipsum

Intestinorum tu-  
nice.

Tenuium inte-  
stinorum diu-  
sio.  
Duodenum.

Ieiunium.

Tenue.

Ieiuni termi-  
nas.  
Crassa intesti-  
na.  
Cœcum.

Colon.

Rectum.

desumpfit. Duplici & ipsum tunica constituitur, quarum exterior rectis fibris frequentissimis, orbicularibus vero rarioribus intexitur. Tertia tunica, tum huius, tum duorum nuper commemoratorum, non secus, ac tenuium intestinorum tunica ex peritonæo enascitur, præter intestini coli partem, ventriculo attensam, quæ ab inferiore omenti membrana tertiam hanc asciscit tunicam, eiusque beneficio dorso deuincitur, perinde ac reliqua omnia intestina mesenterij interuentu dorso etiam colligantur. Sicque omnem intestinorum historiam enarrauimus.

*De Mesenterio: Cap. 5.*

Мәскәтәҗи си-  
тәт.

**I**D græci <sup>a</sup> μεσεντέριον, seu <sup>b</sup> μεσάραιον, hoc est medianum nuncupant, quod in <sup>c</sup> fig. x. z. intestinorum medio collocatum videatur. Alij animellas appellant, quod sit <sup>d</sup> fig. x. y. glandulis vsquequaque refertum. Mesenterium itaque ad posteriorem intestino-  
rum sedem locatum est, inter ipsa & dorsum: cuiusque interuentu intestina dorso  
alligantur, quod vt tutius præstaret, ex duabus mutuo <sup>e</sup> ead. PQ. <sup>f</sup> ead. RST. <sup>g</sup> ead. NN <sup>h</sup> O Q. <sup>i</sup> f. xi. xlm. <sup>j</sup> f. xi. x. PQ. <sup>k</sup> f. xi. g.  
natis <sup>a</sup> peritonæo membranibus constructum est, inter quas plurimæ glandulæ, mul-  
tisque adeps reponitur. Id autem non vnicum habet sui exortus principium, cum  
enim varius sit ipsius situs, parsque ipsius ad <sup>c</sup> dexteram, pars ad <sup>d</sup> leuam, alia ve-  
rò in <sup>e</sup> medio consistat, hæc postrema, cuius beneficio <sup>f</sup> ieiunum ac tenuæ intesti-  
num inuicem connectuntur, ex peritonæi membranibus exoritur, quibus <sup>g</sup> arteria  
magna, & vena caua, secundum suum per lumbos ductum conteguntur. Ex his  
nanque tunicis neruæ fibræ complures emergunt, quæ in duas ilico abeunt mem-  
branas, dexteræ quidem in dexteram, sinistræ autem in sinistram. Quæ rectum &  
Colon deuinciunt ex peritonæi membrana prodeunt, iuxta ipsius incessum. His  
enim in partibus, peritonæum fibras quasdam neruofas emittit, quæ in duas me-  
senterij membranas conuertuntur, inter quas, venarum articularumque gratia, quæ  
vti docebimus, inter vnâ alteramque membranâ diffunduntur, proles numero-  
sæ glandularum reponitur.

De Omento. Cap. 6. il Redano.

**Omengi jitus.**

**O** Mentum<sup>2</sup> anteriori peritonæi fedi subijcitur, & intestinis infidet, à liene, a f. iii. iii. iiii. iecorisque cauo, & ab vniuersa inferiori ventriculi fede ortum desumens. xxv.

**Figura.**

Hincque deorsum protenditur super intestina, quatuor, aut quinque digitos ferè infra umbilicum, interdum verò ad pubis usque os exporrectum: ac deinde refurgit intorsum reflexum, & veram cascidilis imaginem exhibens, infra supraque orbicularis. Omentum id inter superioremem membranam & intestina tantisper effertur, dum ad iccoris cauum cum ea intestini coli partem iungatur, quæ ventriculo adhæret. Vbi verò duplicatio hæc explicatur, quod in quibusdam evenit, eousque omentum protenditur, vt non solum ad vteri os, quemadmodum nonnulli prodiderunt, sed ad scrotum etiam pertingat, vt in herniosis quibusdam contingit. Est autem omentum ex duplici constans tunica, læui & fibris orbata, multisque glandulis conspersis referta, venisque ac arterijs vnicque implicita, sic iniunctis complicatis, vt retis speciem præ se ferat, vnde graeci *ἐνπλοον*, idest implexum appellarunt. Et quamvis ex vnica efformetur membrana, quia tamen ea duplicata est, ex duabus ipsum constare dicimus, quarum altera inferior scilicet ex peritonæo principium desumit, quæ magna arteria per septum fertur, & venæ cauæ adhærescit, ex membranulis ab ea peritonæi regione manantibus quæ à thoracis vertebres enascitur, & venam cauam, magnamque arteriam dorso alligantibus iuxta vndecimâ thoracis vertebram; hinc dextrorsum ad iccoris

**Substantia.**

**Optas,**

caua defertur, iecori nonnullis in locis adhærescens, eique diaphragmatis sedi, quæ costis affigitur, quamuis id rarius eueniat, nec ex eiusdem in cunctis costarum regione. A iecoris cauo ad dextrum ventriculi latus, cui etiam cohæret, & ad vniuersum duodenum intestinum contendit, cui ab exortu adusque ferè ieiunum connascitur; hincque in arcum effertur, imo ventriculo cohærescens, quousque ad lienis caua pertingat. Exterior membrana ex humiliori anteriori ventriculi sede secundum ipsius longitudinem à dextera in læuam oritur, & rectà in lienis concauum sese inferens, inferiori membranæ defigitur, quam in idem quoque cauum definere monuimus. Omentum id nullatenus intestinis adhæret, præterquam inferius, vbi coli regioni ventriculo accumbenti cohæret. Estque is ipsius vltus vt cuncta intestina obtegit, insitumque ipsis calorem tueatur ac foueat, nec non vt venarum arteriarumque propagines tutò excipiat, quæ vti dicemus, ad ventriculum, lienem, duodenum intestinum, & ad coli partem, cui pro mesenterio est, exporriguntur.

De Iecore.

Cap. 7.

Magna inter medicos ac philosophos fuit disceptatio, iecur ne, an cor principium sanguinis existat. Verum qui nutritionis sortus dum in vtero est & postquam in luce prodijt rationem, simulque iecoris ipsius, tum substantiam, tum colorem non oscitanter perpenderit is dubio procul ratum firmumque habebit, iecur nutritionis organorum facile princeps, sanguinis reliquas omnes corporis partes e-nutrientis esse officinam. Sed quia in venarum enarratione id explicatiùs prosequemur, nunc vti acceptum supponimus. <sup>a</sup> Est igitur iecur transuersum sub <sup>b</sup> septo

Iecur sanguinis principium.

Iecoris situs.

Figura.

a fl. ii. HH.  
fi.v. DD. fi.  
xi. x. fi. xix.  
B. fi. xxi. bb.  
fig. xxvi. L.  
li. vi. ta. v. fi.  
x. GG.  
b li. ii. t. vii. a.

c fl. xxi. bb.  
fig. xvii. AA  
BB.

d fig. xvii. C  
DE.  
e fl. xi. KI.  
f ead. PQ.

h fl. xis.

i ead. V. fig.  
xix. H. li. vi.  
t. v. fi. x. H.

k fl. xix. c.

l fl. ii. inter  
HH.

m ead. G.

transuerso à dextris in sinistra positum; quamuis tamen maior crassiorque ipsius pars sinistram regionem occupet; quæ ad sui vsque medium septo transuerso tota innititur; reliquum verò partem duntaxat ipsius anteriorem contingit. Vniuersum autem iecur, varijs hæret in partibus, multarum membranarum vi, quæ à peritonæo vt mox subiiciam, pronatæ, ipsum arcuè adeo diaphragmati deuinciunt, vt præterquam in angustis admodum pectoris hominibus, totum ferè sub mucronata pectoris cartilagine delitescat, sedem occupans vniuersam, à spurijs costis comprehensam. Iecoris forma proximis ipsi organis correspondet; ac proinde <sup>e</sup> elatiori sede, qua septo cauum constituentem figuram incumbit, gibbum est, læue & æquale, ac ipsi veluti consertum. In media verò huiusmodi parte sinus efformatur, vnde venæ caux <sup>d</sup> caudex à noxa immunis exoritur. <sup>e</sup> Inferiori sede, qua <sup>f</sup> ventriculo, quem antea rotundum & latum esse prodidimus, insidet, ita cauum efficitur, vt eum amplexari videatur; quamuis nec læue, nec æquale, vt eminentiori regione, occurrat, imo retiorum inferiori sede nonnihil duobus tuberculis prominet, in medio autem, quodam veluti sinu deprimitur, quæ venam portam reptare dicemus, iamque <sup>h</sup> duodenum intestinum meare tradidimus. In dextro etiam huiusce partis latere sinus efformatur, quo bilis <sup>i</sup> folliculus excipitur; alter item in læuo, per quem stomachus defertur, & septum traiciens, ventriculo iungitur. Quæ dextrum attingit laevis, quæ etiam ventriculi posteriora, crassius admodum est, ac rotundius, quæ vero in læuam pertinet, tenue, ac veluti in <sup>k</sup> apicem definens. Estque vniuersum longè ab extremis quàm in medio tenuius, ac potissimum sede anteriori: qua in parte rimas quasdam adipiscitur, perexiguas quidem illas, <sup>l</sup> vna demum excepta in huiusce partis medio, è regione mucronatæ cartilaginis modicè ad dexteram consistente, cui venam <sup>m</sup> vmbilicalem inferi audies. Neque verò humanum iecur villas præterea in partes diremptum occurrit, quamuis in brutis quatuor vt plurimum aut quinque subeat diuisiones. Summatim, nullam sibi iecur peculiarem figuram vendicat, quàm quæ à conterminis sibi partibus præscribitur. Quod ab re nequaquam effectum est, vt enim venarum multarum quæ per ipsum diffunduntur gratia ingens, crassumque ipsum esse oportuit, sic nulla ipsi tot inter membra reposito, propria opus fuit figura. fit autem maius minus ue, pro maiori minori ue



Substantia.

maiori minoriue hominum helluue. Substantia ipsius nihil est aliud, quam concretus sanguis, per quam innumera venarum genera disseminantur; Vniuersum vero tenui admodum membrana includitur, ex ligamentis enata, quæ ipsum peritonæo sub septo connectunt. Horum ligamentorum duo præcipua habentur, alterum durum & insigniter validum, sed membranæ instar tenue, quod <sup>a</sup> ad dexteram iuxta <sup>n</sup> <sup>fi. v. c.</sup> mucronatam pectoris cartilaginem consistere diximus; alterum perquam robustum, ac propè teres, ex peritonæo <sup>o</sup> pronatum, vbi sinistra iecoris pars in apicem definit, <sup>o</sup> <sup>fi. xi. o.</sup> quod inibi peritonæo ipsum deuincit. Peritonæo quoque alligatur vbi venæ cauæ caudex ex iecore prodit; omento item iuxta venæ portæ initium. Quinetiam anteriori peritonæi sedi, vmbilicalis venæ interuentu connectitur: imo verò venæ huius beneficio iecur vmbilico alligatum videtur, quæ in hominibus arefcit, & vinculi, tendinisue in modum induratur. Ex ligamentis hisce omnibus prædicta membrana enascitur, iecur vniuersum obuinciens, in quam duos neruorum ramos inferi docebimus. Ipsius partes quænam sint iam antea protuli, nullæ in quam aliæ, quàm vt sanguinem ex cibo procreet, quod vt melius præstaret, tot venis donatum fuit.

Munus.

## De Bilis folliculo. Cap. 8.

Cystis suis.

**D**E sanguinis officina egimus, nunc de instrumentis ipsum à recrementis quibusdam repurgantibus agendum est, initio à vesica bilem excipiente desumpto. <sup>a</sup> Quæ sedem eo in sinu obtinet, quem in medio dextræ partis caui iecoris, quæ dextrum ventriculi latus amplectitur, exculpi diximus; ex quo sinu medium corporis vesicæ nascitur, reliquum vnà cum ceruice è iecore prodians ad <sup>b</sup> venæ portæ initium pertingit; vbi in duos diducitur processus, quorum alter sursum effertur, & <sup>b</sup> <sup>fig. xi. h.</sup> anteriori venæ portæ, sedi innitens, in duas diffunditur <sup>c</sup> propagines, quarum altera <sup>c</sup> <sup>fi. xii. Y.</sup> dextrorsum altera sinistrorsum per iecur sparguntur, singulæ in alios complures furculos diremptæ, per iecoris parenchima, inter venæ portæ, & cauæ radices diffusos. Surculis hisce bilis à iecore in vesicam felleam defertur. <sup>d</sup> Alter processus deorsum <sup>d</sup> <sup>fi. xi. xii. c.</sup> porrigitur, inferiore omenti membrana suffultus, sicque obliquè in inferiora tendit ad usque duodeni <sup>e</sup> terminum. Processus hic depulsam ex vesicula bilem in intestina desert, quam semel emissam duæ intestini membranæ inuicem adductæ regurgitare non sinunt: Atque ita bilis ad intestina defertur, nunquam interim in ventriculo irruens, præterquam in biliosis quibusdà naturis, & ijs quos dira exercet fames. <sup>e</sup> <sup>fi. xii. d.</sup> Vesicula hæc oblonga est, in fundo rotunda, sensimque ac sensim ad usque ceruicem pyri modo angustata; constatque ex neruea tenuique membrana, sed densa & valida, quæ faciliè extenditur, subsidetque, prout maior minorue bilis copia in ea continetur: Triplex hæc adipiscitur fibrarum genus, rectas quidem intimas obtinet, quibus secundæ succedunt obliquæ, ijs tertie transuersæ. Huic tunicæ alia ex iecoris membrana exorta obtenditur, non toti quidem vesiculæ, sed eius duntaxat parti, quam extra iecur prominere scripsimus. Huius officium est sanguinem à bilioso excremento repurgare per meatum in iecur implantatum, illudque in intestina deducere; vnde in duodeni extremum maximo nostro commodo inseritur. bilis enim sua qua pollet acredine, & extergendi facultate, pituitam quæ inibi copiosa vt plurimum asseruatur ex ventriculo delapsa, diutius herere non finit; Et hac quoque ratione ut fæces ocys ab intestinis extrudantur efficit. Processus autem hic in nobis nullis ad ventriculi fundum perrepat, hique biliosum vomitum comitem habent perpetuum, vnde hos medici fydere infausto natos appellant.

Meatus bile ducentes educen-  
tesque.

Figura cystis.

Substantia.

Munus

## De Liene. Cap. 9.

Lienis situs.

**L**ien <sup>a</sup> parte sinistra positus est inter ventriculum & costas, parumper versus dorsum; & in longum à Diaphragmate ad spuriarum vsque costarum extremum potrigitur, haud vterius in inferiora procedens in ijs, quibus præter modum vastus non obgit; in latum verò à dorso ad costarum vsque cartilagine pertinet. Ipsius <sup>b</sup> figura

a fi. xix. 00  
P. fi. v. G.

b ff. viii.  
c. cad. D.  
d. cad. inter  
F & G.  
e. inter HH.  
f. BB.  
g. G.  
h. F.  
i. LL.

b figura conterminis respondet partibus; c pars enim superior septo contigua modicè prominet, d interna ventriculum contingens, leuiter depresso. In sui autem medio secundum longitudinem e linea inæqualiter extuberante insignitur, in quam f venę aliquot & arterię, vt suo loco dicemus, inferuntur. Sinistro latere, quæ d dorso defigitur, modicè cauius est; h dextro quæ propter costarum fertur cartilagineas, gibbus; i extrinsecus quæ costis innititur, leuiter quoque gibbus occurrit, & impressa feruat costarum, quibus accumbit vestigia. Est autem humanus lien quam brutorum crassior latiorque, sed breuior, ac propemodum tetragonus, duplo duntaxat longior quam latus: inferius in anteriora corporis protensus in obtusum definit angulum; superius in arcum veluti definit, nonnihil in medio depressus, adeo vt duos admodum obtusos efformet angulos, quorum superior inferiorem latitudine superat. Vniuersus porrò lien tam intus quam extra fuligineo & obscuro colore nigricat, k Substantia ipsius spongiosa est, nigra, & crassa, multæque per ipsam venarum, l et arteriarum propagines disseminatę visuntur. Tenui admodum membrana obducitur ex omenti membranis enata, quę in lineam in interno ipsius latere occurrentem inferuntur, ac dilatēcentes in eam commutantur; verum quia ex peritoneo omentum pronascitur, membranam qua splen includitur, ex peritoneo etiam procreari dicimus. Ventriculo & dorso lien omenti membranę interuentu nectitur; septo autem ac thoraci neruosis quibusdam ac tenuibus fibris, ex peritoneo vbi septum contigit enatis, colligatur; quamuis fibrę huiusmodi haud semper comperiantur. Interdum quoque lienis gibbum exteriori sinistri renis inuolucro multo adipe referto colligatur, præsertim cum lien reni accumbit. Lienis functio est, sanguinem à melancholico succo emundare.

Color.  
Substantia.

x i K.  
l li. vi. ca. iii.  
fi. i. aaa. t. v.  
fi. iii. H.

De Renibus. Cap. 10.

E Gimus de instrumentis sanguinem in iecore adhuc contentum repurgantibus, nunc ad ea sermonem transferre opere precium erit, quę venosum genus à recrementis in ipso consistentibus expurgant. Vnde illud scire expedit, vt suo loco docebitur, elaboratum in iecore sanguinem ilico in venas fluentem, per vniuersas corporis partes distribui; ex quo aliquam assumpti potus portionem ipsi commisceri oportuit, quę ipsum fluxilem magis reddens, vt proutius in venas quaslibet quantumuis exiles permeare posset, efficeret. Serum id vbi suo functum est munere, partim sudore soluitur, partim verò, eodem quo fluxerat tramite, venę caue caudicem repetit, vnde in vesicam elabitur, nõ exiguum adusti humoris in corpore geniti portionem secum deferens. Huius occasione renes procreati sunt, & sub iecore<sup>2</sup> positi, alter quidem ad dextram, alter verò ad leuam; quamuis rarò alter alteri è directo respondeat, & quemadmodum sinister ferè, nonnunquam verò dexter elatiorem sibi sedem vendicat, sic neuter vnquam alterius altitudinem quanta media est alterius longitudo, superat. Editior dextri pars iecori innititur, sinistri autem lienem nonnunquam subit, vt plurimum verò contingit; ambo autem interna sede dorso contigua demissiori diaphragmatis parti incumbunt, quæ id decimę, vndecimę ac duodecimę costę obducitur; vbi hæ retrorsum magis obliquantur; qua in parte ita delitescent, vt nullo ferè impedimento sint. Sunt hi æquè omni ex parte crassi, oblongi & angusti, antè ac ponè deprepsi, exterius orbiculares & gibbi, interius, vbi breuius sunt, introrsum curui. Superiori etiam parte latiores sunt quàm inferiore, ita ut phascoli imaginem ad amussim repræsentent, congruenti ad corpus magnitudine, externa facie læues, intensè rubentes, intus splendidi. Substantia constant carnosæ, densa & solida, nullo fibrarum genere, quemadmodum & iecur, & lien intertextæ; venarum nanque artiarumquę per ipsa diffusarum, tunicæ, attrahendi, retinendi, coquendi, expellendique munere perfunguntur. Neque verò in renibus meatus ille, nec sinus occurrunt, quos medici complures comminiscuntur; imò meatus illi alter quidem è vena caua, alter verò ab arteria magna procedentes, per quos serum à renibus alluci dicemus, simulatque in renem conferuntur, inuicem coeunt, vnum ambo

Renum situs.

Figura.

Substantia.

b ff. xix. a. b.  
fi. xxi. xxii. b.  
mn. ff. xxvi.  
TV.

*Interior renum  
substantia qua-  
lis.*

ambo corpus efformantes, crassa tunica, qualem arteriarum esse docebimus, præditum, & per omne renis corpus hunc in modum distributum. <sup>c</sup> In primis enim latescens in duas dirimitur partes, alteram quidem anteriorem, alteram verò posteriorem. Anterior modo sex, modo septem, interdum etiam plures ramos producit, in quos anterior quoque prædictæ tunicæ pars diducitur. Hi autem omnes per anteriorem, anterioremque renis partem distribuuntur, æquè inuicem abscedentes, & externum renis latera petentes; vbi in multas propagines rursus diffecti, cum ijs, qui per posteriorem anterioremque regionem eodem tramite deferuntur, coeunt, manifestam in medio cavitatem instar semicirculi constituentes. Membrana hæc haud vndecunque reni substantiæ adhærescit, priusquam enim in commemoratas digeratur propagines, anteriori posteriorique ac internæ renis parti connascitur, ab exteriori abscedens. Rami tamen adnatam semper habent renis substantiam, posteriores quidem posteriorem, anteriores verò anteriorem, quousque iterum commisceantur. Inter hos autem ramos quoddam veluti septum producit ramis minimè connatum, & ab illa renis substantia productum, quæ ramis, dum simul vniuntur, connascitur. Adeo ut inter vnam alteramque membranâ sinulus alter exurgat, in duos quoque diremptus. Quauis enim quæ exterius dictæ membranæ latus respicit, vbi hæc primum in ramos diffunditur, simplex esse videatur, quâ tamen ex renis substantia pronascitur extrorsum tendens, geminus conspicitur. Altera enim ipsius pars inter prædictum septum & ramorum anteriores, altera inter idem septum & posteriores ramos consistit. Sinus hic ut plurimum humidus & exanguis occurrit, ipsa vero membrana vnâ cū ramis, quæ primus renis sinus videri posset, sanguine referta semper conspicitur. Secundus sinus duriusculo adipe, ac seroso humore perfuso infarsus visitur, quem nonnulli colatorium illud esse arbitrati sunt, de quo multa complures effusiunt, auriti potius quam oculati auctores, nullum enim colatorium, nulli sinus præter commemoratos, in renibus habentur; serumque ad ipsos desert vena emulgens dicta, quæ ut suo loco dicemus, in medium interni renis latus inferitur, & ab externo nervosæ membranæ latere incipiens, vbi primum in ramos finditur, deinde per eius corporis medium procedens, ex renum medio, per internum renis latus procidit. Renibus duæ adsunt <sup>d</sup> membranæ tum substantia, tum ortu inter se

*Renum mem-  
brana.*

<sup>d</sup> fig. xix. T.  
fi. xxi. oopp.

diffidentes. Prior circumquaque renem contegit, à peritonæo quâ illi renes accum-  
bunt exorta, qua in parte fibras quasdam educit in membranâ hanc abeuntes. Tu-  
nica hæc frequentissimis venis, perinde ac omentum intertextitur, multa pinguedi-  
ne abundans, cuius beneficio renibus, quod perfectius suam obeant functionē, opi-  
tatur. Secunda renum tunica præteruis est, & icoris ac lienis tunicæ consimilis.

## De Vesica.

## Cap. II.

*Figura.*

**V**esica <sup>a</sup> inter pubis os & rectum intestinum posita est, ut in quouis animantium  
intueri licet. Estque figuræ ovalis, latior in fundo quam circa os, vbi in angu-  
stam ceruicem definit, longè in viris quam in mulieribus ampliorem, & tum vsu tū  
partibus ipsi adnatis dissimilem; quamvis enim id commune vtriusque accidat, ut  
vrina per eas excernatur, & musculus illis orbiculatim, uti diximus, circumducatur,  
in viris tamen glandosum præterea <sup>b</sup> corpus in quo elaboratum semen colligitur,  
adnatum habet, & in anteriorem pubis osis regionem contendit, vbi genitalis ra-  
dici <sup>c</sup> coalescit. Mulieres autem corpore huiusmodi destituuntur, imò verò ceruix  
ipsa <sup>d</sup> superiori vteri ceruicis regioni affigitur, & in pubis osis cavitatem pertinet,  
leuiter in superiora reflexa; Vesica hæc ex duabus nervosis tunicis extruitur, atque  
admodum aptis, quæ facillè subsideant, & extendantur, prout necessitas postulabat,  
id quidem ut humoris fieret capaciior, illud verò ut loci minus occuparet. Harum  
tunicarum prior densa est, levis, nervosa & valida, quæ nunc crassior, nunc tenuior  
visitur, prout contracta magis, vel distenta est, quauis tamen ceruicem & fundum  
versus, foraminum quorundam quæ inibi habentur occasione, crassior semper oc-  
currat. Triplici hæc fibrarum genere intextitur, ut eam instantibus conspicuè euadit.

*Prior vesicæ tu-  
nica.*

<sup>a</sup> fi. ii. iii. N.  
fig. v. g. fig.  
vi. L. fi. xi. o.  
fig. xix. p. fi.  
xxi. xxii. V.  
fig. xxv. T.  
hg. xxvi. β.  
li. ii. ta. xvi.  
fi. xvii. Q.  
<sup>b</sup> li. ii. t. xvi.  
fi. xviii. a.  
<sup>c</sup> ead. fi. xv.  
xvii. CC.  
<sup>d</sup> fig. xviii. g.  
fi. xxix. L.

Primæ

Primæ ac interiores rectæ sunt, exteriores transuersæ, mediæ obliquæ; rectis vrinam allicit, transuersis propellit, obliquis retinet, ex Galeni, & Vesalij sententia. Quantum verò id secum veritatis habeat, tunc explicare est animus, quum de vsu partium nostri corporis edisseram. Secunda est, quæ priorem extrâ circumsepit, <sup>Altera.</sup> quam peritonæum expromit, quâ vesicæ fundus anteriorque ipsius regio pubis ossibus accumbentes, peritonæo secus quam in brutis adhærescunt. Posterior vesicæ pars <sup>e f. xix. o. f. xxi.</sup> rectum intestinum, & in mulieribus <sup>f. xxvi. x. l.</sup> vterum contangens admodum leuis ac lubrica est, & seroso humore oblita. In humiliorem huiusce lateris partem duo <sup>g f. xix. o. f. xxi. xxii. qq.</sup> meatus instar venarum pertingunt, ex membrana paulo quàm venarum crassiore formati, obliquis tamen quibusdam fibris intertextis; qui meatus à posteriore renum sinu originem desumunt, & per medium prioris delati, nonnihil in priora descendunt super musculos lumborum vertebrarum corporibus defixos, peritonæo innixi à quo alteram assumunt membranam, qua toti circumtegentur. Hos medici <sup>h f. xxii. x.</sup> *ἐπὶ τῆς*, & *ὀφύς ἐπὶ τῆς* hoc est vrinarios meatus appellarunt, quòd vrinam à renibus in vesicam deferunt, & <sup>b</sup> inter duas membranas adacti, perinde ac bilis meatum in duodenum inseri docuimus, in tot aguntur anfractus, vt immixtæ vrinæ regressus minimè pateat. imò nec inflata etiam vesica, spiritus quicquàm per hoc meatus reddit, vt nec follis pugillatorius. Organorum nutritioni deferuentium historiam absoluiamus. Superest vt speciei conseruationi famulancia prosequamur.

De Virilibus Organis generationi deferuentibus.

Cap.

12.

**C**oncors est medicorum omnium & philosophorum sententia, viri semen præcipuas in foetus procreatione obtinere. Vtrum verò mulier semen profundat nec ne, & si profundit, an id pro materia subijciatur, viri autem semen esse ac figuram conferat, vt lacti coagulum cum caseus paratur, an verò ambo vnâ, quauis dispari ratione concurrant, adhuc sub iudicis est. Vt nec in eo conueniunt, quidnam sit semen ipsum, quaque in parte corporis elaboretur. Sed quia loci huius non est huiusmodi disceptatio, illud scire sufficiat, tam à muliere, quam à viro semen emitti: Cuius quidem rei pleræque mulieres hoc edocitæ fidem mihi fecerunt, estque id argumentum, quòd isdem, quibus & viri organis donantur, et si huiusmodi argumentum (nisi hoc mihi variæ mulieres ingenia fide asseruissent) pauci esset apud me ponderis; quandoquidem & viri etiam perinde ac mulieres mammas habent, nec ideo tamen lac proferunt, nec eas ipsis natura progenuit, quo eis foetus alerent. Rem igitur paulo altius à fundamentis eruens dico, quidquid alimentorum assumimus, antequam in corporis nostri substantiam conuertatur, <sup>Cœlio vt celebratur.</sup> conditionibus quatuor elaborari. Primum enim in <sup>a f. xli. PQR</sup> ventriculo coquitur, & in quipiam vnus substantiæ vertitur instar lactis candidum, quod *χυλός* græcis dicitur. Et aduerte, quidquid in ventriculum ingreditur, quamuis probum sit alimentum, haud eodem tempore vnuerfum, vt multi existimant, in chylum commutari. Neque verò ij audiendi sunt, qui nihil ex ventriculo prodire posse asserunt, priusquam cibus omnis coctus non sit, & in chylum conuersus. Secus enim in dies euentus ipse arguit, in ijs qui tenue quodpiam vinum præsertim copiosius ingerunt, nam paulò post pellucidæ aquæ tantundem ferè per vrinam eiciunt, quæ aliud nihil est, quam serosa illius vini portio, cum tamen interim vel decem etiam post horas, ventriculus nondum sæpenumero cibum concoxit. Idem quoque in ijs obseruatur, qui symsimbrio, asparagis, alijsve vescuntur, si post semihoram meiant, vrina cuiuslibet assumptorum odorem manifestè reddit; quod fieri nequaquam posset, si quælibet ingestis cibi portio in ventriculo etiamnum consisteret. Haud secus quoque pueros videmus nunquam ab edendo desistere, quod si nihil ex ventriculo ante absolutam cibi in chylum conuersionem elaboratur, aut ventriculum ciborum copia disrumpi, aut cruda semper deijci oporteret, info-

insolens id quidem & rarum; imò huiusmodi ciborum gurgites, patentesque voragines, & feliciori valetudine uti, & firmioribus esse viribus animaduertimus. Quod etiam muliones edocti, ubi mulos defatigari nollunt, fenum ipsis ori subin. de suggerunt. Cibus ergo in ventriculum ingessus, si quidem is est, cui excipiendo ventriculus citra noxam sit satis, vniuersus non simul & semel, sed successiue concoquitur. Ac primum quod mollius, tum quod durius est conficitur, & illius quidem prius quod calidum est & humidum, quam reliquum. Quod autem confectum est, quidquid demum id sit, protinus è ventriculo egreditur, ante absolutam eius quod superest coctionem; minimè autem pylorus ipsi egressum præber, sed ora quædam venarum mesenterij, quæ in humiliorem fundi ventriculi regionem inferuntur. Adeo ut iecur ex ventriculo paleis veluti quibusdam tenuior-<sup>b f. ix. MM N.</sup>em chyli portionem exfugere videatur. Ac proinde quamuis vniuersum quis cibum euomat, non ideo tamen nutriri corpus desinit, viuitque in multos annos sanum valensque, quod in p̄multis visum est. Quod crassioris cibi relinquitur, vniuersum per inferius ventriculi orificium, in tenuia<sup>c f. ix. EEE f. xi.</sup> intestina delabatur, ubi moræ tantundem paulò plus minusve, ac in ventriculo, trahit, vltiori em elaborationem adipiscens. Quod summa providentia, ut cætera omnia, summus rerum opifex instituit, quò scilicet in alimenti penuria iecur per easdem mesenterij venas, quid vtilis chyli superest in se capiat, primis veluti vindemijs relicta colligens. Hæc ita se habent, ubi tantum duntaxat alimentorum sumitur, quantum innoxie ventriculus capere possit; quòd si plura quam par sit congerantur, id solum quod sibi opus est hepar prolicat, reliquum ventriculus extrudit, & deteriora deinceps expellens, meliora complectitur; quemadmodum in vasis euenire cernimus, herbam, arboremve implantatam habentibus, quæ licet, plusquam par sit irrigemus, nunquam tamen plus aquæ combibunt, quam ipsis ex usu sit; quòd superest per foramina, quibus ad latera, siue in fundo peruia sunt, elabi sinunt, iecur itaque in eum quem diximus modum, vtiliorem, serosioresque chyli portionem ex ventriculo ad se allicit, reliquum per pyloron elabitur, & moram in intestinis tenuibus, eo quem nuper diximus modo, trahit. Vbi ad iecur chylus permanuit, in sanguinem commutatur, ibique à bile vtraque, & à serositate repurgatus, in venas omnes distribuitur, & exsuctus à venis in membra excidit, in exigua quædam se abdens spatia, seu poros, per vniuersum corpus huius occasione paratos. Sanguis autem è venis manas, in liquorem instar roris vertitur, eum scilicet, quem dum pars quæpiam corporis deglubitur, digitis exprimimus. Ex huiusmodi rore alius liquor efficitur, qui membra nutrit, iam ferè in corporis substantiam conuersus, & Cambium propterea nuncupatus. Ex hoc liquore, quod partibus superest, non feculentum quidem, sed optimum, semen efficitur, quod retrorsum per eandem viam, qua sanguis, & ros in poros deueniant, <sup>d f. xxi. g. e. f. xxvi. Y Z</sup>venam cauam repetit: ex qua <sup>f. f. xix. e. fig. xxi. xxii. qqq</sup>infra<sup>e</sup> renes per <sup>f.</sup>venas quasdam, quas inibi suo loco haberi docebimus, excidit, & ad testes defertur, ubi album euadit, ea quam diximus ratione, quòd membrum vnumquodque, id quòd continet sibi simile in colore reddit. Testium situs nulli non est conspicuus, pendentque extra corpus, tum caloris feminis remittendi gratia, tum ut ipsius vasa tenta detineant, suntque ut plurimum gemini, vnde græcis *διδυμοι* hoc est gemelli dicti sunt, quamuis non desint, qui vnicum duntaxat, & qui ternos etiam gerant, in quibus ferè subest deceptio; quòd tuberculum in seroto reconditum testem ementiatur. Sunt & hi rotundi, longiores <sup>g f. xxi. iiii.</sup>paulò quàm lari, profundiusve, & superiori sede quàm inferiori acutiore, non adeo tamen ut oua æmulentur, quemadmodum cæterorum animantium testes. Externa facie leues sunt, & æquales, interius instar lactis albescentes, & æque omni ex parte molles, nisi quòd venarum quarundam furculis frequentibus insigniuntur, vnde fit ut spongiosi non nihil appareant. Pluribus includuntur tunicis membranisue, alijs quidem vtrique testis communibus, alijs verò priuatim singulos inuoluentibus. Membrana enim carnosa, & cutis ambo testes, simulque seminaria vasa, perinde ac reliquas omnes totius corporis partes in-

*Phuocato quo  
inadixenti ex per  
per decem die  
tri vomit in quo  
vniuersum ab om  
gerabat, & vomit  
tri vomit & valens*

*Seminis mate-  
ria.*

*Testium situs.*

*Substantia, &  
figura.*

*Dus commu-  
nas tunicae.*

uestiunt, binas membranas tunicasque singulis constituentes, quarum <sup>b</sup> exterior  
<sup>h</sup> *fi. xix. t. s.* cutis est, quæ inibi tenuior, quàm in alia corporis parte occurrit, at venis ma-  
<sup>i</sup> *cadu.* gis intertexa. <sup>i</sup> Altera quam membrana carnosâ procreat, huic immediate subten-  
<sup>x</sup> *lib. ii. c. lvi.* ditur, nullo prorsus adipe interiacente. Peculiares testium membranæ binæ quo-  
& exterior testem & seminis vasa ad eam usque sedem integit, qua peritonæum  
traiciunt, supra pubis os. Membrana hæc insigniter valida est, at tenuis, & ve-  
nis referta; & exiua facie, membranæ carnosæ nervosis quibusdam fibris com-  
mittitur, usque adeo frequentibus, vt in aliquibus novam quandam tunicam ef-  
formare videantur, præsertim verò herniosis, aut scrotum aqua refertum haben-  
tibus, in quibus membrana hæc ex hisce fibris producta, aquæ plena visitur. Prior  
hæc tunica sociæ suæ alterum inuoluenti testem, nervosis quibusdam fibris adiungi-  
tur, ideoque externa superficiei, quæ inuicem copulantur, paulò asperiores occur-  
runt. Interna verò facie, læues sunt ac lubricæ, nec vllò penitus corpori connatæ,  
præterquam elatiori sua sede, quæ exoriuntur, vbi peritonæo iunguntur, & humi-  
liori etiam sede, vbi humillimæ testis parti validè cohærescunt. Quinetiam mem-  
brana hæc tenuissimæ membranæ interuentu, posteriori anteriorique sui parte se-  
cundum longitudinem, membranæ adnascitur, quæ à peritonæo educita, seminis  
<sup>f</sup> *fi. xxi. v.* ductus inuoluit: fitque hac in parte paululum carnosâ, in <sup>l</sup> musculum quendam ru-  
bescentem, vt suo loco notauimus, degenerans, vnde vnuerfam tunicam græci  
*ἐνδοσπέρδιον*, hoc est rubeam appellarunt; siue autem ob exitum venarum copiam,  
quæ tunicam peruadentes, ruborem ipsi conciliant, siue alia de causa, parum inter-  
<sup>m</sup> *fi. xxi. f. fi.* rest nominis rationem intelligere, modò res ipsa non ignoretur. <sup>m</sup> Secunda pecu-  
<sup>xxiii. D.</sup> liaris tunica testem duntaxat inuoluit, estque densa, valida, & crassa, quò testium  
substantiam mollem ac flaccidam contineat. Hunc pariter in vsum præfens mem-  
brana commodat, vt ipsius medio, reliquæ testi committantur; ideoque vbi cæte-  
ræ huic adnascuntur, tenuior laxiorque quam alibi spectatur. Elatiori præterea tu-  
nica huius parti seminis ductus associantur, qui ramulos complures, tunicam hanc  
perforantes, vt prolixius suo loco enarrabimus, in testiculi substantiam emittunt.  
Cæterum per reliquam ipsius superficiem exteriorem, læuis admodum est, & aqueo  
humore perfusa, nullique parti connexa: interna vero facie testis substantiæ vnde-  
cunque connascitur; ideoque ipsam græci *ἐνδοσπέρδιον* quæsi supergeminalem dic-  
cas appellarunt; nec quidquam moror quid plerique tunicæ huius ignari senserint,  
veteres per *ἐνδοσπέρδιον*, aliud quid voluisse intelligere, nugæ hac de re multas  
comminiscentes. Dicta est etiam veteribus *δ'απρός*, hoc est, quæ faciliè deglubitur.  
Hactenus igitur quæcunque ad virilia generationis instrumenta pertinent, recen-  
suimus; ordini nostro nunc consequens esset, vt seminis ductus prosequeremur,  
sed quia de omnibus corporis instrumentis prius agere est animus, suum eos in lo-  
cum reijciam.

De Genitali.

(Cap. 13.

**C**Erucis vesicæ cum genitali connexum superius edocuimus. Cuius quidem ge-  
nitalis tum nomen, tum situm & munus, equè ac nos ipsi scire vnusquisque po-  
<sup>a</sup> *li. ii. ta. xvi.* test; ex quibus verò conflatum sit, minimè omnes norunt. Sciendum est igitur <sup>a</sup> pe-  
<sup>fi. xvi. AB.</sup> nem ex duobus spongiosis extrui corporibus, à cæteris omnibus totius corporis par-  
tibus, præterquam ab vteri ceruice, admodum varijs, qua cum similitudinè aliquid  
obtinent. Corpora enim hæc spiritibus repleta turgescunt, atque tenduntur, ijs-  
demque euanescentibus, denuo flaccescunt conciduntque, quod nulli præterea  
corporis partium contingit. Sunt autem corpora hæc non venæ, non arteriæ, non  
nerui, quandoquidem nec ab hepate, nec à corde, nec à cerebri ipsis origo est, ex  
quibus veluti à principijs commemoratarum partium quamlibet necessariò pende-  
re docebimus. Neque etiam tendines dici possunt, quia nullius musculi extrema  
sunt; neque ossa, vt in canibus, cum flexionem facile patiantur; neque vincula,  
quoniam

Genitale ex  
quibus extrui-  
tur.

Genitale quid.



quoniam intus spongiosa sunt, exactissimo sensu pollent, ex molli constant substantia, & nigro sanguine referta sūt. Ex duobus hisce corporibus; ex meatu semen & urinā deducente; ex quatuor musculis, quos ad penis radicem haberi secundo libro retulimus; ex numerosis venarū, arteriarum, neruorumque propaginibus; ex membrana carnosa; & demum ex cute genitale componitur. Ipsius <sup>b</sup> corpora, ferè teretia, ex anteriori, demissiorique pubis ossium regione ad lineę ipsa committentis latera originem desumunt; ac inuicem accumbentia interna sede procedunt, perinde ac si quis vtriusque manus indices mutuo adducat. corpora enim hæc interna sede, quā inuicem iunguntur, plana sunt, externis autem lateribus teretia. Inferiori parte inuicem abscedunt, urinario meatui cedentia, qui ex collo vesicę prodit, vbi penis corpora inuicem committi diximus, eo transacto spatio, quod anum ac testes interiacet, Torriglio Hispanis appellatum; & sub genitili inter duo corpora, ad glandem vsque porrigitur, vbi substantiam ipsius ingrediens, foramen efformat, quod urinę præbet egressum. Vtrunque hoc corpus seorsum oblongum est, & ex neruea contextum substantia, & iuncto perquam simile. Exterius enim rubet, instar nerui durum; intrinsecus verò <sup>c</sup> nigricat, fungosum, nigroque sanguine refertum; non aliter ac si quis innumeros venarum furculos in retis imaginem complacset, & corio dein inclussisset. Atque duo hæc corpora, neruosa quædam obtinent & tenuia ligamenta, quę anteriorem ipsoꝝ partem cartilagini colligat, pubis ossa committenti, vbi primum cute induuntur; ac dein eandem semper figuram seruantia, ad finem vsque perreptant, vbi paululum acuuntur, & glandem efformant, per cuius medium urinaris fertur meatus; qui sub pene vti diximus, inter corpora reptans, in <sup>d</sup> glandem pergit; ibique amplior multo efficitur, & rursus suo fine arctatur, in sui medio ductus veluti <sup>e</sup> conceptaculum constituens, in quo semen in exitu moram trahit, maiorem pariens delectationem. Ac proinde inuoluntario seminis fluxu, aut urinæ ardore laborantes, & ij quibus pituita per penem expurgatur, maiorem hac in parte, quam in aliarum vlla ardorem perferunt, quod pars hæc promptius quam alia meatus pars exulceretur, præterquam in medio <sup>f</sup> perineo, vbi primum meatus reflectitur, inibi enim qui eiusmodi fluxu tentantur, graui ardore afficiuntur, cum genitale ipsis erigitur, ob meatus scilicet reflexum, qui hac in parte efficitur. Cum enim ea declinior sit, quam reliquum meatus, effluens semē inibi detinetur, & corruptum ita interdum partē corrodit, vt si in excessum quempiam incurrunt, magna sanguinis vis ex vena isthinc percurrente profundatur. Corpora hæc duabus integuntur tunicis, altera ex <sup>g</sup> membrana carnosa, altera ex <sup>h</sup> cute pronata; illa penis corpora cuti committit, nullo prorsus interiecto adipe. Explicandę superfunt venę, arterię, ac nerui, genitale adeuntes, de quibus suo loco verba faciemus; musculos enim secundus liber enarrauit.

b li.ii.ta.iii.  
iuxta p.tra. b.  
xvi. fig. xv.  
xvii. cc.

c li.ii.ta.xvi.  
fi. xviii. iuxta V.

d ead. fi. xvi.  
xvii. D.  
e ead. fi. xviii.  
G.

f ead. fi. xiii.  
inter H & I.

g fi. xix. t.  
h ead. fi.

### De Utero, reliquisq; muliebribus generationi famulantibus organis.

(Cap. 14.)

Vteros <sup>a</sup> secundum longitudinem inter editiorem <sup>b</sup> sacri ossis regionem, & muliebri pudendum collocatur; secundum verò profunditatem; inter <sup>c</sup> vesicam & rectum <sup>d</sup> intestinum positus est; & in Ceruicem ferè, ac fundum seu corpus vt rectius dicam, distinguitur. <sup>e</sup> Ceruix à pudendo sub cartilagine pubis ossa connectente incipit, & rectā sursum recto intestino accumbens procedit, donec ē directo sublimioris <sup>f</sup> pubis ossium sedis pertingat, vnde rectorum abdominis <sup>g</sup> musculorum pendet exortus; ibique vteri <sup>h</sup> corpus incipit. Quod vmbilicum versus conscendit & ad ilia porrigitur magis minusue, prout maius minusue ipsum est, incerto prorsus situ, præterquam quod in his, quę vtero non gerunt, subter peritonęi anteriora proximè occurrit, elatius à pubis ossibus, sacro interim osse nunquam superato; neque ceruix & corpus alij vsquam quàm recto intestino innituntur. Anteriori ceruicis parti <sup>i</sup> uesica incumbit, nullo interiacente, præterquam in aliquibus, in quibus i omentum minimè conuoluitur, tunc enim postrema omenti sedes inter vterum ac vesicam

a figu. xxv.  
xxvi.

b li. i. t. i. M.  
c fi. xxvi. b.

d ead. m.  
e ead. ab f

f ad pudendi os.

g lib. i. ta. i. ii.  
iii. p.

h li. ii. ta. v. d.  
fi. xxviii. o.

i fi. xxvi. b.

Vrinarius musculus.

Genitalis tunica.

Vesicifusus.

Vteri ceruix.

Corpus.

vesicam pertingit, & in vtero gerentibus vnuerfum vteri corpus integit, paulò etiam vterius porrectum. Vterus nanque laxis adeo vinculis obstringitur, vt læui negotio sursum deorsumque agatur, prout ceruix ipsius magis minusve producit, siue contrahitur, quod vteri situm per quam varium efficit. At naturalem ipsius situm intelligo, ceruice instar qualcarij rugosa persistente, qualis vt plurimum perstat, si nulla vi extendatur. In ætate autem prouectionibus, laxa vsque adeo sunt corporis vteri ligamenta, ceruixque adeo contracta, vt vteri <sup>k</sup> os adusque ferè pudendum procidat. Porro latera ceruicis fundique vteri <sup>l</sup> membranis adhærent, quibus alligantur, nec non vasīs ipsa adeuntibus. Hunc igitur in modum se habet non prægnantium vteri situs, in quibus eandem ferè nunquam seruat magnitudinem, sed ijs maior, illis minor est, quamuis virginibus minor semper, quam desolatis existat. In vtero autem gerentibus, inter omentum ac te-

Vteri situs in prægnantibus.

m fi. xxx. l.

a cad.  
o cad. O.

p l. xxy. T.

q fi. xxv. abi  
ad K.  
s cad. l.

s fi. xxix. AA  
BB.

t cad. C. D.  
u cad. à G  
versus IEE.

x cad. adla-  
tera F.  
y cad. F.

nuia <sup>m</sup> intestina ad vmbilicum vsque ascendit, in latera multo magis exporrectus, potissimum vbi pariendi tempus instat, ideoque in hīs vteri os multò altius consistit, ceruix verò tensa, & angusta magis. Neque in his, vt in non prægnantibus, mediam corporis regionem vterus occupat, sed ad læuam, vel ad dextram nunc magis, nunc minus vergit. Quod nequaquam indicio est, vt quidam existimant, masne an foemina potius in vtero geratur, cum vtrobique indifferenter vtterque gignatur, etsi mas vt plurimum dextro latere, foemina verò sinistro geritur, Vteri figura in <sup>n</sup> grauidis ingenti vesicæ perquam similis est, corpore siquidem vastus est, <sup>o</sup> ceruice autem corporis respectu perexiguus, secus quam in non prægnantibus, in quibus ceruix admodum ampla est, corpus verò paruulum, nec ceruice latius, præterquam quòd in non prægnantibus, vteri corpus haud rectè vesicæ assimilaueris; Vesica enim magis ouata est, vterus verò antè ac postè depressus; vesica elatiori sede ad amussim ferè orbicularis est, & quā meatus yrinæ à foetu per vmbilicum deducens ipsi iungitur, non nihil prominet, quasi P apicem efformans; vteri autem corpus inibi, in arcum veluti colligitur, instar crescentis Lunæ, ac obtusum vtrinque <sup>q</sup> angulum constituit, à quibus sensim, ac sensim vterus ad <sup>r</sup> ceruicem vsque deorsum fertur, vbi duplo angustior quam in fundo redditur, Corpusque vnuerfum æquè ferè latum est ac longum, vnde nonnulli corpus vteri quadrilaterum esse prodiderunt. Corpus id vnuerfum, præterquam à lateribus, vbi feminis ductus cum alijs quibusdam membranis adnatos habet, externa facie humidum est, læue, æquale, ac subrubrum. Haud secus quoque madida, & læuis est vteri ceruix anteriori posteriorique sui sede, ab initio adusque medium ferè suæ longitudinis, magis tamen quam vteri corpus albicat. Reliqua externa vteri superficies partium ei adiacentium occasione aspera, & inæqualis occurrit. Inter-

Figura.

Exterior vteri facies.

Interior.

Diuisio.

Cervix.

Anat. V. al.

R

prædicti

prædicti sinus comprimantur, feminis aliquid in aliquibus refudat, & in his, quæ inuoluntario feminis fluxu laborant, manifestò ipsius ingressus visitur, quòd meatus magis relaxentur. Præter id, nec vena, nec sinus, nec quidpiam aliud occurrit, quamuis aliter non pauci sentiant; præterquam quod in prægnantibus, & ijs quæ recens pepererunt, posterius intra matricis corpus exigui quidam<sup>z</sup> sinus conspiciuntur, quanti excipiendæ lenti satis essent, quos græci *κοτυληδῶνας* latini acetabula<sup>a</sup>, hoc est alueos, siue sinus rotundos appellantur, in quos<sup>a</sup> tubera quædam inferuntur in posteriori secundarum regione conspicua; ac eorum medio corporis vteri lateribus adhærescunt, & in partu euelluntur. Neque vero aliud præterea in vtero, huiusmodi nomine appellandum venit, vt inertes plerique veritatis indagandæ laborem euitantes, sibi persuaferunt. Vteri<sup>b</sup> substantia neruosa est, crassa, albicans, & modicè carnosæ, talisque vbique visitur, præterquam quòd iuxta<sup>c</sup> os densior paulo, & rugosior occurrit; exteriori facie<sup>d</sup> venas aliquot adipiscitur, vt suo loco dicemus, inter duas ipsius tunicas excurrentes, exteriorem scilicet alteram admodum validam crassamque à peritonæo enatam ex<sup>e</sup> membranis, quæ vasa vterum adeuntia continent, vterumque peritonæo colligant, quæ duo sunt processus duarum membranarum instar, vespertilionum alis similium, inter quas multæ venarum propagines copioso adipe oblectæ perreptant. Duo hæ membranæ à peritonæo vtrinque procedunt, & ceruicis, ac fundi vteri lateribus inuicem iunguntur, exteriorem ipsius membranam efformantes, ea longè crassiorum, quam intestinis mesenterium porrigit; hæc enim vtrinque gemina est, illa verò simplex, ac præterea hæc rugosior est. Interior tunica, quæ propria est vteri substantia in non prægnantibus, omnes totius corporis membranas crassitie superat, nihilque sibi peculiare vendicat præter exiguum collem quem per ipsius medium porrigi diximus. Tunica huius substantia frequentissimis quibusdam fibris intexitur, & capillaribus quibusdam venis per ipsam distributis, quas hæcenus in nulla vterum non gerente, intumescences, vt quidam aiunt, conspexi, quamuis etiam fluentibus mensibus obijisset, vt Pisis obseruauimus anno MDXLV. in muliere quadam quæ filium suum Florentiæ necauerat, quamque ob id Dux Cosmus Medicus dissectioni condemnauerat. Fibræ quibus vterus intexitur trium sunt generum, interiores quidem rectæ, exteriores transuersæ, siue orbiculares, mediæ obliquæ. Harum beneficio vterus suis fungitur officijs, vt de ventriculo retulimus, quæ in prægnantibus euidentius sese offerunt, ob vteri scilicet extensionem, membranarumque tenuitatem. Vteri ceruix vbi contracta est, tota rugis plena occurrit; vbi verò extenditur, læuis & vndeque lubrica, præterquam iuxta pudendum, vbi præter nonnullos implexus, carunculas quasdam adipiscitur; haud æquè in omnibus prominulas. Hæ sunt illæ Poetis decantatæ Nymphæ, quas per nemora errantes à Satyris amari fingebant. Iuxta etiam colli vesicæ insertionem subaspera occurrit vteri ceruix, vbi tenuis vteri ceruicis portiuncula vtrinque excrefcit in ipsius cavitatem propendens, & membraneis illis processibus perquam similis, quos in duodeno intestino ad meatus bilem deducentis extremum haberi monuimus: hæ verò carunculæ vrinam siue aliud quiduis ab vteri ceruice in vesicæ collum regurgitare prohibent. Reliquum ceruicis huius ad os vsque vteri eandem seruat amplitudinem; estque ipsius substantia inter carnosam, ac nerueam media, & spongiosa, corporum ferè genitalis modo, ac proinde muliere in libidinem concita paululum extumescit, præsertimque carunculæ illæ, seu nymphæ quas ad pudendum consistere diximus, quæ tanquam penem amplexuræ arctantur, & quantum semini excipiendo satis est ceruix, dirigitur. Porro vt in puellis Ceruix admodum leuis mollisque est, sic defloratis præsertimque his quæ venere frequentiore vtuntur, assiduo attritu, & collisione, in calum veluti obdurefcit, eoque magis si exsiccatia adhibeant lauacra. Vtrisque autem venæ in ceruice conspectiores quam in corpore sese offerunt, præterquam in vtero gerentibus, in quibus multò euidentiores in corpore occurrunt; Ceruicis huius extremo continuum est vteri s os, & extrorsum nonnihil prominet,

z f. xxxi. EE

a f. xxxii. II.

b figu. xxix: EEE.

c ead. C.C.D. d f. xxvi.

e f. xxv. R.S. figu. xxvii. LEE.

f f. xxix. EE EE.

g fig. xxvii. cD.

in ro.

Vteri substantia.

Interior vteri tunica.

Tunica huius fibra.

Interior vteri ceruicis constitio.

Nymphæ.

Cervicis substantia.

in rotundum latum ac modicè depressum mucronem definens; in sui autem medio transuersa scissura diffinditur, ita vt barbioris imaginem appositè referat.

*Vteri oris figura.*

Os id ad ceruicis etiam contractionem, extensionem ve prorsus immotum perstat, nec ipse mucro ceruicis latera vsquam contingit; in grauidis verò ita occluditur, vt nihil omnino admittat. Quòd si quis mihi obijciat, hoc ita se habente, & muliere, vt retulimus, non minus viro semen emittente, necessum fore, semen in prægnantibus eiactum intra vterum detentum iri, quod citra grauem, tum mulieris, tum foetus noxam esse nequaquam posset. Respondeo, venas, siue meatus à testibus in vterum tendentes, aliquot etiam furculos in ipsius ceruicem emittere, per quos prægnantes, ac puellæ stato mensium tempore purgantur, ac per eosdem etiam, semen in vterum minimè ingrediens, excerni potest. Quod autem nonnulli prægnantem concipere posse ajunt, ridiculum apud me est. Nec vim habet vllam, quæ illos in hanc sententiam ratio deduxit, quòd scilicet prægnantem intueantur semel enixam, post mensem vnum, vel alterum iterum, atque iterum parere. Vt enim ex vno grano, siue altero quouis semine, spicæ plures enascuntur, nec eodem tamen omnes tempore maturescunt, sic etiam ex hominis semine multos fetus gigni, ac diuersis temporibus in lucem prodire contingit, fertilior namque seminis portio vniuersum ferè alimentum in se arripit, nec alias finit excrecere, sique ex ea procreatus fetus primum perficitur editurque; aliæ verò nondum perfectionem consequutæ, intus remanent, & quæ inter ipsas vegetior est, illud quo indiget alimentum assumit, dum probè maturuerit, ac postea emergit; idemque deinceps de reliquis euenit. Siquidem præscriptum re vera non est, ac definitum. scilicet primo nono ve, aut decimo mense pariendi tempus, sed eo duntaxat tempore quo absolutus fetus in eam corpois molem assurrexit, cui matrem amplius alimentum minimè sufficiat, nec locus in quo quiescit ei capiendæ satis, nec aer per arterias ad eam refrigerandam delatus, calori ipsius ventilando idoneus amplius existat, quod ferè post nonum, vel decimum mensem contingere solet. Hac de causa fetus in vtero veluti oppressus, ita sese volutare incipit, vt membranas quibus includitur discerpens, & secundas euellens prodeat, domicilij, alimenti, & spiritus cupidus amplioris.

*Vtero gerens nequis concipere.*

Sed ad vteri os vt redeam, in prægnantibus, ita occluditur, vt ne specillum quidem admittat; & ad ipsius medium alba quædam & lenta viscosa materia, quæ ipsius occlusioni non parum opitulatur. Non prægnantibus, vt plurimum quoque conuiuet, sed vsque adeo leniter, vt nullo prorsus negotio sanis diducatur, cum semen excipiunt, aut cum in pollutione suum met semen emittunt. Sicque os id naturali vi, nullo autem pacto ex mulieris arbitratu ardetur atque dehiscit, vt nullus inibi existens musculus attestatur.

*Os uteri in prægnantibus conuiuet.*

## De Mulierum testibus.

Cap. 15.

Præfens equidem caput citra existimationis meæ iacturam dimitti posse maluissimè, ne scilicet mulierum genus superbius efferretur, intelligens sibi etiam perinde ac viris datos esse testes, ac non solum se fetus intra suum corpus alendi onus perferre, quemadmodum & aliud quoduis intra terram semen enutritur, verum etiam suam se quoque partem non minus quam viros conferre, quandoquidem nec sibi instrumenta desunt, in quibus ea elaboratur; ipsa tamen historia coactus secus facere non potui. Dico igitur mulieres perinde, ac viros testibus suis donari, quamuis intra corpus reconditi non occurrant, vti quidem oportuit, nimirum intra se ipsas concepturis, vnde reliqua etiam omnia mulierum instrumenta ad generationem requisita intra corpus fuere reposita. Mulierum itaque testes corporis vteri lateribus accubunt, non nihil ipso elatiores, quamuis in prægnantibus minus accliuës videantur, quia superius in ipsius vteri corpus cõfistit. Hærentq; laxè admodum peritonæo, quæ illum ossa sacro committuntur, feminalium vasorum beneficio,

a figu. xxv.  
xxvi. xxvii  
N. r. F.

*Mulierum testiculorum figura.*

Magnitudo & figura.

citra ligamenti alicuius interuentū. Sunt hi marium testiculis longē minores, forma verō longiores paulō, antē ac ponē leuiter depressi, lateribus rotūdi, extrinsecus inēquales & ex pluribus veluti glandulis simul coagmentatis conflati. Interior ipsorum substantia, minimē vt virilium testium aequalis, minimē mollis, sed dura est, & glandularum, substantiā similis, quā in mesenterio interiorique omenti membrana conspiciuntur; estque tota sinibus quibusdam prædita, præter sedem, quam venæ aliquot & arteriæ occupant; qui sinus nec eandem omnes magnitudinem, vt nec seriem numerum ue seruant, sed in omnibus aqueus quidam humor consistit, qui testiculis manu compressis magno impetu, veluti ex disrupta vesica, exilit. Vnica eos neruea membrana inuestit, vnde quaque ipsi circumdata, eorumque substantiā firmiter adeo connata, vt difficili negotio diuelli possit, estque substantiā ipsorum nonnihil similis, & tertia virilium testium tunica, cui functione assimilatur, longē tenerior ac mollior. Nullam præterea membranam testiculi muliebres obtinere, præterquam quod peritonæi processus, quos vteri lateribus alligari, & vesperitilionum alis consimiles esse monuimus, superius ipsos integunt. In hos testiculos feminis meatus applantantur, vt suo loco docebimus.

Membrana.

### De fœtu, & secundinis. Cap. 16.

Seminis historia.

Vmbilicus vt efformetur & quot ex vasis.

**E**X viri & mulieris semine fœtum in vtero gigni diximus, altero quidem materiam, altero verō esse, ac formam conferente, vt in pulli generatione fit, aut simul vtriusque commixtis. Vt vt se res habeat, simulatque vterus concepit, clauditur, colligiturque semen vndique comprehendens, quod calore in seminis cuiuslibet morem turgescere incipit, & quemadmodum reliqua omnia semina suas protinus iaciunt radices, quibus necessarium sibi nutrimentum ē terra hauriunt; haud secus quoque humanum semen postquam intumuit, membranam extrinsecus efformat, in astra tenuis cepæ inuolueri, siue interioris ovi pelliculæ; spiritus verō intus conclusus<sup>a</sup> riuum in ipsius medio, cui vmbilico nomen est, producit, aliorum<sup>a</sup> feminum radicibus proportionē respondentem, ex duabus venis totidemque arterijs constatum: Quæ quamuis ab vmbilico in vterum simul contendant, intra corpus tamen fecus euenit; imō venę in vnā abeunt,<sup>b</sup> quę inter peritonęum ac omentum<sup>b</sup> tantisper procedit, dum in<sup>c</sup> rimam inferatur, quam in anteriori iecoris parte haberi prodidimus, & in iecur ingrediens perrepat, quouque venę quam portam appellari diximus, exortui iungatur. <sup>d</sup> Arterię sensim ac sensim inuicem abscedentes feruntur, & peritonęi membranas, ac vesicę latera peruadentes, ad suum quęque latus paulō infra sacrum os; in magne arterię propaginem inferuntur, quam, vbi locus postulat, inibi prorepere dicemus. Per venas igitur alimenta, per arterias vitalem spiritum fœtus trahens, dum in vtero concluditur enutritur, vasis hisce omnibus vnā coeuntibus, instar radicem in posteriore corporis vteri parte, vbi venis artetijque ipsius committuntur: sed vt ad semen redeam, vbi ex eo efformatus est vmbilicus, hominis speciem paulatim induere incipit, quod intra dies triginta si mas fuerit, si verō fœmina intra quadraginta dies molitur, totidem naque dies muliebres purgatio post partum durat. Post hæc anima ipsi infunditur, prius enim vitam duntaxat viuebat plantarum. Licet autem animatus sit fœtus, præ sui tamen paruitate ac mollitie, mouere se ipsum nequit, dum maius robur non acquirat, quod fit; in mare quidem tertio mense, in fœmina verō quarto. Post quę in vtero semper continetur, dum angusta ipsi domus fieri incipit, nutrimentum vti diximus per vmbilicum assumens, qui mediam corporis regionem ad amum sinu tenet, ab ipso ad pedum manumque cacumen, metiendo, corpore in crucem extenso. Ex corpore autem prodians<sup>e</sup> sursum ventri accumbens ad scium vsque humerum conscendit, & circum colli posteriora ductus in dextrum vsque humerum fertur, e cuius regione in corporis vteri scapulas adigitur, fœtus enim<sup>f</sup> in vtero ita situatur, vt caput superiora occupet, facies in<sup>f</sup> vteri scapulas vergat, quō tutus degat, & cubitos ad inguina applicans ita con-

trahitur,

Vmbilicus medius in corpore relocumnet.

Fœtus in vtero situs.

a. f. xxi. l. 1.

b. f. ii. l. 1.

c. ead. f. iii. l. 1.

d. ead. f. iii. l. 1.

e. f. vi. l. 1.

f. vii. l. 1.

g. f. x. l. 1.

h. f. x. l. 1.

i. f. x. l. 1.

j. f. x. l. 1.

k. f. x. l. 1.

l. f. x. l. 1.

m. f. x. l. 1.

n. f. x. l. 1.

o. f. x. l. 1.

p. f. x. l. 1.

q. f. x. l. 1.

r. f. x. l. 1.

s. f. x. l. 1.

t. f. x. l. 1.

u. f. x. l. 1.

v. f. x. l. 1.

w. f. x. l. 1.

x. f. x. l. 1.

y. f. x. l. 1.

z. f. x. l. 1.

aa. f. x. l. 1.

ab. f. x. l. 1.

ac. f. x. l. 1.

ad. f. x. l. 1.

ae. f. x. l. 1.

af. f. x. l. 1.

ag. f. x. l. 1.

ah. f. x. l. 1.

ai. f. x. l. 1.

aj. f. x. l. 1.

ak. f. x. l. 1.



trahitur, ut genibus oculos, talis verò nates propemodum contangat totus in glomum collectus. Quoniam verò fœtus principiò, minore eget alimento, ex eo quod superest, secundinæ hunc in modum procreantur. Circum circa vmbilici insertionem sanguini, & massa colligitur, & carnea quædam moles panis instar orbicularis, spongiosaque ac fuliginæ coloris, & quamplurimis venis intertexta, lienis substantiæ ex toto propemodum similis, quæ secundina latinis dicta est, quòd post fœtum, ut arbitror, edatur. De cuius figura & situ omnes, quorum scripta in hanc usque diem mihi videre contigit, ita sentiunt, alij nanque fasciæ similem esse, totumque abdomen cingere, alij verò non vniuersum abdomen, sed partem duntaxat secundum ipsius longitudinem vincire arbitrantur, delusi utriusque, illi quidem ex his quæ in canibus, hi verò & his quæ in vaccis occurrunt, ac proinde eam inter tunicas fœtum obuoluentes, secus quam nos, annumerarunt.

Ex huiusmodi massa exterior duarum membranarum fœtum inuoluentium producit, dicta græcis *αλλαντοειδής*, hoc est farcimini similis, sumpto in vaccis errore, in quibus hæc tunica ingentis intestini, seu farciminis speciem præ se fert, in humano autem fœtu longè aliam imaginem exhibet, vesicam enim tum figura, tum substantia æmulatur. Parsque ipsius posterior extrinsecus anteriori dictæ massæ parti validissimè adhærescit circum vmbilicum, permultos ab ea venarum, artiarumque furculos assumens, internæ verò facie tota per quam læuis, & lubrica est, totique secundæ tunicæ obtenditur, nusquam ei, nisi iuxta vmbilicum adnata. Secunda hæc membrana eandem cum priore figuram obtinet, eodemque prorsus modo venis, & arterijs ex vmbilicalibus vasis enascentibus intextitur; quæ licet exiles sint, non ideo tamen obtutum effugiunt, cum tunica hæc longè tenuior ac mollior priore sit, & ad hædine cutis mollitiem accedat, vnde *ἀμνιότις* græcis, nobis amictus dicta est. Tunica hæc extima facie læuis, atque humida est, neque visquam nisi propter vmbilicum priorem contangit, inter vnâ enim & alterâ vrina colligitur, quæ à fœtu toto eo tempore, quo in vtero concluditur, excernitur. Interius quoque læuis humectaque occurrit, & vmbilici interuentu fœtui adhæret. Inter ipsam & fœtum magna sudoris copia consistit, qui ex fœtu, dum in matris vtero continetur, emanat, suntque aquæ illæ, quas paritrix mulieribus erumpere vident. Cum enim prior membrana massæ, hæc autem vtero adhærescat, ubi proditurus fœtus sese volutat, priusquam euellatur, tunicas ferè disrumpit, sicque vrina & sudor in ipsis coaceruati excernuntur, & os, ceruicemque vteri emollientes, ad partus facilitatem magnoperè conferunt. Quòd si quando contingat priorem membranam disrumpi, & secundam euelli, fœtus amictu indutus in lucem emergit; cui tamen membranæ, aut pergamenæ ex ea paratæ vis nulla maior, quam alijs inest, quamuis eam striges & veneficæ mulieres in primis extollant. fit etiam interdum, ut exeuntis fœtus crus brachiumve hac membrana inuolutum remaneat, aut ea scilicet non exactè auulsa, aut obstetricis incuria. Huiusmodi membrana siue amictu fœtus includitur, qui flauam quandam materiam, ac luti modo spissam cuti adnatam habet, quartæ nimirum coctionis, quæ in membris efficitur, excrementum. Prædicta massa, & duæ huiusmodi tunicæ, secundinæ mulieribus appellantur, quarum secundina fœtui ad vterum detinendo inseruit, reliquæ duæ ipsum vnâ obuiant, priuatim verò secunda sudorem, prior vero vrinam continet. Quæ quidem in re summus rerum opifex non minori providentia, quam in plerisque alijs corporis nostri partibus usus est. Cum enim salsa, & mordax vrina sit, fœtus verò admodum tenellus, si ea carnibus proximè obnatasset, leui eas negotio erodisset, cui occurrens effecit, ut vrina è fœtu haud per genitale redderetur, sed remans, & per meatus vesicæ fundo enatum delata, per vmbilicum excerneretur inter duas arterias, quas mox eum peruadere dicemus, inter primam ac secundam membranam coaceruata. Hæc sunt quæ ad coctionis, & generationis instrumenta pertinent.

Secunde ex quibus fiant.

Primum fœtus inuolutum.

Aque in parte rumpentes.

Secundarum fœtus.

Fœtus haud per genitale vrinâ reddit.



**E**T si mihi hominis duntaxat structuram persequenti, aliud præterea nihil tentandum foret; quia tamen tractatio hæc historię nostrę finitima est, & maxime omnium in votis, pauca quædam circa ipsam in medium afferenda duxi. Ex menstruo mulieris sanguine foetus in utero ali, huiusque tantum usus gratia eas ipsum à natura obtinuisse, apud medicos atque philosophos adeo in confesso est, ut secus asserere temerarium videri possit. Nihilominus cum nullum, prope ceterorum animantium purgationes huiusmodi patiat, nullumque tamen quod nothum non sit, perinde ac mulier, & multo etiam fecundius non concipiat, procreetque: cumque mulieres non pauca, quibus menstrua nunquam fluxerunt, concipiant, & filios edant à scabie cæterisque id genus morbis immunes, quibus ferè infantium ætas exerceri solet; cum præterea menstruus sanguis vsque adeo corruptus excernatur, ut non foetui duntaxat adeo delicato, ac molli, sed cuius etiam bruto ipsum degustanti, necando sufficere possit, hæc inquam omnia aucter quid sentia proferendi, animum iniecerunt. Scire igitur oportet, vniuersum mulierum genus, tum naturali temperamento, tum sedentaria quam degit vita, aliorum omnium perfectiorum animantium esse humidissimum; lunam insuper, prout communis omnium sententia; & quotidianus docet euentus, communem esse humiditatem parentem, cum eas minuat augeatque, prout singulis ipsa mensibus crescit, decrescitque. Hoc posito, dico in muliere humores singulo quoque mense adeo augeri, ut venis concludi nequeunt, per vniuersum corpus, sanguinem conturbantes tantisper ferantur, dum ipsum natura per viam in id expeditiorem, venas nimirum ad uterum, ipsiusque ceruicem tendentes extrudat. At si quando venæ huiusmodi ut plerunque accidit obstructæ sint, ita ut sanguini egressus non pateat, in corpore corrumpitur, & varias ægritudinum formas inducit. Id quidem ita se habet si sanæ degant mulieres & ab accidente quouis liberæ; at si forte fortuna, aut diuturna vsu inualitudines aut nutrimenti indigæ, ut vbi adolescent, vel utero gerunt, aut lactant, aut vehementius exercentur, superuacaneas absumunt humiditates, etsi humores vnâ cum luna singulis mensibus adaugentur, vbi tamen in quod exerantur habet, corpus haud exagitant, sed nulla prorsus noxa, nullo illato incommodo requiescunt. Menstruæ itaque mulierum purgationes ex humida potius earum constitutione, & otiosa quam ducunt vita, quam ex villa nutriendorum liberorum necessitate proficiuntur. Neque verò quicquam habet momenti ratio, qua nonnulli nituntur, ex menstruo sanguine foetus ideo ali dicentes, quod eo prægnantes, & lactantes destituantur; quin potius quia ex materno sanguine foetus enutritur, tantumque maternæ humiditatis absumit, in eam quam antea solebant copiam assurgere humores nequeunt. Atque hanc ob causam vteri gestationis initio, foetus adhuc parvulo existente, ac nutrimenti minimum assumente, plerisque mulieribus menstrua fluunt; Et hæc laudabiliter vtuntur sanitate, nec vllò tenentur eorum symptomatum, quibus cætera prægnantes grauiter primis mensibus consistari solent, grauiusque adhuc postremis exerceantur, si menstruus sanguis intra corpus, ut quidam existimant, retineretur. Quod cum ita se habeat, cumque videam plerisque mulieribus diuturnas passis ægritudines, menstruas purgationes minimè redire, nisi pingues ut prius euadant; lactantes præterea toto propemodum quo lactant tempore purgationi eiusmodi nequaquam subijci, nihil interim detrimenti, neque his, neque illis incurrentibus; ratum firmumque habeo, sanguinem menstruum haud suapte natura malum esse; præterquam quod in ea agitatione, quam singulis mensibus secundum lunæ motum humores subeunt, aliqua ipsorum portio corrumpitur, quem ut perniciosam natura foras propellit, reliquo in pristinam redeunte quietem. His hunc in modum positis, iam in confesso est, foetum ex perfectissimo, ac laudatissimo matris sanguine nutrir, (prout quidem eo molli, ac tenello vsque adeo existente oportuit, quò viuere posset) simulque non alendorum liberorum necessitate, sed ob humidam duntaxat ipsarum temperamen-

Mulieres naturam humide.

Luna humiditatem parentem.

Menstruorum ratio.

Menstrua cor supprimantur.

Vteri gestationis initio cur fluant menstrua. Quibus mulieribus innoxius sit mensium defectus.

ramentum, mulieres menstrua pati. At iam de mammis agere expediet, sicque præ-  
senti libro finem imponere.

De Mammis.

Cap. 18.

QVoniã educto ex vtero fœtui, in quo is sanguine ali solitus, nullo indiguerat per os nutrimento, haud vllum ferè congruens cibi genus inueniri potuisset, qui sua saltem duritie, ac nouitate non obfuisset, cumque nullum ipsi salubrius alimentum esse posset, quàm id quo in vtero matris vtebatur, summa prouidentia, rerum conditor membrum in mulieribus fabrefecit, ad quod sanguis defluceret, qui vterum prius adibat, in nutrimentum conuersus fœtui apprimè conueniens, quo is in lucem emerfus tantisper vteretur, dū alijs assuescere cibis inciperet; Quod qua ratione fiat, & quo itinere diuertatur, de venis agentes prolixius explicabimus; nunc de mammillis tantum verba faciemus. Summus itaque rerum opifex, <sup>a</sup> mammas duas in pectoris medio vtrinque vnã mulieribus locauit, super <sup>b</sup> secundum brachij motus auctorem musculum, inter membranam carnosam, & cutem. Hæ semiglobi speciem externa facie referunt; & apicem in medio habent, qui Papilla dicitur: posterius verò depressæ sunt, & secundum pectoris prominentiam cauæ. Constant autem glandulis nonnullis, multoque simul adipe; & venis quibusdam arterijsque, ac nervis licet paucis intexuntur, qui eandem perpetuo pro vberum proportionē magnitudinem seruant, secus quam glandulæ, quæ virginibus, ac viris perpaucæ, exiguæ, ac propemodum aridæ sunt; adultis verò mulieribus copiosæ admodum, tumescentes & humidæ; puellis duræ ac solidæ, nulloque humore imbutæ; parituris & iam enixis insigniter turgidæ, & lactus plenæ; ijs tamen, quæ sæpius peperere, flaccidæ admodum ac pendulæ. Huius hæc ratio est, quia vbi sanguis vniuersus ingenti partus dolore agitatur & incalescit, & venæ secundinæ affixæ abruptuntur, membrorum humor omnis sæuo cruciatu expressus per eas expurgatur, mammas relinquens flaccidas adeo & exsuccas, vt pristino amplius decori restitui nequeant.

Mammae ad quid effectæ.

Mammæ situs.

Figura.

Substantia.

Mammae cup sæpius enixis flaccescant.

a figu. xxv.

xxvi.

b li. i. ta. i. j.

4.

# DE ORGANIS NVTRITIONI

(QVAE CIBO POTVQVE FIT) DEDICATIS:

ac deinde propter partium connexum ac viciniam,  
De instrumentis generationi famulantibus.

## TABVLÆ I. FIGVR. I.

**I** N prima figura tanta humani corporis portio delineatur, quanta ad peritonæi sedes ostendendas sufficit: exprimitur itaque hac figura anterior peritonæi sedes, sectionis serie ab octo abdominis musculis libera, nullaq; ex parte dissecta.

- AA,** B, C, D, His characteribus peritonæum insignitur, quodammodoq; hac figura terminatur.
- EE** Linea à mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubis vsque ossiū commissuram procedens, cui oblique descendendum & ascendendum, & transuersim procedentiū abdominis musculorū nervosæ tenuitates pertinacissimè conascuntur.
- F** Vmbilicus, quem inter dissectadum etiam adæptis abdominis musculis, gratia opportunè vmbilici vasorum demonstrationis, referuare solemus.
- G** Seminaria vasa suis mēbris, quas à peritonæo mutuatur, adhuc obuoluta.
- H** Vena ac arteria, quæ potissimū inferiori sedi rectorū abdominis musculorum exporriguntur, quorū & hic quoque propendet portio.
- I** Vena & arteria, quæ sub osse pectoris exporrecte, in anteriorem abdominis sedem prolabantur, præcipuè rectis abdominis oblate musculis, ac superiorem abdominis sedem vniuersam quoque implicantes: quemadmodum illæ quas Insigniuimus, humiliorē & pubis ossibus viciniorē implicant.
- K** Venarum soboles in peritonæi latera excurrentium, ac ab illis venis deductarum, quæ aut à cōiuge carere vena, aut geniculatim à caua pronascuntur, quæ ipsius caudæ

- L** Transuersi abdominis musculi portio à peritonæo diuisa, retrorsūq; flexa.
- M** Ilium ossis sedes hic nuda cōspicitur cui obliqui transuersiq; abdominis committuntur musculi.
- N** Malum punicum, seu ensiformis cartilago.

**S** ECVNDA figura primam sectionis serie subsequitur, hic nanque peritonæum recta linea à pectoris ossis mucronata cartilagine ad pubis vsque os ita diuisum est, ut vmbilici vasorum nullum vitauerim: dein transuersa sectione à sinistro ilio ad dextrum ducta, quatuor peritonæi anguli ab anteriori corporis sede in posteriora reflexi conspiciuntur. Præterea vmbilici quoque una pars cum ipsius vasis, quæ peritonæo prius connectebantur, oculis subiacet. Ad hac præsens figura iecoris portionem, & ventriculi sedem, ac omenti intestinis obducti situm indicat, quem omentum obtinet, quum manus ipsum versus pubis os inter dissectadū trahitur, si quando sursum versus sinistram latum (vbi plerunque accidit, ac sequenti figura occurret) retractum adinuenitur.

- AB** CD. Quatuor peritonæi partes dissecte, atque in posteriora reflexæ, adeo ut interna anterioris peritonæi sedis regio hic ex sectionis serie in conspectum venerit.
- E** Vmbilicus à peritonæo liberatus.
- F** Vena ab vmbilico in iecur porrecta.
- G** Venæ vmbilici in iecoris rimam ingressus.
- HH** Portio iecoris ex gibba ipsius sede apparens.
- I** Præcipuum ligamentum iecur septo transuerso connectentium.
- Dextera arteria ab vmbilico secundum

dum

FIG. I




PI




TABVLA I.

LIBRI III.

III



III



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>um dextrum vesicę fundi latus ad magnam prorepens arteriam .</p> <p><b>L</b> Sinistri lateris arteria ab umbilico secundum vesicę sinistram sedę, ad magnam exporrecta arteriā.</p> <p><b>M</b> Meatus, quo ā vesicę fundo fetus vrinę in secundam fetum inuoluentem tunicam expurgatur.</p> <p><b>N</b> Vesicę fundus.</p> <p><b>O</b> Peritonęi ad vesicę fundum nexus.</p> <p><b>P</b> Ventriculi anterior pars, quę neque iecore, neque omento obtegitur. Hęc sedes ob hoc amplior apparet, quod ventriculus quę hic depinximus, impęse inflatus fuerat.</p> <p><b>QQ</b> Omentum.</p> <p><b>R</b> Vena &amp; arteria simul cū neruo dextre sedı inferioris partis ventriculi exporrectę.</p> <p><b>S</b> Sinistri lateris vasa, quę sinistrā fundi ventriculi sedem amplexatur.</p> <p><b>T</b> Hac sedē dextri lateris vasa sinistris committuntur, ac proinde etiam RT, &amp; S suturam indicant, cuius Aristoteles tertio Historiā de animalibus libro, vt &amp; quarto de animalıū partibus meminit, quā ā medio ventre omētum oriri dependereque asserit.</p> <p><b>XX</b> Venarum arteriarumque propagines superiori omenti membranę exporrectę, adipeque cinctę.</p> | <p>huc omento spectat.</p> <p><b>bb</b> Extuberans hęc sedes vetriculus est, superiori mēbrana omēti tectus.</p> <p><b>cc</b> Omenti humilior mēbrana, quę nonnullis humilior ala nuncupatur. Ceterum extuberās pars, cui duo superiora r &amp; c inscribuntur, colum est intestinum.</p> <p><b>d</b> Hic lien etsi omento obducitur, protuberans sese ostendit, ad quod etiam pellucida omēti iuuat substantia.</p> <p><b>e</b> Caudex venę caue.</p>   |
|  | <p><b>FIGVRA III.</b></p> <p><b>Q</b> VARTA figura omentum suis quibus adnascitur, aut potius a quibus initium ducit, membris liberum, et nulla interim parte diuulsum delineatur, integra &amp; ipsius constructio, &amp; precipuis venarum, arteriarum &amp; nervorum per ipsum series, et glandulosa corpora ipsi innata commonstrantur. Quam concinne vero omentum sacculo, aut perā, aut minoribus piscatorum retibus assimiletur, hac quoque figura discitur.</p>   | <p><b>ee</b> Omenti circulus, seu orificiū, quo initium ducit.</p> <p><b>fff</b> Omenti superioris mēbranę anterior facies.</p> <p><b>gg</b> Inferioris omenti mēbranę anterior facies. at hęc non integra vt superioris mēbranę anterior facies hic cōspicitur, quum inferioris mēbranę sedes tantum in conspectu sit, quę ventriculo subternitur, atque ad colon vsque intestinum, quā id ventriculo exporrigitur, pertinet. Reliqua enim inferioris mēbranę pars superiori mēbrana occultatur.</p> <p><b>hix</b> Tribus his characteribus ad sinistrū latus inferioris mēbranę omenti possint, omenti constructio insignitur. Nam h omenti partem notat mēbranęam, venę arterięque &amp; adipe quoque carentē. i verō vasa indicat, k autem adeps vasis artēsus adnatęve exprimit.</p> <p><b>l</b> Venę portę caudex, quā ex iecore</p> |



procedens inferiori membrana omentis continetur ac suffulcitur.

m Arteric iecoris cauum & bilis vesiculam petens, neruoque concomitata, qui à dextri lateris sexti nervus cerebri paris, nerui ramo, dextri lateris costarum radicibus exporrecto depromitur, ac iecoris cauum bilisque vesiculâ adit.

n Principium venę inferioris ventriculi orificij posteriorem sedem potissimum accedentis, & arteriam habentis coniugem.

oo Arteria & vena & nervus, secundū superioris omēti membranę principium, dextrę fundi ventriculi fedi exporrecti.

pp Illorum vasorum quę dextrę fundi ventriculi fedi exporriguntur furculi, corpus ventriculi implicantes.

qq Dictorum iam vasorum quę fundi ventriculi dextrę fedi exporriguntur propagines, in superiore omenti membranā sparę.

r Vena arteriaque duodeno intestino & ieiuni intestini principio exporrectę, neruulūque socium frequenter admittentes.

s Portę venę in duos trunos bipartitio.

t Dexter seu grandior venę portę truncus, in mesenterium adeoque intestina excurrens.

u Vena in posteriorem ventriculi sedē citra arterię consortiū excurrēs.

x Vena cū arteria & neruo in dextrā inferioris membranę omenti sedē sparsa, ac colon quoque intestinum hac parte accedens.

y Vena simul cum arteria in ventriculi posteriora excurrens, & tādē coronę ritu superioris ventriculi orificium amplectens.

a Hic nonnihil grandior mesenterij arteria se offert, etiam si minimo intervallo inferiori mēbrana omēti suffulciatur.

β Truncus est arterię, qui inferiori omenti membranę intertextus, ventriculo, iecori, bilis vesiculę, colo quā id ventriculo exporrigitur, ac dein lieni ramos depromit, neruosq; has partes adēutes comitat.

γ Vena simul cū arteria & neruo mediam potissimum sedem subiens inferioris membranę omenti, & ramos quoque offerēs colo intestino, quā ad ventriculi prorepat fundum.

δ Vena coniugis arterię expres, quę sinistrę fedi inferioris omēti mēbranę pauculas soboles, vt & ipsa gracilis est, diffundit.

ε Venarum, arteriarum & neruorum in lienem series.

ζ Vena pariter cum arteria neruoque ventriculi fundi sinistrę fedi exporrecta.

η Glandulosum corpus inferiori mēbranę omenti innatū, quod vulgo vocant Brisulo, Dulcē morum seu bolum, Buccam saporitam, Rodol.

θ Glandulosi corporis portio, quod duodeno intestino subnascitur.

TAB. II. FIG. V. VI. VII.

**I**N quinta figura sectionis serie tertiam subsequente, iecur, ventriculus, & intestina proprias servāt sedes, omento interim, quā à ventriculo enascebatur, coloq; intestino continuum erat, prorsus resecto, ne forte id relictum alicuius organi sedē obliteraret. Præterea, ut singula opportunius oculis subicerentur, cistarum aliquot fines (vt inter pingendum factum est) effregimus.

SEXTA igitur figura tenuium intestinorum ductum duntaxat delineavimus, aliqua etiam vetriculi, & coli intestini, simul ceco asseruata portione, vt faciliē præsens figura iam subsequenti septimę adaptetur.

SEPTIMA figura caci intestini & coli & recti imago ductusq; commoñstratur, vnā cum ilei intestini extremo, & musculis recto intestino proprijs.

SUBSEQUENS modo characterum index quinta, sexta, & septima figuris communis est: si quis verò interim character harum alicui peculiaris sit, illum pro figurę numero aut 5 aut 6 aut 7 insigniturus sum: characteres



|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
|    | <i>rañeres autem quibus huiusmodi nulla subiungetur notula, tribus figuris communes censebis.</i>   |    |  |
| 'A | 5. Mucronata pectoris ofis cartilago.   | XX | 5. 7. Coli intestini vñque extuberantes semiglobul., quos cellulas vulgus vocat.                                     |
| BB | 5. Peritonęum vnā cum disruptis costis.   | Y  | 5. 7. Recti intestini initium. Quicquid verò sub Y. consistit, rectum est intestinum.                                |
| C  | 5. Primarium ligamentum, quo iecur humanum septo colligatur.  | Z  | 6. Portio meatus bilem in intestina perferentis.   |
| DD | 5. Iecoris gibbi magna sedes.   | a  | 7. Musculus recti intestini finem orbiculatim amplectens, faciumq; excretionis præfectus.                            |
| E  | 5. Portiuncula venę ab umbilico iecori inserta.   | bc | 7. Duo musculi rectum intestinum post fecium excretionem sursum alacriter contrahentes.                              |
| FF | 5. Ventriculi anterior sedes.   | d  | 7. Hac sede rectum intestinum viro- rum peni & mulierum vteri ceruici interuentu musculose substan- tię connascitur. |
| G  | 5. Lienis sinistrum latus; seu ipsius pars in corporis anteriora vergens.   | ef | 5. Duę arterię foetus peculiare.   |
| H  | 6. Ventriculi portio, quę inferius ventriculi constituit orificium, seu in- testinorum principium, quod hic chordula ligatum finimus.   | g  | 5. Hoc caractere vesicę fundus in- dicatur, vti & meatus quo fetus vrina expellitur.                                 |
| IK | 6. Pars intestinorum ab I ad K pro- tensa, vulgato nomine nunc duo- denum intestinum, nunc intes- tinum duodecim digitorum longi- tudine, mihi vocatur.   |    |  |
| L  | 7. Ieiuni intestini initium, graciliusq; intestinorum sedes.  |    |  |
| M  | 6. 7. Ilei intestini terminus, & graci- lium intestinorum finis.  |    |  |
| N  | Extuberans crassorum intestinorum initium.  |    |  |
| O  | Hoc intestinum mihi cecum nuncu- patur.   |    |  |
| NP | QRST, 5. 7. Colum intestinū his caracteribus insignitur, verum singuli priuatim aliquid notant. N enim ad P vsque coli intestini ductum notat, à dextri renis sede ad iecoris vsque cauum pertinen- tem. à P verò ad Q coli ductus notatur, secundum ventriculi fun- dum à iecoris cauo ad lienis vsq; regionem protensus. a Q autem ad R ductus coli insinuat, à lie- nis regione ad pubis os, secundū sinistrū ille procedens. Cæterum ab R ad S (quod in 7 priuatim vi- situr) coli indicatur ascensus an- fractusque, quem sursum ad um- bilici vsque regionem molitur. At S ad T vsque progressum no- tat, dicti nunc ascensus ad rectū in- testini initium. |    |  |
| VV | 5. 7. Depressa coli intestini sedes.  |    |  |

FIGURA VII.



**O**CTAVA figura recti intestini & coli quoque, quā id recto continuatur, partem expressimus, intestinorum tunicas demonstraturam.

- b Prima intestinorum tunica, quę & intima est, ac solis transuersis circularibus ve confirmatur fibris.
- ii Secunda intestinorum tunica, quę transuersis quoque efformatur fibris: attamen rectis quoque eò do- nat pluribus, quò recto intes- tino vicinior est.
- xx Mesenterij est portio, quę rectū in- testinum ofsi sacro committit, ac tertiam ipsi exporrigit tunicam.
- LL Tertia intestinorū tunica, à mesen- terij pronata membranis.

FIGURA IX.

**V**T præfens figura mesenterij si- rum quam appositissime oculis subiceret, gracilia intestina unde- cunque ad latera sursum deorsumq; inuicem manibus ducta continet, ac proinde mesenterij demonstrat cen- trum, & rationem quā mesenterium

TAB. V. LA. II. LIBRI. III.



|     |   |
|-----|---|
|     | <i>intestinis vasa porrigit, intestinaq; dorso connectit. Ad hac eius quoque mesenterij partem ostendit, quæ coli finem &amp; rectum quoque intestinum dorso alligat. Succedit verò hac figura sectionis serie illi quam quintam locauimus.</i> |
| ABC | D. Portiones peritonæi, aperto iam abdomine in latera extrorsum flexæ.  |
| EEE | Tenuia intestina.   |
| F   | Cæcum intestinum.   |
| G G | G. Colon intestinum.  |
| H   | Recti intestini initium.  |
| I   | Vesica cui peritonæum ea potissimū sede connascitur, vbi alteram ipsi offert tunicam.   |
| K   | Mesenterij centrum, eaque dorsi pars, quæ id à peritonæi membranæ initium ducit, quæ magnam arteriam, & cauam venam hic vertebrarum corporibus adnectunt.   |
| LL  | Corpus glandulosum, mox in ipsa vasorum distributione positum, quæ mesenterij centro inferuntur.  |
| MM  | Glandulæ vasorum distributionibus interiectæ, quæ vasa in ipso per mesenterij ad intestina moliumur progressu.  |

FIGURA X.

**I**N decima figura dūtaxat ipsum delineatur mesenterium è corpore exemptum, omnibusq; partibus ipsi connatis liberum, præterquā ab inferioris membranæ omenti portione, qua colon dorso inibi colligatur, vbi secundum inferiorem ventriculi sedem id procedit.

|    |  |
|----|--|
| K  | Charakter K vt & in nona figura, mesenterij indicat centrum.                                       |
| LL | Hi quoque characteres similiter atque in nona glādulofum corpus notant, totius mesenterij maximum. |
| MM | Glandulæ notantur illis interpositæ vasorum dissectionibus, quæ iam                                |

|        |  |
|--------|--|
| NO     | intestinis appropinquant. His characteribus mesenterij circūscribitur pars, tenuia intestina dorso alligans.   |
| PP     | Ad Q vsque mesenterij indicat portionem, colon intestinum dorso affirmatæ, quæ id à dextri renis sede ad cauum vsque iecoris protenditur.  |
| QQ     | Ad R vsque inferioris omenti membranæ partem notat, quæ colon tota illa sede dorso committit, quæ id secundum ventriculi exporrigitur fundum.  |
| RR     | Ad S vsque mesenterij insinuat portionem colo intestino tota ea sede propriam, quæ id à lienis regione ad rectū vsque intestinum pertinet.   |
| ST     | Quod S & T intercluditur, mesenterij pars est rectū intestini dorso nectens.   |
| V      | Hac sede mesenterij naturam exprimere conati sumus, quandoquidemynam mesenterij membranā ab altera vnguibus diuisam pinximus: vt X nimirū vna sit, altera verò Y inscribatur. Atq; in harum membranarū medio mesenterij vasa excurrunt, & ipsius adeps, vt & glandulæ etiam continentur, quemadmodum quoque in prima muliebrium figurarum cernere licet. |
| X<br>Y |  |

TABVLA III. FIGV-  
RA XI. XII.

**V**NDECIMA figura iam præpositis integris sectionis serie succedit. habet enim figuris dissectum peritonæum, & omentum quoque in hac ablaturum est, & hic costas aliquot etiam effregimus, quo iecoris cauum opportunius delineari posset. Hic namque conspicitur vniuersum iecoris cauum, ipsiusq; iecoris forma. Dein ventriculi quoque apparent orificia. Intestina autem perinde, ac ventriculū in sinistram latius deprestimus, vt in conspectu esset mesenterij pars, ac venæ porta in ipsum series: dein bilis meatus in intestinū infer-

tie, & si qua sunt reliqua que characteribus seriatim adnotabimus, mox atque quid duodecima ostendat figura expresserimus.

PRÆSENS characterum index undecimæ, et duodecimæ figuris ideo habetur communis, quod eandem iecoris sedem plerisque characteribus quibus duodecima occupatur insigniri licuisset, nisi characterum copia delineationem fuisset vitiatura. Quum itaque character occurreret undecimæ figuræ peculiaris illi 1. subiungemus, illis qui duodecimæ priuatim inscribuntur, 2. adiecturi. Si vero quis utrisque figuris simul communis eris, illi 1. & 2. addetur.

HH 1. Peritonæi, vñâ cum costis euerfi portio.

IK 1. Caudum iecoris.

L 1. Portiuncula gibbi sedis iecoris.

M 1. Iecoris sectio, cui foramen alens venâ primûm insertur.

N 1. Rimæ, ac impressiones, & tubercula in iecoris cauo iuxta venæ portæ exortum conspicua. N verò superius, seu finistrum, seu ipso T vicini, sedem indicat, quæ ab vmbilico procedens venâ iecoris cauo ubi portæ caudex prodit, insertur. Ab M enim ad N vsque foramen notatur, quod libere quodammodo vmbilici transmittit venâ ad sedem N insignitam.

O 1. Ligamentum finistræ iecoris partem (quæ in angulum quodammodo acutum definit) septo traverso hic colligans.

Φ 1. Sinus iecori hic incisus, ac stomacho cedens, vbris superiori ventriculi orificio continuatur.

PQ 1. Ventriculus.

R 1. Ventriculi superius orificium, seu stomachi finis, vñâ cum venis, arterijs, & nervis id orificium amplexantibus.

S 1. 2. Humilis ventriculi orificium, ipsiusque duodeni intestini initiû, quod in duodecima figura secus atque secundum naturam se habet; ad interiora refleximus ut in conspectum veniret bilis vesicu-

laræ meatus in ipsum insertus, ac mox e notandus.

T 1. Nervus à nervis elatus ventriculi orificium implicantibus ductus, iecorisque cauo insertus.

V 2. Bilis vesicula. Hæc in utrisque præsentibus figuris est conspicua. verum priuatim illam duntaxat in duodecima characterè notavi, ac proinde primum duodecimæ, ac deinde undecimæ mentem hic & in subsequentiis aliquot characteribus accommoda.

XX 2. Meatus bilis vesiculæ per iecoris corpus exporrecti inter portæ venę & caudæ item venę ramos.

Y 2. Venæ portæ propago in iecoris substantiam diffusa.

Z 2. Venę caudæ propago in iecoris substantiam digesta.

a 2. Concurfus meatorum bilis vesiculæ, qui in iecoris corpus digeruntur.

b 2. Vesiculę bilis ceruix, cui meatus ex iecore ductus ac a notatus insertur, communisque efficitur.

c 1. 2. Bilis vesiculę meatus in duodenum intestinum insertus.

d Ac Sad vsque in duodecima figura duodenum indicat intestinum, quod humiliori sede apertum finimus, ne meatus illius e notati insertio lateret.

e 2. Arteria in iecoris cauum & bilis vesiculam digesta.

f 2. Nervulus iecori, & bilis vesiculæ communis, & à sexti paris nervorum cerebri propagine depromptus, quę dextri lateris costarum exporrigitur radicibus.

g 2. Tenuis portę venę propagines, in bilis vesiculam excurrentes.

h 1. Portę venę caudex.






ii 1. Glandulosum corpus, quo duodeno intestino adnascitur, vasculę ipsi exporrectæ opportunè suntinet.

klm 1. Mesenterium. Verum singuli characteres priuatim aliquid indicat. x enim venę portę dextri seu gravioris trunco distributionem in mesenterium notat. / verò, glandulosum corpus in mesenterio pri-

|    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
|    | mis vasorū distributionibus præfectum. <i>m</i> autem mesenterij insinuat partem, cui colon intestini tota illa sede committitur, quā à dextri renis sede ad iecoris vsq; cauum pertinet. Hic namque colon intestinum à mesenterio diuulsum est, quo, mesenterij centrum aptius delinearetur. | K K | 1. 2. Ventriculi demissior pars, seu fundus.  |
|    |   | L L | 1. 1. Anterior ventriculi sedes.  |
|    |   | M N | 0 2. Posterior sedes ventriculi. Verū singuli characteres aliquid priuatum indicant. O enim impressionem, notat quam ventriculus ea sede exigit, qua vertebris innititur. M quidem prominentiorem sinistri lateris partem, N vero partem dextri lateris prominentiorem. |
| n  | 1. Vena quæ sub posteriori recti intestini sede deorsū protendit, ipsiq; recto intestino venas porrigit.  | P   | 1. 2. Duodenum intestinum, quod hic ad ieiuni intestini principium resectum finimus.  |
| o  | 1. Vescicæ fundi superior pars etiam hic est conspicua.   | Q   | 2. Bilis vesciculæ meatus, in duodenum intestinum insertionem tentans.  |
| p  | 1. Quod hic extuberat dexter est re, sua pingui membrana adhuc obtectus.  | R   | 2. Hic character in interna dicti nuper intestini sede visus, inferior nem meatus illius notans, quem modò Q insigniuit.  |
| q  | 1. Meatus vrinarius, à dextro rene vrinam in vescicam deducens.   | S   | 2. Glândulosum corpus duodeno intestino subnatum, vasque illi intestino exporrecta sufficiens.  |
| r  | 1. Vena ac arteria seminales dextri lateris.  | T   | 1. 2. Dextri nerui sexti paris neruorū cerebri propago ad stomachū exporrecta, multipliciq; serie in ipsius orificium elatus, distributa.   |
| f  | 1. Vas semen à dextro teste versus ceruicis vescicæ initium perferens.  | V   | 1. 2. Sinister neruus.  |
|    | FIGURA XIII. ET. XIII.  | X   | 2. Sinistri nerui propago, secundum elatiorem ventriculi sedem ad iecur vsque excurrens, hincque quo iecori proxima est, Y insignita.   |
|    | <b>H</b> A R V M figurarum prior ventriculi, et gule anteriorem partem exhibet, altera vero posteriorem.  | Y   | a 2. Prima (vti doctrinæ studio nuncupare eam solemus) ventriculi vena & arteria.   |
| A  | 1. 2. Stomachi pars in fauces orisque adeò amplitudinem pertinens, hic à faucibus præfecta cernitur.  | b   | 2. Secunda ventriculū accedens vena, quæ coniuge caret arteria.   |
| AB | 1. 2. Ab A ad B vsq; ductus stomachi notatur, recta per mediam vertebrarum ceruicis, & quatuor superiorum thoracis sedē descendens.   | c   | 1. 2. Tertia ventriculi vena cum coniuge arteria, & neruo quoque, secundum dextram ventriculi fundi regionem exporrecta.  |
| BC | 1. 2. a Bad C vsq; ductus stomachi in dextrum latus super quintā & aliquot sequentes thoracis vertebrae modice declinans.   | d   | 1. 2. Quarta ventriculi vena coniugem obtinens arteriam, & elatius ventriculi orificium coronæ ritu amplectens.   |
| CD | 1. 2. a C ad D vsque stomachi ductus insignitur ex dextra sede versus sinistram, supra magnā confcendens arteriam, & per septum transuersum in ventriculi superius orificium G notandū pertinens.   | e   | 1. Rami jam dictæ venæ & arteriæ, qui secundum ventriculi elatiorem sedē ad inferius vsque ipsius orificium contendunt.   |
| EE | 1. Dux tonsillæ, quæ non procul à stomachi sede in oris cauitate pertingente distant.   | f   | 2. Quinta vena simul cum coniuge arteria & neruo, sinistram sedem fundi ventriculi perreptans.  |
| FF | 2. Glandulosū corpus stomacho frequenter adnatū, qua quintæ thoracis vertebræ corpori infidet.  |     |   |
| G  | 1. 2. Superius ventriculi orificium.  |     |   |
| H  | 1. 2. Inferius ventriculi orificium.  |     |   |
| I  | 1. 2. Superior ventriculi pars.   |     |   |



TABVLA III. LIBRI III.





88 1,2, Alię venę ac arterię, ab illis pronatę vasis, quę lieni inferuntur.

## FIGVRA XV.

**F**IGVRA decimaquinta ventriculū à stomacho ac intestinis liberauimus, ac dein inuertimus, ut interior ventriculi sedes seu superficies cibos & potus amplectens, in conspectum veniret.

*b* Circulare vetriculi tuber ea fede conspicuum, vbi stomachus ventriculo continuatur, aut vbi elatius ipsius consistit orificium.

*i* Tuber orbiculatim quoque in humilioris orificio ventriculi apparens.

## FIGVRA XVI.

**D**ECIMASEXTA figura ventriculi tunicarum seriem, numerumq; & naturam, quantum pictura assequi potuimus, docet.

*x* Tertia vetriculi tunica, à peritonęo pronata, atque hic à ventriculo magna ex parte diuulsa.

*l* Secunda ventriculi tunica, minus quàm tertia à vetriculo diuulsa.

*m* Prima intimaque ventriculi tunica, hac in parte à duabus exterioribus tunicis libera.

## FIGVRA XVII.

**D**ECIMASEPTIMA figura iecoris gibbam posterioremq; sedem, unā cum caua uena caudicis portione exprimit.

*A A* Iecoris gibbi superior pars.

*B B* Iecoris gibbi posteriorisq; sedis infima regio.

*C* Cauę venę sedes, qua septum permeat, ipsique foboles exporrigit.

*D E* Hoc intervallo sedes notatur, qua cauę caudex posteriori iecoris sedi innascitur.

*F* Portio præcipui iecur septo alligantis vinculi.

*G* Ligamentum iecoris partem in sinistra maxime exporrectam septo connectens.

*H* Venę portę portio.

*I* Sinus quo iecur stomacho cedit, quā sinistro ventriculi orificio continuatur.

## FIGVRA XVIII.

**P**RIMA decimaoctaua figura effigies lienę anteriori facie exprimit, unā cū omēti portione, seu inferioris superiorisq; omenti membranarū partibus. A namque lienis sinistrum indicat latus, dextrum autem, ac media ipsius sedes omento integuntur.

*B B* B & B enim inferioris omenti membranae portionem indicant, lienis vasa deducement, C verò & C superioris omenti membranae portionem significant, qua ad ventriculum vasa perferuntur, ab illis vasis pronata quę in lienem iamiam inferenda veniunt. Secunda effigie decimaoctaua

*DE* figurę lienis caua regio exprimitur, ab omnibus quę illi committuntur partibus libera. ac hic *D* notat superioris lienis sedem, *E* inferiorem, *F* sinistram, *G* dextram, *H* verò & *H* lineam indicat in caua lienis regione conspicuam, cui lienis vasa inferuntur.

Tertia effigies lienis gibbum commostrarat cum sulcis, quos costę impresse, notantur *L L*.

Quarta lienis quoque cauam sedem delineatam continet. At huic duas indidid sectiones, ut lienis substantia conformatioq; oculis subicerentur. Atque hic *I* & *K* sectiones modo dictas indicant.

## TABVL. IIIL. FIGVR. XIX.

**P**RÆSENS figura sectionis serie undecima succedit: ab hac enim omnia intestina executimus, relictā duntaxat ventriculi portione, superioris orificij ventriculi sedem commostrarante. atque ita hac figurā pleraque indicat, quę nunc opportunius cum characterum indicibus, seriatim insinuabuntur.

*A A* Septi transuersi portio peritonęo fucineta, atque unā cum costis aliquot sursum reflexa.

*B B* Caua iecoris sedes.

*C* Iecoris ligamentum, quo ipsius sinistra pars septo alligatur.

*D* Venę per vmbilicum iecori exporrectę portio, vbi & sinus ille in-

dicatur

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
|    | dicatur primū hanc admittens venam, quæ per priuatum ipsi in iecore humano incisum foramen ad iecoris vsque sedem perreptat, vbi hic G non procul à K adhibitur conspicis, vbique vena hæc in iecoris substantiā primū verè digeritur. | b  | Vena arteriaque in sinistrum protensa renem, emulgentesque vulgò nō secus appellatæ, quàm illæ quæ dextro reni sunt propriæ.   |
| E  | Hac sede iecur sinum obtinet, quo cedit stomacho per septum transversum ad elatius ventriculi orificium contendenti.   | cc | Meatus ex dextro rene vrinā in vesicam deferens.   |
| F  | Superius ventriculi orificium, ventriculique portio.   | d  | Meatus quo sinistri renis vrina in vesicam ducitur.  |
| G  | Lineæ, impressiones vè, tuberaq; in iecoris cauo, vbi portæ venā promittit, conspicua.   | e  | Seminalis vena sinistrū accedens testē   |
| H  | Bilis vesicula.  | f  | Seminalis vena, dextri testis.   |
| I  | Portæ venę caudex hic abscissus. Verū I quoque duas indicat venulas bilis vesiculæ exporrectas.  | gg | Surculi à seminalibus venis, qua peritonæo committuntur, in ipsoque adeò versus testes progressu, ad peritonæum deriuati.  |
| K  | Iecoris. neruus ab illis propagatus, qui elatiori ventriculi implicatur orificio.  | b  | Seminalis arteria dextrū testē petēs.  |
| L  | Arteria iecori & bilis vesiculę communis.  | i  | Arteria feminalis, quæ sinistro testī est propria.   |
| M  | Neruus à sexti neruorum cerebri partem propagine initiū ducens, quæ dextri lateris costarum exporrigitur radicibus, atque hic neruus iecori pariter & bilis vesiculæ communis censetur.  | k  | Arteriæ in humiliorē mesenterij sedem ad colon intestinum & rectum excurrentis radix.  |
| N  | Bilis vesiculæ meatus hic abtruncatus visitur, qui ad intestina pertinet.  | l  | Arteriæ magnæ super cauam venam ascensus, ac ipsius magnæ arteriæ & cauæ supra ossis sacri initiū in duos truncos diuisio.   |
| OO | Lienis anterior cauaque regio.   | mm | Præcipuæ venæ ac arteriæ earū, quæ geniculatim à magnis vasis lumborum carnibus, ipsiq; peritonæo offeruntur.  |
| P  | Lienis linea, cui vasa ipsius implantantur.  | n  | Arteriæ magnæ soboles sacri ossis foramina accedentes.   |
| Q  | Vena caua.   | o  | Recti intestini pars à colo libera, atque, vt inter dissecandum fit, vinculo intercepta.   |
| R  | Magna arteria.   | p  | Vesica vrinæ receptaculum.   |
| S  | Radices artieriarum in ventriculum, iecur, lienem, omentum, mesenterium, ipsaq; demum intestina excurrentium.  | q  | Semen à teste ad penem deferentis vasis portio, qua secundum pubis os deorsum ad vesicæ ceruicis initiū retorquetur.   |
| T  | Dexter ren, pingui sua obducta tunica.   | r  | Cutis quæ penem inuestiebat.   |
| V  | Sinister ren, similiter pingui ipsius inuolutus tunica.  | s  | Scortum.   |
| X  | Vena in sinistri renis pinguem diffusā tunicam.  | t  | Carnosæ membranæ pars, quæ haud secus atque scortum, vtrunq; ambiebat testem.  |
| Y  | Vena dextri renis pinguem tunicam accedens.  | u  | Tunica à peritonæo inibi pronata, vbi seminarijs vasis iter præbet, estque hæc exterior testis tunica, earum quas testibus singulis proprias peculiareque numeramus. |
|    | Vena arteriaq; dextro reni serosum sanguinem deducens.   | x  | Denudati penis portio.   |

FIGURA XX.

PRIMA tabella sectionem secundum renis longitudinem per gib-

bum

*bum ipsius inductam habet adeo profundam, ut in secundum renis pertingat sinum, interim nulla renis substantia ablata portione.*

*a* Significet igitur *a* dextri renis anteriorem partem, *β* verò posteriorem. *γ* & *γ* orificia sunt ramorū primi sinus renis, seu ipsius membranei corporis, qua inuicem illi rami coeunt. Hic enim rami necessariò per sectionem in mutuo coitu diuiduntur. *δ δ* primi sinus corpus, seu membraneum corpus in quod vena & arteria renis terminantur.

*ε* Foraminulum hoc vrinarij meatus est initium. Vrinarij meatus pars. *λ* Super membraneum hoc corpus *δ* & *δ* insignitum, secundus renis consistit sinus, cuius interius & corpori illi membraneo proximum latus in hac sectione tantum apparet. Eius enim partes, quæ in exteriora ad vtrumque septi ex renis substantia conformati latus producantur, ipsumque sinum vel bipartitum efficiunt, nisi speculo in circuitu sub *ζ* hic & *η* ducto intueri nequis. Septum namque illud præserti sectione in duas partes, anteriorem scilicet & posteriorem diuisum cernitur: ac *η* quidem partem ipsius notat anteriorem, *ζ* verò posteriorem.

*θ* Secundæ etingiei omnia cum nuper commemorata sunt communia, nisi quod vniuersa propemodum renis substantia septum illud constituens, cultello orbiculatim adæ præsit, neque aliter sanè septi illius figuram ob oculos ponere licuit. Conspicitur hic itaque secundus renis sinus vniuersus, at non quemadmodum est bipartitus, eò quod septum abstulerim sinum hunc in exterrori ipsius latere dirimentem. *a* igitur, & *β* & *γ* & *λ* eadē hic quæ in prima tabella notant. Circulus autem inter *a* & *β* ductus, secundū renis indicat sinum. *θ* verò anteriore partem primi sinus, seu membranei corporis, qua hæc in ramos discinditur, i corpo

ris membranei posteriorem partē indicat: adeo vt *θ* & *λ* simul membraneum notent corpus, seu primum renis sinum: *α* autem vrinarij meatus insignitur origo. Tertia tabella primi sinus seu membranei corporis ramos omnes insinuat, renis enim substantia, quæ summis eius sinus ramis adnascitur, penitus derasa est. Atque hæc citra characterū operæ sūt obuia.

## FIGURA XXI.

**V**IGESIMAPRIMA figura sectionis serie decimanonæ succedit. in hac namque costarum aliquot fines effracti, et extrorsum sursumque retorti occurrunt, ut iecoris gibbum ita hic spectaretur, ut ipsius cauum in decimanona figura in conspectu erat. Renes hic etiam pingui illorum tunica denudati se se offerunt. In hac figura venarum arteriarumque seminalium exortus ductusque etiam ostendente, priuatim à caua vena caudice ramulum pronasci effinximus, qui sinistra seminali commiscetur vena. Præterea peritonæum, quæ vasis seminarijs iter præbet, vna cum tunica à peritoneo pronata, testemque & sui lateris vasa seminaria amplectente, dissectum est, & cum seminarijs vasibus testis cum suis musculis abui sunt. Insuper pubis ossa inuicem ita dirempta atque adeo reflexa videntur, ut inuicem insigniter dehiscant, & vesica, & glandosum corpus vesicæ ceruici proprium vna cum ipsius musculo, & penis corporibus, eorundemque progressu oculis subiiciantur. Quod autem à dextro femore cutem prorsus, & à sinistro reliqua ex parte ademinus, neminem ambigere reor.

*a a* Peritonei pars cum septi transuersi portione, & effractis costis fursū extrorsumque reflexa.

*b b* Iecoris gibbum.





*c c* Caua iecoris sedes.

*d* Præcipuum iecoris ligamentum, ad dextrum latus mucronatæ cartilaginis consistens, & hic à iecoris anteriori sede magna ex parte diuulsū.

XIX

TABVLA IIII. LIBRI III.

XXI



|    |   |  |     |   |   |
|----|---|--|-----|---|---|
| e  | Ligamentum iecoris partem in finitrum protēsam septo cōmittens.   |  |     |   | bi ossis, coxendicisque regionem descensus, ac ascensus pariter semen à teste deferentis vasis quod n, & x mox notabitur. |
| f  | Venæ portæ portio, vnā cum arteria & nervis iecur petentibus, & bilis vesiculæ meatu intestina petente, hic vinculo est intercepta, & dein præfecta.  |  | δ   | Venæ seminalis & arteriæ commixtio, & corporis quod variū imagini conferam, initium.  |   |
| g  | Venæ cauæ caudex.   |  | ε   | Varicosi corporis in testem insertio.   |   |
| h  | Arteriæ magnæ truncus, deorsū spinæ exporrectus.  |  | ζ   | Testis intimo ipsius inuolucro obtectus.  |   |
| i  | Principium venæ, pinguem sinistri renis tunicam adeuntis.   |  | η   | Principium, semen à teste deferētis vasis.  |   |
| x  | Radices arteriarum in intestina excurrentium, & ventriculo, iecori, bilis vesiculæ, lieni, & ipsi demū omento ramos offerentium.  |  | z   | Sedes qua deferēs semen vas sursum secundum testis humillimam sedem reflectitur, & à teste ipsi nō amplius connatum, abscedere incipit.   |   |
| l  | Initiū venæ dextri renis pingue inuolucrum petentis.  |  | z   | Hic semen deferens vas nullam amplius conuolutionum ostēdit speciem, at sursum instar nerui teres porrigitur.   |   |
| m  | Vena ac arteria dextrum accedentes renem.   |  | y   | Vesica vrinæ receptaculum.  |   |
| n  | Vena, ac item arteria sinistro reni ferosum sanguinem deducentes.   |  | ξ   | Glandulosum corpus, vesicæ cervicis initio adnatum, & semen deferentium vasorum insertionem excipiens.  |   |
| oo | Dextri renis pingue inuolucrum, ab anteriori sede renis liberatum.  |  | ρ   | Circularis vesicæ cervicem ambiens musculus.  |   |
| pp | Sinistri renis pingue inuolucrum, ab anteriori etiam sede sui renis diuulsū, & peritonæo vnde principium ducit, adhuc connexum.   |  | σ τ | Duo penem constituentia corpora, quorum finitrum à suo principio, quod à sinistro pubis osse ducitur, liberatum est: dextrum autem corpus suo principio adhuc pubis dextro ossi firmatur. Præterea hic S nostri figura in conspectu est, quam penis flaccidus languidusque cum vesica effingit. |   |
| qq | Et dexter, & sinister meatus, quō vrina è renibus in vesicam fertur, q insignitus est.  |  | u   | Venarum, & arteriarū, neruorumq; penem adeuntium series, tam apte ac in huiusmodi figuris id moliri datur expressa.   |   |
| t  | Seminalis vena dextrum accedens testem.   |  | φ χ | Primum, exterius ve testis peculiare inuolucrū à peritonæo inibi pronatum, vbi φ ascripsimus: vbi verò χ locatur, ea eius inuolucris sedes notatur, qua hæc in fine testis parti connascitur.   |   |
| u  | Principium seminalis venæ, dextrū testem adeuntis, quod instar rotundi tuberis prominet.  |  | ↓   | Testis musculus iam dicto inuolucro innatus.  |   |
| x  | Seminalis vena sinistro testi exporrecta.   |  | ω   | Musculus femur mouentium septimus, hic se spectādum offert, quā super coxēdici os deorsū ducit.   |   |
| y  | Venula à venæ cauæ caudice pronata, ac venæ seminali sinistra commixta, vnita ve. Quamuis enim hæc venula rariū occurrat, tamē quum in alijs figuris sinistra vena absque hac delineatur, illaq; hic nihil obscuret, ipsam exprimere visum est. |  | *   | Recti intestini portio.   |   |
| a  | Seminalium arteriarum origo.  |  |     |   |   |
| β  | Surculi, quos venæ seminariæ peritonæo inibi depromunt, quā ipsi connexæ deorsum ad pubis ossa contendunt.  |  |     |   |   |
| γ  | Dextræ seminalis venæ, & item arteriæ, per peritonæum supra pu-   |  |     |   |   |



FIGURA XXII. ET XXIII.

**D**V. & hæc figura inuicem solum differunt in hoc, quod una partem anteriorem, altera vero posteriorem demonstrat: utraque enim instrumenta semini, & urina dicata ostendit.

- 1 Hac numeri nota indicatur anterior renis regio.
- 2 Posterior renis regio.
- 3 Superior renis regio.
- 4 Inferior renis regio.
- 5 Externum renis latus.
- 6 Internū renis latus, in quo 6. 7. & 8. sinum eius lateris indicant. verū 6. priuatim notat eius sinus tuber: 7 autē & 8. sinus eius, angulos impressionesque.
- g Venæ cauz caudex, inibi abscissus, quā deorsum tendens iecur superauit.
- h Arteriæ magnæ truncus inibi resectus, vbi primum sub septo transuerso in peritonæi amplitudinē fertur.
- k Radices arteriarum quæ mesenterio & inferiori membranæ omenti digeruntur.
- l Venæ pinguem dextri renis tunica petentis principium.
- m Vena & arteria dextro reni ferosum sanguinem deducentes.
- n Vena & arteria sinistro reni in fero si sanguinis ductu famulantes.
- o Venæ in pinguem sinistri renis tunicam excurrentis origo.
- q q Meatus urinam è renibus in vesicæ amplitudinem deportantes.
- r Meatum urinæ vesicæ deducentiū in vesicam insertio; ac in dextra quidem effigie orificia indicantur, quā hi meatus in vesicam pertinent, & membrancei processus quoque his orificijs præfecti: in sinistra autem effigie sedes indicatur, quā illi meatus primum vesicæ appllantantur.
- z Seminalis vena dextra,
- u Tuberculum, seu protuberans seminalis venæ dextri lateris principiu.
- x Vena seminalis sinistru petēs testem.
- a Seminalium arteriarum ex magnæ

- arteriæ caudice initia.
- β Surculorum radices, quos venæ feminales peritonæo offerunt, quā illi secundum lumborum regionem committuntur.
- δ Venæ arteriæque feminalium coitus commixtio v. & varicosi corporis initium.
- ε Venæ & arteriæ feminalium ad testem insertio, seu varicosi corporis basis.
- ζ Testis intimo ipsius inuolucro adhuc obiectus.
- η Principium vasis semen à teste deferentis.
- θ Descensus vasis semen deferentis secundum posteriorem testis regionē.
- z Locus quo deferens semen vas rursus secundum testis humiliora sursum fertur, neque amplius testis cōnascitur, vti faciebat a η per θ ad z.
- x Sedes deferentis semen vasis, vbi primum nervi modo citra omnem reuolutionem spiram v. & sursum properat.
- λ Hac sede semen deferens vas ad posteriorem regionem venæ ac arteriæ feminalium reflexum, in peritonæi amplitudinem cōtendit.
- μ Dextri semē deferentis vasis cum sinistro coitus, propter vesicæ ceruicis initium.
- ν Vesica, quæ in dextra effigie priuatim ad aperta est, ipsius communistranscauitatem.
- ξ Glandulosum corpus vasorum semen deferentium insertionē excipiens, ac in dextra effigie longa sectione ad meatus vsque vrinarij amplitudinem dissectum.
- q Amplitudo cavitatisque ceruicis vesicæ, in quam vasa semen deferentia insertionem moluntur.
- ρ Musculus vesicæ ceruicem ambiens, ac urinæ excretioni præfectus.
- σ & τ Duo penem potissimum cōstituentia organa.
- u Venæ ac item arteriæ penem ceruicemque vesicæ accedentes.
- φ Sedes notatur meatus urinae seminiq; communis, quæ reliquo ipsius ductu amplior in penis glande visitur.



## FIGURA XXIII.

**I**n hac figura peculiariter monstrantur testiculi, idq. diuersis modis.

- A B** Testiculi dextri pars anterior.  
**C** Vena & arteria feminales illic abtrūcata, ubi iam ex magna peritonæi amplitudine exēdentes inuicē implicantur, cōmifcenturque, ac corpus, quod varicosum mihi appellabitur, efformare incipiūt; seu huius varicosi corporis quod pyramidi assimilabitur conus.  
**D** Basis varicosi corporis, seu sedes quæ vena & arteria feminalis testis inseruntur, & ramulos in testis intimum inuolucrum, & testis substantiam spargunt.  
**E** Vasis semen à teste deferentis initiū.  
**F** Reflexus vasis semen deferentis secundum testis humiliorem sedem.  
**G** Surfum cōscēdēns deferentis semē vasis portio, & ipsius regio, in qua amplius testis cōnasci definit.  
**H** Præfens effigies deferentis semen vasis portionem ostendit, quæ testis intimo connata erat inuolucro: & foraminula illa asperitatesque cernuntur, quæ in eius vasis sede post se cōtionē conspicuntur, quæ inuolucro illi cōnascēbatur.  
**I** Hac effigie eadem vasis semen deferentis portio, quæ & mox præcedenti delineatur, verum hæc sedē eius portionis ostendit, quæ gibba est, testisque inuolucro non cōnascitur.  
**L** Testis à quo semen deferens vas absectum est, ipseque adhuc testis cum intimo ipsius inuolucro, & varicoso corpore remansit.  
**M** Hac eadem cum effigie L notata indicat, verum ut illa anteriorem testis faciem exprimebat, ita hæc posteriorē, & duæ subsequētes notę utriusque sunt cōmunes.  
**N** Prima venę, & arterię feminalium cōmixtio, seu varicosi corporis conus.  
**O** Varicosi corporis basis; & in testis substantiam ipsiusque intimum inuolucrum insertio.

- P** Testis suo intimo adhuc obductus inuolucro, sed à varicoso liberatus corpore, & superiore ipsius regione ostendens, in qua varicosum illud corpus inseritur. Apparent namque hic foramina ramulorum varicosi corporis, qui (vti dicebam) testis implantantur.  
**Q** In hac effigie intima testis tunicā inuolucrum uel nouacula dissectui, & ex altero latere à testis substantia eius inuolucrum partē R notatam diremi, in posterioraq. reflexi, ut ductus in cōspectum uenirent, qui à ramis inuolucrum intertextentibus in testis substantiam pertinet. Alteram verò huius inuolucrum partē S insignitam, testis adhuc connatam reliqui.  
**T** Hic testis per medium dissectus iacet, vasorum per ipsius substantiam diffusorum, ac V & V naturam distributionisque seriem cōmonstrans. Qui verò modo subsequuntur characteres, duabus grandioribus, & magis precipuis vigesime secundę figurę effigiebus proprij habentur.  
**V V**


## TABULA V. FIGUR. XXV.

**H**æc muliebrium figurarum prima est, in qua sublatis intestinis omnibus, omentum reflexum est sursum, relictum etiā spectatur mesenterium, cuius membranas hic aliqua ex parte diremimus: verum præfens figura in hoc potissimum delineata est, ut uteri & vesicæ positum ita ostenderet, quemadmodum in hac muliere utero nobis nulla ex parte moto, is occurrit; cæterum omnia melius oculis exhibentur, in corporibus non admodum obfess.

- ABC** D. Peritonæi anterioris sedis interior superficies.  
**EE** Mesenterij parstenua intestina dorsales connectens.  
**FF** Altera mesenterij membrana notatur, ab altera, quā G & G insignitam, diuisa. Vtraque autem membrana vasorum per mesenterium seriem, & glandularum vasorum distributionibus interpositarum

naturam

FA BV LA-V-XXVIII LIB-XXVII-III



XXVIII



XXVII

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
|    | naturam indicat.  |     |  |
| HH | Hac mesenterij parte colon intestinum, quâ recto erat proximum, committitur eatur.  |     | significat. Rugæ verò hic conspiciuntur, illæ sunt, quas vteri ceruix in se collapsa, neque alias distenta, inter secandum demonstrat.   |
| I  | Hac mesenterij parte, coli intestini initium, seu ipse cum tenuibus intestinis cōtinuitas, dein cæcum quoque intestinum cōstitebant.  | V   | Vmbilici est portio, à peritoneo inter secandum liberata, & vnâ cū vasis fœtui peculiaribus hic deorsum reflexa.   |
| K  | Rectum intestinum inibi præfectū, vbi colon definit, quæ sedes est è regione connexus sacri ossis cum infima lumborum vertebra.   | X   | Portio venæ ab vmbilico iecur petentis.  |
| L  | Anterior vteri fundi sedes, à qua nihil prorsus auulsum cernitur.   | Y   | Meatus à vesicæ fundi elatissima fede ad vmbilicum pertinens, ac fœtus vrinam inter secundū & intimum ipsius inuolucrum deducens.  |
| M  | Dexter mulieris testis.   | Z & | Duæ arteriæ ab vmbilico huc secundum vesicæ latera proprepentes, atque hac sede magnæ arteriæ ramis pubis ossium foramina potissimum adeuntibus insertæ, seu continuæ.   |
| N  | Mulieris sinister testis, atque huius anterior pars hic tota oculis subiicitur, quum interim dextræ testis modica videatur portio: idque ideo accidit, quod dextrum testem ita delineauerimus, quemadmodum vterque testis membrana tegitur feminaria mulieris vasa deducente, atque à peritoneo nata: finistrum verò testem illa membrana deteximus, quod solius manus nullo adhibito cultro, sit beneficio. Hæc namque membrana anteriori testis sedi nulla ex parte adnascitur, sed incumbit solum. |     |  |
| OO | Membrana à peritonæi dextra sede pronata, & testem dextrum vnâ cum huius lateris feminalibus vasis, ac illis quæ vteri elatiorem sedem implicant vasis, dorso committens, vterumque pariter continens, & denique cum alterius lateris membrana secundam vteri tunicam constituens.  |     | FIGURA XXVI.   |
| P  | Hac in nuper dicta membrana carnes excurrunt fibres, dextrum vteri constituentes musculum.  |     | <b>H</b> ic sublatum est è medio totum mesenterium, ventriculus & intestina. Conspiciuntur autem matrix, vesica, cæteraq; instrumenta ad procreationem necessaria: mamilla item denudata cute, ut melius perspicui natura eius posset. |
| QQ | His characteribus sinistra lateris membrana notatur, quæ illi correspondet, quam nuper OO, indicauit.   | AA  | Venæ ad mamillas subinde excurrentes ab illis, quæ cuti summo humero obducuntur offeruntur.  |
| RS | Vteri ceruicis anterior pars inter R & S ea adhuc obducta tunica, quâ peritonæi partes illi offerunt, quæ ipsi vasa exporrigunt, deducuntque, ac illum peritoneo adnectunt. Cæterum interuallum inter R & S consistens, vteri ceruicis amplitudinem quodammodo  | B   | Venæ ab illis pronatæ, quæ per axillam in manum porriguntur.   |
|    |   | C   | Præcipuum mamillæ corpus.  |
|    |   | DD  | Glandule, ac adeps vndecunque corpori illi glandoso ac C insignito adstratæ.   |
|    |   | FFG | H. Peritonæi anterioris sedis interior superficies. est enim hic anterior peritonæi regio, ad lateris & sursum deorsumque flexa.   |
|    |   | IK  | Venarum ac item artiarum sub pectoris osse deorsum à iugulo prorepentium portiones.  |
|    |   | L   | Iecoris gibba sedes.   |
|    |   | M   | Iecoris cauum, hic quoque aliqua ex parte conspicuum.  |
|    |   | N   | Venæ ab vmbilico iecur petentis portioncula.   |
|    |   | O   | Venæ portæ caudæ hic simul cū vasis ipsi attentis præfectus.   |
|    |   | P   | Vena caua.   |

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| Q   | Arteria magna.   |    | id circum testis latera conficit.  |
| R   | Arteriarum ventriculum, iecur, lienem, omentum, ac intestina petentium radices.  | u  | Vasis semen deferentis ad vterū progreffus.  |
| S   | Principium venę pingue finiftri renis tunicam implicantis.   | xx | Vteri ceruix.  |
| T   | Vena, ac arteria dextro reni serofum humorem deducentes.   | y  | Vafa inferiorem vteri fundi fedem, ac vteri ceruicem implicantia.  |
| V   | Vena, ac arteria finiftro reni serofū humorem deferentes.  | a  | Vena veficam ab illis vasis accedens, quę vteri ceruicem intertextunt; atque hic etiam character vrinariorū meatū infertionē notat.        |
| X   | Principium venę pinguem dextri renis tunicam adeuntis.   | aβ | Veficę fundi posterior fedes.  |
| Y   | Dextri renis anterior fedes.   | γ  | Veficę ceruicis mufculus.  |
| Z   | Siniftri renis anterior facies.  | δ  | Hac fede veficę ceruix, vteri ceruici implantatur.   |
| aa  | Meatus a dextro rene vrinam in veficam deducens, & ad humilium effractus: portio autē huius meatus reliqua, ac veficę adhuc continua, b infignitur.                              | e  | Cuticulares ceruicis vteri orificij caruncula, atque hic vteri colles & ceruicis ipfius orificium, citra characterum operam neminē latent. |
| b   |  | ζ  | Arterię humillimam, mefenterij partem accedentis, radix.   |
| cc  | Meatus vrinam a finiftro rene in veficam deferens.   | n  | Vafa ab illis quę crus adeūt venis, ac arterijs furfum ad abdominis mufculos ascendentia.  |
| dd  | Dextra feminalis vena, cuius initiū elatius d' indicat.  |    |  |
| e   | Seminalis vena finiftrū petens testē.  |    |  |
| f   | Seminalium arteriarum ortus.   |    |  |
| g   | Seminalis arteria dextra.  |    |  |
| h   | Seminalis arteria finiftra.  |    |  |
| ixl | Anterior vteri fundi pars, ac i dextrum fundi obtufum indicat angulum, k autem finiftrum, l verò regionē vteri vbi ipfius fundi confiftit orificium, ipfiusque ceruix inchoatur. |    |  |
| m   | Rectum inteftinū, quò minus vtrumque figurę latus inibi, vbi par utrinque eft ratio onerē, vni duntaxat lateri iā characteres opportunē adhibebo.                                |    |  |
| n   | Venę, ac arterię feminalis portio, vteri fundi fuperiorē accedens fedē.  | A  | Vteri fundi anterior facies, nulla membrana prorfus detecta.   |
| o   | Venę, ac item arterię feminalis portiones testem adeuntēs, & in unū coeuntēs, corpusque inftar pyramidis confluentes. ac p humili corporis bafim notat, testi commiffam.         | BB | Vteri ceruix.  |
| p   |  | C  | Fundi vteri pars glandis modo in fuperiori em vteri ceruicis fedē protuberans.   |
| q   | A nuper dicto corpore eiufmodi vafcula in membranas excurrunt, teftem peritonæo committentes.  | D  | Orificium fundi vteri.   |
| r   | Testis anterior facies.  | EE | Membrana vterū peritonæo connēctens, ipfiusque vafa continens.   |
| f   | Vasis semen a teſte in vterum deferentis initium.  | F  | Sinifter vteri teſtis.   |
| st  | Vasis semen deferētis reflexus, quos   | G  | Vena & arteria feminalis.  |
|     |  | H  | Portio venę, ac arterię feminalium, vteri fundi fuperiorem fedem accedens.   |
|     |  | I  | Portio arterię, & venę feminalium teſtem accedens.   |

FIGURA XXXVII.

**P**RÆSENS. figura vterum vnā cum illum peritoneo alligantibus membranis a corpore exectum commonſtrat. atq; ipſus ceruix adeo hic furſum eſt conuoluta euerſa q, ut fundi vteri orificium in ſpectu ſit. Veficę verò fundum, & ceruicem quoque aperuimus, ut veficę cauitas meatuumq; vrinariorū infertio in propatulo eſſent.

- K Vas semen à teste in vterù deducens.  
 L Vesicæ cauitas.  
 M Vrinariorum meatuum insertio.  
 N Vrinariorum meatuum frustula hic propendent.

## FIGURA XXVIII.

- θ **R**AMVLVS à vena & arteria in membranam excurrentes, quæ peritonæo committuntur.  
 , Portio venæ, & arteriæ testè adeuntium, superiorem fundi vteri sedem petens.  
 x Commixtio venæ, & arteriæ seminalium, quæ instar pyramidis est, & varicibus assimilatur.  
 λ Testis sinister.  
 μ μ Vas semen à teste in vterù deferens.  
 ν Obtusus vteri fundi angulus, in què vas semen deferens insertionem molitur.  
 ξ Hac sede fundus vteri in cervicè terminatur, hacq; regione ipsius consistit orificium.  
 ο π Vteri ceruix.  
 ρ Hic vesicæ ceruix in vteri ceruicem producitur ac definit.  
 ς Vasa sunt inferiorem vteri fundi sedem & ceruicem implicantia.  
 τ τ Ceruicis vteri oris colliculi.  
 υ υ Meatus urinam è renibus in vesicam ducentes.

## FIGURA XXIX.

- F**IGURA hæc vterum cum sua ceruice refert, ea magnitudine, quæ ferè in non pregnantibus visitur. Estq; adueriendum vteri copus à summo ad imum esse dissectum, quo ipsius cauitas melius in còspectum veniat.  
 AA B.B. Vteri fundi sinus.  
 CD Linea quodammodo instar suturæ, quæ scortù donatur, in vteri fundi sinum leuiter protuberans.  
 EE Interioris ac propriæ fundi vteri tunice crassities.  
 FF Interioris fundi vteri portio, ex elatiori vteri sede deorsum in fundi sinum protuberans.  
 GG Fundi vteri orificium.  
 HH Secundum exteriusque fundi vteri inuolucrum à peritonæo pronatum, &c.

- II Membranarum à peritonæo pronatarum, & vterum continentium portionem vtrinque hic asseruimus.

- K Vteri ceruicis substantia hic quoque conspicitur, quòd sectio, quæ vteri fundum diuisimus, inibi incipiebatur.  
 L Vesicæ ceruicis pars, vteri ceruici inserta, ac urinam in illa proiciens. Vteri colles, & si quid hic spectandum sit reliqui, etiam nullis appositis characteribus, nullis non patent.

## TABULA VI. FIGURA XXX.

**H**ÆC est effigies grauidæ mulieris, cuius venter decussatim apertus est, ex eòq; exemptum omentum, ut melius appareat ventriculus, intestina & vterus, huiusq; figura exactius in prægnate obseruetur.

- AB C. Pars interior peritonæi, quæ musculis abdominis adhærescit.  
 EE Portio connexa hepatis partis, quæ sine vlliis costæ còtractione oculis occurrit.  
 FF Ventriculus.  
 GH Coli intestini pars quæ iuncta est vetriculo.  
 IK Membranæ per quas vterus ossibus pectinis annectitur.  
 L Vteri substantia, quæ in hac effigie ad umbilicum vsque ascendit.  
 OO Tunice à peritonæo pronatæ, quæ testiculos, ductus spermaticos, partemque vteri anteriorem obuoluunt, huiusque externam tunicam constituunt.  
 QR Q Colli matricis anterior pars.  
 R Vesica.


## FIGURA XXXI.

**I**N hac figura conspicitur vterus exemptus è corpore, diuisusq; ad rectos angulos, parte sua posteriore quòd venarum illa congeries (secundæ vocant) huius anteriori maxime parti adhærescentes potius videatur.



TABVLA · VI · LIBRI · III ·

FIG · XXX





|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| AB  | CD. Vteri decussatim aperti posterior pars, quam foras euertimus quo alueoli, quibus secundinæ vasa extremitatibus suis coalescunt, apertius cōspiciantur, hos autem coriledones vocant. | M   | Huius membranæ pars interna.  |
|     |  | N   | Vasa quæ producta ex secundis fetus vmbilicum constituunt.  |
| EEE | Secundinæ, posterior pars, quam effingit congeries vasorum, ex quibus per vmbilicum foetus sanguinem allicit.  | *   | Vasorum vmbilicum constituentium nec non vrachi dicti insertio, cæterum canalem ex hisce vasis constatum, quadam sua parte ad vesicam protendi indicauimus figura xxv. caractere Y. |
| F   | Portio tunicæ allantoidis vocatæ.  | OO  | Interius foetus inuolucrum, amnium dictum, hoc adeo est subtile ac pellucidum, vt fetus, ei quæ circumfusus sudor oculis pateant.   |
| G   | Ceruicis vteri portio.   |     | FIGURA XXXIII.  |
| H   | Vena & arteria, quæ deriuantur ex arteria & vena caua statim postquam infra os sacrum diuiduntur, & per vterum distribuuntur.  |     | <b>I</b> n vltima hac figura stat aperta vtraque tunica, a fetu detracta, qui eadem seruat figuram quam habebat, cum ipsis clauderetur.   |
|     | FIGURA XXXII.  | PQ  | Externa foetum obuoluens membrana. P priuatim notat partem eius externam. Q verò internam, quæ adhuc notatur SS.  |
| III | Secundæ.   | R   | Portio secundarum parti externæ dictæ tunicæ adhærens.  |
| KK  | Tunica exterior, foetus cuius extimæ parti secundæ adhærescunt: sed hi characteres peculiariter monstrant vasa, quæ per ipsas distribuuntur.   | SST | In externa parte extimi foetus inuolucrum conspicuum fit, quo modo venæ ex secundis oriuntur, peculiariter SS monstrantur venæ, T verò qua ratione in vmbilici formam concurrant.   |
|     | FIGURA XXXIII.   | VV  | Pars externa amnii membranæ.  |
|     | <b>H</b> ic conspicitur inuolucrum, quo lotium foetus totius gestationis tempore asseruatur.   | XX  | Eiusdem membranæ pars interior.   |
| LLL | Membrana foetum extrinsecus obuoluens, cuius parti posteriori notatæ duobus LL secundæ coalescunt.   | YY  | Distributio vasorum vmbilici, ex qua ab interna parte retro amnium simul ad fetus vmbilicum conueniunt.   |

## IOANNIS VALVERDI

Medici de Humani Corporis  
Anatome.

## LIBER QVARTVS.

In quo de Vitalibus instrumentis agitur.

*In quibusnam corporis partibus Vitales spiritus procreantur.*

## Cap. I.



V<sup>m</sup> summus rerum opifex vitam nobis, quàm stirpium generi præstantiorem esset largiturus, peculiare organum in corpore nostro fabricare ipsum oportuit, in quo tanquam in officina quadam, virtus eiusmodi efformaretur. Cor itaque in nobis condidit ad vitam adeo necessarium, ut nullum prorsus animal sit quantumvis exiguum, cui aut membrum hoc, aut quid ei proportionem respondens non inest. In corde hoc, vitæ spiritus, dicti ob id Vitales, gignuntur; quorum materia sanguinis vapor est, unâ cum aeris portione, quem assiduò per os, & nares inspirando ducimus. Quia verò de membris ad sanguinis generationem requisitis superiore libro verba fecimus; in hoc de his, quæ ad spirituum productionem requiruntur, agere operæ precium erit. Iam neminem latere arbitror, si ad cor aerem deferri volumus, inspiratione opus esse; aeremque intrò ductum per <sup>a</sup> laryngem, ac dein per asperam arteriam ingredi oportere; vbi per pulmonum substantiam diffusus sanguini permiscetur, quem à <sup>b</sup> dextro cordis ventriculo per venam <sup>c</sup> arterialem ad eandem pulmonum substantiam deferri dicemus; ac simul ambo per venalem <sup>d</sup> arteriam feruntur, à qua in <sup>e</sup> sinistrum cordis ventriculum ingrediuntur. Cum igitur antequam ad Cor aer peringat per omnes hæc partes deferri debeat, de illis primum agere expediet, ad quod aggrediar, vbi prius de membrana costas succingente, Pleura ob id vocata, verba fecero, quæ membra simul omnia, perinde ac peritonæum coctionis organa inuestit.

*Cur quorsum effectum.**Animantia omnia corde prædicta esse oportet.**Aer vi ad cor deferatur.*

- a li. i. t. vii. f. i. iii.  
b fi. vii. viii.  
c li. vi. ta. iii. fi. iii.  
d ead. fi. iii. d  
e fi. ix. x.

*De membrana costas succingente, Pleura ob id appellata. Cap. 2.*

P<sup>l</sup>eu<sup>r</sup>a hæc membrana est, costas intrinsecus adhærens, nec non omnibus cavitatis thoracis partibus. Quæ à ligamentis corporum thoracis vertebrarum enascitur, posteriore quidem parte à prima thoracis vertebra ad vndecimam vsque pertinens, quâ <sup>a</sup> magna arteria inter dorsum, & diaphragma perrepat; anteriore verò parte, à iugulo ad finem vsque ossis pectoris, cui septum transversum adhæret; à lateribus à prima costa ad superiorem vsque septi regionem, quæ thoracis cavitatem respicit, hanc vniuersam, ut & reliquam omnem thoracis cavitatem, cui figura correspondet, succingens. Superiori enim parte, ut & thorax, angusta est, & acuminata, inferius verò paulò latior, præsertimque à lateribus; antè brevis, postèrùs tanto longior, quanto postrema thoracis vertebra humilior osse pectoris existit. Tandem, cum thoracis cavitati cui cohærescit, eandem figuram seruat. Interius quæ thoracis cavitatem spectat, lævis, atque humida est, præterquam vbi apices quosdam siue neruosos processus obtinet, ex quibus aliæ nascuntur membranæ, quibus corpus aliquod alligatur, ut quæ potissimum secundum vniuersam posteriorem partem, iuxta thoracis vertebra, quâ <sup>b</sup> intersepiens thoracem membranas producit.

*Membranae costas succingentis nomen, & situs.*

- a li. ii. t. vii. f. 4.  
b q.

- b fi. i. H. KL  
O. fi. ii. GG  
HIK.

Huic

Pleura quibus  
adherens partis-  
bus.

Huic autem membranæ <sup>c</sup> stomachus, <sup>d</sup> vena cava, <sup>e</sup> magna arteria, & vena <sup>f</sup> coniu-  
gis expers innituntur, eique ligamentorum quorundam interuentu connectuntur,  
quæ ab ea educuntur, & in tunicas quasdam abeunt, vasa hæc omnia induentes; pa-  
riter quoque se habet secundum ossis pectoris, & septi à pectore ad dorsum vsque  
ductum; vbi intersepientes etiam thoracem membranæ illis continuantur, dictæ  
ob id Mediastinū, hoc est sepimentum, de quibus capite sequenti priuatim agemus.

Pleure substantia.

Membrana hæc ex duabus admodum tenuibus tunicis constat, estque substantiæ du-  
ræ, nervosæ, albens, inæqualis; ac peritonæum robore nonnihil superat, similem  
cum eo habens functionem. Vt enim illud omnia nutritionis organa induit, sic  
membrana hæc omniū respirationi, ac spiritibus vitalibus inferuentibus orga-  
nis obtenditur; & quemadmodum in illo adipis nonnihil conspicitur, sic quoque  
in hac interdum, licet rarò, internæ ipsius parti adipis tantillum adnascitur, potissi-  
mum verò iuxta dorsum vertebrae, & quæ maiores membranæ huius venæ perreptant.  
Ex hac etiam membrana modo in vno, modo in altero latere præsertim lauo ner-  
uæ quædam fibræ prodeunt, quarum interuentu pulmo ipsi <sup>g</sup> connectitur; & quæ  
diaphragmati adhæret, cordis etiam <sup>h</sup> membranæ magna ipsi amplitudine coalescunt,  
imò re vera ex ea oriri videntur. Externa verò facie, quæ proximis sibi partibus ad-  
nascitur, subaspera, & inæqualis est, vt connexæ inuicem membranæ solent; nec  
adeptamen effatu dignus ipsi adhærescit. Nihilominus tamen haud eque omni ex

Membrana co-  
stas in iugulis sue  
cingit.

parte hæret, costis enim alterius membranæ beneficio, earum vnamquamque priua-  
tim inuoluentis, cui nomen est Periostrion, validius multò connascitur, quàm interco-  
stalibus dictis musculis; neque aliter nervosæ diaphragmatis parti quàm carnosæ lon-  
gè firmitus affigitur. Quæ etiam septo membrana hæc obducitur, bina ostendit i for-  
amina illorum instar, quibus peritonæum peruium esse retulimus, alterum quidem  
gule, alterum verò venæ cavæ paratum; ac <sup>k</sup> scissuram præterea magnæ arteriæ, & ve-  
næ coniugis expertis viam præbentem. Iuxta iugulum haud insigni villo foramine  
perforatur, sed multis exiguis spiraculis peruia est, venas complures transmittenti-  
bus, membranam hanc perreptantes, quibus annectuntur, & à quibus alteram mu-  
tuantur membranam, præter peculiarem, quam obtinent. Hac ergo in parte <sup>l</sup> venæ  
cavæ, ac magnæ arteriæ ramos transmittit, <sup>m</sup> stomachum præterea magnæ arteriæ,  
et <sup>n</sup> asperam arteriam, <sup>o</sup> sextæ adhuc cerebri coniugationis, & septum <sup>p</sup> adeuntes nervos, ac <sup>q</sup> vena-  
rum demum propagines per costarum intervalla repentes. Membranæ huius, Pleuræ  
appellatæ vsus est, præterquam dicta omnia obuinciendi, septo etiam transuerso,  
crassitie ipsius adaucta, robur addendi.

Vasa Pleuram  
transmittentia.

### De Mediastino. Cap. 3.

Harum mem-  
brandarum situs.

Quæ à iugulo ad septum vsque transuersum membranæ thoracem interdiri-  
munt<sup>a</sup> duæ sunt, quæ à membrana costis obducta enascuntur, secundum om-  
nem ossis pectoris, ac diaphragmatis longitudinem, necnon omnes thoracis vertebrae  
exporrectæ, ac duos veluti triangulos ex inæqualibus lateribus conflatos verin-  
que constituentes. Primum enim latus idemque breuius à iugulo secundum pecto-  
ris ossis longitudinem ad usque ipsius extremum, quæ diaphragma ipsi committitur,  
procedit. Secundum isto longius à iugulo itidem secundum dorsum vertebrae ad vn-  
decimam vsque thoracis vertebrae fertur, quæ etiam diaphragmati committitur.  
Tertium longitudine inter ipsa medium à primi extremo proficiscitur, septum in-  
terdiuidens. Præsentibus duæ membranæ mutuo congressu plurimū euariant, à secun-  
do enim latere semper coeunt; à primo tantum inuicem abscedunt, quanta est ossis  
pectoris latitudo; niuersum verò inter unam alteramque membranam spatium in-  
teriacens <sup>b</sup> nervosis quibusdam atque intextis fibris oppletur, & pro varia ossis pe-  
ctoris latitudine amplius, & angustius redditur; à tertio latere tantum inuicem di-  
stant, quanta est nervosæ diaphragmatis partis latitudo; in huiusmodi autem inter-  
uallo multò pauciores, quam in prædicto fibre occurrunt, quo fit, ut longè illo cui-  
dentius sese offerat. Cavitas hæc in homine nihil præterea cõplectitur, quam cordis

Quid mediasti-  
ni membranæ  
interiacent.

li.iii.f.xiii.  
xiii.ABC.  
d li.vi.t.iii.ii.  
e li.vi.t.iii.ii.  
f li.vi.t.iii.FF

g fi.i.iungi-  
tur I ad V.  
h fi.iii. à G  
ad H.

i li.ii.ta.vi  
n.f.

x cad.q.

l lib.vi.ta:  
iii.v.  
m li.ii.t.v  
E.  
n ead.F.  
o fi.vi.a.d  
p fi.iii.II  
q lib.vi.fi.  
bb.

a fi.ii.dex  
GG. sinist  
I I K figu  
I L M.

b pro isti  
de fi.ii.  
iiii.

mem-

membranas, ipsumque met cor, & venæ cauæ partem diaphragma permeantem. Alia quinetiam inter hæcæ membranas cavitates efformatur in medio dextræ, ac sinistræ membranæ, in qua cordis membranæ, ipsumque cor, & vena cauæ, vt diximus, fiunt. Interna facie quæ mutuò iunguntur insigniter asperæ sunt, quæ verò dehiscent leuēs, nulla interim nisi miraculo quodam villa in parte, interiecta pinguedine, quauis ad exteriorem partem thoracis cavitatem respicientem, quæ pars admodum leuīs, & humida est, & pulmōi quibusdam in partibus adnata, adeo vt plurimum copiosus adeps conspiciatur, vt hæc interdum membranæ omento crassiores videantur. Præter huiusmodi adipem, glandulæ quædam in editiore harum membranarum sede conspiciuntur, ad venæ cauæ scilicet distributionem, ex qua etiā multas hæc venarum propagines, vt suo loco dicemus, mutuantur. Membranæ hæc ijs quæ *Aspera arteria* stas succingunt longè tenuiores existunt, estque præcipuus ipsarum usus, vt cordis membranæ ipsumque met cor obuoluant, & quo minus deorsum, ac retrorsum concidere possint, ea contineant. In id similiter conferunt, vt quæ hæc progrediuntur vasa securius ipsis innixa ferantur; nec non etiam vt thoracem duas in partes dirimant; quò scilicet altero thoracis latere forte fortuna vulnerato, pulmonis motus ab altero latere feruaretur, quod nulla prorsus ratione, vt fusiùs postea docebimus, sepro huiusmodi deficiente, fieri possit.

De Aspera Arteria. (Cap. 4.

**L**arynx, <sup>a</sup> cuius principium, siue os, vt <sup>b</sup> primo libro retulimus, primum duorum Lorificiorum est in faucibus occurrentium, ex tribus confatur cartilaginibus, temporis progressu in ossa degenerantibus. Laryngis huius extremo continua est aspera arteria, quam veteres nonnulli arteriam simpliciter appellarunt, quòd aerem duntaxat intus contineat; postquam verò venæ omnes pulsus edentes id nominis acceperunt, aspera hæc arteria quòd dura, & inequali consistet substantia, fuit nuncupata, ad aliarum quæ tales non sunt differentiam, ac eandem semper appellationem apud latinos obtinuit; Italis canna del Polmone dicitur. Hæc vnica est, tenditque vt facile vnusquisque in seipso digito explorare potest, rectà à gutturis principio, <sup>c</sup> gulæ posterius innixa, ad cernicis vsque finem, ac inde latitans ad quartam vsque thoracis vertebram deferitur, vbi in pulmones ingrediens, in duos finditur <sup>d</sup> ramos, qui pulmones alter quidem dextrorsum, alter verò sinistrorsum adfuit. Ipsorum autem vterque in plures variosque ramos dirimitur, per omnem sui lateris partem distributos, qui duas quoque singuli fundunt soboles, hæcque rursus duas, sicque deinceps soboles vnaquæque in duas alias diducitur tenuiores semper euadentes, donec per omnem pulmonum substantiam hunc in modum disseminentur, inuersetque arboris imaginem appositè referentes, cuius caudex in duos, hique singuli in plures ramos diuiduntur. Præcipuus caudex figura plurimum euariat; editior enim principij eius pars larynx appellata, pro <sup>e</sup> laryngis operculi ratione magis minusve acuta, vel obtusa est; anterior autem pars & latera, quod guttur est, eam scuti vereris figuram commonstrant. Et quemadmodum superior scuti huius pars latior est, inferior verò angustior, sic etiam superior laryngis sedes latior inferiore cernitur; imò <sup>f</sup> humillima laryngis pars, quam ex cartilagine constitui diximus, anulo, quo Thraces sagittarij vtuntur similis, eque ferè angusta est, atque asperæ arteriæ truncus. <sup>g</sup> Posterior laryngis pars ferè plana est, processum occisione, quos prima cartilago scuto similis, retrorsum profert; alias enim regio hæc, secundæ, ac tertie cartilaginis sedes, res propemodum foret, quemadmodum etiam se habet posterior tertie sedes, quò primæ cartilaginis alæ nequaquam pertingunt. Variat quoque laryngis figura prout tertia cartilago in laryngis cavitatem magis contrahitur, aut retrorsum magis porrigitur, tanto enim magis primæ cartilaginis apices abdundant, aut foras prominent. Reliquis asperæ arteriæ caudex sibi ferè semper similis est, <sup>h</sup> anteriore scilicet regione, *Aspera arteria* ne, & ad latera teres, & ex cartilaginibus quibusdam ad C literæ speciem, in orbes *Aspera arteria* actis, *substantia* *Sitas* *Distributio in pulmonis* *Laryngis figura ex descriptio*



Anterior sedes.

Membrana laryngem operiens.

Membrana hæ præ tenuitate in figuris exhiberi nequeunt.

Tertia laryngis tunica.

Exterior aspera arterie partis.

Aspera arteria quibus partibus hæret.

Interior laryngis constructio.

Aspera arterie versus.

actis, & membranarum quarundam interuentu colligatis, conflatas; quæ in respiratione magis quàm cartilaginee attolluntur, citra respirationem verò magis concidunt. Aspera hæc arteria anteriore sede thoracis vertebrarum corporibus coaptatur, ipsius verò cartilaginee quamuis in ipso caudice teretes videantur, singule tamen scorsum quadratæ sunt, & longæ magis quàm latæ, atque admodum tenues, licet non æquè in medio, atque ad latera, versus quæ sensim, ac sensim attenuantur, & in membranas abeunt; quæ carnosæ euadentes anteriori asperæ arteriæ parti coalescunt, variamque ipsius figuram reddunt: imò in respiratione posterior hæc pars æquè ac anterior, interdum verò magis teres efficitur; in deglutitione secus euenit, nam versus arteriæ cauitatem agitur; citra deglutitionem respirationemque plana perstat, versusque ipsius cauitatem nonnihil adigitur. Ex hisce cartilaginibus vna eademque serie postis larynx extruitur, quæ arteria distenta tumescenteque tantum inuicem abscedunt quanta est earum cuiuslibet latitudo, ipsa verò concidente, mutuo ferè iunguntur earum membranarum beneficio, quibus eas deuinciri retulimus. Quarum prima veluti amictus quidam harum omnium cartilaginum est, perinde ac periosium ceterorum ossium, quamquam membrana, hæc cartilaginee hæc non solum quàm inuicem hæc connectuntur, inuehit, verum etiam à lateribus, ac posteriùs quàm stomacho continentur. Secunda tunica, siue membrana, arteriam extrinsecus in orbem amplexatur, primæ membranæ validissimè connata; estque admodum tenuis, & peritonæi membranæ propemodum similis, nec non etiam ijs, quæ à costis succingente membrana enascuntur; membranæ huius interuentu arteria conterminis partibus, ipsi verò recurrentes nervi adnectuntur. Tertia tunica internam omnem arteriæ sedem succingit, ipsius cartilaginum membranis robustissimè adhærens; estque linguæ, labris, palato, stomacho, & internæ laryngis regioni communis, longè quam secunda crassior, validiorque, licet tenuis etiam existat. Crassitudo verò non vndeunque parem adipiscitur, in interna enim laryngis amplitudine crassior multo est adipsque aliquid inter seipsam, & laryngis cartilaginee adnatum habet; vbi autem ad iacium rimam pertingit in callum ad latera veluti obdurefcit, magisque multò candicat, intra pulmonem longè mollior rubidiorque occurrit, in caudice verò arteriæ medio inter durum, ac molle se habet modò; in his autem æque ac in illis partibus, rectis quibusdam fibris intexitur. Vniuersa porro arteria ex prædictis constans partibus externa facie aspera est, quemadmodum & aliæ quoque membranæ alijs adnatæ; postica enim regione stomacho adhærescit, medijs nervosis quibusdam fibris, superiore laryngem versus, stomacho communis vtriusque tunicæ interuentu validissimè cohæret, ad latera & penè laryngem stomacho etiam firmissimè adhæret, musculorum beneficio stomachum amplexantur, & in primam laryngis cartilaginem infertorum; anteriore autem sede musculis affixatur, ipsam supergredientibus, ac nervis præsertim recurrentibus. Neque verò arteriæ huius propogines, quod pulmonum substantiæ afferuntur, admodum quoque læues sunt. Interna amplitudine, licet prominentium cartilaginum occasione insigniter æqualis minimè sit, lævis tamen & humida citra ullam prorsus asperitatem occurrit. Necsecus quoque interna se habet laryngis facies, quamuis vnicam vndeque figuram minimè seruet, inferiori nanque sede semper teres est, & eodem obiecta modo, ob secundam cartilaginem, quam perforari monuimus. In medio itaque cum occluditur, rimam veluti fistulæ edit ab anterioribus in posteriora, adeo ut larynx orbicularis intus existat. Rima huiusmodi clausa sinus vtrinque singuli conspiciuntur, rima paululum editiores, qui duas hic veluti coronidas exhibent. Perinde verò ac inferior scissuræ huius pars varia est, prout larynx occluditur, diduciturque, sic quoque superior se habet, etsi exactè nunquam orbicularis visitur, præterquàm quòd prout plus minusve referatur, sic ea magis minusve à posterioribus in anteriora dehiscit. Aspera hæc arteriæ in id effecta est, quòd aeri ingressum, egressumque ad pulmones præbeat, qui suo ingressu vitales spiritus restaurat, egressu verò cordis fuligines, ut ait Galenus, secum educit, simulque vocis materia est; aere nanque impetu foras erumpente laryngis; lingulam percutiente sonitum, ut fistula edit, eumque varium, prout plus minusve aeris

x li. ii. t. iiii.  
c. v. vi. p.  
l. li. vii. c. i. f.  
iii. QSS

m li. i. t. xv.  
f. xi. xii. xiii.

aeris ipsi offerimus, & pro maiori minori'ue adhibita vi, simulque prout magis minusue lingulam prædictam aperimus claudimus'ue.

## De faucium Glandulis, quæ tonsillæ Chirurgis vocantur. Cap. 5.

**Q**uanis tonsillarum explicatio haud omninò huc pertinere videatur; quia tamen hæc alium in locum aptius referri minimè poterant, cum & ipsæ lingulam, laryngem asperamque arteriam irrorantes edendæ voci quodammodo famulentur, de ipsis hoc loco agere libuit. Scire itaque in primis oportet fauces latinis dictas, *Faucius appellationes.* *ισμὸν* quibusdam hoc est angustum appellari, quòd sit hæc omnium totius corporis regionum angustissima, ductusque plurimos, & vasa transmittat; in ipsam namque nali foramina pertinent, in ipsa larynx reponitur, stomachus, linguae radix, os hyoides, multique insuper muscoli, venæ, arteriæ, ac nervi, hac progredientes. In hisce faucibus triplex continetur glandularum genus. <sup>a</sup> Primæ ad laryngis radicem à lateribus asperæ arteriæ consistunt. <sup>b</sup> Secundæ iuxta os occurrunt inter foramina in nasum pertinentia & fauces, vtrinque singulæ, satis insignes, & glandium imaginem ad amulsiim referentes: salivam hæc colligunt, qua quidem os, lingua, fauces, & larynx humectantur. Has Chirurgi tonsillas appellant, quæ tumescerent morbum inferunt, qui vulgo dicitur *Strangogioni*; ipsarumque vlcera, præsertim quæ à lue venerea induta, egrè adeo curationem admittunt, ut nisi sulphuris calchanti'ue oleo tractentur, nunquam ad sanationem deducantur. <sup>c</sup> Tertium glandularum genus penè aures, sub maxillis obuium est. Hæc vulgo *Glandole*, siue *Gangole* nuncupantur, quæ iuuenibus interdum intumescunt, Strumas morbum inuehentes; aliæ verò inflatæ morbum qui *Gangole* vulgo dicitur, inferunt. *Quotuplex glandularum genus.*

## De Columella. Cap. 6.

**P**lurima hæc pars, apud veteres nomina inuenit: Alijs nanque tintinnabulum dicitur, hoc est parua campana, quod aere ipsam veluti campanam percutiente, vox efformetur. Alij ob eandem rationem Gargar, Gurgulionem, siue Gargareonem appellant. Alij ab vtriusque similitudine vnam nuncupant. Alij à parvæ columnæ imagine Columellam, Alij alijs appellarunt nominibus à diuersarum rerum similitudine. Italis vulgò *Campanella*, siue *Vgola* vocatur, cuius figuram, magnitudinem, ac situm describere non est opus, cum læui negotio in hyantis os intuentibus offeratur. Ipsi autem vsus vocis modulatio est, quod in his conspicium euadit, quibus ea vel deest, vel crassior, aut plus æquo longior adest, adeo enim rauescunt, ut loquentes vix audiantur. In id præterea confert, quòd minùs facillè pulueris aliquid vnà cum aere nobis respirantibus in pulmones illabatur. *Columelle appellationes.* *Figura et situs.*

## De Pulmone. Cap. 7.

**P**ulmo duas in partes diremptus est, in duabus illis cauitatibus repositas quas in thorace haberi diximus vtrinque singulas; seiunguntur autem thoracis intersepto, iniquemque posteriore sede coalescunt duarum propaginum interuentu, in quas asperam arteriam cum pulmones ingreditur diffindi scripsimus. Vtraque pulmonis pars aere plena suam thoracis cauitatem ita opplet, ut nihil prorsus inane relinquat; figuram præ se ferens à cauitate in qua continetur præscriptum; ac proinde externa facie costarum cauum respicientem gibbus pulmo efficitur interna verò cauius, cordis nimium gratia, quod in ipsius medio locari audies. Posteriore sede quæ partes ipsius inuicem committuntur inter vnam alteramque ductus quidam secundum longitudinem protenditur, modicè depressus à thoracis vertebrarum corporibus efformatus, qui secundum dorsi incuruationem, non nihil etiam in priora obliquatur. Anteriore sede, dextra læuaque pars paulò magis inuicem abscedunt, propterea



pterea quòd intersepientes membranę, magis iuxta pectoris os quàm versus scapulas inuicem distant. Atque inibi pulmo longè breuior occurrit, quemadmodum etiam & pectus ob tranuersum<sup>f</sup> diaphragmatis situm, linea pulmonem dirimit quā f li.ii.c.vii.a. septum tranuersum respicit, longè cōspectior à superis ad ima, quàm in medio sese offert; adeo vt inferior pulmonis regio vngulam bubulam ex toto æmuletur; parsq; posteriori anteriori, anterior posteriori, totusque tandem pulmo vngulę bubulę exacta quadam proportionē respondeat. Interna etiam fede quā intersepientibus cōmittitur membranis, alias pulmo impressiones sinus ue proponit, cordis membranas, ipsumque cor in medio comprehendentes. Hęc de distento pulmone accipienda sunt; vbi autem collapsus flaccescit, vtraque ipsius pars in 8 duas dirimitur partes g fi.xii.EFG H. fig. xiii. BCDE. superiorem alteram, alteram inferiorem lobos veteribus dictas, obliquę lineę beneficio, è regione quartę thoracis vertebrę incipientis, & ad mucronatam cartilagineam protentę, sic vt humilior lobus superiore maior existat. Huiusmodi autem distinctio, haud æquē in homine, atque in ceteris animantibus conspicua est, quod neruosis quibusdā fibris hæreant: Vt neque alię distinctiones sese in conspectum dant, si in plures quandoque lobos secari pulmonem contingat. Et si nunquam mihi hætenus ea pulmonis portio in quoquam visa est, quę in brutis, puluinaris instar venę cauę subternitur, quintus lobus Galeno dicta. Pulmo vniuersus extima facie leuis, & lubrico quodam humore oblitus est, quanuis in hominum nonnullis, quibus pulmo membranę costas succigenti affirmatur, asper perinde, ac membranę inuicem adhærentes occurrat. Ac in his quidem pulmo ipse subniger, & decolor magis conspicitur, secus quam in alijs in quibus pulmo scapulis nequaquam adhæret, præterquam ipsarum initio, asperę arterię membranarum interuentu, nec non cordi venalis arterię, & venę arterialis beneficio. Qui verò pulmones costas adnatos gerunt, licet vulnus in thorace accipiant, respirare tamen non desinunt, quòd pulmones coarctari nequeant, & his vulnera, quanuis pulmones attingant, citius curatio nem suscipiunt. Humani pulmonis substantia spongiosa, & albicans nõ secus quam alterius cuiusvis animantis est, & triplici vasorum genere, vt suo loco dicemus referata. Extrinsecus tenui admodum membrana perinde, atque iecur inuoluitur, à membranis pulmonum initio enata, quę ab intersepto, seu à membrana costas succigente productę tria omnia commemorata vasa per pulmones distributa inuestiunt: membrana hæc totas pulmonibus, tam posteriùs, quàm anteriùs obrenditur; estque tenuis ac mollis, quòd meliùs colligi possit. Præcipuum pulmonis munus est aerem suscipere, eumque idoneam vitalibus gignendis spiritibus (si tamen gignantur) materiam reddere, simulque noui aeris quem assiduò haurit, frigore, nimium cordis calorem remittere. Quam ob rem haud musculi alicuius impulsu, suā ue sponte agitur, sed hac duntaxat ratione, quia scilicet dilatato thorace musculorum quos ipsius motibus præesse diximus, opera, vacui aliquid inter costas ipsumque pulmonem relinquitur, quod natura nequaquam ferens, attolli pulmones, & vacuum illud occupare cogit; & consequenter quia dilatato pulmone vacua quædam exurgunt, huic protinus occurrunt, hausto ab ipsis pulmonibus per asperam arteriam aere; perinde atque in foliis, dum ignis accenditur, euenire conspiciamus; vbi enim eos diducimus, si cannam flammis proximè admoouemus; extemplo in eam irruunt, quò vacuum illud repleant.

## De Cordis Membranis. Cap. 8.

Cordis inuolueri figura, & situs.

Foramina.

**C**Or inuoluentes<sup>a</sup> membranę in medio<sup>b</sup> intersepientium thoracem membranarum vti antea diximus, consistunt; suntque vesicę similes, pinę nucis figuram æmulant<sup>a</sup>. Incipiunt autem inter quartam quintamque thoracis vertebram, & pectoris os, ad amissim in cavitatis medio, prout cor ipsum postulabat. Vesica hæc siue capsula, quinque ad minimum foraminibus peruia est. Primum venę cauę vti dicemus ingressum, secundum verò egressum eidem præbet; Tertium venam arterialem dictam transmittit; Quartum magnę arterię aditum largitur; Quinto arterialis

a fi.iii. b fig.i. HH fi.iii.LL.

realis vena defertur, quod bipartitum quodammodo est, quia vena hæc priusquam, & hæc membranis egrediatur, in duos truncos diffunditur, quod venali quoque arteriæ interdum contingit. <sup>c</sup> Vasis hæc omnibus huiusmodi membranæ validissimè adhærescunt paulò à corde superius, aliquam sui exortus portionem ab ipsis defumantes; exterior enim horum vasorum tunica, ab harum membranarum exortu adusque cor ab ipsis abscedit, & dilatata, in hoc abit inuolucrum, quod non magis cordis mucronem quam ipsius basim, aut latera contingit, sed ipsum in medio continet. Capsulæ huius reliquum nullum foramen sortitur, estque equale, & vndecunque, tum substantia, quæ tota nervosam præ se fert membranam, tum colore, qualem charta pergamena monstrat, similes, ac vniiformes, sed figura varium, nam ut diximus nonnihil inferius angustatur, in obtusum, & orbicularem <sup>d</sup> mucronem definens, qui ad lævam declinans adeo in priora eminet, ut sinistrum ossis pectoris latus, & cartilagine in ipsum insertas attingat. Nullum prorsus villorum genus membrana hæc adipiscitur; imò simplex quædam veluti tunica est subcrassa, & densa, ac tantæ capacitas, ut cor ea conclusum, & stringi, & dilatari facile possit: facie autem interna vsque quaque levis, atque uuida est; adipem omni intus extraque destituta; qui enim ad huius cum intersepiens thoracem membranæ coalitum adæps conspicitur, ad eas magis quam ad hoc inuolucrum pertinet: quod externa sede asperus est, intersepiens enim membranas adnatas habet, ea sanè ratione quam capite de mediastino proposuimus. Huius tamen inuolucrum mucro, magna que anterioris ipsius regionis pars septi transuersi, <sup>e</sup> neruo circulo insigni spatio connascuntur; anterior autem pars membranæ costas succingenti ad sinistrum suum latus nerveis quibusdam fibris adhæret, quæ sextæ, ac septimæ costæ cartilagine pectoris ossi connectuntur. Vesicæ huic siue membranæ, muneris id conceditum est, ut cor ipsum circumsepiat, simulque aquam contineat, quæ in cunctis ferè hominibus reperitur, quantum in pueris quam iuuenibus longè copiosior; quemadmodum etiam in mulieribus, eodemque modo in his, quæ aliquot antè dies quam qui recens è vita migrarunt, multò maior ipsius copia spectatur. Aqua hæc mea quidem sententiâ, ingenti cordis calori, & siccitati remittendis temperandis ve deferuit.

Exortus.

Capsulæ cordis  
visus.

De Corde.

Cap. 9.

**C**ordis idemmet <sup>a</sup> situs, eadem figura est, quæ capsulæ ipsius qua concluditur, quam pinæ nuci perquam similem esse tradidimus, antè scilicet, ac ponè depressam, in apice verò, paulò latior. Exterior itaque cordis facies lævis tota est, quantum interim, <sup>b</sup> venarum, arteriarumque propapines, ipsum (ut suo loco dicemus) perrepantes, & adæps etiam quem obtinet, aliquid ipsi asperitatis adferant. Editorem quinetiam ipsius regionem venæ, atque arteriæ, quas inibi suo loco haberi dicemus, modicè inæqualem reddunt. Incumbit autem cor quartæ, & quintæ thoracis vertebrarum corporibus, haud magis ad dextram quam ad lævam, neque retrorsum magis quam antrosum, secundum longitudinem vergens. Ipsius basim, thoracis medium adamusim occupat, thorace quidem non pro vniuersâ quam costæ occupant amplitudine accepto, sed anteriori duntaxat ipsius regione à iugulo ad mucronatam vsque cartilagine. <sup>c</sup> Reliquum ipsius in sinistrum latus exporrigitur, sensim, ac sensim angustatum quousque in obtusum mucronem definat, qui anteriori thoracis parti leuiter innitens, inter sextæ, ac septimæ costarum sinistri lateris cartilagine definit. Pro thoracis enim maiori minori ve amplitudine, cordis magnitudo euariet; estque substantia ipsius carnea, & musculorum carne paulò minus rubra sed densior, & villis quibusdam vsque adeo frequentibus tenuibusque intexta, ut oculorum ferè obtutum effugiant; quod ideo effectum est, ne spiritus in eo contenti facile adeo exoluantur. Cordi vniuerso tenuis extrinsecus membrana obtenditur, instar illius quæ iecur inuoluit; cui superiori hac in parte (superiorem partem eam intelligo, quæ latior est, à cuius medio adhæret) ingens duri adipis copia connascitur, ex quo in hominum nonnullis quidâ veluti radij eiusdè adipis deriuant venis adnati

Cordis figura  
et situs.

Cordis tunica  
in corde adæps  
continetur.

Ale cordis.

Anat. Val.

V

proce-

procedentes, quas per cor distribui audies. Editiore præterea ipsius regione <sup>d</sup> alæ <sup>d</sup> fig. iiii. IK. <sup>f</sup> v. B. fig. vi. <sup>f</sup> f. vii. viii. <sup>c</sup> f. ix. x. A.

duæ, siue auriculæ spectantur, altera quidem ad leuam, altera verò ad dextram; eadem qua & cor substantia præditæ, licet aliquantò neruosiore, mollioresque, & cordialis in quouis altero animantē cōsimiles, sint, vnde in earum structura explicanda diutius mihi immorandum esse non duxi. Quisnam ipsarum situs, quæ partes sint intellexisse sufficiat; hæc nimirum vt duarum alarum more collectæ, atque explicatæ cordi locum præbeant, quò id, vbi veluti languens recreari optat, vberiore spiritum sanguinemque, sese diffundens haurire queat; quod egrè sanè duabus hisce alis destitutum moliri potuisset, quæ duarum instar vesicularum, ad cordis dilatationem, constrictionemque laxantur, conciduntque. Ac proinde dextra quàm leua laxior effecta est, nam vt mox docebimus in dextro cordis latere plus sanguinis, in læuo autem plus continetur spirituum; hi verò sinistra etiam auricula non explicata promptius in sinistrum latus pertranseunt; quam sanguis crassior scilicet, & minus fluxilis in dextrum. Atque hunc in modum se habet, facies cordis exterior. Interiorem duo ventriculi occupant, <sup>e</sup> dexter, ac <sup>f</sup> sinister, insigni eiusdem cordis substantiæ septo dirempti, ac tum magnitudine, tum figura varij. Dexter enim longè maior est, & ad cordis mucronem magis descendit cavitatem crescenti lunæ similem efformans; dextro namque latere anteriùsque, ac posterius concavus est, & gibbo correspondet, quod cor extrema edit sede; sinistro latere arcuatus visitur, ob septum inter ventriculorum hunc, & leuam interiaccens, quod sede ad dextrum hunc ventriculum pertinet, in arcu prominet, hancque eadem figuram totus ventriculus à summo ad imum seruat. Sinister ampla quoue basi incipit, sensimque versus cordis mucronem angustatur, pyramidis aut V maiusculi figuram exprimens: septum enim quæ ventriculo huic correspondet, haud gibbum est, vt quæ dextrum respicit, sed concavum. Sinister hic ventriculus <sup>g</sup> medium ferè cordis profunditatis tenet, imò ipsius duntaxat gratia cor re vera extructum videtur, dextrum verò ei extrinsecus <sup>h</sup> instar loculi cuiusdam adherere, quemadmodum in marsupijs plerisque se habere cernimus. Si quidem tam septum ipsum quàm reliquum cordis substantiæ sinistrum ventriculum constituentis, durum est, crassum & solidum præterquam initio, vbi vasorum illinc prodeuntium gratia, minus durum esse oportuit. Substantia verò dextrum efformans mollior est atque tenuior. Porro ventriculi <sup>i</sup> vtriusque septum leuiter inæquale est, ob riuulos quosdam siue furculos in cordis substantiam impressos, qui longè magis in leuo quàm in dextro ventriculo conspiciui occurrunt; neuter verò ex vno ventriculo in alterum permeat, (vt aiunt) quotquot hæcenus hæc literis cōsignauerunt. In his præterea ventriculis <sup>k</sup> fibræ quædam conspiciuntur, neruosi teretes, ac tenues, quarum interuentu membranas in ipsis consistentes cordi herere monebimus. Horum autem ventricularum interest, dextri quidem sanguinem, ex quo vitales spiritus gignantur præparare, quemadmodum ventriculi est, alimenta conficere; sinistri vero elaboratum hunc sanguinem excipere, partemque ipsius in spiritus vitales conuvertere, ac reliquum vnâ cum hisce spiritibus per arterias demittere, vt suo loco dicemus. Cuius quidem vsus gratia ventriculus vterque officina duo, siue foramina obtinuit: quorum <sup>l</sup> primum in dextro ventriculo occurrens dextro basis cordis lateri in humiliori eius regione iuxta dextram <sup>m</sup> auriculam adhæret, cui (vt suo loco dicemus) maxima totius corporis <sup>n</sup> vena correspondet, partim cordis substantiæ, partim dictæ auriculæ innitens; quo efficitur, vt longè amplius quam sit, officium videatur. <sup>o</sup> Secundum foramen multò minus primo est, & in elatissima basis ventriculi huius parte iuxta dextrum commemorati septi latus conspicitur, magnæ <sup>p</sup> arteriæ truncus adherens; atque ex eo <sup>q</sup> vena quædam arterialis dicta exoritur, per pulmones, (vt suo loco audies) distributa; quæ egressum sanguini præbet, per primum officium ingressu, (vti prolixius sexto libro edocebitur.) Sinister ventriculus bina, & ipse foramina eodem modo sortitus est, alterum quidè sanguini, & spiritibus ingressum, alterum verò egressum eisdè præbens. <sup>r</sup> Prius ipsorum, quo illis ingressus patet, admodum patens & orbiculare est, & in demissiori sinistri ventriculi basis parte, iuxta sinistram auriculam visitur, statimque in exortu <sup>s</sup> bipartito scinditur; quod nullo in cā siniam deduxit, s. vi. KL.

**a** cad. L. **ut** in corde etiam diuisionem huiusmodi perdurare arbitrentur. Ex hoc orificio <sup>f</sup> arteria enascitur, venalis dicta, quam etiam per pulmonis substantiam suo loco distribui audies. <sup>u</sup> Alterum orificium omnium primo excepto maximum, in elasticissimæ cordis regionis medio conspicitur, venæ arterialis orificio innitens: atque ex eo <sup>x</sup> magna arteria per vniuersum corpus diffusa egreditur, in <sup>y</sup> duos statim ramos dirempta: per quam vitales spiritus, & sanguis distribuuntur, quibus ingressum præbuerat <sup>z</sup> arteria venalis nuncupata. Ex hisce orificijs, tria priora ad os in sui amplitudine, singula tres membranulas obtinent, postremum vero duas duntaxat. Primum ad <sup>a</sup> primi orificij os, cui vena caua iungitur tenuis habetur membrana orificium circum undique cõplectens; quæ in ventriculi cauitate paulisper procedens, in <sup>b</sup> tres ilico membranas finditur, quæ in triangularem cuspidem singulæ desinunt, paulò supra medium ventriculi longitudinis: ex vnoquoque autem mucrone <sup>c</sup> nervuosi quidam villi prodeunt, ventriculi lateribus iuxta ipsius finem inserti; porro nec membranæ, nec fibræ cordis substantiæ præterquam in exortu, & insertione asfiguntur, fibris eiusmodi quidam delusi, nervuorum principium cor esse existimant. Membranam hanc hoc se modo habentem, dissectionum professores, ob ipsius diuisiones, triplicem faciunt, estque id earum munus, quemadmodum & situs, & exortus ipsarum apertè docet, ut primum hoc orificium occludant, quo sanguis per venam cauam in dextrum ventriculum illabens regurgitare nequeat. Quod quidem tunc præstant cum cor contrahitur; vbi enim dilatatur, tunc ipsæ cedentes, sanguini ex vena caua in hunc ventriculum concedunt ingressum. Eundem serè in modum quo præfens membrana orificij huius principio adnascitur, altera quoque ad principium prioris sinistri ventriculi orificij, ex quo <sup>d</sup> arteriam venalem exoriri diximus, consistit, nisi quòd haud tres in partes, ut illa, sed in <sup>e</sup> duas duntaxat scinditur, æquæ prioris orificij membranis figura similes, ac magnitudine, roboreque dissimiles; ex ampla enim basi in obtusum mucronem desinunt, paulò magis deorsum, quam dextri ventriculi membranarum cuspides, protensum. Ex duabus hisce partibus, altera lèuam ventriculi huius latus, altera dextrum occupat; anteriori enim posteriorique sede nulla reponitur membrana; adeo ut simul ambæ episcopalem mitram appositè repræsentent. Processum horum vterque <sup>f</sup> nerueas quasdam fibras adipiscitur, quæ ab ipsa enatæ, ad ventriculi finem, substantiæ cordis applantantur; in qua <sup>g</sup> sulci quidam ijs paulo maiores conspiciuntur quos in sinistro ventriculo haberi prodidimus. Membranam hanc ob duas quas educit cuspides, geminam veteres fecerunt. Estque idem propemodum ipsius vsus qui & ad <sup>h</sup> primum dextri lateris orificium repositæ; siquidem ut illa dilata cedensque cordi adhæret, & sanguini ex vena caua ingressum in dextrum ventriculum largiatur, collecta verò contracta, venæ, sanguinis regurgitationem in venam cauam prohibet; haud secus quoque hæc introrsum deducta, sanguinem, spiritusque à venali arteria in sinistram ventriculum irruere sinit. <sup>h</sup> Membrana secundo dextri lateris orificio cui arterialis vena coheret adnata à superioribus tam situ, ac figura, quam robore dissidet; ut enim aliæ suos processus, versus ventriculi mucronem obtinent, ita hæc eos versus arterialis venæ truncum ex hoc enascentis orificio, adipiscitur. Præterea haud ex simplici constat membrana, sed in <sup>i</sup> tres admodum dissidentes dirempta est; quarum vnaquæque velut in semicirculum à venæ arterialis trunco exoritur, paululum initio protuberans, ac dein crassior paulò reddita, à corde remouetur, magisque crassescens tubercula quædam in cordis basi impressa producit; hisque tuberculis tres veluti processus, siue apices efformantur, qui sese, ut in puncto contingentes, sub, supraque angulos quosdam constituunt. Ex hisce tuberculis <sup>k</sup> membranæ tres, singulæ in semilunæ imaginem producuntur, nec cordis basi, nec alibi vsquam adnatæ. Latior harum membranarum pars, à corde magis quam reliquæ omnes earum partes remota, illudque ipsarum latus quod cordis basi minimè adnascitur, haud ita recta cernitur, ac si membranæ singulæ absolutù efformarent semicirculum; imò nonnihil introrsum adigitur, neque adeo extrorsum in medio, atque terminis isporrigitur, quibus cordis basi vtrinque committitur. Quum itaque elasticissima hæc, latissimaque harum

Foraminum nra  
branz  
Primi forami-  
nis dextri ven-  
triculi membra-  
ne.

Primi forami-  
nis sinistri ven-  
triculi membra-  
ne.

Secundi forami-  
nis dextri ven-  
triculi membra-  
ne.

membranarum exortus, quâ continuantur, veluti semicirculum efformet, græci membranas has *συμμοειδεις* hoc est elemento quod Sygma dicitur, similes, appellarunt. Ipsarum verò munus est, vt reclusę sanguini egressum præbeant, qui ex vena caua illapsus per primum ventriculi huius orificium ingressus est, occlusę autem sanguinem prius elabi non sinant, quàm idoneus spiritibus vitalibus gignendis à corde redditus fuerit. Tribus hisce membranis totidem alię correspondēt, ad secundi orificij sinistri lateris os, cui magnam arteriam herere dicemus, posite; quę commemoratis similes vsquequaque sunt, magnitudine duntaxat roboreque dissidentes; quemadmodum etiam arteria magna, venam arterialem magnitudine superat. Quomodo autem sanguis hic à dextro ventriculo in læuum, & per quas vias illabatur, tunc opportunè docebimus, quàm de ductibus à corde manantibus verba faciemus. Sicque præsentī libro finem imponentes, ad tertij membri principem in corpore locum obtinentis enarrationem aggrediemur,



# LIBRI QVARTI FIGVRARVM

## EARVMQVE CHARACTERVM

### I N D E X.

#### FIGVRA I.

**P**RESENS figura tantam hominis in dorso cubantis partem ex sinistro latere commonstrat, quātam ostendenda thoracis sedis, sufficere arbitrati sumus. Ab anteriori itaque thoracis sede & lateribus, ac dein ab aliqua colli regione cutem sectionis serie ademinimus, ac dein musculis qui costis obducuntur resectis, costarum ossa à suis cartilaginibus vnā cum pectoris osse liberauimus, & costarum ossibus (vbi inter secundum sit) effractis, costarū cartilagineas sursum versus dextrum latus attraximus, vt thoracis amplitudo, hancq; intersepientes membrana, & pulspo, reliquaq; in conspectum venirent, quae modo in characterum indice significabuntur.

- AA** Sinistri lateris costarum indicantur cartilagines, vnā cū pectoris osse, dextrorsum sursumque tractę.
- BB** Intercostrales musculi interualla cartilaginum occupantes.
- CC** Costarum à cartilaginibus seiunctarum ossa.
- DD** Intercostrales musculi interualla ossium adimplentes.
- E** Clauicula hic nuda, atque in sua sede adhuc asseruata cernitur.
- F** Venarum, arteriarū, neruorumque in axillam perreptantium series.
- G** Exterior iugularis vena hic mox a uulsa cute secantibus occurrens.
- HH** Sinistra thoracis amplitudinē interdiuidens mēbrana, superficie ipsius sinistra hic conspicua, quam etiam **LMN** & **O** indicant.
- II** Septum transuersum ea superficie hic apparens, qua sinistra cauitatis thoracis sedem respicit.
- K** Sedes vbi inter diuidentium thoracē membranarum sinistra septo con nascitur.

- L** Hęc protuberans sedes, cordis gratia hic in sinistrum adeo prominet: id nanque vnā cum ipsius inuolacro inter membranas thoracem diuidentes comprehensum, in sinistrum longē magis, quā in dextrum porigitur, atque huius potissimum tuberi occasione præsentem figurā ex sinistro potius, quā dextro latere expressimus.
- M** Vena sinistro pectoris ossis lateri exporrecta, & sinistrę thoracem interdiuidenti mēbranę varios furculos offerens.
- N** Arteria sinistro pectoris ossis lateri exporrecta, & similiter, ac vena Minisigna ramulos sinistrę thoracem intersepienti mēbranę exhibens.
- OO** Ramuli à vena, ac arteria deducti, qui secundū pectoris ossis sinistrū latus à ingulo ad abdominis regionem pertingunt.
- PP** Nervus septi transuersi sinister, hic conspicuę thoracem intersepientis mēbranę superficiē in progressu adnatus.
- Q** Vena in hominibus potissimum à ingulo vnā cum septi transuersi neruo deorsum excurrēns, & mēbranę thoracem intersepienti ramulos deriuans.
- RST, V** Pulmonis pars sinistram thoracis cauitatem occupans, ac **R** & **S** huius partis sedē notant, quę costis, seu ipsas succingenti mēbranę proxima est, gibba ve cernitur. **T** verō & **V** eius partis sedem indicant, quā priusquam collabebatur, exteriori superficiē mēbranę thoracem interdiuidētis committebatur. Rursus **R** & **T** partis huius pulmonis superiorem insinuat fibrā, seu lobum, **S** autem & **V** inferiorem.



## FIGURA II.

**S**ECUNDA figura, quam erecta non autem humi prostratam finimus, primam sectionis serie subsequitur: etenim anteriori thoracis sede, & lateribus cute, & musculus qui illi adnascantur denudatis; ac costarum cartilaginibus ab ossibus liberatis, ipsiq; ossibus extrorsum effractis, tandem pectoris vna cum ipsi coarctatis cartilaginibus ab utrisque thoracem intersepientibus membranis liberauimus, sursumq; deduximus, ut illius interior superficies obuia esset, & membranarum thoracem interdiuidentium natura accuratius adhuc quam in prima figura exprimeretur.

- A A** Pectoris ossis vna cum costarum ipsi commissis cartilaginibus interior, seu thoracis cauitatem spectans superficies.
- B C** Dux indicantur venę a iugulo pectoris os petentes, ac præter frequentes quas diffundunt ramulos, etiam ad elatiore abdominis fedē excurrentes.
- D E** Dux arterię venas nuper commemoratas ad vmbilici vsque regionē concomitantes, nullibi tamen ut venę ad cutem subeunt.
- F** Glandulę sub elatissima pectoris ossis fede in iugulo repositę, ac vasorum securę distributioni a natura præfectę.
- G G** Dextrę membranę thoracem interdiuidētium membranarū sedes, quę dextro pectoris ossis lateri adnascantur.
- H** Dicitur modò membranę dextra, seu pulmonem spectans superficies.
- I I** Sinistrę membranę thoracis cauitatem intersepientium membranarum pars, quę sinistro pectoris ossis lateri ante sectionem connata fuerat.
- K** Dicitur modò membranę sinistra, seu pulmonem respiciens superficies.
- L L** Interuallū indicatur inter duas thoracem intersepientes membranas inibi cōspicuum, vbi humano pectoris ossi continuantur.

MM

Hec protuberans regio cordis indicatur: cor enim vna cū ipsius inuolucro immotum inter membranas thoracē sepiētes collocat.

NO

**P, Q.** Pulmonis gibbum, sedes ve costis contentima indicatur: neutra namque ex parte pulmonis partes in latera refleximus. Verum **N & O** duas fibras dextrę partis pulmonis indicant, **N** quidem elatiore, **O** vero humiliore, atque ita etiā in sinistro latere **P & Q** tum elatiorem, tum humiliorem.

RR

**S** Septi transversi sedes, quā a mucronata pectoris ossis cartilagine hic insignita, & dein a cartilaginū quę pectoris ossi non coarticularur mucronibus liberaui.

TV

Cutis deorsum a thoracis anteriori sede euerfa, atq; ea superficie conspicua, qua musculus obducebat.

## FIGURA III.

**Q**UONIAM duę præcedentes figurae cordis, ac pulmonis situm abunde indicant, præsentem figurā vtriq; subsequentes vniuersas) tanquam e thoracis cauitate euulsam delineauimus, ne singulis figuris truncum corporis appinxissemus, negotium frustra operosius redderetur. Tertia itaque figura cor suo uestitum inuolucro continet, vna cum pulmone & septi transversæ portione, cui in hominibus magna amplitudine cordis inuolucrum connascitur.

A

Hic venę caue portionē sursum conscendentem, & magnam arteriam præcidimus, tanta vasorum cordis asseruata portione, quāta cordis inuolucro obducitur, aut a qua id inuolucrum potius initium ducit. Vbi enim hic **B** ascripti, illic inuolucrum pertinacissimē caue venę, & magnę arterię, & venę arteriali adnascitur, ab illis vas non secus quā a corde, toto illo interuallo abscedens, quod a **B** ad **C** metitur. **C** enim cordis basis fedē regionem ve indicat.

DEF

Cordis inuolucrum anterior sedes, cordis figuram nuci pineę nō admodū absimilē referēs. **D** enim & **E**

basim notant, F verò mucronem.

G Ab F ad G sedes insignitur, qua cordis inuolucrum septo transuerso in hominibus fecit multò quàm in canibus adnascitur. Cæterum venule hic in cordis inuolucro conspiciunt, non cordis, at ipsius inuolucrum sunt: idemque in hominibus tum crassum validumq; visitur, vt cordis color per illud vix transpareat.

H Septi transuersi pars.

II Septi transuersi nerui.

LM NO. Pulmo, at singuli characteres singulas humani pulmonis insinuant, fibras, lobos &c.

#### FIGURA III.

Q VARTA figura cordis inuolucrum diuisum gerit, ipsiusq; cor & cordis vasa anteriori sede ab inuolucro deteximus, corde interim immoto.

A Sedes, qua cordis inuolucrum vasis supra ipsius basim contiuetur.

BB Cordis inuolucrum ab anteriori cordis sede in latera reflexum.

CD E. Cordis anterior sedes. ac C quidē & D ipsius indicant basim, E verò mucronem.

F Vena caua.

G Arterialis vena.

H Magna arteria. Venalis autem arteria nisi corde in dextrum latus (vti sexta ostendit figura) reflexo, nulla ex parte conspici potest.

I Dextra cordis auricula.

K Sinistræ cordis auriculæ apex.

LL Venæ sunt, ac arteriæ a cordis basim cingentibus vasis pronatæ, atque huc ex posteriori cordis sede, adeoque sinistro ipsius latere antrosum reductæ.

MN O P. Pulmonis indicantur fibræ lobulæ.

Q Septi transuersi pars.

#### FIGURA V.

Q VINTA figura non cum pulmonibus cor exprimit, verum ab ipsius inuolucro penitus liberum: ac in sinistram latus in hoc reflexum, vt venæ caue ad cordis basim continuas oculis subiceretur.

A Cordis dextrum latus, magna q; ipsius posterioris sedis regio.

B Dextra cordis auricula.

C Vena caua, quæ in corde defliscit, aut ab ipso pronascitur.

D Venæ caue portio, septum transuersum permeans.

E Septi transuersi pars.

F Venæ caue portio iugulum petens.

G Venæ pari carentis initium.

H Aggeriæ magnæ radix.

K Portio est nerui sinistri, sexti paris neruorum cerebri, à quo subsequens figura cordis neruulū depromi ostendit.

LM NO. Pulmonis notantur fibræ.

P Vasorum pulmonem ad eundem hic aliqua series conspiciuntur.

#### FIGURA VI.

S EXTA figura cor in dextrum latus ita conuolutum proponit, quemadmodum mox præcedēs id ad sinistram ostendebat reflexum, atque vt illa venæ caua ad cordis basim continuitatem indicabat, ita præsens venalem exprimit arteriam, ac sinistram cordis aurem, at cordis quoque neruulum, cuius ductus, vt esset conspectior, arteriæ magnæ aliquot propagines, & aperiæ arteriæ, et neruorum sexti paris cerebri portiones huic figuræ adnexas reliquimus.

AB C. Cordis sinistram latus, & posterioris ipsius sedis magna regio.

D Venæ, & arteriæ cordis basim cingentes.

EE Venæ, & arteriæ a vasis cordis basim ambientibus deorsum expor rectæ.

F Sinistra cordis auricula.

G Arteria venalis.

HH Arteriæ venalis soboles in sinistram pulmonis partē excurrentes. Quæ verò in dextram feruntur, oculis non patent: quod illarum radix sub corde mox in huius vasis ortu ad dextram pulmonis sedem proropat.

I Venæ arterialis principium.

K Arterialis venæ pars, sinistram pulmonis partem petens.

L Arterialis venæ pars dextræ pulmo-

- nis parti distributa, ac secundum  
posteriorem caudicis magnæ ar-  
teriæ sedem reflexa.
- M Apex dextræ cordis auriculæ.
- NN Vena caua.
- O Magnæ arteriæ caudex.
- P Magnæ arteriæ portio deorsum ad  
spinam detorta.
- Q Magnæ arteriæ portio sinistra maxil-  
lam accedens.
- R Arteriæ magnæ portio iugulum pe-  
tens.
- S Arteriæ magnæ portionis iugulum  
petentis dextra pars, à qua axilla-  
ris dextri brachij constituitur ar-  
teria T. insignita.
- T.
- X Soporaria, seu somnifera arteriæ.
- Y Aspera arteriæ caudex.
- a Dexter nervus sexti paris nervorum  
cerebri.
- b Ramuli, quos nervus a insignitus ad  
dextri recurrentis nervi constitu-  
tionem digerit.
- c Dexter recurrens, seu reversus ner-  
vus.
- d Sinister nervus sexti paris nervorum  
cerebri.
- e Sinistri nuper commemorati nervi  
furculus, sinistræ pulmonis parti  
oblatus.
- f Ramuli sinistri nervi d insigniti, à  
quibus sinister recurrens nervus  
constituitur.
- gg Sinister recurrens nervus.
- b Nervulus secundum venam arteria-  
lem exporrectus, ac cordis basis  
centrum adiens.
- ixlv Pulmonis indicantur fibræ.
- no Septum transversum.

## FIGURA VII.

SEPTIMA. figura cor a pulmone,  
& septo transverso liberum osten-  
dit, cuius dexter ventriculus unica  
sectione adaperitur cernitur ab ante-  
riori sede orificij vena caua ad cor-  
dis usque mucronem ducta, quod id o-  
rificium, & ipsi præfecta membrana  
in conspectum venient. Verum mo-  
nendus hic est dissector, me à Vesalio  
discedere, in hac & tribus proximè  
sequètibz figuris, quod in illis nō sa-  
tis aperte omnia oculis exponeretur.

- A Vena arterialis.
- B Arteria venalis.
- CC Dextra cordis auricula, quæ quod  
cor monstratur apertum, sita est  
in latere sinistro.
- D Huic loco respondet vena arterialis.
- EF Tres membrana quæ principio ca-  
uitatis primæ adhsunt.
- HH Harum membranarū fibræ mucro-  
nem cordis petentes.
- I Inter septum cordis.

## FIGURA VIII.

Hæc figura nihil differt à præ-  
cedenti, nisi quod vena arteria-  
lis ad apertorem inspectionem divi-  
sa exhibeatur.

- A Diffectum venæ arterialis orificiū.
- B Arteria venalis.
- C Auricula dextra.
- D Huic loco respondet foramen venæ  
arterialis.
- EF Ad huius foraminis principium sitæ  
membrana.
- HH Membrana quæ proveniunt ex mo-  
do dictis.

## FIGURA IX.

OSTENDIT VR hic cor, ac ven-  
triculus eius sinister apertus.

- A Sinistra auricula.
- B Arteria aorta.
- CC Duæ membrana, orificij arteriæ ve-  
nalis adstantes.
- D Literæ huic subesse fingitur foramen  
arteriæ aortæ.
- E Fibræ, seu vili apparentes in cordis  
substantia, item ventriculorū in-  
terstitium.
- FF Principium membranarum quæ no-  
tantur CC.
- GG Orificium arteriæ venalis.


## FIGURA X.

PECULIARITER hic ostendun-  
tur membrana orificij ipsius ma-  
gnæ arteriæ.

- A Auricula sinistra.
- B Arteria magna.
- CCC Membrana quæ sunt ad principium  
eiusdæ arteriæ.
- D Huic loco respondet orificium arte-  
riæ magnæ.
- E Ventriculi interstitium.

TABVLA

LIB. IIII



## FIGVRA XI.

**V**NDECIMA figura cor per transversum dissectum ostendit, ut cordis substantia secundum ipsius ventriculos crassities in conspectum veniret.

- A Cauæ venæ pars.
- B Dexter cordis auricula.
- C Arteriæ magnæ caudex.
- D Vena arterialis.
- E Sinistra cordis auris, cui portio appēdet venalis arteriæ.  
Atq; hi characteres cordis basim insinuant.
- F Cordis mucro.
- G G Dexter cordis ventriculus.
- HH Sinister cordis ventriculus.
- II Septum cordis ventriculorum.

## FIGVRA XII.

**D**VODECIMA figura anterior pulmonis sedes, a qua cor præfectum est, delineatur. quæ inferiori,

- A terramq; spectanti bubuli pedis sedi non admodum imagine abssimilis visitur.
- A Stomachi quo cibus in ventriculū fertur pars.
- B Asperæ arteriæ portio.
- C Vena arterialis.
- D Venalis arteria.
- EFG H. Quatuor pulmonis fibræ, seu lobi. Verum G & H priuatim pulmonis sedem indicant septi transuersi gibbo thoracis amplitudinē spectanti congruentem.
- I Septum transversum.

## FIGVRA XIII.

**D**ECIMATERTIA figura pulmonis ex thorace euulsi posteriorem notat sedem.

- A Asperæ arteriæ portio, posteriori ex sede hic conspicua.
- BC DE. Quatuor pulmonis fibræ seu lobi, bubuli pedis superiorē regionem forma exprimentes.
- F Canalis pulmonis.



# IOANNIS VALVERDI

## Medici de Humani Corporis Fabrica.

### LIBER QUINTVS.

Motionis sensusq; organis dicatur.

*De membranis organa hac ambientibus. Cap. I.*



E organis nutritioni vitæque hominis famulantibus duobus præcedentibus libris egimus. Verum quia duohæc principia ad absolutam fabricæ perfectionem minimè satis erant, cum nec ullam in partem moueri, nec variarum rerû in hoc orbe productarû aspectu frui posset, circa quarum notitiam in summi earum opificis, qui solus hominum finis est, cognitionem deuenire minimè potuisset, propterea haud se orbis conditor, minus liberalem hac in re quam in reliquis omnibus, humano generi præstare voluit. Quinimò tertium in eo principium produxit, in quo tanquam in fornace quadam spiritus formantur, visionis, auditus, gustus, tactus, & motus opifices, ideoque animales latinis dicti ex vitalibus procreati spiritibus, quos in corde progigni retulimus. Tertium hoc principium Cerebrum appellamus, in suprema corporis regione positum; non quia tutior illi accommo-

*Qui actum superioribus duobus libris.*

*Cerebrum cur in capite repositum.*

datione alia in parte reponi poterant, arcis nimirum corporis nostri vt sunt, excubito-  
res futuri. Quare situs defectui probè admodum nostri opifex obuiam iuit, capillis ipsum & cute, nec non præduro validoque cranio obtegens, quod instar galeæ cerebrum tutatur, ne faciliè adeo vulneretur; duabus præterea ipsum membranis inclufit, altera crassiore, quæ dura Menynx dicitur, altera tenuiore, cui nomen pia Menynge; quæ cerebrum, ipsiusque processus, ac nervos omnes ambiunt, perinde ac peritonæum nutritionis organa omnia, & succingens costas membrana, organa in thorace reposita complectitur, & quia processus addidi, sciendum est, Cerebro  
processuum caudæ instar adesse, spinalem medullam cõmuniter appellatum, quæ  
a cerebri basi enascitur. & per maximum occipitis<sup>c</sup> foramen egrediens, per dor-

*Cerebri processuum.*

*Prima cerebri membrana.*

a li.vii.ti.fi.  
i.ii.E.fi.iii.  
b cad.fi.i.D.  
c lib.i.t.iii.  
fi.vi.z.  
d fi.i.AAAB

c li.i.v. fi.i.  
M.

ffi.vii.ooo.

sum ad sacri vsque oſis extremum reptat, paulò semper tenuior redditã. <sup>d</sup> Dura  
menynx perinde ac pia, pars est corporis nostri spermatica vnã cû reliquis partibus  
genita; Cerebrum ea obtegit, vbique continuata, nisi quod foraminibus quibusdã  
venarum instar perforatur. Ipsiùs verò figura, & magnitudo oſibus cerebrum, ac  
spinalem medullam continentibus coequalis est, illicque figura confimilis, semper  
enim oſi præterquã supra<sup>e</sup> foueam oſis cunei formis, adhæret, quamuis alijs, quàm  
alijs in partibus firmius. Atque ita tum ob id, tum ob fibras quarum interuentu mē-  
brana hæc cranio committitur, externa facie admodum aspera, & inæqualis occur-  
rit, quemadmodum etiam & ossa, præsertimque iuxta oſium foramina, & proces-  
sus, ex quibus quodammodo enasci videtur, multoque magis iuxta futuras, quibus  
committitur tenuis admodum membranæ beneficio, quæ a pericranio exoritur, &  
per futuras ingrediens, in hanc membranam inseritur. Plerasqua insuper inæquali-  
tates dura menynx ostendit, quibus nunc referendis, non immorabor cùm ex his,  
quæ in oſibus sunt facile innotescant. <sup>f</sup> Præterea dura hæc membrana inter cere-  
brum, ac cerebellum sese insinuat, & superiorem omnem cerebelli regionem obte-  
git, ipsum a cerebro dirimens. Ex medio quin etiam duræ menynge, secundum  
vniuersam



Inter septi cere  
bri figura.

vnuerſam capitis longitudinem à fronte ad occiput, processus quidam educitur, qui deorsum protensus inter læuam dextramque cerebri partem adigitur, falcis & im-  
ginem exprimens, cuius mucro <sup>h</sup> processui octauæ capitis ossis, qui sinus olfactus or-  
ganorum diuidit, proximus est, basis cerebello contermina, acies, corpori <sup>i</sup> calloſo, <sup>i</sup>  
dorsum <sup>k</sup> caluariæ. Processus hi eandem ambo cum reliquo duræ menyngis crassi-  
tiem seruant, nisi <sup>l</sup> qua <sup>m</sup> cerebellum illa obtegit, vbi triplo crassior quam alibi oc-  
currit. In hac insuper tunica sinustres efformantur, vt prolixius sexto libro docebi-  
mus; vnus quidem <sup>n</sup> à coronali ad occipitis commissuram pertinens, duo verò <sup>o</sup> ab  
huius extremo enascentes, & ad suum singuli latius inter cerebrum, ac cerebellū pro-  
gredientes. Horum primus, processum falcis similem crassiorē reddit, cui adhæret;  
& quanuis sinibus hisce adaptis: dura membrana gemma inibi appareat, statim ta-  
men simplex deprehenditur. <sup>p</sup> Intima membranæ huius facies læuis admodum est,  
ac lucida, adipe omni vacans, & aqueo humore madens; hæret autem tenui mem-  
branæ medijs quibusdam <sup>q</sup> venarum, arteriarumque furculis ab vna in alteram por-  
rectis; quod laxè adeo efficitur, vt cerebri impulsus minimè impediatur. Quinimo  
vt cordis inuolucrum, latius paulo effectum est; quò liberius cor tenderetur, sic  
dura hæc membrana paulo amplior cerebro effecta est, vt id extēdi, & colligi posset,  
quemadmodum in his faciliè conspicitur, quibus caluaria ob vulnus frangitur. Su-  
pereffent nunc recensenda foramina; suè ductus, quos dura hæc membrana sibi ven-  
dicat; sed quia hæc <sup>r</sup> primus liber edocuit, illud intellexisse sufficiat, membranam <sup>r</sup>  
hanc per omnia egredi foramina ex quibus nerui prodeunt, quos omnes inueſtit; at-  
que in omnibus partibus peruiam esse, in quas vena quæpiam, & arteria ingreditur;  
medullam item spinalem, neruosque omnes ab ea procedentes obuincire. Duræ me-  
nyngis officium est, venas arteriasque cerebrum enutrientes excipere. Huic <sup>s</sup> tenuis <sup>s</sup>  
membrana proximè subtenitur, longè illa tenuior, molliorque; ac ynæquaque  
læuis, & sibi continua; quæ cerebro adhærens, ipsum extrinsecus contegit; & in om-  
nes ipsius anfractus sese indens, nullam non integit partem, calloſo duntaxat ex-  
cepto corpore, cui aut non obtenditur, aut ita hæret, vt dignosci nequaquam possit.  
Membrana hæc extrema superficie læuis admodum est, & aqueo humore perfusa, in-  
teriore vero sede subaspera, perque ipsam quamplurimæ <sup>t</sup> venarum, arteriarumque <sup>t</sup>

Inter septi sinus.

Interior sedes.

Dura menyn-  
gis foramina,  
& processus.

Tenuis mem-  
brana.

## De Cerebro, et Cerebello.

### Cap. 2.

Cerebri parti-  
tio.

Cerebrum anatomici duas in partes dirimunt; <sup>a</sup> anteriorem alteram, quam Ce-  
rebrum communiter appellamus, alteram <sup>b</sup> posteriorem, quam Cerebellum  
vocat. Anteriorem rursus in <sup>c</sup> dextram, <sup>d</sup> læuamque partiuntur. Verum partes hæ  
omnes inferiori sede sibi continuæ sunt, iuxta capitis basim (basim appello caluariæ  
fundum super quo cerebrum firmatur; ) pars quidem sinistra dextræ continuatur,  
calloſi <sup>e</sup> corporis interuentu, quod ex alterius basi enatum, basi alterius affirmatur; <sup>e</sup>  
alterius item corporis medio, quod huic substratum rectitudinem veluti efformare  
audies; nec non <sup>f</sup> septi beneficio super tertium ventriculum positum tandemque eius-  
dem cerebri substantiæ interuentu copulantur, potissimū ad spinalis medullæ exor-  
tum, qua etiam in partē duobus locis Cerebellum continuatur. Cerebrum vnuer-  
sum vnā cum Cerebello omnem opplet caluariæ cavitatem, cui vtrunque, tum ma-  
gnitudine, tum figura correspondet: quanuis Cerebellum decuplo minus cerebro  
exiſtat, sedemque in posteriore, humilioreque capitis regione quam occiput appel-  
lamus, obtineat, <sup>g</sup> foueas illas, sinus ve inſarciens quos in ima istius ossis parte conſi-  
ſtere monuimus, & foueas quasdam ossium temporalium iuxta <sup>h</sup> mamillares pro-  
cessus, haud interim prædictos sinus altitudine superans, ad mediam nempe occipitis  
regionem, nec vltra temporalium ossium partem auri dicatam protensum. Est ita-  
que Cerebellum latum magis quam longum, profundum ve; superiori parte modi-  
ce depressum; inferiori verò latioris globi modo rotundum; in medio exiguam  
quandam <sup>i</sup> impressionem obtinet, à <sup>k</sup> tuberculo productam, quod occipitis ossi in  
interna

Cerebri sinus, et  
figura, & pri-  
mus cerebelli.

Cerebelli figu-  
ra.

a f. iii. lili.  
b f. vii. ooo.  
c f. viii. RR.  
d f. i. BB.  
e ead. AA.

f f. iii. LL.

g f. v. xx.

h f. xii. LN.

i f. lib. i. lili.

k f. i. x.

l f. ix. C. fig.

xi. CD.

m f. ix. Q.

1 f.x.KL

interna ipsius regione adesse retulimus, cui impressioni dura membrana satis valide adhærescit, anteriori verò sede, quâ<sup>1</sup> eam cerebri partem respicit, quam natibus assilari dicemus, modicè acuminatū est. Reliquam omnem capitis cavitatem cerebrū occupat, cui tam subtus, supraque, quam ad latera, & antrorsum figura respondet, et si posterior pars cerebello contermina, huic magis, quam calvarie figuram habet congeneram. Ac proinde superiori sede, ad latera, & antrorsum, orbiculace cerebrū est; inferiori verò leuiter depressum & inæquale, quemadmodum & calvarie basis ob sinus in maioribus duabus cuneiformis<sup>m</sup> alis, & in frons ossis insculptos. Summatim, cerebri basis ossium capitis figuram insculptam demonstrat. Porro cerebrū vti diximus membrana dirimitur, quæ sese inter læuam, & dextram partem inserit, ex octauis ossis capitis processu per capitis medium ad os vsque occipitis producta. Ast vtrique pars impressiones quasdam penitus exculptas adipiscitur, quæ in obliquos quosdam anfractus actæ cerebri figuram<sup>n</sup> intestinorum inuolutionibus similè reddunt. Impressiones has ad meliorem cerebri nutritionē factas esse arbitror; eademq; de causa longam illam impressionem, quia cerebrum per medium distinguitur factam esse reor, citra quam ingens adeo moles nutiri minimè posset. Atque ideo cerebellum quod longè minus est, impressiones minus profundas, neque in tot sinuosos implexus actas natum est; imò verò tam dextra, quam sinistra cerebelli pars impressiones has æquidistantes secundum ipsius latitudinē obtinent, quæ deorsum protensa, velut in puncto terminantur iuxta nucam, dextræ quidem ad dextrum latus, sinistrae autem ad sinistrum. Cerebri ac cerebelli substantia mollis, ac tenera est, quod æquè in quouis animante, atque in homine animaduerrere licet. Substantia hæc, et si eam nonnulli capitis medullam vocant, à cæterorum tamen ossium medulla differt, cum neque ad ignem eliquetur, neque in famæ etiam, euectis, vti aliæ medullæ solènt, absumatur. Hæc haud vniformem vbique colorem obtinet, iuxta enim commemoratas impressiones, tam inera, quam supera sede, multoq; magis externa facie à tenui menynge vti dicemus obtecta, cerebrum subobscuri, & subcinericij coloris visitur, ita vt coloris quosdam, & ipsæ gyros impressionum conuolutionibus similes, in cerebro efformare videatur. Cerebri reliquum albisimum est, nec conspicua villa vena implicitum, quanuis ferè non minus in benè valentibus quàm phrenitide capitis hominibus, puncta quædam sanguinea occurrant; quod esse nequaquam posset, si nulla ipsum vena perreptaret.

Cerebri figura.

Cerebri impressionum vti.

Cerebri substantia.

Cerebri color.

Cerebri vena.

De Calloso appellato corpore, et ventriculorum septo. Cap. 3.

a f.iii.LL

Cerebrum in dextram, læuamq; partem distingui, & duri cuiusdam, albique instar calli corporis interuentu committi antea retulimus. <sup>a</sup> Corpus id in cerebri medio sitū est, licet postrema ipsius pars posteriori cerebri sedi paulò proximior sit, quàm anterior anteriori; estque album illud, & arcum corpus, quod dextra cerebri parte à sinistra manibus leuiter diducta, in conspectum venit, paulò magis in medio, quàm antè aut ponè protuberans, eum ferè in modum quo capitis vertex, frontem, occiput ve superat. Corpus id non ab exteriori cerebri parte comemoratis anfractibus insignita, sed ab interiore, quæ durior est, & albidior enascitur, ac proinde durum quoque, atque album ipsum est. Iuxta superiorem huius corporis regionem vtrinque ad latera secundum ipsius longitudinem, <sup>b</sup> sinus duo in cerebri substantia impressi habentur, qui vti etiam callosum corpus eò euidentiores occurrunt, quo cerebrum validius sursum obliquè in latera ducimus. Estque ipsorum munus primum à capite delabentem per gibbam corporis callosi superficiem in palatum, & nares deducere. <sup>c</sup> Inferior, intima ve corporis huius facies, leuiter sursum arcuatur, duosque obtinet <sup>d</sup> canaliculos instar quartæ circuli partis, qui secundum corporis huius longitudinē ducti, prominentem in medio lineam constituunt, posteriùs latè, sensimq; ac sensim angustatam, dum duæ quartæ circuli partes velut in punctū committi videantur. Linea hæc paulatim attenuata desertur, rursusq; crassifecit, & in <sup>e</sup> corpiū inseritur quod instar cornicis extrinsecum esse dicemus, septum constituens in medio illius cavitatis, quam sub hoc calloso corpore efformari audies, corpus verò callosum

Callosi corporis sinus.

Superior callosi corporis facies.

Duo huius corporis sinus.

Inferior facies.

Duorum ventriculorum septum.

Corporis callosi  
si visus.  
Septimus.

losum vnâ cū cornice testudinis effigiē refert. Septu id licet eandē cū cerebro substantiâ obtineat, in medio tamē quod ad superiora, & inferiora pertinet, adeo est tenuer, vt facile satis pelluceat, & madidē hostiæ imaginē præ se ferat. Corporis huius officii, vt diximus est, dextrâ cerebri partē sinistrâ cōmittere; Septi verò partes sūt dictâ cavitatē in duas distinguere, simulq; callosū corpus suffulcire quō minus deprimat, aut supra ventriculos concidat, quod citra repentinā mortē contingere minimē posset.

## De Cerebri ventriculis.

## Cap. 4.

Ventriculorum  
cerebri nume-  
rus.

**M**VLtæ ac diuersæ admodum Theologorum, ac Philosophorum de cerebri ventriculis extiterē sententię, omnesq; adeo absurde, vt liquido hinc appareat maluisse eos disceptationibus excruciaci, quā vnus, aut alterius horū laborem in perscrutando cerebro impendere, bruti saltem cuiuspiam animantis, si hominis non poterant, vel nolebant. Dimissis igitur omnibus, quę multi hac de re, protulerunt, insomnijs, dico in cerebro tres duntaxat adesse vtriculos, dextero scilicet, ac sinistrū in ea cavitatē insculptos, quam calloso corpori subijci prodidimus, inter septo diremptam; & alterum in horum duorum medio inferius paulō repositum. <sup>a</sup> Dexter, cui figura, situ reliquisq; omnibus <sup>b</sup> sinister correspondet in dextra cerebri parte, secundum ipsius longitudinem situs est, tantū à fronte, & occipitis ossē remotus, quantum externum ventriculi huius latus à temporibus distat. Interno autē latere per totam corporis callosi longitudinem, haud magis inuicem distant, quā quanta est cōmemorati septi <sup>c</sup> crassities. Vbi verò ad eam cerebri sedem pertingunt, quæ omniariam distincta est, vt pars cerebello incumbens, parsq; frontis os adimplens, <sup>d</sup> multo magis inuicem abscedunt, præterquam enim quod cerebri membranis dirimuntur, plurima etiam cerebri substantia eos interstinguit. Ac proinde dexter vtriculus initio, & sine in dextrum latus magis porrigitur, quā in medio, eodēq; modo sinister in sinistrū latus. Quod si ambo vnâ spectentur initio magis disidēt, in medio magis coeunt. Ipsorū autem vterq; posteriore sede rotundus est, deorsumq; per cerebri substantiā fertur, in priora paululū obliquatus; arcuorq; redditus ibi desinit, vbi olfactus <sup>e</sup> organa, & <sup>f</sup> visorios nervos principium habere audies, supra eā scilicet cuneiformis ossis <sup>g</sup> regionē quā sellæ cōsimilē esse narrauimus, sub media vtriculi huius lōgitudine, à fronte ad cerebellū. Atq; inibi instar cornu mucronis in cerebri substantiā porrectus, deorsumq; protensus, ad cerebri basim in vnā ipsius cōuolutionē definit. <sup>h</sup> Ambo hi vtriculi lęues, & aqueo quodā humore perfusi sunt, imò aqua vt plurimū, præsertim in receter mortuis pleni occurrūt. Quo fit vt magnopere nonnullos irridere soleā, q inopinatē cuiuspiā mortis causā indagātes, caput aperūt, & huiusmodi aquā in eo cōspiciētes, causā in ipsā referūt, minimē interim aduertētes ex naturę id præfati pro esse, vt ad profundē das lachrymas prōptitudo facile attestat, simulq; nōgēs aquę vis, quā tēporis momēto ex oculis prorumpere cōspicimus: eo enim instatū produci existimare planē ridiculū est. Hi ergo vtriculi aquę copiā effusū dignā ferē cōtinēt, parsq; ipsorū superior, quē ad modū & latera, lęuis est, & vnde quaq; equalis, licet quā extrorsū obliquatur tuberculis aliquot prominere videantur. Inferiorē partē reddit aspera <sup>i</sup> sinus quidā ab externo latere posterioris horū ventriculorū partis exortus, & ad cōmunē amborū cavitatē, tertiū scilicet vtriculū prærepēs, quā ad faciōrē pituitæ defluxū cōfert. Huiusmodi etiā asperitū adaugēt, vtriculorū à posterioribus in anteriora reflexus, quo efficitur vt in anteriori posterioriq; imē vtriculi sedis, regione, mōticulus appareat, qui à dextra ad lēuā, versus cōmunē vtriculorū cavitatē declinū tēdēt, humilior enim priorū vtriculorū pars, quę tota septi lōgitudine cōtinuā est, in medio, vbi septū hoc deficit, cavitatē cōstituit, ambobus vtriculis cōmunem. <sup>k</sup> Cavitatē hāc tertiū appellamus ventriculū, ex quo bini educūtur meatus. Alter ex humiliori ipsius regione, vbi vallis ritu cōcauus est per omnē vtriculi longitudinē, rectā deorsum versus ossis cuneiformis foueā porrigitur, in qua glandulā haberi monēbimus capitis pituitam excipientem. <sup>m</sup> Alter, qui magnā ventriculi huius partem constituit, inter cerebri <sup>n</sup> testes, natesq; ac super dorsalis medullę initū deorsum fertur, dum in <sup>o</sup> exiguam admodū cavitatem desinat, cerebello ac dorsali medullā cōmunem, quam aliqui quartum ventriculum nūcupant; & vltērius supra posteriorē

Primus, & secundus.

In cerebri ventriculis aqua se recipi videtur.

Tertius ventriculus.  
Ipsius, riuuli.

a fig. iiii. v.  
M M N N.  
f. vi. E.  
b cad. I. L.

c f. iiii. III.  
d ead. inter  
L & M.

e f. xiii. LL.  
f ead. NO.  
g ead. sub M.  
h f. iiii. LM  
NN.

f. vi. R. S.

x fig. vi. sub  
H & sub L  
f. vii. vii. H  
f. xvi. xviii.  
A.  
m fig. vii. K.  
f. vii. K. L.  
f. x. B. C.  
n f. vii. MN  
f. viii. NO  
PO. fig. x.  
EFGH.  
o lib. vii. t. i.  
f. i.

rem

rem dorsalis medullæ principij partem procedens, per ipsam tantisper fertur dū caluariam sit egressurus, canalis cuiusdam, siue scriptorij calami effigiem ferens: extremum nanque canalis tertij ventriculi, quod nates interiaceret, anumque appositè æmulatur, internam calami amplitudinem constituit; crena verò & cuspidēs calami, in ima canalis parte conspiciuntur, apices autem crenæ calami quæ characteres sinuntur canalis lateribus adamussim correspondent. Meatus hic haud exactè orbicularis est, sed triangularis; inferiori enim sede vnde incēperat, eandem vallis imaginē seruat; in superiore verò parte, quæ P glandulæ venarum, arteriarumque tertium hunc ventriculum petentium diuisioni subiectæ, proxima est, alia est linea, quæ duobus commemoratis meatus lateribus committitur, alia duo latera cum illis constituunt.

p fig.vii. l.f.  
x.D.

q si.viii. K.

r si.ix. l.f.x.  
LMNO.

¶ Soler & interdum ex imo meatus istius angulo, statim atque inter cerebri testes ferri incipit, alter deduci meatus, qui cerebri substantiam peruadens, in pituitæ colatorium terminatur. Tribus hisce ventriculis, r alius insuper accedit, qui exigua cavitates est, dorsalis medullæ initio, & cerebello communis, in quam tertium ventriculum pertinere tradidimus, quæque quartus ventriculus cunctis dicitur, etsi non video quā benè id ei nominis adoptent, cum à cerebri substantia haud vndique comprehendatur, quod ad ventriculi constitutionem requiritur. Sed ventriculus ne, an non, appelletur, parum omnino interest; illud intellexisse sufficiat, ipsum adesse, nihilque præter aquam in se continere. Primus autem & secundus, præter aqueum humorem, re te quoddam ex numerosis, ac tenuissimis arterijs intextum continent, quod plexus propterea dicitur, de quo prolixius suo loco sermonē habebimus; tertius verò s ænam admittit plexum efformantem. ¶ Præterea tres hi ventriculi tenui admodum membrana intus succinguntur, vti optimè Galenus aduertit, quanuis Vesalio fecus videatur, quam piæ menyngis portionem esse pro certo habeo. Quartus ventriculus nulla membrana obducitur, ideoque ventriculi appellationem minimè meretur. Horum ventriculorum munus est, vti maxima medicorum, & philosophorum pars prodiderunt, animales procreare spiritus, quod & ipse quoque arbitror. Quæ autē ratione gignantur, quæ item ipsorum alij alias edant functiones, decerni posse existimare, ridiculum apud me est.

Quartus ventriculus.

In primo, ex secundo ventriculo quid continetur.

Ventriculorum cerebri vsus.

s lib.vi. l.iii.  
fi.ii. Q.  
t si.iii. v.oo.  
fi.vi. MN.

### De cerebri corpore testitudinis faciem præ se ferente. Cap. 5.

a si.iii. LM.  
fi.v. ST. fig.  
vi. BC.  
b si.iii. LL.

c si.v. S. continuatur T.  
& in vi. BA,  
ad AC.

d si.v. V.

e si.vi. iuxta P.

f si.v. a T. ad S.

g cad. ab T. ad V. & ab S. ad V.

h cad. o. o. fi. l.iii. o. o. fig. vi. M, N.

**A**D cerebri medium, sub duum priorum ventriculorum septo a corpus quoddam areponitur, tenue ac fornicis ritu arcuatum, eiusdē cum b calloso corpore substantiæ, magnitudinis, atque vsus. Id ex posteriori dictorum ventriculorum parte quā in priora reflectuntur exoritur; parsque ipsius è dextro pendens ventriculo ei committitur, quam sinister ventriculus educit; & ambæ simul c corpus quoddam constituunt latum, quod statim ab ortu à ventriculorum substantia remouetur, sicque antrorsum tendit, angustius vsque redditum, dum in d apicem desinat, iuxta anteriore e tertij ventriculi sedem; quæ in parte apicis huius interuētum cum cerebri substantia coalescit, duobus quidem ventriculis stratum, tertio verò tectum præstans. Corporis huius figura triangularis est, ex inequalibus conflata lateribus: f primum enim idēq; breuissimū g ex posteriori dextri ventriculi sede ad eandem sinistri pertinet; secundum ac tertium alterum dextri, alterum sinistri ventriculi latera constituunt. Iuxta ipsa verò h plexum illum arterialem ferri audies, quem in duobus prioribus ventriculis conspici tradidimus. Anguli omnes trium horum laterum inferiore duntaxat regione cerebri substantiæ committuntur, ad latera enim nullatenus coeunt; superiore autem parte, acutus tantum angulus in priora vergens ipsis copulatur. Inferiore sede corpus id alteram duntaxat faciem in arcum prominentem nanciscitur, tertio ventriculo incumbentem, ex qua corpus cornicis nomen adeptum est. Extima facie, quæ gibba est, in medio secundum longitudinem extuberanti linea insignitur, cui septū inniti diximus, priores duos ventriculos dirimens. Corpus id perinde, atque corpus callosum insignis tenuitatis membrana obducitur; in id productum, vt tertium ventriculum obtegit, simulque cerebrum sustineat, quō minus super ipsum concidat.

Corporis tertius finis.

Figura.

Vfus.

## De Cerebri glandula pinea nucis imaginem referens. Cap. 6.

Glandula huius.

**I**Nxtra posteriorem corporis <sup>a</sup> huius in cornicem extructis sedem, <sup>b</sup> glandula quædam reponitur pineæ nuci perquam similis, *κωνία* veteribus appellata. Quæ à cerebri basis substantia nascitur, <sup>c</sup> meatus conspicitur, à tertio ventriculo in quartum pertinens; hæc mucronem suum habet sursum spectantem; & editiori anteriorique cerebri <sup>d</sup> testiculorum sedi innititur; ac plerumque in cerebri extractione, venæ cuidam hæreere solet, quam hæc perreptare docebimus, cui dum in varias propages discinditur, pro falcro est.

Vfus.

## De testiculis natibusq. cerebri. Cap. 7.

Corporis huius sicut.

**I**N cerebro etiam, inter anteriorem <sup>a</sup> cerebelli <sup>b</sup> posterioremque cerebri partem; Inec non inter spinalis medullæ initium, ac superiorem cerebri partem cerebello incumbentem, aliud <sup>c</sup> corpus visitur, cuius infima pars duabus mutuo commissis natibus, editior verò duobus testibus confimilis existit, vnde illa *γαστήρ*, hoc est natus, hæc vero *διδυμίων* hoc est testiculus dicta est. Corpus id anteriore, inferiorique fede cerebro committitur, imò ipsius interuentu dextra cerebri pars sinistra copulatur: à lateribus verò, superius, ac posterius nulli adnectitur parti, imò à tenui meningi, ut & vniuersæ cerebri superficies obtegatur; atque ob id eandem tum substantiâ, tum colore cum cæteris partibus extra cerebrum positis obtinet. Munus ipsius est, cerebrum quò minus super meatum à tertio ventriculo ad quartum tendentem concidat, ipsumque obturet, continere.

Figura.

## De Vermicularibus cerebri processibus. Cap. 8.

Horum processuum situs, &amp; figura.

**C**erebrum anteriori, atque infima sede, processum obtinet, qui retrorsum progreditur in gyros quosdam vermis, aut tinea ritu actus; hic duos educit apices, quorum <sup>a</sup> alter anteriorem quarti ventriculi sedem, <sup>b</sup> alter posteriorem respicit, eandem ambo figuram seruantes, vnde græcis *σκοληκοειδής* hoc est vermi formes dicuntur. Quæ horum processuum partes sint, vti apud me incertum est, sic illud, pro rato habendum ipsorum neutrum <sup>c</sup> meatus <sup>d</sup> orificio obturando famulari, qui à tertio ventriculo in quartum proficiscitur. Nam nec illi voluntario quo id præstare valeant, motu pollent, nec meatum occludi necessum est, si per eum animales spiritus ad spinæ medullam deferri debeant, ut concors est omnium sententia.

Vfus.

## De Pelui, &amp; Glandula cerebri pituitam expurgantibus. Cap. 9.

Peluis figura.

**I**N cerebro duos haberi meatus expurgandæ pituitæ dicatos antea retulimus. Eorum <sup>a</sup> prior, frequentius occurrens ex tertio ventriculo exoritur, & supra ossis cuiusvis forme <sup>b</sup> foueam terminatur. <sup>c</sup> Alter perquam raro visitur, longè arctior, prodiitque ex <sup>d</sup> meatu à tertio ventriculo ad quartum, sub cerebri natibus exporrecto; ac in priora deorsum sensim protensus fertur, donec in prioris meatus extremum pertingat, vbi orificium ex ambobus exurgit. Ad <sup>e</sup> orificij huius latera, ex tenui meningi, cerebri basim succingente <sup>f</sup> apex quidam, siue processus educitur, similem cui reliquo ipsius substantiam obtinens, nisi quòd gracilioribus, frequentioribusque venis hic intextitur. Processus huius initium infundibuli oris imaginem eleganter exprimit; sensim nanque infundibili ritu in arctum cogitur, donec tandem in angustam desinat fistulam, quæ duræ meningis foramen traiciens, supra glandulam desinit, cum eiformis ossis sedi insidentē, inferius orbicularem, superius verò foueam quadratam in medio sinuatam, qua pituitam excipit. In fundibulo hoc tanquam colo vniuersa capitis pituita percolatur. Ipsamque excipiens <sup>g</sup> glandula, vti diximus, humiliori sede orbicularis est, superiori leuiter depressa, à lateribus rotunda, & ad tetragonum acc-

Glandule figura.



accedens. Substantia constat paulò quàm cæterarum glandium duriore, tenuique vndique membrana obducta, quæ à membrana ex qua peluim efformari diximus, exoritur, aut à membrana caluariam inibi obtegente, qua efficitur, vt dura membrana caluariam minimè contangat, quæque glandula hæc alligatur: Cuius h<sup>1</sup> sopo<sup>1</sup>ralis arterie propagines, vt dicemus, innituntur, quæ rete admirabile, (vt dissectionis pro-  
 i fig. xix. CD fessores quidam existimarunt), nullum constituunt. Ad glandulæ huius latera<sup>1</sup> cana-  
 EF. les duo vtrinque descendunt, alter in priora, qui<sup>k</sup> in foramen desinit, l<sup>1</sup> secundo ce-  
 G. rebri neruorum pari egressum præbens; alter in posteriora magis descendit, & per  
 i fig. xliii. xv. inæqualem asperamque scissuram ducitur, cuneiformi, temporum, & occipitis of-  
 G. si communem, quæ tertio cuneiformis osis foramini proxima est, insigniori sopo-  
 ralis arteriæ ramo ingressum largienti. Hi omnes meatus expurgandæ cerebri pitui-  
 tæ opitulantur, duo quippe riuuli, quos in cerebri substantia super osse cuneiformi  
 insculpi diximus, ventriculorum humorem expurgant, & in peluim deferunt, siue  
 infundibulum. Hoc verò infundibulum, superius latum est, tū meatum in ipsum  
 desinentium gratia, tum dextri, sinistrique ventriculi capitum, quæ inibi desinunt,  
 excipiendorum occasione. In id etiam capax ad eo huiusmodi infundibulum extru-  
 m fig. iii. LL. ctum est, vt si quid pituitæ, humoris, ve super<sup>m</sup> calloso corpore, aut in<sup>n</sup> sinibus in ip-  
 a cad. MM. so incisus colligeretur, id facile in infundibulum piæ menyngis beneficio illabi pos-  
 set; siue nanque à posteriori, siue ab anteriori callosi corporis parte humor huiusmo-  
 di defluat, semper in duram menyngeam, quæ cerebri basim inuestit, hincque in co-  
 lum prolabitur. Quod (quò declinuius fertur) eo angustius redditur, pituitam om-  
 nem excipit, eamque per exiguum quoddam in tenui menynge incisum foramen  
 reiectans, in commemoratæ glandulis centrum procumbere sinit. Ex qua per sinus  
 o li. i. v. f. i. illos siue riuulos, quos iuxta cunei formis osis<sup>o</sup> foueam exoriri tradidimus, pituita  
 M. deducta, partim per foramina in palatum pertinentia illabitur, partim per ea, quæ in  
 oculos pertinent, partim per alia caluariæ foramina, neruis quidem egressum, venis  
 verò atque arterijs ingressum præbentia, nullum præterea peculiare foramen obtinens  
 per quod expurgetur. Neque vllus eam ad nares meatus deducit, cum per eas pitui-  
 ta secundam naturam minimè excerni soleat, sed in materiæ duntaxat exuperantia,  
 vt in coriza & atque in his eorum omnium, quæ ad cerebri historiam pertinent, tra-  
 ctationem absoluiamus; De veterum nanque plexibus alijs quidem reti; alijs verò se-  
 cundinq̃e similibus, sexto libro seorsum agemus.

Meatus pituitæ  
in expurganti-  
bus.

Infundibulis  
piæ.

Pituitæ per na-  
res fore non ex-  
purgatur.

De sensibus exterioribus.

Cap. 10.

COrporis nostri compage, ac structura in mediū propofita, tribusque in eo po-  
 sitis principijs, ipsius nunc perfectiones nobis pertractandæ superessent. Nam  
 præter nutritionem, vitam, ac sensum, exterioribus quibusdam sensibus opus ha-  
 buit, quorum ope in productarum rerum, & consequenter in ipsarum opificis noti-  
 tiam melius deuenire possemus. Deus igitur tam homini, quam bruto ynicuique ta-  
 ctus in primis, & gustatus sensum largitus est, quibus noxiū à salutifero discernitur;  
 secundariò auditum, quo tum doctrinas, ac scientias, quibus perfectiores euadimus,  
 tum etiam vocum discrimina; & sonorum concentus audimus, quibus in celestium  
 quodammodo cōcentuum, & animæ nostræ constructionis cognitionem manu du-  
 cimus. Post hæc olfactus sensum à Deo accepimus; ac postremo visum, solam omnis  
 cognitionis originem; sine quo quidquid de mundi machina disceptatur, quidquid  
 scitur, semper hominem latuisset. Nisi enim prius Cælum, Solem, Lunam, Sydera,  
 ipsorumque motiones, tenebras in super, ac lucem, intuiti essemus, quibus omnibus  
 in naturalium causarum, ipsorumque motoris notitiam impellimur, & excitamur,  
 dubio procul bonorum omnium, quæ in hac vita in nos conferri poterant, præstan-  
 tissimo careremus. Quia verò de sensu auditus primo libro disseruimus, de olfactus  
 autem Gustatus, & Tactus instrumentis vna cum neruis acturi sumus; hic de oculi  
 duntaxat, verba faciamus.

Visus sensum  
exteriorum præ-  
cipuus.



**D**iximus primo libro inter frontis, & primum quartumque superioris maxillæ os orbicularem utrinque cavitatem efformari, quæ introrsum acta velut in trianguli mucronem definit; cavitatem hanc oculi orbitam cõmuniter appellant in qua oculus consistit; secundo autem libro musculos ipsius motores prosequuti sumus. Nunc peculiarem ipsius constructionem perscrutari operæ precium erit. Scire igitur oportet <sup>a</sup> humanum oculum absolutæ rotunditatis esse, atque ex triplici humore natura propemodum aqueæ constare, vnde eiusdè & ipse vniversus naturæ est. <sup>b</sup> Horum humorum primus, fuso vitro similis est, quia pellucidus, adeoque liquidus, vt ab oculo exemptus, ilicò naturalem suam figuram amittat. Hic græcis *υαλοειδης*, Latini vitreus dictus est, qui plus quam sex partes oculi cavitatis occupat; estque posteriori sede globosus, anteriore planus; & exiguum in medio sinu edit; in quem alius <sup>c</sup> humor longè durior excipitur, crystalli modo pellucidus, vnde crystallinus humor dictus est, cuius figura exactè ferè lentis imaginem exprimit, vnde ipsum nonnulli *καρνεϊδης* appellantur. Humor hic externa facie admodum levis, & lubricus est, & tenui cōmodum tunica obductus, aranearum telis simili, atque aranea ob id nuncupata; posteriori sede nulla tunica obtegitur, humore scilicet vitreo vti diximus exceptus. Qui anteriore, ac posteriori sede tenuissima quadà <sup>d</sup> tunica includitur, quæ (vt mea fert opinio) <sup>e</sup> membranæ aranæ pars existit. Præter hanc membranam, alia insuper posteriori tantummodo huiusce humoris parti obducitur, è visorij <sup>f</sup> nervi substantiaeducta, quem in centrum posterioris oculi sedis è regione pupillæ adamus sim inferi tradidimus. Ad hæc igitur partem nervus iste perductus, mollior paulo ipsius substantia redditur, & in membranam dilatatur, posteriori vitrei humoris regioni obductam, & <sup>g</sup> quibusdā venarum, arteriarumque propagini bus, vt dicemus, conspersam. Tunicam hanc plerique inter alias minimè retulerunt, quòd aliarum membranarum modo dura non fit, sed mollis instar mucij; in se nanque collecta cerebri substantiam aqua liquefactam appositè refert, explicata verò rete paruum emulatur, ac propterea *αμφυβελος* <sup>h</sup> dicta est. Tertia oculi tunica, quæ secundæ obducitur, nullatenus interim ipsi colligata ex tenui menynge <sup>i</sup> visorium nervum induente producit, totumque oculum, tam antica, quam postica parte inuoluit, figuram edens rotundam, nisi quod antèrius, vbi oculi nigrum pertingit, leuiter <sup>j</sup> introrsum comprimitur; atque in huius compressionis medio exiguum quoddam foramen visitur, oculi pupillam constituens. Tunica hæc vix acino, cui exemptus sit pediculus, & leuiter introrsum actò, per quam similis est, vnde ipsam græci *παρχειδης*, aut *ρῶνα*, Latini vucam nuncuparunt. Aliquibus etiam *σανχειδης* appellatur, quòd ex dura menynge procreetur, aut quòd per eam venæ oculum cunctantes diffeminantur, quemadmodum per tenuem menynge, quæ cerebro alimentata porrigitur, Tunica huic <sup>m</sup> alia circunducitur, oculum vniversum obtegens; proditque ex dura menynge visorium nervum inuolvente, quæ vbi ad posticā oculi regionem pertingit, statim dilatatur, & durior, crassiorque reddita, oculum circumcirca, tam anteriore quam posteriore parte obtegit. <sup>n</sup> Posterior tamen ipsius pars, à visorio nervo ad nigrum oculi porrecta, longè durior est, & alba, non pellucens, vt nec dura menynx; vnde *απληρώτης* hoc est dura dicta est. Ipsi <sup>o</sup> reliquum, vbi scilicet oculi nigrum consistit, laternæ cornu imaginem præ se fert, ex duabus enim squamis extrahitur, leuibus pellucidis, & cornu instar duris, præsertimque in senibus quibus adeo obdurescit, vt obtutum ipsi adimat, eamque sibi ipsis radere cogantur. Partem hanc præsentis tunicæ, veteres à cornu effigie *κοραρχειδης*, huc corneam nunc cuparunt. Ac ipsius partium, tam in substantia, quam in appellatione varietas nonnullos in eam sententiam adduxit, vt plures vna esse arbitrantur; at ipsius cõtinuatio liquido attestatur, haud plures vna esse, quæ interna facie dum ad oculi nigrum pertingat, <sup>p</sup> vucam citra rei alicuius interuentum amplexatur; imò verò quibusdā <sup>q</sup> venarum, arteriarumque furculis inuicem hærent, quos mutuo sibi ipsis porrigit, perinde

Oculi structura.

Humor vitreus.

Prima oculi tunica.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Cornu eadem ac dura.

a. tab. iij. f. i.  
xix. li. ii. ca.  
xv. f. xx. xxi  
xxii. xxiii.  
b. t. iij. f. i. G.  
fig. iij. v. vi.  
viii. a.

c. f. i. A. f. ii.  
iii. f. v. T. f. i.  
vi. v. fig. vii.  
x.

d. f. xi. xii.  
e. f. i. B. fig. x.  
d. f. xii. i.  
f. fig. i. D. fig.  
xiii. f. x. xv.  
o. f. xvi. a.  
g. f. xviii.

h. f. i. G. fig.  
xiii. xv.  
i. f. i. F. f. xv.  
o. f. xvii. f.  
x. fig. i. D. f.  
xv. a. f. xvii.  
a.  
l. fig. i. H. fig.  
xiii. m. fig.  
xv. 7.

m. f. i. M. f.  
xvi. fig. xvii.  
7.

n. fig. xvii. à  
nervuo ad cir  
culu nigrū.  
o. t. iij. fig. i.  
n. f. vi. xvii.  
x. y. fig. xix.  
b. a.

p. ead. f. i. xv.  
u. u.  
q. ead. tt. f. i.  
xv. pp.

r ead. f. i. in  
ter. N. & I.  
s f. x. v. inter  
duo qq  
r ead. f. vii.  
y. f. viii. b.

perinde ac cerebri meninges solent, præsertimque circa iridem, vbi validissime co-  
hærescunt. Ab iride verò in priora, tota ea pars, (quæ cornea dicitur) ab ea<sup>r</sup> abscedit,  
vnea enim vti diximus introsum inibi<sup>s</sup> adacta est. Intervallum hoc inter duas hæc  
tunicas interiacens, humore quodam oppletur, qui ab aque similitudine *ιδανδης*  
hoc est aqueus dicitur; Alij quod ovi albumen referat, albuginem vocantur. Caus  
haud ea copia est, quam sibi Vesalius in animum induxit, oculo enim mortui etiã ho-  
minis referato, haud plures quàm sex, septem<sup>ve</sup> aquæ guttæ profiliunt. Humor is vi-  
treo longè liquidior est, quod si quando instar cæpæ in volucris crassescat, suffusione  
committens, tantisper visum adimit, dum acu tenuissima in tunicam corneam ada-  
cta membranam illam, siue suffusionem pupillæ prepositam deiecerint: sit etiam in-  
terdum, vt humore hoc aut exoluto, aut infortunio quopiam foras profiliente, sta-  
tim visus deperdat, nulla interim lésione in oculo occurrente. Id parenti meo an-  
num agenti quadragesimum contigit, qui cultri mucrone sibi met in oculum infixio  
statimque manu ipsi admotâ, leuiter ipsum expresserat, & humor hic foras prodie-  
rat, quod visus in eo oculo amissio ilicò sequuta est, nulla tamen noxa in eo plùs  
quàm in altero sese prodente. Sed vt ad hanc tunicâ redeamus, exterius, quâ pellu-  
cet, leuis est; reliquum verò ipsius asperum, non aliter, ac ceteræ membranæ, alteri  
cupiam adherentes. Huic in sternitur<sup>u</sup> quinta ex musculorum m oculum mouentium  
capitibus educta; quæ anteriorem omnem oculi regionem ad iridem vsque obregit,  
ad oculum caluariæ validius asfirmandum consensens. Sequitur postremò<sup>x</sup> sexta, al-  
ba, siue adhærens dicta, quæ anteriorem quoque oculi regionem extrinsecus ad iri-  
dem vsque ambit, pertinaciter adeo quintæ adhærens, vt difficili negotio separetur;  
hæc admodum tenuis existit, & internæ palpebrarum membranæ continua est. Iam  
verò vt rem in pauca contrahamus, tres oculo humores insunt; primùm quidem, du-  
ctus ab anterioribus exordio, adest<sup>y</sup> aqueus, hunc sequitur<sup>z</sup> chrysallinus, postremò  
<sup>a</sup> vitreus. Tunicæ sex habentur; prima, vt ab intimis exordiamur, est aranea, siue  
*μπαρκοειδης*; secundâ Retinâ, siue *ἀμφιφληροειδης*; tertiâ vnea, siue *βαιοειδης*; siue  
*χροειδης*; quarta est durâ; *αλληρότης* dicta; Quinta ea est quæ à musculorum nasci-  
tur capitibus, cui nullum nomen est in ditum quod hæc veteres lateuerit; sexta, alba,  
Enarranda duntaxat nobis ea membrana, siue vt melius dicam circulus ille superes-  
set, inter humorem chrysallinum, & vitreum extrinsecus occurrens, quem multi  
pro peculiari tunica enumerarunt; ego verò araneæ partem esse pro certo habeo, &  
puncta illa nigra in ipso occurrentia, vneæ partem esse arbitror, quæ abscedens relin-  
quit. Sed peculiaris ne tunica sit, nec ne, parum interest, modo scias, tenuissimam ef-  
se membranam, inter chrysallinum humorem, & vitreum interiectam. Atque hic  
finem præsentis libro imponam; oculi enim partium functiones prosequi, arduum  
adeo duco (præterquàm quod extrâ propositum nostrum quodammodo est) vt vni-  
cuique perscrutandum id relinquere malim, quàm prouinciam eam suscipere, vni-  
de laudis vsque adeo parum in me possit accedere.

Aqueus hu-  
mor.

Quinta opuli  
tunica.

Alba siue adhe-  
rens.

Partium oculi  
omnium brevis  
enumeratio.

u f. xviii. per  
totum exte-  
riorem cir-  
culum.  
x fig. i. o. fig.  
xix Q ad  
tertium cir-  
culum.

y fig. i. o. fig.  
vii. y. f. vi.  
b.

z fig. i. A. f.  
ii. iii. R. fig.  
iiii. S. fig. vi.  
u.

a fig. vii. x. f.  
i. C. f. iiii. v.  
vi. f. viii. a.

# CHARACTERVM QVI LIBRI

QVINTI, IN QVO DE CEREBRO, ET SEN-  
suum organis agitur, tabulis inscribuntur explicatio.

## TABVLA I. FIGV. I.

- P** *PRIMA itaque tabula figura pri-  
ma, totum cerebrum dura menyn-  
ge adhuc operum ostendit, orbicula-  
tim ob id dissecto, quantum neceffe-  
rat, sublatoq; craneo.*
- AA** Dextrum duræ cerebri membranæ  
latus, seu eius membranæ pars dex-  
tram cerebri regionem ambiens.
- BB** Sinistrum duræ cerebri membranæ  
latus.
- CC** Tertius duræ membranæ sinus secun-  
dum capitis longitudinem expor-  
rectus.
- DD** D. Duo inuicem appositi ductus, ven-  
narum modò in duram cerebri mē-  
branam secundum ipsius vniuer-  
sum latus excurrentes.
- E** Ductus duræ cerebri membranæ, in  
quem sexta caluariam ingrediens  
vena exhauritur.
- F** His characteribus venulæ indicant-  
tur, à dura cerebri membrana per  
caluariæ foraminula ad capitis cu-  
tem, membranasque caluariæ suc-  
cingentes, transmissæ, quarum fre-  
quentiores, & crassiores iuxta F  
maximè latitantis sedem plerun-  
que obseruantur.
- GG** G. Portiunculæ fibrarum à dura mem-  
brana per coronalem futuram ad  
caluariam succingētis membranæ  
constitutionem profilientium.
- HH** Portiunculæ fibrarum quibus sagit-  
talis futura viam offert.
- II** Hi quoque characteres in umbra oc-  
cipitij regionis latitant, sedem no-  
tantes, à qua fibræ porriguntur per  
futuram A Græcorum similem,  
ad caluariæ inuolucris constitutionem  
deductæ.
- K** Vnum tuberculum eorum quæ in-  
qualibus caluariæ sinibus plerun-  
que iuxta sagittalis futuræ cum  
coronali coitum conspicuis, ad-

nasci solent.

- L** Cavitas frontis osi iuxta supercilio-  
rum sedem propria.
- MN** M. Cranium, N pericranēū notat.

## FIGVRA II.

**I** *IN hac figura duplici sectione, ad  
angulos rectos ducta, duram men-  
yngem diuisimus, & inuersa deor-  
sum pendere fecimus, ut tenuis mem-  
brana melius conspiceretur.*

- AA** A. Elatior sedes duræ membranæ pro-  
cessus, dextram & sinistram cere-  
bri partes intercedentis.
- BB** Tertij duræ membranæ sinus cavitatis  
hic est in propatulo.
- CC** Orificia, vasorumque initia exte-  
rio duræ membranæ sinu in tenuē  
membranā pertinentia: atque hic  
vasorū orificia in cōspicuo sunt. à  
læuo huius sinus latere in tenuis  
membranæ partem pertinentiū,  
quæ sinistræ cerebri sedi obuolui-  
tur. Orificia autem à dextro late-  
re pronata, hic nō conspiciuntur,  
verum initia occurrunt vasorum  
in tenuem membranam, qua dex-  
træ cerebri sedi obuoluitur propa-  
gatorum, ac
- DD** DD, D & D insignitorum.
- EE** E. Tenuis membrana cerebrū in-  
uestiens.
- FFF** Ductus, vasa ve in tenui membrana  
secundum cerebrū inuolutionum  
seriem excurrentia.
- GG** G. Propagines notantur à ductibus  
secundum duræ membranæ latera  
excurrentibus, in tenuem mem-  
branam pertinentes.
- HH** H. Duræ membranæ portiones à te-  
nui membrana diuulso, & deor-  
sum reflexæ.






## FIGVRA III.

**I** *IN hac figura ostenditur cerebrū  
vtraque menynge exutum, & di-  
ductum*

TABVLA I. LIBRI V.

FIGVRA I.

II



|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| <i>ductum versus utrunque latus : quo scilicet duræ meningis portio falci similis latus sinistrum à dextro separans, magis conspicua sit, &amp; corporis callosi sedes elegantius se spectandam offerat.</i> |   |              |  |
| AA   | A. Dextra cerebri pars.   | LL           | xus constitutionem excurrentis, quem secundæ seu extimo foetus nuolucris comparamus.   |
| BBB  | Sinistra cerebri pars.  | MM           | Cerebri callosum corpus.   |
| CC   | <i>&amp;c.</i> Hic passim cerebri conuolutiones, gyri, & anfractus indicantur.  |              | Sinus utrinque ad callosi corporis latera in cerebro cōspicui, quos hic aliter quàm modò præstitimus, exprimere nequimus, quum angusti sint, & angustiores rimas plurimùm referant.  |
| DD   | D. Duræ cerebri membranę portio, dextram cerebri partē, & sinistrā intercedens, hic ex sua sede super sinistram cerebri partē producta.   | N            | Portio duræ membranę partis, dextram cerebri sedem, ac sinistram interuenientis, ac superius D aliquot insignitæ, quæ septo connascebatur, olfactus organorum sinus dirimenti, octauī capitis olis processui,  |
| EEE  | Quando primum dextram cerebri partem à sinistra inter dissecandū diducere contendimus, tunc manus ope ea vasa effringuntur, quæ ex tertio duræ membranę sinu in tenuem membranā utrobique pertinent. ac proinde quum in huius figurę administratione id quoque nobis faciendum fuerit, effracta eorum vasorum initia hic oculis subiiciuntur. | OO           | Tenuis membranę portio à cerebro diuisa.   |
| F  | Ductus venæ modo in humiliorem sedem duræ membranę partis excurrentis, quæ dextram cerebri partem à sinistra determinant, atque hic ductus à quarto duræ membranę sinu anteriori sede enascitur.  | PP           | Duræ cerebri membranę portio.  |
| GG   | G. Ductus iam ante F insigniti propagines in eandem duræ membranę partem sursum aliquousque excurrentes.  | FIGURA IIII. |  |
| HH   | H. Surculi ab humiliori angulo tertij duę membranę sinus propagati, in duræ membranę partem, quæ dextra cerebri pars à sinistra dirimitur.  | AA           | <b>I</b> N quarta figura omnes duræ, tenuisq; membranarum partes rescuimus, quæ in prioribus figuris occurrerunt, ac dein dextram sinistrāq; cerebri portionem sectionis serie ita ademinus, ut iam cerebri ventriculi in conspectum venire incipiant. |
| II   | Principia sunt ductuum, quia à quarto duræ membranę sinu venarū prorsus modo in tenuem cerebri membranam secundum superiorem callosi corporis regionē perferuntur, atque hic vnā eam tenui membrana aulsa sunt.   | AAA          |  |
| K  | Initium vasū à quarti sinus duræ membranę termino pronati, atque sub eo cerebri corpore quod testitudi ni seu cameræ instar arcus cōstruetæ assimilamus, in tertium cerebri vetriculum, & dehinc ad ple-  | BBB          | A. Cerebri adhuc in caluaria relictī pars dextra.  |
|  |   | CCC          | Pars sinistra.   |
|  |   | DD           | Portio cerebri dextra, quæ sectionis serie à reliquo cerebro ablata, hic resupina iacet.   |
|  |   | EE           | D. Lineæ partim cerebri anfractus, & partim varium cerebri substantię colorem cōmonstrantes. quicquid enim extra lineas consistit, quasi luteum, & subcinericiū magis est: quicquid intra, ad amulsi album visitur. quemadmodū                         |
|  |   | FF           | E & F in dextra, & sinistra cerebri parte luteum est: G verò & H album prorsus, & interdū rubris punctis interstinctum.  |
|  |   | GH           | Callosum corpus utrinque à cerebri substantia, cui alioqui continuatur liberum,  |
|  |   | III          | Callosi corporis portiuncula, adhuc sinistræ cerebri parti, quæ adempta est, continua.   |
|  |   | KK           | Dextri cerebri ventriculus.  |
|  |   | LL           |  |

|    |   |
|----|---|
| MM | Sinister cerebri ventriculus.   |
| NN | Sinister ventriculi superioris sedis portio.  |
| OO | Plexus cerebri ab imagine quam cū extimo foetus inuolucro similem exigit, <i>χορκοειδης</i> nuncupatus.   |
| PP | Aranearū modo graciles venę, dextri, & sinistri vētriculi substantię hoc in loco connatę, ac ab illis ductę vasis, quę nuper cōmemoratum, & secundę nō absimilem plexum extruunt.               |
| Q  | Venulę à nuper quoque commemoratis vasis in tenuem cerebri membranam sub callosi corporis anteriori sede huc excurrentes, & incerta serie (quemadmodum & P notatę) inter res cādū se offerētes. |

FIGURA V.

**P**RÆSENS figura quod ad relietam in caluaria cerebri portionē attinet, nulla ex parte variat: atque id solum habet proprium, quod callosum corpus hic anteriori sua sede à cerebro primum liberauimus, ac dein eleuatum in posteriora refleximus, scriptum dextri, ac sinistri ventriculorum diuellentes, et corporis instar testudinis extructi superiorem superficiem ob oculos ponentes.

|     |   |
|-----|---|
| AQ  | Ab A ad Q vique omnes characteres idem ostendunt quod in figura quarta.   |
| RRR | Notatur inferior callosi corporis superficies: est enim à sua sede motum, atque in posteriora reflexū.  |
| STV | Superior corporis instar fornicis, seu testudinis extructi superficies, & veluti ipsius triangularis circūscriptio quam ab S ad T, & à T ad V, ab V ad T metimur. |
| XX  | Dextrum ventriculum & sinistrum intercedentis septi inferior pars, corpori testudinem referenti continua.   |
| YY  | Septi iam cōmemorati superior pars callosi corpori continua.  |

FIGURA VI.

**H**ÆC figura à quinta in hoc differt, quod corpus testudinis modo fabricatum anteriori sua sede à

cerebri substantia liberauerimus, id sursum in posteriora reflectentes, ut inferior ipsius superficies in conspectum veniret: & vas illud etiam cerneretur quod à quarto dura membrana sinu pronatum sub corpore testudinis modo extructo fertur, et plexuum tandem non minimam partem constituit, quos secundarum imagini veteres assimilarunt.

|    |   |
|----|---|
| AA | A. Corpus testudinis modo extructū hic inferiori ipsius superficie, qua tertij ventriculi superiorem constituit sedem, conspicuum.  |
| B  | Portio corporis instar testudinis efformati in dextro ventriculo, à cerebri substantia hic principium ducens.   |
| C  | Portio corporis testudinem forma, & vñ referentis, quæ ex sinistro cerebri ventriculo pronascitur.  |
| DD | Dexter cerebri ventriculus.   |
| EE | Cerebri sinister ventriculus.   |
| F  | Arteria per inferiorē, posterioremq; dextri ventriculi sedem à dextræ soporalis arteriæ ramo duram cerebri membranā perforante, huc in dextrum ventriculū descendēs.                          |
| G  | Arteria in sinistrum cerebri cōscendens ventriculū.   |
| H  | Vas à quarto dura cerebri membrana sinu principium ducēs, ac sub corpore instar testudinis efformato in comunem dextri, & sinistri ventriculorum cavitatem, seu tertium ventriculū properans. |
| I  | Vasis H insigniti in duas portiones diuisio.  |
| K  | Vasis H, insigniti diuisionis altera portio, dextrum cerebri petens ventriculū.   |
| L  | Portio nuper commemorati vasis, sinistrum accedens cerebri vētriculū.   |
| M  | Plexus dextri ventriculi secundinarum imagini comparatus, atque ab arteria F insignita, & vasis H indicati portione, quam K notauimus, constitutus.   |
| N  | Plexus sinistrum cerebri ventriculū occupans, ac ex vasis G & L insignuatis constans.   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>OO</p> <p>P</p> <p>Q</p> <p>RS</p> <p>AA</p> <p>CC</p> <p>DD</p> | <p>Huiusmodi venulæ cerebri substantiæ hic obnascuntur, ab illis productæ vasis quæ K &amp; L notauimus,</p> <p>A venit quæ cerebri substantiæ hic offeruntur, ramusculi extra ventriculorum amplitudinem hac ad tenuem cerebri membranam pertinent.</p> <p>Meatus ex communi cõcauitate dextri, ac sinistri ventriculorum, seu à tertio cerebri ventriculo rectâ decliuis pertinens versus peluim, quæ cerebri pituitam excipiens, eam infundibili modo ad glandem deferit, eius infundibuli extremo subditam.</p> <p>Canales, sinus ve leuiter in ventriculorum substantia exsculpti, &amp; pituitam ad meatus nuper Q, insigniti orificium deducentes.</p> <p>TABULA II. FIG. VII.</p> <p><b>P</b> RÆSENS figura à tribus proximè præcedentibus plurimum uariat, nam cerebri substantia in illis relicta ea pars in hac ablata cernitur, quæ dextri, sinistriq; ventriculorum sedem in illis figuris conspicuam efformabat. deinceps ea quæ cerebello adhuc innitebatur, hic quoque resecta est, ut duræ membrana conspiceretur portio, cerebellum, ac cerebrum intercedens. Insuper duræ membrana sinus in illa consistentes ductus cul telli anterioris mucrone sectionibus, hic etiam aperuimus, &amp; vas à quarto sinu duræ membrana in cerebri ventriculos pertinens, hic ex tertio cerebri ventriculo subleuatum, &amp; à plexibus secundina similibus auulsam, in posteriora refleximus; ut tertij cerebri ventriculi, seu communis dextri sinistriq; ventriculorum cõcauitatis sedes in conspectum melius ueniret, vnâ cum eius cavitatis meatibus.</p> <p>BB. Cerebri substantiæ adhuc in caluaria reliquæ pars.</p> <p>Lineæ in basi cerebri cõspicue: quod lineis hic interceptitur, fuluam seu subpallidam cerebri notat substantiam: quemadmodum sedes, D, D, D insignitæ. Quod verò extra lineas consistit, alba est prorsusque</p> | <p>EEE</p> <p>F</p> <p>G</p> <p>H</p> <p>I</p> <p>K</p> <p>L</p> <p>MN</p> <p>OO</p> <p>PP</p> <p>QQ</p> <p>R</p> <p>S</p> <p>T</p> <p>V</p> <p>candicans cerebri substantia, hic E, E &amp; E insignita.</p> <p>Portio est sopalalis arteriæ secundum humiliorem, angustioremq; sinistri ventriculi sedem sursum ad plexus secundas imitantis cõstitutionem prorepens.</p> <p>Arteriæ sopalalis portio, secundum humiliorem, posterioremq; dextri ventriculi sedem sursum, quemadmodum arteria F insignita, prorepens.</p> <p>Humillima sedes tertij ventriculi: quam, ut aprius cerneretur, nonnihil distentam finximus.</p> <p>Meatus rectâ decliuis ex tertio cerebri ventriculo pertinens: cerebriq; pituitam ad peluim huic excipienda paratam deferens.</p> <p>Meatus ex tertio cerebri ventriculo inter cerebri testes, natesque, in cavitatem cerebelli, &amp; dorsalis medullæ communem pertinens.</p> <p>Glandula nuci pineæ non ab similibus, &amp; vasorum ex quarto sinu duræ membranae cerebrum petentium fulcrum.</p> <p>Hanc cerebri partem testes, &amp; nates quoque cerebri appellauimus, hic adhuc tenui membrana obtektas.</p> <p>Duræ cerebri membranæ processus, portio ve inter cerebellum, &amp; cerebrum reposita. Qui hanc accedunt instar venarum ductus, partim à primo, secundoq; duræ membranæ sinibus, partim verò à quarto pronascuntur.</p> <p>Duræ cerebri membranæ dexter, seu primus sinus.</p> <p>Duræ cerebri membranæ sinister, seu secundus sinus.</p> <p>Primi &amp; secundi duræ membranæ sinuum congressus quem Græcorum nonnulli <i>αλευον</i>. quod est torcular appellarunt.</p> <p>Principium tertij duræ membranæ sinus.</p> <p>Quartæ duræ membranæ sinus, similiter atque alij hic adaperus.</p> <p>Vas à quarto sinu duræ membranæ in cerebri ventriculos porrectum, hic autem in posteriora ex sua sede reflexum.</p> |
|---|---|---|

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| XX | Hac sede cerebellum dura cerebri membrana non obtectum ostenditur.  | NO | PQ. Quatuor his characteribus corpus id indicatur, quod ante sectionem vnicum est, atque in septima figura M & N insignitur. hic verò ex sectionis serie diuisum occurrit. ac N & O eius corporis sedes indicat, quibus testium nomē accommodatur. P verò & Q illas quas nates ferè nuncupamus. |
| Y  | Ductus venarum modo à quarto duræ cerebri membranae sinu in tenuem membranam pertinentes, quæ cerebellū ipsique cerebri testes induuntur.                               | RR | Cerebellum tenui adhuc obductum membrana.   |
| ZZ | Duræ membranae sedes, qua ossi omnium totius corporis ossium durissimo, & auditus organum intus cōtinenti adnascitur. Hanc namque caluariae regionē cerebro detreximus. | SS | CC. Vasa venarum modo tenuem cerebelli membranam implicantia.   |
|    |   | TT | Propagines vasorū tenuem cerebelli membranam implicatū, ad eas producta arterias quæ secundum dextri, & sinistri cerebri ventriculorum posteriora sursum conscēdūt, plexus efformatur, quos extimo sētus inuolucro dissectionis proceres contulerunt.   |
|    |   | VV | Duræ membranae portio, quæ superiorem cerebelli sedem à cerebro dirimebat.  |
|    |   | XX | Propagines notantur à vasis dictam nuper duræ membranae portionē implicantibus in tenuē membranam, qua cerebellum vestitur, excurrentes. Idem hic Z & Z notāt, atque in septima figura, durā videlicet cerebri membranam ossi adnatam, in quod auditus organum reponitur.                       |
|    |   | ZZ |   |

## FIGURA VIII.

**P**RESENS figura à septima in hoc variat, quod hic adhuc cerebri plus rescuerimus, & testes longa sectione in hoc diuiserimus, ut meatus occurreret ex tertio uentriculo in quartum pertinens. Ad hac, duræ membranae portio cerebello obducta, hic dissecta, atque in posteriora reflecta cernitur. Quum itaque praesens figura pleraque, cum septima habeat communia, in hac idem AA, & BB, & CC, & DD, & EE, & F, & G, & H quod in septima indicabunt. Verum arteria F & G insignita, tanto magis hic quam in septima antrosum vergunt, quanto magis cerebrum versus basim in septima, quam in sexta ablatum est.



- I Meatus in sexta etiam figura I notatus, qui rectè decliuis fertur, atque cerebri pituita ad peluim defert.
- K Meatus pituitæ deducendæ paratus, qui interdum ab illo deducitur meatu, qui ex tertio ventriculo inter testes in quartum ventriculū pertinet.
- L Vmbra quæ apparet intra K & L foramen meatumque notat, quæ ex tertio ventriculo cerebri ad quartum fertur.
- M Glandulā hic adhuc reliquimus, quæ pinæ nucis formam ostendens, vasorum ex quarto duræ membranae sinu in cerebri ventriculos pertinentium fulcrum efficitur.

## FIGURA IX.

**I**N hac figura eadem cerebri portio, quæ in octaua seruatur. verum praesens figura in faciem prorsus reposita, eam duræ membranae partem abscessam habet, quæ cerebrum à cerebello dirimit, deinde cerebellum hic deorsum è sua caluaria sede manibus prorractum, ac deorsum modicè inuersum propendet, ut ipsius regio caluariae alias congrua oculis subiceretur, & dorsalis medulla cavitās videretur alteram partem quarti ventriculi constituentem. Ad hac, prater venarum quarundam, & nervorum progressus, etiam primus & secundus duræ membranae sinus hic aperti ad amussim exprimuntur.

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| AA  | Cerebri portio adhuc in caluarię amplitudine reliqua, atque hic in sua sede adhuc asseruata.   | PQR | quaquam verò à cerebello ducāt. Sinus occipitis ossis, quibus correspondet cerebelli figura: nam P cerebello inscriptum, B congruit. Q autem, C. R. verò, D.  |
| BCD | Tribus his characteribus cerebellum deorsum ex sua sede reflexū indicatur, tenui membrana adhuc inuolutum, ac dorsali medullę connatum. Verum B priuatim cerebelli sinistram indicat sedē, caluarię sinui P notando correspondentem. D verò dextram, quę illi caluarię sedi insidet, cui R inscribam. C autē cerebelli media pars insignitur, vermi non absimilis, & suis finibus eos cōstituens processus, quos vermium imagini ve teres compararunt. | SSS | Dexter seu primus durę membranę sinus, hic cultelli mucrone adapertus.  |
| E   | Posterior terminus medię partis cerebelli, qui vermiformium processuū posterior mihi recensēbit.   | TTT | Sinister seu secundus durę membranę sinus, atq; in nulla cerebri delineationum, horum sinum ductus ita conspicuē ac in præsentī oculis subijcitur.  |
| FGH | Dorsalis medullę pars adhuc in caluaria consistens, ac F & G huius partis, seu dorsalis medullę sedes indicant, quibus cerebellum connascitur. H verò sedē dorsalis medullę significat, ē caluarię amplitudine procedentem.  |     | FIGURA X.   |
| I   | Sinus dorsalis medullę calami quoscribimus mucroni nō absimilis, ac mediam cavitatem constituens communis ventriculi dorsalis medullę, & cerebelli, quam quartum cerebri ventriculū dissectionis periti vocarunt.  |     | <b>H</b> Ac figura eam cerebri portionem expressimus, quę dorsalis medullę ducit initium, dein cerebellum a dorsalis medullę hic conspicua parte ademptum est, et cerebri testes, & nates, & glans pinę nuci imaginem referens, ac postremo cavitates ea dorsalis medullę quę cum cerebelli cavitatem quartum cerebri efformat ventriculū, hic pariter exprimuntur.   |
| K   | Vasa ductus ve venis, quā simillimi, hęc in cerebellum ab illis vasis pertinentes, quę in primum & secundū durę membranę sinus exhauriuntur. atque vt hi ductus frequentes admodum sunt, ita etiam non semper pari propagantur serie.  | AA  | Cerebri pars dorsalem producēs medullam.  |
| L   | Et hac quoq; ductus venę similis in tenuem cerebelli membranā pertinet, ab illis vasis, quę hac in parte duram cerebri membranā intertexunt.   | B   | Meatus ex tertio cerebri vetriculo in quartum sub cerebri natibus tendēs, cuius terminū in quartū pertinentem ventriculū C insigniui.   |
| M   | Quintum cerebri neruorum par.  | C   | Glans cerebri, nuci pinę imagini à dissectionis professoribus assimulata.   |
| N   | Sextum cerebri neruorum par.   | D   |   |
| O   | Septimum par neruorū cerebri. atq; hic videre est quod furculis duo postrema cerebri neruorum paria principium à dorsali medulla ne-   | EFG | H. His characteribus cerebri testes, ac nates indicātur: videtur namq; dissectionis proceres grātia lineę inter E ac F, & inter G & H conspicuę, superiora tubera E & G insignita ab inferioribus F & G notatis distinguisse, ac superiora testes vocauisse, quod illis glans penis quasi modō incūbit. Inferiora autem nates vocarunt, quod meatus ex tertio ventriculo in quartū pertinentis terminus C hic insignitus, podici conferri possit. |
|     |  | IK  | Sedes duę, quibus dorsalis medullę initium cerebello adnascitur.  |
|     |  | LM  | NO. Cavitates dorsalis medullę initij, alterā partē quartū vetriculi cōstituēs, atq; ab Herophylo calami  |


TA<sup>VII</sup>BVLA II LIBRI<sup>VIII</sup> V



IX



IXII




XI



XIII



XVI




XV

XIII



XVII



XIX



cauitati afsimilata, quam atramen to ſcribentes intingimus. Sedes enim Linſignita eius calami cauitatis parti reſpondet, quæ indici ſcribentis proxima eſt. M autem & N angulis illis afsimilari poſſunt, qui in cauitatis calami lateribus conſiſtunt. O verò mucronē exprimit, quo characteres formamus.

- P Dorſalis medulla hic præfecta eſt, quâ in vertebraſ procidens caluariam egreditur.

## FIGURA XI.

**H**ac figura cerebellum à caluaria, ipſaq; adeò dorſali medulla auulſum & ſupinum iacet, humiliorem ipſius ſedem qua dorſalem ſpectat medullam commonſtrans. Ac proinde regiones ipſius, quibus dorſali medulla continuatur, ac ſinum inſuper oſtendit, qui alteram portionem efformat quarti uentriculi, ſeu ſinus, cerebello & dorſali medulla communis. Porro ad humiliorem præſentis figuræ ſedem ſine pinximus media partis cerebelli, ut proceſſum uermis imaginem referentium natura conſpiceretur.

- A Dextra cerebelli pars tenui membrana cerebellum inueſtienti liberû, uti etiam totum cerebellum hic ea membrana denudatum commonſtratur.
- B Sinistra cerebelli pars.
- Cc Media cerebelli pars. ac C notat huius partis anteriorem regionem, c verò poſteriorem.
- Dd Fines terminique mediæ partis cerebelli: quorum anteriorem D indicat, poſteriorem verò d.
- E Cerebelli ſinus, qui cû dorſalis medullæ ſinu, quartum nobis appellatû, cerebri ventriculû cõſtituit.
- GG His ſedibus cerebellum dorſali medullæ adnaſcitur.
- H Anterior ſinis mediæ partis cerebelli hic, ac ſi ab alio cerebello iſ reſectus eſſet, expreſſus.
- I Poſterior ſinis mediæ partis cerebelli, à cerebello quoque exectus.

## FIGURA XII.

**H**ac figura, caput à ſiniſtro latere exprimitur, dextro nonnihil ſublenato. Ex caluaria autem amplitudine cerebellum hic euulſimus, ea tantum cerebri relictâ portione, quæ in octaua, & nona figuris adhuc ſeruabatur. Verum illa cerebri portio hic in ſua non conſiſtit ſede, ſed eleuata eſt, & in poſteriora ab ipſa caluaria baſi aliquoſque reſtixa, ut tandem in conſectum venirent cerebri proceſſus, forma neruis non abſimiles, & olfactus organo ſubminiſtrantes: quorum ſiniſter è ſua ſede cum ipſo cerebro eleuatus eſt, dextro adhuc dura cerebri membrana qua octauo capitis oſſi obducitur, cõnexo.

- AA Cerebri pars dextra.
- BB Sinistra cerebri pars, tenui membrana adhuc quemadmodum & dextra pars obuoluta.
- C Dextrum olfactus organum, in ſua ſede adhuc ſeruatum.
- D Sinistrum olfactus organum, vnâ cû cerebro in poſteriora reflexum.
- E Sinus, cui ſiniſtrum olfactus incumbit organum: eaquæ regio duræ mēbranæ hic indicatur, quæ odoratus nomine hac in ſede multis, ſed exiguis foraminibus peruia cernitur.
- F Vena caluariam petētium ſexta, hic in duram cerebri membranâ aliquot ſurculis excurrans.
- G Septû ſinus olfactus organis incifos interdiuidens.
- H Duræ cerebri membranæ proceſſus portio, quæ dextram cerebri partem à ſiniſtra dirimit.
- II Cerebrû paſſim excavatæ ſibi in caluaria amplitudini reſpõdens, hic quoque ad frõtis oſſis regionem ſibi inſculptis cauernis congruit, & leuibz tuberibus prominet, quæ alij mamillares cerebri vocantur proceſſus.
- K Vena caluariam petentium quinta, cui iter præbet foramen ſecundo neruorum pari exculptum. L, ut & ſubſequentes characteres, in vmbra occipitij cauitatis latitat, &

L parui etiam est momenti: quādo-  
quidem L caluariæ sinū indicat,  
cui dextra cerebelli pars cōgruit.  
M sedem, quæ mediam cerebelli  
partem respicit. N sinum, in quē  
sinistra cerebelli pars reponitur.  
O verò dextrū, seu primum sinū  
indicat duræ membranæ. P autem  
tertiū, Q secundū; seu sinistrū.

FIGURA XIII.

**H**ÆC figura occipitio prorsus in-  
nititur, et vniuersa cerebri sub-  
stantia, quæ adhuc reliqua erat, in po-  
steriora deorsum deflexa pendet, ut  
olfactus organa, & visiorum ner-  
uorum coitus, & maximi soporalis ar-  
teria rami in conspectum venirent.

- AA Dextra cerebri pars, adhuc tenui mē-  
brana cerebri obducta.  
BB Sinistra cerebri pars.  
CC Cerebri tubera, quæ à similitudine  
quam cū papillis habent, mamilla  
res cerebri processus plerisq; nun-  
cupantur.  
DD Sinus olfactus organis parati.  
E Septum olfactus organis paratos sinus  
interdiuidens.  
FF Sinus caluariæ, quibus mamillares ce-  
rebri processus C & C insigniti  
congruunt.  
GG Vtrinque notatur vena caluariā in-  
gredientium sexta.  
H Vena caluariā ingredientiu quinta.  
I Vas notatur venæ correspondens, in  
tenuem cerebri membranā ab il-  
lis vasis excurrans, quæ in dura cō-  
sistunt membrana.  
K Principium eorū ductuum qui per  
duræ membranæ latūs excurrūt,  
sed apertius apparet in prima figu-  
ra sub litera D.  
LL Olfactus organa hic vnā cū cerebro  
à durā mēbrana deorsū diuisa.  
M Nervorum visiorum coitus.  
Visorius nervus dextrum oculum  
petens.  
NO Visorius nervus sinistrū petens ocu-  
lum. & perinde ac dexter, venula  
concomitatus, ab illis propagata  
vasis, quæ tenuem cerebri mēbra-  
nam inibi contextunt.  
P Soporalis arteriæ ramus duram cere-

- bri membranā perforans, ad latūs  
glandis cerebri pituitā excipiens.  
Q Arteriæ P notatē propago, dextrum  
accedens cerebri ventriculū.  
R Arteriæ P notatē propago hic in te-  
nuem cerebri membranā surcu-  
los diffundens.  
S Hic portio cōspicitur peluis cerebri  
pituitam excipientis.

FIGURA XIII.

**C**APUT hic in sinistram aurem  
reclinatum iacet, interne calua-  
riæ amplitudinis basim exprimens,  
dura cerebri membrana succinctam.  
Atque tanta duntaxat cerebri dor-  
salisq; medullæ adhuc afferuatur por-  
tio, quāta cerebri nervorum paribus  
videndis sufficit.

- AA Modica cerebri portio, vnā cū dor-  
salis medullæ initio.  
BB Nervi visorii ea parte hic tantū cō-  
spicui, qua caluariæ amplitudinē  
egrediuntur.  
CC Peluis cerebri pituitam excipiens.  
D Hic in peluim pertinet meatus cere-  
bri pituitam ex tertio ventriculo  
deducens, ac I in septima figura &  
octaua notatus.  
E Dextræ soporalis arteriæ ramus, du-  
ram membranā ad latūs dextrū  
glandis perforans, qua cerebri pi-  
tuita excipitur.  
F Sinistræ soporalis arteriæ ramus.  
G Secundum cerebri neruorum par.  
H Tertij paris neruorum cerebri graci-  
lior radix.  
I Tertij paris neruorum cerebri cras-  
sior radix.  
K Quartum neruorū cerebri par, tertij  
paris crassiori radici conterminū.  
L Minor radix quinti paris neruorum  
cerebri.  
M Principium sexti paris.  
N Sexti paris neruorum cerebri prin-  
cipia, ac furculi.  
O Septimi paris neruorum cerebri prin-  
cipia, ac furculi.

FIGURA XV.

**H**ÆC figura cauitas ostenditur  
ossis cunealis dura menynge ve-  
lita, cui peluis superimminet.



- A B Nervi viscerum portiones.  
 C Sinistri lateris arteria, quæ durâ membranâ hic perforans, partim in tenuem cerebri membranâ, partim verò in dextrum cerebri ventriculum digeritur.  
 D Dextri lateris arteria.  
 E Hic peluis collecta propèdet cerebri pituitam ex tertio defluentem ventriculo excipiens.  
 F Foramen, quo peluis huius infundibuli modò extructæ finis glâdem petit, cerebri pituitam excipiens.  
 G G Secundi paris nervorum cerebri portiones.

FIGURA XVI.

**H**Ac figura nudâ depinximus glandem, quæ cerebri pituita excipitur, unâ cum pelui, seu infundibulo pituitam huc deferente, & hic flaccido propendente. A lateribus verò arteriarum soporalium portiones, quæ reticulatè plexum efformare dicuntur, ita hic expressimus, uti nobis inter secandum occurrere. Atque vi eæ arteriarum portiones variè se secantibus offerunt, ita quoque variè eas delineauimus.

- A Glans, cerebri pituitam excipiens.  
 B Peluis, seu infundibulum cerebri pituitam super modò dictam glandem deferens.  
 C C Arteriarum portio, quæ secundum suorum in ossè caluariæ foraminum ductum obliquè feruntur.  
 D Sinistræ arteriæ ramus, in duræ membranæ sinistram latem excurrans.  
 E Arteriæ sinistræ portio, per propriû foramen ad narium usque amplitudinem pertingens.  
 F F Hac sede diuersam arteriæ seriè delineauimus. ac dextrum quidem F arteriam notat eam seriè ductâ, ut hic nō dirimatur: quæmadmodum sinistram F arteriam hâc in duos ramos, qui mox in vnû rursus coeunt insinuat.  
 G Arteriarum portiones durâ cerebri membranâ perreptantes, ac partim in cerebri ventriculos, partim in tenuem membranâ cerebri basi obductam digesti.

H Propago arteriæ per foramen secundum di paris nervorum cerebri caluariam excidens, ac neruum viscerum, ac dein oculum petens.

FIGURA XVII.

**H**Ac figura plexum sinximus, cuiusmodi is esse deberet, qui Galeni in libris de visu partium descriptionibus conueniret. Significet itaque hic A & B arterias caluariam subeuntes, moxq; in mirabilem illû plexum diffusas. C verò & D ramos in quos plexus illius propagines colliguntur, quiq; illis prorsus arteriarû magnitudine respondet, quas A & B indicauimus. Cæterum E glandem notat, pituitam cerebri excipientem.

FIGURA XVIII.

**P**RESENTI figura arteriarum sub durâ cerebri membranâ consistentium, ac ad glandis cerebri pituitam admittentis lateris reptantium seriè depinximus, quam in ouium, ac boum capitibus obseruamus. Atque hanc proponere libuit, ne quis latere arbitraretur, quæ illorum animalium hic cum homine sit differentia. Significat autem in hac figura A dictam iam sepius glandem, B & C arteriarum sedem, quæ primum in caluariam ingrediuntur.

FIGURA XIX.

**P**ARVA hac figura, erectam sinximus peluim, seu cyathum, quo cerebri pituita in glandem ipsi subditam distillat. ac dein hic sinximus quatuor ductus à glande pituita per proxima glandis foramina deferentes. Inducit igitur A glandem, cui pituita instillatur. B peluim, quæ hac ducitur. C, D, E, F, verò meatus ad faciliorem pituitæ huc decumbentis egressum paratos.

TABULA III. FIG. I.

**H**VIUS tabulæ figura ad oculi partium notitiam faciunt. prima figura alteram oculi partem exprimit una sectione ab interiori angulo ad externum, atque ita per ner-

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
|    | uum visorium diuisi, perinde scilicet, ac si quis diuisa secundum longitudinem capae simul cum suo germine, alteram partem ea superficie delinearet, qua alteri parti connata, continuas, fuerat.  |     | SECUNDA figura, solum chrySTALLINUM humorem anteriori sede ita exprimit, quemadmodum is omnibus illum ambientibus partibus liberatus, è directo intuenti occurreret.   |
| A  | Humor chrySTALLINUS.   |     |  |
| B  | Tunica anteriori humoris chrySTALLINI sedi obducta, & tenuissimæ cęparum pelliculæ instar, pellucida.  |     |  |
| C  | Humor vitreus.   |     |  |
| D  | Nerui visorij substantia.  | R   |  |
| E  | Tunica quæ reti assemilamus, quæq; diducta visorij nerui efficit substantia.   |     | TERTIA figura, nudè prorsus chrySTALLINUM humorem commonstrat, ea sede se ostendientem, qua ex latere, (ut ita dicam,) ab aliquo spectaretur. Verùm R asperitatem, sedemq; notat, cui oculi tunica palpebrarum pilos referens, ac undecima, & duodecima figuris exprimenda, humori chrySTALLINO cõnascitur.                                  |
| E  | Tenuis cerebri membranæ portio, neruo visorio obducta.   |     |  |
| G  | Vuea tunica, in quam tenuis visoriũ neruum induens membrana degenerat.   |     | QUARTA figura, humorẽ vitreum ita effectum cõmonstrat, quemadmodum is si suam formam, quam in oculo obtinet, reseruaret, in anteriori ipsius sede conspicuus esset, quum chrySTALLINUS humor ex illo euulsus esset. S enim cauitatem ipsius indicat, in quam media chrySTALLINI humoris pars, reponabatur.                                   |
| H  | Hac sede vuea tunica in posteriora cõprimitur, neque corneam exterius illi obductam contingit tunicam.   | S   |  |
| I  | Foramẽ, quõ vuea ipsa ve est peruia pupilla.   |     | QUINTA figura, vitreum humorẽ eadem facie qua quarta exprimit, verum adhuc ipsi chrySTALLINUS humor T notatus innat.   |
| K  | Tunica ab vuea initium ducens, & cilijs, seu palpebrarum pilis imagine correspondens, & fortè hæc & illa quæ B. notatur, eadem est.  | T   |  |
| L  | Duræ cerebri membranæ portio, neruum visorium obuoluens.   |     | SEXTA, vitreum humorem ex latere exprimit, unã cum chrySTALLINO quĩ ipsi adhuc innatũ V notatur.   |
| M  | Dura oculi tunica, quam dura cerebri membrana constituit.  | V   |  |
| N  | Duræ oculi tunicæ pars, quæ cornu instar pellucida visitur.  |     | SEPTIMA figura, aqueum humorẽ ex latere ita exprimit, quemadmodum in oculo consistit, & adhuc anteriorem chrySTALLINI humoris sedem integit. X namque chrySTALLINUM humorem in presenti figura notat, ac Y eam humoris aquei sedem indicat, qua vuea tunice pars in ipso dum integer est oculus continetur, qua à cornea abscedit, distatq;. |
| OO | Humor aqueus, atque inferius O sedẽ indicat, in qua suffusiones plerunque proueniunt.  | X   |  |
| PP | Musculi oculum mouentes.   | Y   |  |
| Q  | Adhærens, alba ve oculi tunica. R. hac in parte nullus est musculus sed mera pinguedo. Cæterũ subsequẽtes figuræ seriatim oculi partes exprimunt; primum quidem humores, ac dein tunicas. Atque has figuras omnes semper ad primam non ineptè contuleris: quandoquidem illæ compositionis ordine inuicem subsequuntur, ac ad primæ huius figuræ proportionẽ sunt expressæ, sumpto initio à chrySTALLINO, ad exteriora procedẽs | a b | OCTAVA figura, vitreum humorẽ a notatum, & aqueum b insignitum simul cõmonstrat, ita inuicẽ distitos, quemadmodum eæ dirimuntur tunica, quæ palpebrarum pilis non perperam in effigie assemilamus. Atque huius tuniculæ sedes inter hos humores confisfens cindicatur.   |

NONA figura, tunicam anteriori  
 chryſtallini humoris ſedi obnatā,  
 et inſigniter pellucidam, atque hic  
 ab ipſo humore liberatam à latere  
 exprimit.

DECIMA figura, chryſtallinum hu-  
 more à latere offendit, adhuc ea tu-  
 nica intectum, quē nona figura  
 expreſſit. atque hic d, & e chryſtal-  
 lini humoris partem indicant po-  
 ſterioſiorem, & illa tunica non ob-  
 ductā, ſed in vitreo humore, quum  
 integer eſt oculus latitantem.

VNDECIMA figura, tunicam oſten-  
 dit quam vnea producit, quæq; pal-  
 pebrarum pilis aſſimilatur. Cate-  
 rum hæc circulo g & g notato ab  
 vnea pronāſcitur, circulo autem f  
 & f inſignito chryſtallino humori  
 inferitur, adnaſcitur ve.

DVODECIMA figura tunicā, quam  
 undecima oſendit adhuc vitreo hu-  
 mori obductā, et chryſtallino ad-  
 natam continet. h enim & h tuni-  
 cam notant, i verò, humorem chryſ-  
 tallinum.

DECIMATERTIA figura, tunicā  
 oſendit, quam reti diſſectionis pe-  
 riti-comparant, atque hæc à latere  
 exprimitur, vñ cum nervi viſorij  
 ſubſtantia x inſignita, & dura te-  
 nuig, cerebri membranis libera.

DECIMAQUARTA figura vne tu-  
 nica internam oſendit ſuperficiē.  
 hic enim ipſam euerſam, vii inter  
 ſecandum fit delineauimus. l ita-  
 que portiunculā notat tunica, quæ  
 producitur à teneri meninge n ſe-  
 dem, in qua anterior vnea regio  
 introrſum, ſeu in poſteriora com-  
 primitur.

DECIMAQUINTA figura, exter-  
 nam vneæ tunica ſuperficiem ex  
 latere delineatā continet, vñ cum  
 nervi viſorij ſubſtantia, tenui mē-  
 brana cerebri obducta. n enim ner-  
 ui viſorij ſubſtantiam notat, hic à  
 tenui qua inuoluitur mēbrana li-  
 beram, o tenuis notatur membra-  
 na, nerui viſorij ſubſtantiam inte-  
 gens, et hic à dura membrana, quæ  
 ipſam quoque ante ſectionem ob-  
 voluit, denudata. p, p. venarum,


arteriarumq; à dura oculi tunica  
 in vneam pertinentium ſunt por-  
 tiuncula, iam ex ſerie ſectionis  
 effracta. q, q ſedes, quæ vnea tuni-  
 ca anteriori in r parte cōprimitur,  
 & à cornea abſcedit. r foramen,  
 vneæ pupillæ conſtituens.

DECIMASEXTA figura, duram o-  
 culi tunicam ex latere cōmōſtrat,  
 tranſuerſa ſectione in hoc diuiſa,  
 ut ſeries in conſpectum veniret,  
 vaſorum ab ipſa in vneam perti-  
 nentium. ſignificet igitur t ner-  
 uum viſorium vñ cum duabus il-  
 lum inuoluentibus membranis ob-  
 truncatum, & uenis arterijsq; con-  
 comitatum. t verò, & t venas, ar-  
 teriaſq; per duram oculi tunicam  
 excurrentes. u autem, & u vneam  
 tunicam hic propter, dura ſciſſio-  
 nem, conſpicuam, & ramulos duræ  
 tunice vaſorum excipientem. Ca-  
 terum x ſedem indicat, vbi dura  
 oculi tunica inſtar cornu leuigatur  
 pellucidaq; cernitur. ſedi autem y  
 notata, pupillæ reſpondet foramen.

DECIMASEPTIMA figura inte-  
 gram nudamq; duræ oculi tunicæ  
 externam ſuperficiē ex latere ſpe-  
 ctatā exhibet, vñ cum magna  
 riſorij nervi portione, in qua a, no-  
 tat ipſius ſubſtantiam, ſe verò te-  
 nuem qua obducitur, membranā,  
 γ autem duram cerebri membra-  
 nam, δ venas, arteriaſq; nervum  
 viſorium concomitantē. Porro x,  
 & dein y, idem hic atque in deci-  
 maſexta indicant.

DECIMAOCTAVA figura, oculum  
 à palpebris liberatum, atque ex  
 ſua in calvaria ſede erutum, vñ  
 cum ipſius muſculis nōdum diſſun-  
 ctis à latere exprimit. atque ner-  
 uum indicat viſorium, ζ & ζ  
 muſculos oculum mouentes. tria  
 λ, pinguedinem, quæ neruus vi-  
 ſorius circumueſtitur. n & n ad hæ-  
 retem oculi tunicam à maiore ocu-  
 li circulum ſeu iridem, vbi ad hæ-  
 renſ mēbrana deſinit, corneæq; tu-  
 nica pertinentiſſimē adnaſcitur. u  
 autem ſedem notabit, è regione pu-  
 pillæ, ſeu minoris circuli cōſſentē.

Figura I TABVLA III V LIB V



Decimanona figura anteriorem oculi integri, & a palpebris tantum liberi sedem exprimit. atque hic  $\lambda$  carunculâ infinuatur, in maiori oculi sedis angulo repositam.  $\alpha$  verò &  $\theta$ , idem hic atque in præcedente figura indicant. Cæterum si ali cui oculi enarratione ab extimis ipsius partibus persequi visum sit, is in uerso oculi figurarum ordine decimanonâ secundæ loco habebit, & decimamoctauâ tertiæ, atque ita deinceps.

## DE INSTRUMENTIS

QVÆ SECTIONIBVS ADMINISTRATIONIBVS PARARI POSSUNT.

FIGVRA XX.

**P**RÆSENTI figura mensa cui dâ incumbentem finximus asserem, quo in viutorum sectionibus opportune vrimur, dein huic asseri omnia propemodum accommodauimus, quibus in dissectionum administrationibus, adeoq; tota Anatome quis posset uti. Quo autem singula leuiori opera assequaris, huic etiam figura characteres, ac demum eorum indicem adhibere non gratus sum. Indicetur itaque.

- AA Mensa, cui reliqua omnia modò feriatim indicanda supersternuntur.  
 BB Asser viuus sectionibus administrationis idoneus.  
 CC Varia foramina, quibus laqueos pro animalis mole adhibemus, quum femore, & brachia vincimus.  
 DD Eiusmodi annuli, summis manibus, pedibusque ligandis adaptantur.

- E Huic annulo maxilla superior, libera inferiori catenula alligatur, vt caput immortum seruetur, ac interrim neque vox, neque respiratio vinculorû occasione præpediant.  
 EF Diuersa nouacularum genera, quibus spongia accumbit.  
 G Cultelli ad earum speciem formati, quibus calami adaptantur.  
 H Vulgaris qui mensæ adhibet culter.  
 I Grandis ac validus culter.  
 K Cultri è buxo parati.  
 L Hamuli.  
 M Varij stili vnâ cum siphone.  
 NN Obliquatæ acus cum filo crassiore, quibus literarum fasciculos colligamus.  
 n Minores acus, quas vulneribus suis accommodamus.  
 O Serra.  
 P Forficula.  
 Q Malleus ligneus.  
 R Arundines inflandis pulmonibus, & alijs quibusdam partibus idoneæ.  
 S Filum æneû, ossibus nec tendendis aptû.  
 T Subula forandis ossis parata.  
 V Varia subularum ferra.  
 X Forpex intorquendis filorum extremis comparatus.  
 Y Forpex, quo intorti, & ossa iam committentis filii reliquias præscindimus.

FIGVRA XXI.

**H**Ac figura suæ assert, quem viuis sectionibus administrationis parare solemus, alligatam conspicis, præstat autem suæ quàm vllum aliud animal sumere, propter assiduum grunnitum, quo melius vocis resolutio ablatioq; perspicitur.

# IOANNIS VALVERDI

## Medici de Humani Corporis Anatome.

### LIBER SEXTVS.

In quo de Venis, & Arterijs agitur.

*Quid Vena.* Cap. I.



**H**UMANI corporis fabricam, armis iam, ac tegumentis instruximus, tresque in ea recessus posuimus, abdomen, thoracem, & caput, quas ferè in partes vniuersum corpus diuidi solet: Præterea in triplici hac sede tria præcipua membra habitare diximus, in quibus tanquam in fornace quadam, quæcunque ad nutritionem, vitam, & motum necessaria sunt efformantur. Nunc scire oportet, ex tribus hisce principijs triplex meatuum genus enasci per quos, tanquam per aque du-

*Quid superioribus libris tractatum.*

ctus vim suam cunctis corporis partibus impartiuntur. Dico enasci, non quod iecur, cor, & cerebrum prius quam venas, arterias, ac nervos produci existimem; cum spermaticæ corporis nostri partes, æquè omnes in sui creatione à semine efformentur, nulla interim urgente necessitate, vt alterum ab altero sumat exortum; sed quia ita extructi meatus sunt, ac si ex commemoratis principijs nascerentur. Attamen ex ipsis ne producantur, inferantur ve, parum omnino interest, modo sciamus ex ipsis in iam natis, veluti à fonte membra omnia, vim, sustentationem, ac motum per hosce canales accipere; et eos qui à cerebro emanant, nervos; qui à corde arterias; qui à iecinore venas appellari; de quibus primum agere incipiam, quod ex primo imperfectioreque principio deducantur. Vnà etiam arterias persequar, quod venis, vt

*Vena quid.*

a. l. ii. iii.

plurimum focie accedant. Est igitur <sup>a</sup> vena, pars nostri corporis spermatica, instrumentaria, atque intus caua per quam veluti per ductum quandam sanguis cætera omnia membra nutriturus deseritur. Hæc peculiari tunica, membrana ve constituitur, quæ cunctis alijs corporis membranis, quod ad figuram, crassitiam, coloremque at-

b. c. d. f. iii. E

tinet assimilis est, etli aliàs admodum differens. Venarum namque tunica ex <sup>b</sup> triplici constat fibrarum genere, rectis nimirum, quæ secundum tunicæ longitudinem porriguntur; obliquis, quæ tunicam circum circa in orbem perreptant; & circularibus, siue transversis. Verùm obliquæ, ac transversæ utraque in orbem feruntur, & sese decussatim interfecant, quadrangulos quosdā in medio consiuentes, vt leui vnusquisque negotio, (modò grane non sit venam perferuari) in quouis intestino, aut vesica intueri poterit. Ex hoc fibrarum discrimine vena pars dissimilis euadit. Aliæ siquidem membranz vnicum duntaxat fibrarum genus adeptæ sunt, & similia ob id corpora nuncupantur. Porro venarum fibræ, etli musculorum fibris substantia, figura, & colore correspondent, actione tamen plurimum differunt; illæ namque carnem habent adnatam, & voluntario motui famulantur; hæ vero nulla carne implicitæ motui naturali edendo præficiuntur, nulla ratione ex arbitratu nostro pedenti, quo quidem, sanguinem, siue alium quemvis humorem in seipsis contentum attrahunt, retinent, & expellunt; vnoquoque fibrarum genere peculiari motui deserviente, rectis nimirum nutrimenti attractioni; obliquis retentioni eiusdē, quod ita amplexantur, vt nec sursum, nec deorsum plus quam pro corporis nutritione parsit ipsum deferri sinant; transversis expulsioni. Ex triplici hoc fibrarum genere alba, quædam, & neruea membrana, prima scilicet venarum constat, quæ facile pro maiori

*Venarum tunica quo ab alijs tunicis differat.*

*Fibræ tunicæ venarum quo à musculorum fibris differant.*



maiori minori ve contenti sanguinis copia ampliatur, stringitur ve. Præter peculiaritatem hanc tunicam, aliam in super-venæ sibi vendicant, plenique alijs corporis partibus communem: hæc ipsa venas, ubi nullo musculo, nulla ve viscerum parte obteguntur, quales sunt, quæ inter cutem, & carnem occurrunt, obuoluit; præsertimq; si venæ huiusmodi iuxta os, aut durum quodpiam corpus porrigantur, vel nulli parti adhærentes serantur. Tunc enim ex proximioribus partibus tenuis licet educitur tunica, venamque inuoluens, tutiorem ipsius ductum reddit, & conterminis partibus firmiter adnectit. Quod quidem ex eo apparet; quod corpus aliquod ipsas custodiens perreptans, ac destituuntur; tum quod abundè firmatæ ipsa non egeant; tum quod sanguinis exitus, qui refudatione per huiusmodi tunicas fit, magis impediretur; & quia sanguis difficilius præ tunicarum crassitie, alterationem intra venas, à membris fusciperet. Atque hanc ob causam venæ intra iecur consistentes tenuissimas omnium membranas adeptæ sunt, tum quod cibum in sanguinem commutent, tum quod eundem ab omnibus ferè recrementis emundent. Præcipuus venarum usus, ut diximus est, alimentum ad membra deferre; quanuis ramali aliquot, ut venæ portæ propagines, mesenterium peruadentes, cibum à ventriculo ad iecur alij, quales renum sunt, superfluitates ad vesicam deferant.

Sanguinis à venis ad membra refudatio.  
Venarum usus.

Quid Arteria, quæ ipsius substantiâ, et usus. Cap. 2.

Arteria quid.  
Quid in arterijs consistatur.

Arterias nunc appellamus, a vasa illa teretia, ex corpore instar membranæ, tenui, albo, & cauo, perinde, ac venæ conflata, quibus vitales spiritus per vniuersum corpus diffunduntur, calorem ipsius remittentes, rescientesque vna cum tenuissimo totius corporis sanguine, qui pro vehiculo, ac duce ipsi est. Et si Hippocratis, Platonis, & Aristotelis temporibus, b asperam duntaxat arteriam, nomine arteriæ dignabantur, quasque hodie arterias nuncupamus à venis eo tantum distinguebant, quod illæ pulsam ederent, hæc verò nequaquam, quodque sanguinem illæ quam hæc calidiorem continerent. Ast his, quæ ab ipsis constituebantur differentijs, aliæ insuper accedunt. Arteriæ liquidem duas obtinent peculiare tunicas quibus induuntur; quarum exterior venarum tunice, tam crassitie, quàm robore similis est; interior verò quintuplo ferè crassior existit, & vsque adeo dura, ut eam nonnulli cartilagineam, Arabes autem neruum pulsatilem appellarint. Tunicæ hæc, non secus quam venarum, fibris quibusdam constant; interior transuersis tantummodo donatur; exterior rectas adipiscitur, & quasdam subobliquo; transuersis omnino destituitur. Quod quidem haud citra graue mysterium effectum est; cum enim arterijs partes hæc demandatæ sint, ut spiritus, quemadmodum diximus, contineant, caloremque narium refrigerent, cordis spiritibus in corpus vniuersum demandatis, transuersas fibras plures quam obliquo obtinuisse oportuit, quippe cum illarum beneficio spiritus dispen- sent expellant ve, his autem eisdem retineant. Interior tunica cutem obtinet internæ ventriculi, & intestinorum cuti, siue araneæ teli consimilem; quæ in insignioribus ramis adeo conspicua est, ut eam nonnulli tertie tunicæ loco recensuerint, Præter hæc tunicas, alteram in super quibusdam in partibus fortiuntur, qualem venas habere tradidimus. Arteriarum tunice validiores quam venarum sunt, ob perennem scilicet motum, quo faciliè inualidæ existentes disrumperentur; sunt, quoque densiores, quod spiritus minus faciliè exoluantur.

Quo differant vena & arteria.

Arteriæ tunice, ac substantia.

De Venarum Arteriarumq; numero. Cap. 3.

Quemadmodum omnes venarum in corpore consistentium propagines, magnas paruasque recensere velle, haud minus arduum quàm superuacuum existit, sic insigniores diuersaq; principia, & processus habentes enumerare, tam facile est, quàm necessarium. Sunt igitur venæ in homine tres. a Prima ex caua iecoris sede prodiens per bilis folliculum, ventriculum, lienem, omentum, mesenterium, & intestina diffunditur. Huic, Porta nomen est, quod per eam veluti per portam, cibus à ventriculo,

Venarum diuisio.

a. tiiii.

b lib. i. c. vii. f. iii.

c ra. iii. f. i. A, B, C.

a. tiiii. f. i.

**b** t.ii. triculo, & intestinis in iecur deferatur. **b** Secunda à gibbis iecoris emergens, per cæ-  
 teras omnes corporis partes, pulmone duntaxat excepto, innumera ramorum sobole  
 distribuitur; & vena magna, siue caua dicitur, quod in ea tanquam in cauea quadam  
**c** t.iii. f.iii. sanguis recondatur vniuersus. **c** Tertia ex dextro cordis ventriculo emanans, in totos  
 pulmones excurrit, diciturque vena arterialis, quod membranam obtineat, instar ar-  
**d** t.iii. f. v. t. vsque progreditur, ibique in venam portæ inferitur, foetui in vtero alimenta suppe-  
 ditans; quam in præsentia in venarum classem minimè referam, quod vsus in homi-  
 nibus nullum præbeat, quoddam venæ portæ ramus videatur. Arteriæ haud plures  
**e** t.iii. f. v. duabus existunt. Quarum <sup>e</sup> prior ex sinistro cordis sinu pronata per vniuersum cor  
**f** ta.iii. f. iiii. pus, pulmone excepto, digeritur, diciturque arteria magna. <sup>f</sup> Altera ex eodem sinu  
 originem sumit, & in pulmones disseminatur, arteria venalis dicta, ob tunicâ, quam  
**g** ta. v. f. vii. venarum tunica similem adpiscitur. <sup>g</sup> Adfunt & alii duo arteriarum furculi ab vm-  
 bilico per vesicæ latera procedentes, & singuli vtrinque in magnæ arteriæ caudicem  
 iuxta os sacrum inserti, qui haud magis in arteriarum numerum seorsum referendi  
 veniunt, quam vena ab vmbilico ad iecur porrecta.

Arteriarum di-  
 uisio.

De Glandulis venarum, arteriarum, & de duobus Tibis adnatis. Cap. 4.

**V** Bicumque venæ atque arteriæ in ramos diffinduntur, glandulas quasdam cir-  
 cum circa adnatas habent, nodis, qui in arboribus conspiciuntur similes; quæ  
 vsus hunc præstât, tum vt venæ atque arteriæ inibi validiores sint, nec ad spirituum  
 sanguinisque per ipsas ingressum scindantur, referentur ves; tum vt ipsis per durum  
 aliquid corpus repentibus strati ritu substernantur. Verum aduertere oportet, haud  
 æquæ ramis omnibus huiuscemodi glandulas assistere; sed quemadmodum in illis  
 venarum arteriarumque partibus membranas haberi narrauimus, vbi aut denudatæ  
 illæ sunt, aut os quoddam supergrediuntur; sic etiam præsentibus glandulæ numero-  
 siores crassioresque inibi occurrunt, vbi venæ, aut arteriæ, ramos proferunt, qui è mè-  
 branis aliquibus pendent, aut super articulum aliquem, siue os acutum perperant;  
 quemadmodum in vena <sup>a</sup> portæ conspiciuntur fit, quæ tota in stomachum, lienem &  
 intestina distribuitur, nullæ vsquam parti, quàm tenuibus quibusdam membranis  
 adherens. Eundem quoque in modum <sup>b</sup> in venis iis conspiciuntur, quibus <sup>c</sup> mem-  
 branæ thoracis cavitatem succingentes, & tunica cerebrum ambiens, implcantur, præ-  
 sertim quæ ipsius testes obtegunt. Sub elatissima etiam ossis pectoris regione glandulæ  
 huiusmodi visuntur, sub auribus iuxta laryngem, sub axillis, in cubiti flexu, in ingui-  
 nibus, in poplite, & plerisque aliis in partibus, vti sigillatim suis locis adnotabimus.  
 Glandes hæc carne constant spongiosæ, superfluitatibus humoribusque suscipiendis,  
 inter omnes corporis partes aptissima; quantis aliquid inter ipsas in substantia, co-  
 lore, figura, nomine ac duritie discriminis intercedat. Quædam enim mollior: s rubi-  
 dioresque sunt, nec à glandis imagine admodum absmiles; qualis <sup>d</sup> ea est, quæ ad te-  
 nuium intestinorum habetur intuitu, paulò infra ventriculi fundû, & <sup>e</sup> quæ in elatissi-  
 ma sede inferioris omētis membranæ sub ventriculo consistit, quæ quod adeo rubeat,  
 & carni assimiletur, sitque æquæ omni ex parte mollis, <sup>αδγπεας</sup> græcis, idest tota car-  
 nea dicta est. Huic etiam consimilis est, quæ sub pectoris osse in stomacho reponitur.  
 Aliæ in quibusdam corporis nostri partibus glandibus nō absmiles occurrunt, diuer-  
 sas appellationes pro locorum quos occupant ratione obtinentes; vt <sup>f</sup> quæ in mesen-  
 terio habetur, vulgo animellæ dictæ; & <sup>g</sup> quæ in cerebro est, pineæ nucis imaginē refe-  
 rends. Alia quintetia in corpore glandularū genera comperiuntur, quæ nō vt prædictæ  
 mēbro cui attexuntur muniendo, sed superfluitatibus in eo productis excipiendis fa-  
 mulantur; cuiusmodi ea est <sup>h</sup> quæ ossi cuneiformi insidet, cerebri pituitâ excipiens,  
 eamque ad os, & nares demādans; & <sup>i</sup> quæ lingvæ radici appositæ sunt, & quæ sub axil-  
 lis, in inguinibus, & sub auribus cōsistunt, huius quoque generis sunt <sup>k</sup> quæ vesicæ collo  
 in maribus attexūtur, in quas vt diximus seminis ductus siue canales inserūtur. Aliæ  
 loco in quo sunt humectando deferuiunt; quales sunt, quæ in duodeno intestino  
 Anat. Val.

Harum glandu-  
 larum vsus.

Quibus in par-  
 tibus plures pie-  
 ciores, & glandu-  
 le consistunt.

Glandularum  
 substantia.

Glandule recre-  
 menta suscipien-  
 tes.

Quæ ad partis  
 humectationem  
 conferunt.

Z & quæ

& quæ in mesenterio consistunt. Aliæ locos in quibus reperiuntur, opplent, vt quæ gutturi vtrinque in mulieribus asident, & quæ sub auribus sunt. Mamillarum glandulæ præterquam, qd lacti producendo inferiunt, mamillas insuper duriores reddunt. Aliæ plures alias, varisq; habent functiones, vt suis priuatim locis dicemus.

De Venæ Portæ exortu ac distributione. Cap. 5.

**A**B interna iecoris parte, Venam Portam enasci, ac in ventriculum, lienem, omentum, intestina & mesenterium distribui diximus. Sequitur nunc exortus ac distributionis ratio explicanda. Sciendum est igitur ex toto<sup>a</sup> iecoris ambitu venas quasdam per exiguas enasci, quæ in internam iecoris regionem versus ipsius medietate exporriguntur, inuicem deinceps coeunt, maioresq; soboles tantisper constituentes, dum tandem omnes in<sup>b</sup> quinque vt plurimum ramos, nonnunquam vero in pauciores coeant. Atq; hi simul omnes in caua iecoris regione, paulò magis introrsum, & versus posteriora, iuxta dorsum, in<sup>c</sup> insignem amplumq; caudicem congregiuntur, qui vena porta, vt diximus, appellatur. Vena hæc hunc in modum producta oblique paululum ad læuam descendit, exiguos quosdam furculos effundens ex medio nempe anterioris suæ regionis iuxta iecur, <sup>d</sup> duos admodum tenues ramos, qui bilis vesicæ collo inserti ipsum in orbem amplexantur, inque plures exiguos ramos discissi, in exteriorem omnem vesicæ tunicam diffunduntur, nõ dissimili ab his modo, quos per albam oculi <sup>e</sup> tunicâ excurrere cernimus. Ex eadem anteriori sede, paulò inferius, ad dextrum latus<sup>f</sup> alius proferitur ramus, prioribus insignior, qui pyloro insertus, in posteriorem ventriculi sedem dorsum respicientem ramulos aliquot emittit. Quibus proiectis, inferiora paulisper petit, & in duos dispartitur truncos, <sup>g</sup> minorem alterum, qui ad læuam tendit, alterum <sup>h</sup> maiorem, qui ad dexteram fertur. Si nister duos ilicò furculos profundit; <sup>i</sup> alterum dextrorsum qui dextram adit inferioris omenti membranæ regionem; & eam intestini coli sedem, quæ hac porrigitur; <sup>k</sup> alterum sinistrorsum in soboles aliquot discissum, quæ dexteram ventriculi regionē scapulas respicientem adeunt. Ac paulò vltius protensus, ad dextrum latus<sup>l</sup> propages quasdam in eas glandulas effundit, quas in interiore omenti membrana reponi diximus. Post hæc<sup>m</sup> alium proferit ramum, omnium ventriculum adeuntium longè maximum, qui per inferiorem etiam omenti membranam digeritur. Ramus hic oblique sursum ad læuam; sub ventriculi regione dorsum respiciente serpit, cui <sup>n</sup> duos exiguos ramos exporrigit, vtrinque; vnum, in plures quoq; propages dispersos. Atq; hinc sursum per eandem posteriorem ventriculi sedem, ad <sup>o</sup> dextrum oris ipsius latus, non nihil in priora contendit, & anteriorem omnem prædicti oris partē ambiens, denuò retrocedit, coronæ ritu ipsum circumdās, & ramulos semper aliquos deorsum per ventriculum effundens, aliosq; sursum per stomachum, quā is ventriculo cōtinuat per excurrentes. Inter ceteros autem ramos, vnum <sup>p</sup> priuatim ex dextra venæ regione producit, qui per posterius oris ventriculi latus in priora ad ipsius fundum delabitur, inferius officium venulis aliquot comprehendens, & exiguos quosdam radios circū circa in oēm partem profundens. Venę huic, quā frequēti adeo sobole ad ventriculū repere tradidimus, <sup>q</sup> altera correspondet ab inferiori eiusdē trunci sede pnatā, & in inferiorē omenti tunicā insertā; q paulò post exortū in <sup>r</sup> duos dirimitur ramos insigni ab inuicem intervallo distantes, q statim in cōplures dissecantur ramusculos, deorsum per eā crassi intestini partem (quæ inferioris omenti membranæ interuētū, dorso ac si pars mesenterij esset, cōmittitur) & per eandem quoq; omenti membranā disseminatos. Vbi ramus hic cōmemoratas eduxit propages, ilicò in duos diducitur <sup>s</sup> ramos, hiq; rursus in duos alios, & sic deinceps alij in alios dissecantur, donec numerosa furculorū serie per vniuersum <sup>t</sup> lienis corpus, inferiore omenti tunica ppetuò suffulti, rectā dispergātur, ex ramo tñ imā lienis regionē petente, priusquā in tot agatur propages, <sup>u</sup> tenuis quædam vena emergit, quæ per inferiorē omenti membranā gemina sobole dispensatur; idq; potissimum vbi primus maioris venæ in prædictā membranā pertinentis ramus, adeo exiguus est, vt per vniuersum omentum distribui ne queat. ex ramo autem qui editissimo lienem adeuntium ramo proximus est, paulò

Vena portæ oritur ex iecore.

Quinque venæ huius ramos.

Caudex.

Ramus in pylorum insertus.

Vena portæ ramus, in duos truncos dispartitur.

Vena dextrum ventriculi latus petens.

Vena ventriculi orificium ambiens. Alter ramus.

Vena inferiorē omenti tunicam petens.

Quæ ad lienem fertur.

Quæ ad inferiorē omenti membranā.

a t.iii.fig.1. AAAA.

b ead.iii.iii.iii.v.

c ead.B.

d ead.CC.

e li.v.iii.f. xviii.xix.

f t.iii.f.i.D.

li.iii.fig.xiii.

g t.iii.f.i.E.

h G.

k x.

l M.

m x.

n oo.

o t.iii.f.i.P. li.iii.f.13.d.

p t.iii.f.i.R. t.v.iii.g.

q t.iii.f.i.s.t. v.iii.H.

r ead.

s ead.TT.

t aaaa.

u V.

x xx.Y.

paulò ante quàm ad lienem pertingat, <sup>x</sup> vena quædam educitur, per finiftrum ventri-  
culi latus, adufq; os ferè ipsius excurrrens. Id Romæ Pontificatus Pauli Tertij vacatio-  
ne, in Cardinali Cibone confpicuum euafit, qui fanguinis per vomitum reiectione  
ne è viuis fublarus, diffectus fuerat. Quò enim loci, vnde fanguis profunde-  
batur certiores redderemur, ventriculom exprimebamus, statimq; lien euidenter intumefcere  
& contra expreffo liene, ventriculus infigniter fanguine turgefcere confpiciebatur,  
per huiufcemodi fcilicet venam, quæ notatu dignæ amplitudinis erat, & proximè ad

7 2.

ventriculi os confcendebat. Haud fecus ex ramo lienis inferiora petente <sup>y</sup> altera ve-  
na paulò amplior expromitur, quæ perinde ac prædicta dextrorfum vergit, & in leuif-  
fundi ventriculi latus adigitur, illi correfpondens venæ, quam per dextrum latus ad  
idem orificium defcendere monuimus. Ambæ enim iuxta ipsius medium in exiguos  
quofdam ramos inuicem complicatos definunt, Ac finiftra quidem, perinde ac dex-  
tera furculos quofdam ad finiftrum fundi ventriculi latus antrorfum retrorfumque  
profundit; fimulq; ambæ anteriori omenti tunicæ riuulis complures exporrigunt.  
Fit quoque non infrequenter, vt ex ambabus venis in lienis caua implantatis, paulò  
antè quàm ad ipfum pertingant, duæ aliæ exiles venæ proferantur, quæ in ventricu-  
lum, non procul ab alijs in fectiorem moliuntur; immò verò neque colore, neque in-  
fertiorem modo, à reliquis venis in ventriculo occurrentibus quicquam differunt. Hi  
sunt, quos finifter truncus expromit rami. <sup>z</sup> Dexter, alimenta in fectinis deferens, fimu-  
latq; ad omentum pertingit, in <sup>a</sup> tres præcipuos difcinditur ramos, in innumeras pro-  
pagines diffectos, quæ per mefenterij membranas, difperguntur, & posteriorem inte-  
ftinorum fedem eidem mefenterio alligatam amplexantur, in ieiunum, ileum, cæ-  
cum, & dextrum coli latus, quæ id renibus & iecori adiacet, definentes. Quotnam hi  
rami funt, per arduum fcitu eft, tum quòd non idem fit in omnibus eorum numerus,  
tum quòd non eundem omnes ordinem feruent, quantum omnes, vt diximus ad inte-  
ftina contendant. At ex tertio ramo, qui per læuum potiffimum latus mediæ mēfen-  
terij partis propagatur; <sup>b</sup> in fignis quædam vena exoritur, in eam <sup>c</sup> mēfenterij partem  
inferta, quæ inteftinum <sup>d</sup> craffum dorfo committit, à liene ad rectum vfque intefti-  
num; ac dein alios exerit ramos, in eam coli partem applantatos, quæ à finiftro ven-  
triculi latere ad rectum vfque inteftinum pertinet. Inter hos etiam ramos, interio-  
rem finiftri lateris mēfenterij regionem petentes, <sup>e</sup> alius in fignis amplitudinis habet-  
tur, inter duas ipsius membranas exporrectus, perinde ac cæteri rami, fub craffo inte-  
ftino, ac recti vfque initium; & per inferiorem ipsius regionē complures ramos proj-  
ciens, ad podicem pertingit, vbi non folum pofteriorem ipsius partem occupat, fed  
etiam <sup>f</sup> propagines multas quoquouersum effundit, quæ circum circa, podicem am-  
plexantur. Porro etfi tres hi commemorati rami, furculos innumeros in omnia inte-  
ftina emittunt, longè tamen plures <sup>g</sup> tenuibus, quàm craffis inteftinis communicant,  
vti vnufquifque in quouis corpore leui negotio intueri poterit. Nam quo inteftina  
ventriculi fundo proximiora funt, eo plures obtinent venas, quandoquidem plus nu-  
trimenti ex his, quàm ab inferioribus iecur exugit. Quemadmodum verò nonnullis  
venæ portæ ramis glandulas quafdam attendi ad initium diximus, quæ venas am-  
plexantur; fic etiam in <sup>h</sup> mēfenterio habentur, vbi ramos aliquot exerunt; quæ qui-  
dem glandulæ pro eductorum furculorum ratione maiores minoresue funt. Hæc  
eft venæ portæ vniuerfa diftributio, cuius præcipuæ partes funt nutrimentum à ven-  
triculo ad iecur deferre; Adhæc ventriculo, inteftinis, lien & reliquis omnibus  
coctionis instrumentis; per quæ diffeminat, nutritiendis deferuit, nec non etiam  
fuperfluitatibus quibufdam fanguinis expurgandis. <sup>i</sup> Quæ ad bilis veficam ferunt-  
ur, priorem ipsius tunicam enutrient: Haud fecus <sup>k</sup> quæ lienem adeunt, lienem  
alendo famulantur, & confequenter iecur à fœculentum fanguine vindicant. Quæ  
à liene in ventriculum ferpit, craffum illum humorem, quem lien veluti fuper-  
fluum dimittit, expurgat, fiue is ventriculi os fiue ipsius fundum petat. Qua  
de re magna eft inter medicos controuerfia; fiquidem ex græcis (a quos qui-  
dem ego viderim) folus Paulus Aegineta, ad os ferri ait. Verum ita fe habet;  
ad mediam ventriculi amplitudinem ferè confcendit, hincque deorfum prolabitur

Que ad ventri-  
culi fundum.

Alia vena ven-  
triculum peten-  
tes.

Dexter vena  
portæ caudex.

Vena hæmorrhoidales.

Vena portæ mu-  
nis.

a G.

a b, b, b.

b c, c, c.

c li.iii.f. x. R.

S, T.

d cad. fig. v.

vii. a Q ad

T.

e t.iii.f. i. d.

d, d.

f cad. e, e.

g li.iii.f. viii.

M, M.

h cad. fig. x.

M, M.

i t.iii.f. i. C.

k cad. T. T.

in aliquibus autem corporibus os ipsum adit, vti iam de Cardinali Cibone retulimus, quod & in aliis priuatim ipse obseruauit. Ex reliquis venæ portæ ramis in ventriculum & intestina disseminatis, alii nutrimentum hisce partibus deferunt, alii assumptum ex ventriculo, & intestinis alimentum ad iecur mittunt per insignem meatum ex venis hisce omnibus conflatum, veluti per portam quandam, vnde venæ hæc porta dicta est. Cuius ramus, quem sub recto intestino, & per mesenterium ferri diximus, ramos quosdam effundit, qui ad anum pertingentes, earum venarum capita constituunt, quas hæmorrhoides appellamus; quæ quotiescunque lien scæculentum sanguinem è iecore non excipit, aut susceptum in ventriculum non eruat, referantur; tunc enim venæ huiusmodi intumescunt, disrumpunturque. Estque hic illud animaduertendum, quod sanguinem alicui detracturi, iecoris, lienis, ventriculi, intestinorum, omenti aut mesenterii occasione, haud aliunde quam ex hæmorrhoidibus id ipsum præstare possumus; & ex his non ab alia corporis parte, quam iuxta anum.

Cui nam corporis partis magis conferat sanguinis per hæmorrhoides detractio.

ta.iii.f.i.B.  
li.iii.6.xi.B.

*De Venæ caua, & primùm, de ipsius cum venæ portæ ramis, in iecore, congressu. Cap. 6.*

Quenam venæ à iecore procedant.

Venarum in iecur diremptus.

ET si graui contentione inter se medici ac philosophi certant, ex iecore ne, an à corde venæ causæ pendeat origo; quia tamen dubium non est, secundum corporis nostri ordinem, cibum prius in ventriculo os, hincque per aliquot venæ portæ ramos ad iecur ferri, vbi manifestò in sanguinem conuertitur, per vniuersum corpus diffusum, ideo venam hanc ex iecore potius, quam aliunde proficisci dicerem. Sciendum est igitur, quod quemadmodum ex iecoris caua<sup>a</sup> venulas complures in orbem enasci diximus, quæ ad iecoris medium modicè retrorsum porrectæ inuicem coibant, in maiores alias radices deinceps commutatæ, dum ex omnibus insignis caudæ exurgeret; haud aliter quoque à conuexa iecoris regione numerosa venarum soboles vndique circum emergit. Imò verò iecoris substantia aliud nihil est, quemadmodum tertio libro edocuimus, quam venarum multarum, quibus concretus sanguis obducitur, coitus quidam & congressus; hæ igitur venæ versus medium, vti diximus, contententes, & inuicem coeuntes, b in maiorem deinceps amplitudinem assurgunt, donec vnà omnes in elatiori iecoris sede dextrum dorsum vertebrarum latus respiciente congregiantur, vbi in insignem abeunt caudicem, qui posteriorem omnem iecoris regionem perrepat, paruam quādam impressionem per omne quod pertransit spatium efformans, ita vt rudis in truncum adacta, facillè citra in iecur ingressum permeet. Truncus is ramos, vti inferius audies, in corpus vniuersum effundit, & venæ caua, siue magna dicitur: cui sanguis à venæ porta communicatur, aut vtriusque radicum extremis inuicem coniuuentibus, aut sanguine in iecoris substantiam, hincque in venæ causæ radices refudante: quæ sanguinem à venæ porta elaboratum, & ex bile vtraque expurgatum excipiunt, inque omnes corporis partes, tam inferiores, quam superiores demandant.

a. t.ii. AA. ta.  
iii. f. i. AAA  
versus 1. 2.  
3. 4. 5.

b lib. iii. fig.  
xvii. AA. BB  
t.iii. f. i. B.

Venæ causæ quo modo à portæ sanguis communiceatur.

*De venæ magnæ supra iecur consistentis distributione. Cap. 7.*

VENA caua suo è iecore egressu in duos truncos, vt multi existimarunt, nequaquam finditur, vt<sup>a</sup> magna arteria, dum cor egreditur. Neque illud verum est, a venam hanc, à iecore ad lumbos, quàm vsque ad cor ampliòrè esse; imò vnus idemque est truncus vniuersus, cuius elatior pars in sublime fertur, dextrum b diaphragmatis latus perforans, tumque ilicò nec pulmonis parte, nec alio quouis corpore interiecto, cordis membranas supergreditur, quæ quibusdam in partibus septo transuerso laxè committuntur, eaque præsertim, per quam præsens vena porrigitur, quæ c duos inibi profert ramos, multiplici sobole per diaphragma vniuersum, partimque per cordis membranas, vbi septo copulantur, diffusos. Quum primùm verò venæ hæc d septum egressa est, modicè in latus dextrum declinat, denique ad latus

Venæ septum transuersum persequens.

a. t.iii.  
b li. ii. v. s.

c t. ii. C.  
d li. iii. f. v. D.

uam



e li.iii.f.iii. uam paulisper obliquatur, & iuxta elatiorem dextri <sup>e</sup> cordis lateris regionem, infigni orificio <sup>f</sup> laevo sui latere dehiscit, quod dextro cordis ventriculo responderet. Atque inibi recta cordis auricula, anteriori venæ huius parti iungitur. Ex postica verò ipsius parte, vena <sup>g</sup> quædam efflatu digna emergit, quæ secundum posteriorem leuamque cordis regionem perrepat, cordis basim coronæ in modum succingens. Ab humiliori autem venæ huius parte <sup>h</sup> furculi quidam promuntur, deorsum per vniuersum cor ad ipsius vsq; mucronem excurrentes; qui eo crassiores sunt, quò prædictæ venæ pars, ex qua enascuntur, crassior est; ac proinde sinistri lateris ramus, & qui ventriculorum septum perreptant, insigniores ferè sunt. Vena hæc aliam interdum sociam habet, licet minorem, quæ ab anteriore ipsius regione nascitur, & per anteriorem cordis sedem spargitur. Vbi cor vena caua superauit, paulò gracilior efficitur, & cordis membranas perforans, <sup>i</sup> magnæ arteriæ superuehitur, dorso nequaquam insidens, vt quidam arbitrantur, cum inter ipsam & dorsum primum stomachus, deinde aspera arteria, tum magna arteria reponantur. Cum igitur vena hæc ad dorsum pertingere nò possit, tum ob dictarum partium interpositionem, tum etiam ob pulmones, & diaphragma, venam educere oportuit, quæ costis nutrimentum suppeditaret. Hæc <sup>k</sup> à dextro ipsius latere producit, simulatq; cordis membranas, & sedem egreditur, qua dextra pulmonis pars sinistræ connectitur, venarum arteriarumque ipsius interuentu, iuxta tertiam scilicet thoracis vertebram; statimque per idemmet dextrum latus iuxta thoracis vertebrarum corpora decliuus porrigitur, quousque ad aliquot lumborum vertebrae pertingat. Vena hæc, quæ nulla ipsi ab altero latere correspondeat, solitaria, siue coniugis expertis dicitur; imò à posteriori venæ huius regione dorso vertebras respiciente, furculi aliquot emergunt, singula costarum interualla singuli adeuntes, inferiores costas enutrituri. Venæ hæc siue furculi in integrarum costarum interuallis ad cartilaginem vsque porriguntur; in spuriarum verò interuallis, vltra cartilagine versus abdomen pertinent, in ipsius musculos etiam sese inferentes. In ipso autem per costarum interualla progressu, ramulos in proximiores musculos diffundunt. Præterea ex vena hac coniugis experte <sup>l</sup> furculi alij pullulant, dorso vertebrarum corpora, iuxta quod porriguntur, nec non spinæ medullam, & musculos qui partem hanc attingunt, enutrientes. Alij insuper propagines ex hac vena interserpientibus thoracem membranis, vbi hæc dorso coherent, offeruntur. Neque prætereundum est, ex hac vena protinus vt exorta est, exiguum nonnunquam ramum proferrì, in minores alios furculos diffissum, qui haud rectà excurrunt, vt qui inferioribus costis nutrimentum suppeditant, sed errabundo incessu in trium priorum costarum interualla disperguntur, ex quibus numerosa tenuium furculorum propago emanat, in totam costas succingentem membranam diffusa, fit etiam interdum vt hæc siue coniuge vena, vbi nonam thoracis vertebram attingit, in duos findatur truncos, quorum vterque decliuus iuxta costarum sui lateris radices fertur, ramulos ipsi aliquos exporrigens. Nonnunquam verò à sinistro venæ huius latere hoc eodem loco insignis quidam ramus effertur, quantus maximus illorum est, quos à vena porta educi, inferioremque omenti membranam adire prodidimus. Qui vbi transuersum vertebræ illius, per quam porrigitur, corpus transcendit, in duos ilicò ramos partitur, quorum alter sursum, alter deorsum, iuxta costarum capita siue radices fertur, singulis costarum interuallis singulos furculos in progressu offerens, id tamen raro euenit, bis mihi duntaxat, in hanc vsque diem visum. Hæc tota est venæ coniuge carentis historia; quæ haud oscitanter ob venæ sectionem in pleuritide pendenda est. Et meherculè si exortum progressumque ipsius respexerimus, & ex dextro potius latere sanguis mittendus videbitur, quodcunque tandem latus dolor infestet; aut saltem parum omninò interesse ostenditur; ex vtrolibet enim brachio sanguis detrahatur, semper ex vena caua prius, dein ex prædicta educatur necesse est. Sed vt eò vnde digressa est, nostra redeat oratio, Vena caua, vbi venam hanc de se protulit, ad iugulum rectà descendit, membranis thoracem interserpientibus, plurimisque glandulis, iugulo hinc circum adnatis

Vena caua cor  
da quomodo iun  
gatur.

Vena cor trans  
iens.

Vena coniugis  
expertis oritur,  
& incessu.



Vnde præses  
sanguinem mit  
tere in pleuriti  
de.



*Vena caua in  
fauibus parti-  
tio.*

fuffulta, quæ in vnum omnes corpus congregientes, pluribus è vena caua ini-  
bi eductis ramis, strati ritu substernuntur. Hac enim in parte primum in duos  
insignes <sup>m</sup> ramos finditur, ex quibus venę omnes brachia, caput, & musculos <sup>m</sup> t.ii.H.  
aliquot, superius ab vmbilico positos, enutrientes expromuntur. Ex vtroque hoc  
ramo statim atque dirempti sunt, <sup>a</sup> vnus inter alios per exiguis enascitur furculus, <sup>n</sup> t.ii.K.  
qui deorsum iuxta costarum radices, ad tertiam vsque costam illabitur, ramusculos  
quosdam nunc duarum, nunc trium costarum interuallis offerens. Ramulus hic in-  
terdum non ex huiusmodi vena, sed à caua proficiscitur, antequam in prædictos duos

*Vena sub pecto-  
ris ossis ab usque  
vmbilicum ince-  
dens.*

ramos dissecetur; quamuis fere desideretur, quia costarum interuallis venę pari ca-  
rentis propagines alimenta subministrant. Paulo altius ex anteriore venę caue se-  
de, vbi diuisionem subitura est, <sup>o</sup> vena vtrinque depromitur, quæ ad elatiorem os-  
sis pectoris sedem contendit, <sup>p</sup> deorsumque ad suum quæque latus, sub eo iuxta co-  
starum cartilagine fertur, multas variasque fundens propagines, alias quidem in  
membranas thoracem intersepientes, quibus venę hæc vnā cum alijs è vena caua ena-  
tis, perque ipsas irrepentibus, nutrimētum præbent; alias in interualla cartilaginum  
septem priorum costarum; in musculos insuper pectori incumbentes, partimque in  
ipsas etiam mamillas. Ac deinde à suo <sup>q</sup> ambe latere iuxta <sup>r</sup> mucronatam pectoris car-  
tilaginem egrediuntur, & per rectos abdominis <sup>s</sup> musculos ad mediū vsq; <sup>t</sup> ipsorum  
diffusę, aliquos semper ramos in proximas partes effundunt, quorum præcipuus ab-  
dominis cutem subit, & secundum costarum cartilaginum terminos delabitur; in  
exiles quasdam venas instar capillorum distributus, quæ obtutum ferè oculorum ef-  
fugiant. Duę hæc venę, etsi ferè, vti diximus, ex anteriori duorum insignium ra-  
morum sede, quā inuicem abscedunt, originem desumunt, interdum tamen ex radi-  
cibus trunci venę caue, antequam diffindatur, educuntur. Et quandoque altera  
quidem, præsertim sinistra ex ramo sinistram brachium petente, altera ex media ve-  
næ causę bifurcatione promitur. Nonnunquam verò vnica duntaxat ex vena caua,  
vbi hæc bipartitò scinditur, exortum sumit, & quum primum pectoris os attingit,  
in duos finditur ramos, quamuis id infrequentius accidit. <sup>u</sup> Duorum venę causę  
insignium ramorum vterque à suo latere, brachium versus contendit sub clauicula  
iuxta primam costam, ad usque axillam, quā in parte, non autem prius, vt prodidit  
Vesalius, in duos partitur ramos, per brachium vt postea dicemus distributos. Ex  
elatori tamen vtriusque priorum ramorum parte, priusquam è thorace excedant, <sup>x</sup> t.ii.NN.

*Progressus rami-  
um venę causę  
iuxta ingulum.  
Propagines ab  
hiscet ramis edu-  
ctæ antequam  
ad brachium per-  
tingant.*

vena exurgit effatu digna, quę obliquè sursum, versus posteriora tendit, ad laterales  
vsque ceruicis vertebrarum processus. Reliquum venę huius caluariam adit, & co-  
mite <sup>y</sup> arteria, per foramen ingreditur, quod iuxta posteriorem occipitis <sup>z</sup> capituli  
sedem haberi tradidimus; vbi verò caluariam subit, hæc quidem in <sup>a</sup> secundum, seu  
sinistram durę menynge sinum, socia verò ipsius in dextrum diffunditur. Præter ve-  
nam hanc <sup>b</sup> alia insuper ex posteriori eiusdemmet dicti rami parte, antequam is tho-  
racem egreditur, prodit, quæ per inferiores colli, elatiore verò thoracis vertebris  
adhærentes musculos, & per capitū quoque musculos exhauritur. Deinceps dicta  
ratione ex capacitate thoracis, inter primam costam & clauiculam emergit, <sup>c</sup> secundum  
musculum dorsum mouentium perforans; hinc axillam versus irrepit, iuxta  
glandulas hac in parte repositas delapsa: vbi sequentes præfundit ramos; Primum  
quidem duos, quorum <sup>d</sup> alter ex anteriore sede pronascitur, & per musculos <sup>e</sup> t.ii.P.  
digeritur, à pectoris ossis ac costis ad brachium, & scapulas porrectos; in mulie-  
ribus verò per mammas, cutemque ipsarum, <sup>e</sup> Alter ex posteriore sede promi-  
tur, & per musculos cauiam scapulę sedem occupantes, aliosque conterminos mul-  
tiplici propagine spargitur. Ramus autem ad pectus permanens, mediocrius ampli-  
tudinis venam interdum profert, quæ obliquè secundum pectoris latus decliuis fer-  
tur, perque musculum distribuitur, quæ brachium retrorsum demittitur. Vbi ve-  
rò ramus est præsentem venam non expromit, <sup>f</sup> ex eademmet iecoris vena enascitur, <sup>f</sup> R.  
paulò inferius propter axillam. Præterea ramuli quidam exiles inibi exoriuntur, in  
glandulas, & membranas axillæ subiacentes, distributi, hincque postmodum in  
internam brachij sedem, ut sequens caput edocebit, exhausti. Nunc operæ pretium  
erit,

*o* t.ii.L.ii.ii.  
*t* v.ii.ii.ii. fi.  
*i* K.  
*p* t.ii.ii.ii. fi.  
*BC*.

*q* t.ii.ii.ii. fi.  
*r* t.ii.ii.ii. fi.  
*s* t.ii.ii.ii. fi.  
*t* t.ii.ii.ii. fi.  
*u* t.ii.ii.ii. fi.  
*x* t.ii.ii.ii. fi.  
*y* t.ii.ii.ii. fi.  
*z* t.ii.ii.ii. fi.

*u* t.ii.H.

*x* t.ii.NN.

*y* t.ii.ii.ii. fi.  
*z* t.ii.ii.ii. fi.  
*a* t.ii.ii.ii. fi.  
*b* t.ii.ii.ii. fi.  
*c* t.ii.ii.ii. fi.  
*d* t.ii.ii.ii. fi.  
*e* t.ii.ii.ii. fi.  
*f* t.ii.ii.ii. fi.

*c* t.ii.ii.ii. fi.

*Q*.

*d* t.ii.P.

*e* cad. Q.

*f* R.

Vena iugularis interior.

Vena iugularis exterioris distributio.

Tres in margine occurrentes figurae in regione, posteriora tria genera ostendunt, in qua iugularis exterior dividitur, primum namque in secunda tabula conspici-

erit, ad ceteras venas, quae ab elatiore rami huius parte inter iugulum, atque humerum enascuntur, sermonem rursus conuertere. Primum iuxta commemoratam diuisionem in egressu ex thoracis cavitatem § vna depromitur, quae sursum altero asperae arteriae lateri haerens procurrit, riuulos semper aliquos asperae arteriae, ac membranis inibi consistentibus communicans. Vena haec Latinis, interior iugularis dicta est, quae vna cum soporali <sup>h</sup> arteria, cerebrum conscendit, furculos al. quos in itinere elatiori musculorum parti offerens, qui ceruicis vertebrarum anteriora occupant, ac stomacho subsunt; nec non etiam membranis sextum, septimumque nervorum par in vertice colligantibus. Simulatque autem <sup>i</sup> caput attingit, in duos finditur ramos; quorum <sup>k</sup> insignior, retrorsum iuxta cranium desertur, dum capitis cavitatem ingrediatur, per <sup>l</sup> foramen, quod sexto pari nervorum cerebri egressum praebere audies, alit nullum inter soporalis arteriae ramum comitem sibi, vt Vesalius ait, asciscens. Ramus is quem primum caput subiit, ilico distribuitur, vti peculiari suo capite fusius explicabimus. Nunc ipsarum in caput ingressum sermone persequi sufficiat. <sup>m</sup> Minor internae iugularis ramus soporali arteria relicta, capitis cavitatem ingreditur, per <sup>n</sup> foramen, quod ipsius gratia iuxta <sup>o</sup> tertij, & quarti paris nervorum foramen inciditur. Priusquam autem vena haec in duram menynghem digeratur, <sup>p</sup> furculum de se mittit, qui per foramen quoddam transuersum in temporum ossibus consistens, venae huic & ramusculo quinti paris nervorum cerebri commune, ad aures foramen desertur. Sed ad partitionem iterum redeamus quam in iugulo fieri tradidimus; statim post internae iugularis exortum, in progressu ad humerum, <sup>q</sup> alia producitur vena, quae non procul ab ortu <sup>r</sup> ramum a se depromit, qui per cutem posteriori ceruicis sedi obducitur, & musculos aliquot cuti hac in parte substratos, multiplici sobole distribuitur. Editio hocramo inter cutem, & latum, tenuemque buccas agentem musculum, per colli latera ad fauces conscendit, exteriorem iugularem appellatam constituens. Quae, vt in vetulis pluribus, in vociferantibus, in spiritum continentibus conspicuum euadit, quadrifariam discinditur. Prima distributio est, cum inter cutem & carnem recta ramus sursum irrepit, exiles quasdam venas proximis musculis, & cuti etiam exporrigens. Secundum distributionis genus est, vbi vena haec in medio colli longitudinis bipartito finditur, parsqe altera versus posteriora, altera versus anteriora conscendit. Tertium, quod infrequentiùs visitur, est, quum exterior haec iugularis in duos partitur ramos, qui paralleli sursum irrepunt; Quorum maior interdum inter cutem carnemque minimè conspuitur, quod sub eo musculo delitescat, qui à pectoris ossis apice, & à clauicula enatus, in mamillarem processum sese inferit; quod quidem nonnullos in eam sententiam deduxit, vt ramum hunc interiorem iugularem esse arbitrentur, ipsius amplitudine delusi. Quarta partitionis ratio fit, cum duo hi rami, hunc in modum ascendentes iuxta fauces cocunt in vnum acti, protinusque gemini redeunt, in duos dissecti ramos, vti mox subiungam. Haec venarum discrimina in collo spectantur, at qualiscunque tandem distributio fiat, semper in transitu ramulos quosdam tum in cutem, tum in conterminos musculos profundunt. Et vbi ad fauces pertingunt, sub maxilla propter aures, <sup>s</sup> pars ad internos oris musculos, & ad duram menynghem procurrit; reliquum in <sup>t</sup> cutem, faciei musculos, ad tempora, & <sup>u</sup> ponè aures, inque omnem capitis cutem exhauritur. Pars oris interiora subiens, in <sup>x</sup> tonsillarum regione partitur, ramusculos ipsi aliquid exporrigens, alios verò paulò insigniores in laryngem, in <sup>y</sup> glandulas ipsi alsidentes, in musculos ossis hyodis, in linguam, omnesque asperae arteriae, ac faucium partes, diffundit; quorum <sup>z</sup> maximus sub lingua secundum ipsius longitudinem concedit, in multiplices, & errabunda serie prorepentes ramulos discissus. Aliam praeterea <sup>a</sup> venam, ramus hic oris interiora peruadens, exerit, quae caluariam per illud <sup>b</sup> foramen subit, quod iuxta posteriorem sedem mamillarum temporum ossis processus visitur; quin etiam & ramos aliquot in tunicam, quae palato, & narium cavitati obducitur, diffusos. Ex quibus postmodum venulae quaedam, caluariam pariter subeuntes emanant; vna scilicet per <sup>c</sup> foramen, quod <sup>d</sup> secundum cerebri nervorum par transmittitur, quae in duram membranam absorbetur; altera per <sup>e</sup> maximum



s X.  
t V.  
u Y.  
x li.ii. vi. F.  
y li.ii. vi. L.  
z Is sub lingua iuxta vinculum occurrat.  
a li.iii. li.iii. E.  
b li.ii. v. li.ii. g.  
c ead. G.  
d li. v. li. xiii. G.  
e li. i. ta. v. li. i. I.

Vena per faciem  
propagata.

oculorum ossis capitis foramen, in duram quoque menynghem excurrens. Rami autem hi, vbi cranium ingrediuntur, aliquas etiam propagines in oculos projiciunt, ad frontis vsque cutem pertinentes. <sup>f</sup> Quod reliquum est venę huius, quam per cutem, & faciei musculos, caputque vniuersum distribui diximus, eaquam subijciam ratione, dirimitur. Primum vbi vena hæc regionem ponē aures attingit, vbi maxilla inferior superiori committitur, & glandulas quasdam offendit, venę huius distributioni eo in loco præfectas; ac in ipsarum medio in duos partitur ramos, quorum <sup>h</sup> alter ad genas, ad cutem nasi cartilagine obtegentem, ad <sup>i</sup> frontem, incerto ductu, ac distributione fertur; alter in alios duos scinditur ramos, <sup>k</sup> alterum in sui lateris tempus exhaustum, <sup>l</sup> alterum, post aures procurentem, inque occipitis cutem diffusum. Porro exterioris iugularis soboles in faciem & caput distributę, quę alterum latus occupant, alterius lateris venis copulantur, omnesque in vnā congregiuntur, præsertim in fronte, vbi <sup>m</sup> quę conspicitur vena, ex duabus hisce iugularibus venis constata est, quę per internos oculorum angulos irrepentes in ipsius medio inuicem coeunt. Illud quoque minimè ignorandum est, ex eisdem hisce ramulis, venas quasdam instar capillorum exiles proficisci, cerebrum adeuntes, per <sup>n</sup> foramina quædam in caluaria excisa, vsque adeo exigua, vt ferè non appareant. Haud secus quoque alię ex caluaria in cutem emergunt, vt suo loco dicemus.

### Axillaris & humerarię Venę in brachium propagatio. Cap. 8.

Numeralis vena  
in brachium  
distributio.

Diximus superiori capite ramum à iugulo in brachium tendentem, iuxta axillam in duos scindi ramos in brachium distributos. Horum <sup>a</sup> superiorem, capitis venam vulgo appellant, ex eo delusi, quòd à iugulari exteriori eam nasci arbitrentur. <sup>b</sup> Alterum venam iecorariam appellant. Cephalica vbi ad humeri summum pertingit, priusquam in musculum brachium attollentem sese abdāt, furculos aliquot in cutem effundit, quorum <sup>c</sup> præcipui per cutem prædicto musculo obductam digeruntur. In mulieribus verò nonnullis ad mammas vsque excurrunt, super clauiculis prorepentes, & venarum liuidarum partem constituunt, quę in earum aliquibus visuntur. Ramis his eductis, in <sup>d</sup> musculum cuius beneficio brachium attollitur, sese recondit, & inter internum musculi huius latus, & tendinem <sup>e</sup> musculi brachii pectori adducentis procedit, iuxta quorum insertiones iterum emergit. Ac postmodum inter cutem carnemque carnea membrana obducta deorsum porrigitur, & versus externum brachij latus contendit (vt vnique in se ipso, nisi venas impensius graciles obtineat, sit ut præter modum obesus, intueri licet) secundum externum <sup>f</sup> primi musculi cubitum flectentium latus irrepens, & <sup>g</sup> ramos aliquot in cutem, inque antè dicti musculi latus projiciens, qui partim recta, partim transuersim deorsum perreptant, ita vt versus brachij interiora nonnunquam cum <sup>h</sup> iecorarię venę ramis coire videantur. Vbi verò humeraria hæc, cubiti attingit articulum, <sup>i</sup> in duos vt plurimum, nonnunquam verò in tres scinditur ramos, qui aliquando equales, aliquando alter altero insignior occurrunt: <sup>k</sup> Primus, qui sepius deest, versus interiorem brachij fedem è regione cubiti descendit, definit que in furculos aliquot dissectus, sub <sup>l</sup> musculorum capitibus, secundos, tertioque digitorum articulos flectentium. <sup>m</sup> Secundus idemque maior à dicta sede oritur, & obliquè sub cute ad cubiti cum humero articuli flexus medium delabitur, hincque per brachij medium paulisper procedens, paulò antè cubiti articulum, alteri cuiusdam <sup>n</sup> ramo iungitur, quem à iecoraria vena educi audies, vnaque ex vtriusque <sup>o</sup> vena, communis proinde dicta, conflat. <sup>p</sup> Tertius ramus <sup>q</sup> secundum musculum radij motorem conscendit, sensumque ac sensum obliquus deorsum per radium ad medium vsque longitudinis ipsius procedit, deinde vnam versus obliquatur, quam vbi attingit <sup>r</sup> exiles quasdam venas super dicto musculo in cutem, sub qua defertur, effundit, quarum <sup>s</sup> maxima illa est, quam iuxta principium educit, vbi eam tripartito secari diximus. At sciendum est, ramum hunc in obliquo versus vñx appendi-

Communis vena  
ad.

ead. x. x.  
u ead. l

x t. ii. m.

y li. ii. ta. iii.

t. t. xii. T.

z ead. t. iii. l.

t. ii. v.

a ead. t. viii. t.

b t. ii. n.

c li. ii. t. x. f.

d t. ii. inter P.

& R.

e ead. o.

f ead. p.

g li. ii. ta. ix.

S. T.

h ead. Y. Z.

o. A.

i li. vii. ta. ii.

iii. a.

K li. ii. t. i. a.

l t. ii. q. r.

m t. iii. N.

n li. vii. t. ii. r.

o li. ii. t. vi. in

ter o. & y

p t. v. f.

q ead. g.

r li. ii. t. vi. r.

t. vii. i. z. 3. t.

x. l.

t. li. r.

s li. i. t. vi. fig.

vi. s.

u ead.

x t. ii. t. u.

y ead. G.

z ead. a.

a ead. g.

b ead. x. x.

c ead. i.

appendicem brachialisque radicem descensu<sup>t</sup> alteri axillaris venæ ramo<sup>u</sup> commi-  
sceri, & maiorem vnum ex ambobus confurgere, qui brachiale conscendit, & in  
ramos aliquot incerta serie dissectus, proxime ad paruum & anularem digitum con-  
cedit, ibique venam constituit saluatellam, siue Lienis venam appellatam, quam  
medici nonnulli in lienis affectibus pertundi iubere solent, quorumdam potius au-  
toritate, quàm vlla ratione adducti, vt perspicuum magis fiet, cum de iccorariæ ve-  
næ ortu verba faciemus. Ex hisce ramis aliqui in paruum anularemque digitum spar-  
guntur; Atque is est venæ humerariæ terminus. \* Axillaris protinus vt ab axilla  
emerit, & in brachium adigitur, sese inter musculos humeri os amplexantes re-  
condit, præsertimque inter anteriorem sedem<sup>y</sup> primi cubitum extendentium, &  
posteriorem tendinis<sup>z</sup> illius musculi, quo brachium pectori admouetur; ac post-  
modum inter posteriorem partem cubitum flectentium<sup>a</sup> musculorum, ramos ali-  
quot in progressu expromens. Ac<sup>b</sup> vnum quidem in primis<sup>c</sup> musculorum cu-  
bitum extendentium capitibus offert, qui<sup>d</sup> venulas illas è directo respicit, quibus  
glandulas enutriti monuimus. Post hosce ramos paulò inferius ex posteriore<sup>e</sup> ve-  
næ huius parte insignis exoritur ramus, qui venulas quasdam in cutem externæ bra-  
chij parti obductam mittit. Alius quinetiam ab externa venæ huius regione<sup>f</sup> ra-  
mus effatus dignus enascitur, qui obliquè per posteriorem brachij partem inter os  
& s<sup>g</sup> musculos cubitum extendentes ad externum vsque ossis humeri tuberculum  
delabitur, vbi<sup>h</sup> musculorum etiam ex huiusmodi tuberculo siue capite producto-  
rum subit capita, quibus exiguos quosdam ramusculos exporrigit; ac dein per ex-  
ternam vlnæ sedem deorsum fertur, vnà cum<sup>i</sup> quarto neruo eorum, quos brachium  
adire narrabimus. Hi sunt quos axillaris venæ, priusquam se in conspectum det, ra-  
mos educit, adusque scilicet<sup>k</sup> musculi brachium pectori adducentis infertionem;  
atque ibi in<sup>l</sup> duos propemodum æquales truncos dirimitur. Quorum alter toto pro-  
gressu occultatus, m<sup>m</sup> arteriaque ac<sup>n</sup> tertio manum petentium neruo comitatus in-  
cedit, & inter duos cubiti flexores<sup>o</sup> musculos, deorsum ad mediam sedem cubiti  
flexus porrigitur, ramulos quosdam tum hisce musculis, tum membranis nervos ob-  
tegentibus offerens. Vbi cubitum superauit, statim atque inter musculos motus  
digitorum opifices abdi incipit, p<sup>p</sup> in duos partitur ramos, qui parum omnino in-  
ter se abscedentes, furculos aliquot in conterminos iaciunt musculos; hisceque  
vlnæ alter, alter radio innitentes vnà cum horum musculorum tendinibus, ad ma-  
nus vsque volam procedunt, sub transuerso etiam brachialis ligamento porrecti.  
Volam vbi attingunt, in alios diducuntur ramos, qui sub volæ manus membrana re-  
pentes, in internam digitorum sedem, hac quam subiungam ratione digeruntur. q  
Ramus qui radio innititur, furculos duos in pollicem, totidemque in indicem;  
atque vnum in medium digitum emittit. Qui vlnæ incumbit, paruo digito duas  
propagines totidem anulari; vnâ medio exporrigit. Atque ex hoc ramo venula  
depromitur, quæ musculis externam volæ sedem occupantibus nutrimentum de-  
fert; ex altero autem furculus educitur, qui<sup>r</sup> musculos in primum pollicis os infer-  
tos enutrit. Sicque vniuersus hic axillaris venæ truncus nuppiam conspicuus pro-  
greditur. s<sup>s</sup> Alter sub cute versus internum ossis humeri<sup>t</sup> tuberculum incedit, Vena brachium  
vsque cubiti articulum, perinde ac humeralis conspicuus. Quum primum verò ela-  
tior interioris humeri<sup>u</sup> tuberis regionem attingit, sub cubiti flexum<sup>x</sup> in duos  
finditur ramos; quorum anterior cuti, quemadmodum & omnes ex eo educæ pro-  
pagines, substratus, deorsum ad mediam cubiti flexus sedem properat, vbi secun-  
do humerariæ<sup>y</sup> ramo<sup>z</sup> iungitur, nunc superius paulo, nunc paulò inferius; & ex  
vtriusque vena, quam Communem siue Mediam nuncupamus, efformatur. a Poste-  
rior ramus illic editus vbi, axillatis venæ truncus, iuxta interioris humeri tuberculum  
partitur, furculos complures educit, per inferiorem brachij sedem sub cute descen-  
dentes, partimque ad interna & externa latera pertinentes; ex quorum præcipuis b  
vnus per inferiorem vlnæ sedem, nonnihil extrorsum ad brachiale vsque contendit,  
& ramos quosdam profundit, cum humeralis venæ ramis<sup>c</sup> cœnentes quibus venæ hu-  
merariæ ramis deficientibus, vena hæc ipsorum defectui sufficitur. Præterea ex  
posteriore

Vena interna.

Vena brachium  
petens inter cu-  
tem & carnem.  
Vena axillaris  
ramus sub cute  
incedens.

Communis 70.

posteriore hoc ramo <sup>d</sup> alius emanat, qui per cubiti posteriora fertur, & per exteriorē d ead.y.  
 vlnę sedem inter cutem pariter & carnem delabitur. Alij rursus ex postrema hac ve-  
 na <sup>e</sup> furculi emergunt, <sup>f</sup> qui per internam brachij sedem diffunduntur, vario & in- e t. ii. ad z.  
 certo implexu tum inuicem, tum etiam cum nonnullis venę illius ramis coeunt, inferius.  
 quę per humiliorem vlnę sedem diffunditur. Ramis his <sup>g</sup> alia insignis vena copula- f ead.u.  
 tur, quam <sup>h</sup> axillaris venę ramus communem venam constituens, ab humiliori sede g ad z. supe-  
 & ex medio progressu emittit. Vena hæc interdum rectā, interdum verò in orbes rius.  
 quosdam acta, in brachiale fertur, sese alijs eiusdemmet venę propaginibus commi- h ead.t.  
 scens, quę adeo tenues sunt, vt leui negotio varicosę reddantur. Hæc ad brachiale ne-  
 quaquam terminantur, sed partim rectā, partim obliquę ac transuersim, modo inui-  
 cem commixtę, modò diremptę in internam manus cutem exhauriuntur, cuti non-  
 nunquam connatę, nonnunquam verò inter ipsam & membranam carnosam pro-  
 currentes. Atque harum <sup>i</sup> propaginum, quę pollicis radicem petunt, cum alijs co- i ead.s.  
 eunt <sup>k</sup> furculis, qui à communi vena educti in externam pollicis regionem diffun- K ead.q.  
 duntur. <sup>l</sup> Vena enim communis statim à sui productione, obliquę deorsum ad elati- l ead.s.  
 orem brachij sedem fertur, donec <sup>m</sup> radium paulò vltra suę longitudinis medium m ead.s.  
 conscendens, & ramulos aliquot incerta serie diffundens, ac nonnunquam propagini-  
 bus internam brachij sedem perreptantibus copulata, in externam brachij regionem  
 pertingat, per quam toto ductu inter cutem carnemque progreditur adusque me-  
 diam ferè vlnę appendicem, vbi in duos <sup>n</sup> partitur ramos <sup>o</sup> & siue A literę imaginem n ead.y.  
 æmulantes. <sup>p</sup> Elatio P sectionis huius ramus, furculum ad internam brachialis sedem o ead.s.  
 iuxta pollicis radicem mittit, qui dictis nuper hanc sedem perreptantibus <sup>q</sup> furculis p ead.s.  
 commiscetur, ac postmodum exterius inter pollicem & indicem procedit, in plures q ead.q.  
 soboles, quę interdum inuicem coeunt, discissus, & eam constituens venam, quam  
 medici complures, nescio qua ratione, in iecoris affectibus incidendam curant. <sup>r</sup> Infe- r ead.s.  
 rior horum duorum ramus ad indicem & medium digitum, & aliquatenus ad parvū  
 exporrigitur, in multiplices & ipse propagines dissectus. Huiusmodi est venarum  
 per brachium distributio. Qua in re illud animaduersione dignum occurrit, sectio-  
 nem, quam in manu fieri tradidimus, vsq; adeo variam esse, vt inter mille homines  
 vix duos reperiās, in quibus hæc eodem se modo habeat. Quamobrem, & quia venę  
 huiusmodi in quouis benevalente homine facillè occurrunt, illis demonstrandis mi-  
 nimè diutius immorabor. Id duntaxat, q̃ summè necessarium iudicem, subticere no-  
 lo, eos qui ex vena sanguinem detrahunt, inter pollicem & indicem excurrentes, hu-  
 merariam sese aperire existimantes, in magno errore versari; nec minùs hallucinan-  
 tur qui ab axillari sanguinem missuri eam pertundunt, quę inter paruum digi-  
 tum & anularem, siue inter anularem & medium porrigitur, cum ambę soboles sint  
 venę communis. Porrò non solum manus venę in diuersis hominibus euariant, verū  
 etiam quę brachij interiora perreptant, siquidem communis vena nunc declinior est,  
 nunc altius consistit; atque interdum humeraria deperditur, vbi cum axillari coit; in-  
 terdum verò hæc sola visitur; nonnunquam secus euenit, hisce atque alijs consurgenti-  
 bus differentijs, vt vniciuque in se ipso explorare licet.

Manus venę ad  
modum varię.

### De Venę Cauę infra iecur distributione. Cap. 9.

VENę cauę distributionis seriem superius à iecore tradidimus, superest nunc,  
 vt propagationis infra iecur rationem edoceamus. Scire igitur oportet, venam  
 cauam à <sup>a</sup> posteriore iecoris sede prodeuntem, statim atq; ab eo recedit, ad dextrum  
 dorsi latus <sup>b</sup> deflectere, ac <sup>c</sup> furculum in sinistram latus projicere, qui potissimum, in  
 crassam tunicam à peritonæo enatam & reni obductam, exhauritur; cui ramo al-  
 ter nonnunquam in dextro latere correspondet. Quanquam ferè dextri renis <sup>d</sup> ve-  
 na haud ex venę cauę caudice, sed ex <sup>e</sup> vena ferum ad renes deferente ortum defu-  
 mit; interdum verò secus accidit, vt scilicet vena per sinistri renis tunicam distribu-  
 ta ex vena ferum ad eundem renem deferente prodeat, & quę in dextri renis  
 tunicam

Vena exteriorē  
missuri renis tu-  
nicam petens.

a t. ii. AA. li.  
iii. fig. xvii.  
AA. BB.  
b t. ii. ab A,  
ud s.  
c t. ii. li. iii.  
f. xix. v.  
d t. ii. li. iii.  
f. xix. y.  
e ead. a. figu.  
xxii. m. a

tunicam exhauritur, ex dextro venæ cauæ latere originem ducat. Quum primum  
 vena hæc exactè ad dorsi medium appulit, iuxta primam lumborum vertebra[m]  
 duos<sup>f</sup> insignes educit ramos vtrinque singulos, qui rectà sese in renes propriunt,  
 Venæ emulgentes dicti, quod per eos serosum sanguinè renes exfugant. Et quem-  
 admodum nunc dexter, nunc sinister ren superior est, haud secus quoque modo  
 dextrum; modo sinistrum ramum editiorem esse contingit; nonnunquam ve-  
 rò ren altius consistit, ramus autem inferior subsistit. At nunquam sibi inui-  
 cem è directo respondent, quò melius renes serosum sanguinem alliciant, vti expli-  
 catius suo loco proditum est. Vterque igitur hic ramus ad sui lateris renem pertin-  
 ens, ilico in <sup>8</sup> duos partitur, mirabili artificio, vti suo loco diximus, in renis substan-  
 tiam exaustos. Verum ab humiliori sede sinistri rami circa ipsius medium, <sup>h</sup> vena  
 in viris exit, quæ peritonæo, quæ id lumborum musculos contegit, adherens in-  
 cedit, & furculos aliquot in ipsum deriuans, obliquè deorsum in sinistrum latustem  
 dit super<sup>i</sup> vrinarium sui lateris meatum, circiter ad os vsq; sacrû, hincq; pubis os iux-  
 ta inguen conscendit, & peritonæi membranæ, nec non primum secundum, &  
 quartum abdominis musculum circueus, pubis os<sup>k</sup> supergreditur per impressionem  
 ob id in ipso excultam. Ac postmodum<sup>l</sup> in gyros quosdam varicosos acta, (vnde  
<sup>m</sup> *xiprocædis* & *αἰσχροῦς*, quasi retortum quid testibus affidens dicas, appellata est) deor-  
 sum illabitur, dum se in testis elatiora inserat, vbi exiles quasdam<sup>m</sup> propagines in in-  
 ternum testis inuolucrum, aliasque complures in ipsam testis substantiam spargit. Ve-  
 næ huic sinistrum accedenti testem, alia interdum sed rarò iungitur, <sup>n</sup> quæ à sinistro  
 venæ cauæ latere paulò infra emulgentem venam emergit, & ex vtrisque simul iun-  
 ctis alia confurgit vena, qua semen in sinistrum testem deferitur. Ceterum <sup>o</sup> vena  
 dextrum petens testiculum non ex emulgente, sed <sup>p</sup> ex anteriori caudicis venæ cauæ  
 latere paulò infra emulgentem, versus dextrum latus, nonnihil prominenti & ro-  
 tundo exortu profertur. Venæ huic aliam ex eiusdem lateris emulgente ortam, ad-  
 iunctam fuisse Vesalius semel duntaxat sibi obseruatum testatur: Ipsi hæcenus nun-  
 quam vidimus. Dug hæc venæ, quæ seminis materiam disponunt, quò albedinem  
 à testibus promptius suscipiant, etsi varium obtinent exortum, iter tamen minimè  
 diuersum peragunt, eundem in viris omnibus ductum seruantes. Duabus hisce ve-  
 nis testiculos adeuntibus, <sup>q</sup> arteria vtrinque copulatur, quam<sup>r</sup> & magnæ arteriæ  
 trunco paulò infra venam enasci audies; hæc inuicem commixtæ implicationes quas  
 dum mutuo ingressu egressuque efformant, donec ex arteriæ spiritibus, & venæ  
 sanguine corpus quoddam vniforme confurgat (mixtio hæc græcis *αἰσχροῦς*, hoc  
 est venarum apertio dicitur) sicque in eminentiorem testis regionem concedit.  
 iuxta exteriorem finis huiusce meatus partem alius<sup>s</sup> exoritur ipsi continuatus,  
 nonnihil eo albidior duriorque; qui externa facie subrotundus est, vbi vero inte-  
 riori testis inuolucro applicatur, paululum in medio canalis instar excavatus. Sic-  
 que deorsum prædictæ membranæ adherens, à posteriore corporis varicosi sede in  
 posteriorem eiusdem partem labitur, ac interius paululum consistens, posteriori tes-  
 tis regioni innixus ad humiliorem vsque ipsius<sup>t</sup> regionem properat. Ac postmo-  
 dum denuò<sup>u</sup> ascendit, eadem membrana suffultus, ipsi interim minimè connatus,  
 & in gyros quosdam anguis siue vermis instar, actus elatiorem testis sedem conscen-  
 dit; vbi<sup>x</sup> tenuior, teretiorque redditus, rectà sursum citra vllos anfractus fertur,  
 anteriori<sup>y</sup> meatus parti innixus, quem semen ad testiculum deferre monuimus, ad  
 eminentiorem vsque pubis ossis regionem, iuxta inguen. Et per idem<sup>z</sup> foramen  
 ingrediens, quod priori meatui egressum præbuerat, deorsum tendit posteriori pe-  
 ctinis ossis parti incumbens, & peritonæo adherens, super vrinarium sui lateris<sup>a</sup>  
 meatum, procedit, & insertionem in<sup>b</sup> posticam ceruicis sedem molitur, in eam  
 scilicet glandulam, quam vsus huiusce gratia inibi haberi diximus. Hæc ita se ha-  
 bent in maribus. In muliere meatus hi ad os vsque sacrum eundem, quem & in  
 viro ductum seruant, sed crassius quibusdam<sup>c</sup> membranæ suffulti prorepunt, &  
 priusquam ad testem pertingant, ambo in duas finduntur partes; quarum<sup>d</sup> al-  
 tera in crassas quasdam membranas, & in vteri latera, nonnihil versus ipsius fun-  
 dum

Vene. ad renes  
 tendentes.

Sinister seminis  
 meatus.

Dexter.

Seminalis vena  
 cum arteria coi-  
 tus.

Meatus quo se-  
 men à teste ad  
 penem deferatur.

Meatus semina-  
 rius mulieris.

f. ta. ii. 8. li.  
 iii. fig. xix. a.  
 b. fi. xxi. 22.  
 a. n. a.

g. li. iii. fi. xix.  
 xxi. xxi. 25.  
 h. t. ii. li. 3.  
 fi. xix. c. fig.  
 xxi. x.

i. li. iii. fi. xxii.  
 q.

K. li. iii. fi. i. a.

l. cad. fi. xxii.  
 a. s. ad. fig.  
 xxiii. ab x.  
 ad x

m. fi. i. lii. D  
 n. fi. xxi. y.

o. fi. xxi. t.  
 p. fi. xxi. u.

q. li. 3. fi. xxii.  
 a.

r. li. iii. fi. xix.  
 G. fig. xxi.  
 xxii. a

s. cad. fi. xxii.  
 u.

t. ca. fi. xxiii.  
 F. fi. xxii. i.  
 u. cad. G.

x. cad. B. fig.  
 xxi. x.

y. cad. fi. xxi.

z. li. iii. fi. i. G  
 H.

a. li. iii. fi. xxi.  
 xxii. q.

b. fi. xxii. r.

c. fi. xxiii. o.  
 o.

d. fi. xvi. n.



dum digeritur. <sup>c</sup> Altera feminali arteriæ, perinde ac in viro fieri diximus, ilico coe- <sup>f. xvi. o.</sup>  
 pulatur, & minimè abdomen egressa, in sui lateris <sup>f</sup> testiculum adigitur, qui vti di- <sup>f. cad. r.</sup>  
 ximus ad latus fundi vteri situs est, & in <sup>g</sup> elatiorem testis regionem recurrès <sup>h</sup> haud <sup>g. cad. d.</sup>  
 editiora petens, irrepit in orbes, siue anfractus quosdam anguis riu acta, quousque <sup>h. cad. u.</sup>

Discrimina in-  
 ter prima, & se-  
 cunda seminis  
 vasa.

in angulum fundi vteri suæ regionis inferatur. Porò quantum in viris, ac mulieribus,  
 meatus testiculos adeuntes ab his, qui hinc vterius procedunt, tum substantia discre-  
 pent, tum etiam quia quod in prioribus continetur sanguinis colorem obtinet, in  
 posterioribus verò semen iam confectum, elaboratumque est; veruntamen quòd à  
 principio ad finem continuenter, vtrique spermatica vasa latinis dicta sunt. Estque  
 illud animaduersione dignum, in posterioribus ferè tantam feminis copiam asserua-  
 ri, quanta vni aut alteri procreationi plus minus ve satis esset; atque hanc ob causam  
 boues recens castratos prolem genuisse obseruatum est. Et quia diximus semè altiùs  
 à testiculis proficisci, sciendum est, nihil præterea in testiculis semen acquirere,  
 quàm quod mammæ in sanguinem conferunt, albedinem scilicet; neque verò ideo

Eunuchi cur mi-  
 nimè procreent.

Eunuchi filios minimè procreant, quòd semen ipsi desit, sed quia abscissi meatus  
 sunt, per quos ipsum deferri oportebat. Verùm his dimissis, & ad historiam no-  
 stram redeundo, præter duas hæc venas, quibus semen ad testes defertur, vena ca-

Vena lumbos ac-  
 cedentes.

ua à posteriore sui sede, quæ lumborum vertebrarum corpora spectat, quibus adhæ-  
 rescit, <sup>i</sup> propagines complures instar pedunculorum expromit, quæ per harum ver- <sup>i. t. ii. §. li. iii.</sup>  
 tebrarum foramina ingreditur, vnde neruos proflire audies, & spinali medullæ <sup>f. xvi. §.</sup>

alimentum deferunt; simulque ramulos aliquot in musculos vertebris hisce adnatos  
 diffundit, ex quibus alij rursus emergunt, ad abdominis vsque latera in arcum por-  
 recti, & musculis abdominis, quos perreptant, enutrientes. Simulatque autem <sup>k</sup> vena <sup>x. t. ii. o.</sup>  
 caua <sup>l</sup> sacrum os attingit, arteriæ magnæ, ne sacrum os ipsi officiat, paumentis ritu <sup>l. t. iii. f. xix.</sup>

substernitur, ac in duos protinus æquales ramos dirimitur, quorum alter dextrum, <sup>xxi. xxii.</sup>  
 alter sinistrum crus accedit. Ab exteriori vtriusque horum latere ab ipsa statim par-  
 titione, siue in ipsamet, nonnunquam verò & paulò altiùs, <sup>m</sup> vena promitur om- <sup>m. t. iii. v.</sup>

nium, quas ad lumborum vertebras, & abdominis musculos, aliosque lumborum ver-  
 tebris annexos reptare diximus, maxima: quæ transuersim supra lumbos progredi-

tur, ramos aliquot tum ipsi, tum abdominis musculis, & peritonæo porrigenis. Vena  
 hac educta, truncus vterque oblique deorsum versus exteriora fertur, & ambo in-

uicem A græcæ literæ figuram constituunt, <sup>n</sup> furculos nonnullos superioribus sacri <sup>n. o.</sup>  
 osis foraminibus in progressu offerentes. Dein vterque vterius concedens in duos

inæquales partitur ramos; quorum <sup>o</sup> interior idemque tenuior, ilico in duos alios <sup>o. p.</sup>  
 finditur; quorum <sup>p</sup> exterior, versus exteriora transuersim, inter sacrum & coxen-

dicis os, vnà cum <sup>q</sup> maximo cruris neruo se proripit, multiplicem ramorum seriem <sup>q. lib. ii. t. x. §.</sup>  
 in musculos, ab iliū osis externa fede pronatos, femurque mouentes, nec non etiam <sup>lib. vii. t. ii.</sup>

in eos qui ab humiliori coxendicis osis regione proferuntur, effundens: adeo vt po-  
 sterior coxendicis articuli sedes, & inguinum cutis à pluribus venæ huius propa-

nibus nutrimentum suscipiant. Interior ramus ab interiore sui latere exigua <sup>r</sup> ali- <sup>r. v.</sup>  
 quot propagines in sacri osis foramina mittit, aliasque his maiores in ani <sup>s</sup> muscu- <sup>s. f.</sup>

los, & cutem ipsi circumductam projicit, ex quibus aliqua ex hæmorrhoidibus con-  
 stituuntur. Paulò vterius <sup>t</sup> alia ex hoc ramo vena depromitur, quæ in maribus vesti- <sup>t. x.</sup>

cæ latus suæ regionis adit, & in plures dissecta ramos, in vesicæ collum, & penem ex-  
 hauritur; <sup>u</sup> in mulieribus pingui obrecta mrambrana propreditur, & ramulos ali- <sup>u. lib. iii. fig.</sup>

quot vesicæ porrigit, longè autem plures in fundi vteri latus dispensat, quorum ali-  
 qui crassiores effecti in ipsius ceruicem pertingunt, ac per hos virginibus, atque vte-

ro gerentibus menstruæ purgationes erumpunt. Haud ideo tamen cæteris etiam mu-  
 lieribus sanguinem hac parte expurgari incipias eo, quanuis per internam vteri ani-

plitudinem potissimum excernatur. Quod reliquum est <sup>x</sup> sinistri rami partitionis <sup>y</sup> ab: nasci-  
 supra os sacrum factæ, ad pectinis os contendit, & <sup>y</sup> ramo eundem ductum ab altero <sup>z. o.</sup>

latere seruanti copulatum, <sup>z</sup> venam vnà cum eo constituit, quæ primùm perito- <sup>a. lib. ii. t. xv.</sup>  
 neum, ac dein <sup>a</sup> decimum femur mouentium musculum perforat, & pubis osis <sup>b</sup> fo- <sup>f. xvi. f. g.</sup>

ramen permeans per sinum, tum ipsius, tum arteriæ, ac nerui gratia in elatori for-  
 minis <sup>b. lib. i. t. ii. li. iii.</sup>

Partitionis ve-  
 næ causæ iuxta  
 os sacrum figu-  
 ra.

Virginum, &  
 prægrnantium  
 menstrua qui-  
 bus effluunt ve-  
 nis.

**e** li.ii. c.iiii. minis sede insculptum, ac <sup>e</sup> membranam huic foramini obductam, nonumque fe-  
**b** b. mur mouentium musculum transuersim permeans, in femur se recondit, secundi  
**d** ra.ii. iuxta crus mouentium musculi, quintique, atque octauī femoris motorum capitibus ra-  
**e** mos aliquot exporrigens, ex quibus alij profiliunt furculi ad cutem vsque iuxta in-  
**a** guina reptantes. Præter hosce ramos <sup>d</sup> alius coxendicis acetabulum adit, per sinum  
**f** iuxta x. ingrediens, qui ob id priuatim in eo exculpitur. Hunc in modum ramus iste dige-  
**g** 5. ritur, & femoris medium raro superat; nihilominus præcipua ipsius vena quam  
**h** li.ii. c.vi. per quistum femur mouentium musculum propagari diximus, alteri maioris <sup>e</sup> ve-  
**li.iii. f.** na in crus deducta <sup>f</sup> ramo commiscetur. § Exterior caudicis venæ cauæ ramus obli-  
**i** c.ii. M. ta. v. quæ in crus contendit, & prius quam peritonæum perforat, ab elatiore sui sede, me-  
**li.ii. f.** diocrem expromit venam, quæ sursum per peritonæum, versus abdominis ante-  
**li.iii. f.** riora tendens, & ramulos quosdam peritonæo communicans in rectum abdominis  
**li.ii. c. vi.** musculum sui lateris pertingit; <sup>h</sup> ubi peritonæo, ac transuerso abdominis musculo  
**li.iii. f.** circumducta, in internam recti abdominis musculi sedem suæ regionis inferitur,  
**li.ii. c. vi.** & recto tramite ascendens, ramos aliquot in cæteros abdominis musculos transuersi-  
**li.iii. f.** m emittit. Vbi verò umbilicum paulo superat, in plurimos discinditur furculos,  
**li.ii. c. vi.** i venarum terminos contingentes, quas à iugulo deorsum sub pectoris osse deferri  
**li.iii. f.** monuimus. Venæ huius beneficio mammillis cum vtero communionem inter-  
**li.ii. c. vi.** cedere complures aiunt, eo quòd quæ deorsum fertur, dum mammas pertransit,  
**li.iii. f.** cum ipsarum venis coit, quæ verò ascendit iuxta ramum exoritur, quem ad vterum  
**li.ii. c. vi.** progredi diximus. Id quàm verum sit, deservere hic superfedeo, ne breuitatis in-  
**li.iii. f.** tractanda historia mihi propositæ terminos egrediar. Id nunc intellexisse suffi-  
**li.ii. c. vi.** ciat, venæ ascendentis, ac descendens extrema rarissimè inuicem committit.

Vena illi coale-  
 scens quæ sub pe-  
 ctoris osse me-  
 dit.

Mammæ  
 atque vteri con-  
 sortium.

De venæ cauæ in crus propagatione. Cap. 10.

**P**Ræter ramos quos à venæ cauæ in posteriorem coxendicis sedem effundi, & in fe-  
**a** mur prolabi diximus, duæ priuatim venæ ab ea proferuntur; <sup>a</sup> minor altera,  
**b** truncus in quæ uti diximus, per pubis ossis foramen ad femoris vsque medium se proripit, citi-  
**ter o & a.** meiectis sibi musculis alimentum suppeditans; altera maior, aliarum omnium  
**c** crus aduentum quidam veluti truncus. <sup>b</sup> Hæc ab exteriori ramo alterius venæ ca-  
**li.ii. c. viii.** uæ caudicis, post factam ipsius supra os sacrum disunctionem exoritur, & simu-  
**o, a.** latque à peritonæo emergit, in inguina fertur, per elatiorem, interioremque ossis  
**d** li.ii. c. i. x. coxendicis regionem, quæ <sup>e</sup> sextus, & septimus femoris motores musculi descendunt;  
**e** li.ii. c. iii. m. & per femoris anteriora, introitum non nihil perreptans, nullo obiecta musculo per  
**f** li.ii. c. iii. i. sinum fertur quem <sup>d</sup> primus crus mouentium musculus, <sup>e</sup> octauusque femoris mo-  
**g** c. i. f. o. torum in inguine efformant; ibique in complures ramos discinditur. Quamobrem  
**h** li. i. f. ra. ii. i. frequentes inibi <sup>f</sup> glandulæ repositæ fuerunt; quemadmodum & sub axillis, cæterisq;  
**li.iii. f.** omnibus venarum partitionibus multas haberi prodidimus. § Primus venæ huius ra-  
**li.ii. f.** mus crus accedens in signis est, & ex interiore ipsius parte enascitur, ac inter cutem &  
**li.iii. f.** carnem, per femoris, genu & cruris interiora, ad internum vsque <sup>h</sup> malleolum ex-  
**li.ii. f.** currit; ubi in pedis superiora descendens, in varias partes digeritur, alijs huc perti-  
**li.iii. f.** nentibus, uti dicemus, venarum furculis commixtus. Vena hæc ad usque malleolum  
**li.ii. f.** eundem ferè in cunctis corporibus progressum seruat, secus quàm vltèrius ab eo: et si  
**li.iii. f.** enim malleolum ut plurimum conscendit, nonnunquam tamen sub eo fertur. Va-  
**li.ii. f.** rius quoque non parum est ipsius in pedion; & pedis digitos diremptus; interdum  
**li.iii. f.** nanque alijs quibusdam ramis commixta in minimum digitum ipseque proximum,  
**li.ii. f.** interdum verò in pollicem eique proximum excurrit. Paucis, eundem distributio-  
**li.iii. f.** nis rationem in nemine propemodum seruat, imò vix vnquàm eodem modo in crus  
**li.ii. f.** vtrunque digeritur. Quinetiam rami quos per crus descendens educit, nunquam  
**li.iii. f.** ferè eundem seruant ordinem, quanuis id vnum commune omnes habeant, ut cu-  
**li.ii. f.** tem inter & carnem serantur. Ac ferè in elatiore interna femoris regione vena hæc  
**li.iii. f.** duos proferat ramos; <sup>i</sup> minorem alterum qui introitum per perinæum, per ingui-  
**li.ii. f.** na, & femoris interiora progreditur; <sup>k</sup> alteram exteriorem, & maiorem, qui fe-

Quod præcipua  
 vena in crus fe-  
 rantur.

Maxima crus  
 petens venæ.

Primus venæ  
 huius ramus.

Anal. Val,

A a moris

moris exteriora anterioraque inter cutem carnemque perrepat, in plures perinde ac interior propagines dissectus. Præterea ubi ad femoris medium præfens vena pertingit, venas quasdam notatu dignas educit, inter quas<sup>1</sup> vnam priuatim; <sup>m</sup> in I n. primum crus mouentium musculum emittit. Ex hac eadem vena, ubi versus popliteum reflectitur, <sup>a</sup> binæ rursus venæ profiliunt, exiles quidem illæ & æquales, quarum altera in genu anteriora, in flexum altera porrigitur; quanuis hæc nonnunquam desit, nonnunquam verò tenuis vsque adeo sit, vt intuentes propædum effugiat, tunc scilicet, cum genu adiens <sup>o</sup> vena solito maior existit. Insuper, vena <sup>o</sup> b. hæc, suo per crus incesu, furculos quosdam producit, qui antrorsum, retrorsumq; crus amplexantes, & cum proximis quibusdam venis coeuntes incedunt. E' regione huius propaginis vena hæc insignis <sup>p</sup> aliam educit, quæ extrorsum ducta, in cutem <sup>p</sup> a. anteriori ossis coxendicis regioni obductam, atque in musculos inibi situatos exhauritur. Quum primum duas eiusmodi propagines, vena magna edidit, in musculos femoris os amplexantes reconditur, <sup>q</sup> septimo & nono crus mouentibus musculis, <sup>r</sup> insignem offerens ramum, ex quo furculi quidam in cutem deriuantur. Vltèrius alium depromit <sup>s</sup> ampliorem, qui in <sup>t</sup> quintum femur mouentium musculum distribuitur, soboles aliquot in <sup>u</sup> octauum cruris motuum autorem dispensans. Eodem modo venas alias complures emittit, quæ musculis femur ambientibus propè omnibus nutrimentum elargiuntur; Harum <sup>x</sup> maxima extremo illius venæ committitur, <sup>y</sup> quam pubis ossis foramen permeare, & ad medium vsque femoris delatibet, ea in longa adeo producta, vt propædum in genu pertingat. Deinceps maxima vena, deorsum ad femoris os, nonnihil ad posteriora reflexa labitur, & furculos quosdam prætenues in membranas præcipuis cruris musculis obductas diffundit. Ac postmodum alium de se promit <sup>z</sup> venam, quæ in femoris posteriora excurrens, furculos quosdam sursum in cutem propagatos exerit. Venæ huius <sup>a</sup> 2. à 2. ramo, quem in quintum femur mouentium musculum dispensari diximus, soboles quædam accedit, & mediocri ex utrisque vena confurgit, cutem, vti monuimus accedens; quanuis non infrequenter accidat, <sup>b</sup> vt duæ ab insigni cruris vena propagines emergant, vna editior altera, quæ in progressu inuicem copulatæ, eam constituent venam, quæ in cutem porrigitur. Quæ ubi <sup>c</sup> ramos quosdam in elatiorem posterioremque femoris sedem germinauit, rectâ deorsum per medium <sup>d</sup> poplitei in suram illabitur, multiplicem <sup>e</sup> ramorum sobolem incerta serie per eam dispensans; imo alij rectâ, alij obliquè, transuersim alij progrediuntur, quidam vero inuicem coeuntes, in vnum abeunt. Quæ venarum multitudo, vt varices inibi fiant, in causa est. Vena hæc ubi hos germinauit furculos, in alijs ad <sup>f</sup> talum vsque porrigitur, ibique definit; in alijs verò aliquibus permiscetur ramusculis, per cruris anteriora accedentibus, & eò quâ ipsa incedit, pertinentibus; ac dein ad <sup>g</sup> exteriorem porrecta malleolum, pedis superiora inter carnem, & cutem adit. Hunc itaque in modum magna cruris vena, femoris ossi accumbens descendit, atque ita in ipsum obliquatur, vt ad genu pertingens, <sup>h</sup> inter posteriora imæ ipsius sedis <sup>i</sup> capita feratur; ubi in duos in æquales finditur ramos. <sup>k</sup> Interior qui oppidò tenuior est, furculos aliquot in suræ musculos effundit, præsertimque in anteriorem <sup>l</sup> primi & secundi pedem mouentium regionem, simulque <sup>m</sup> ramos aliquot in cruris interiora dispensat. Vbi autem <sup>n</sup> ad humiliorem tibiæ appendicem ramus iste pertingit, & ramos aliquot in cutem deriuauit, sub malleolo flectitur, & per internum pedis latus ad pollicem vsque contendit; ubi ferè in cutem obliteratur; nonnunquam verò ramus hic inter calcis os & tibiam, vnâ cum tendinibus hæc pedion addeuntibus porrectus, insertionem in digitos molitur. <sup>o</sup> Exterior diductionis in poplite factæ ramus, longè amplior est, duasque in venas dirigitur; quarum <sup>p</sup> maior, eademque interior, in surâ <sup>q</sup> musculos tota porrigitur, rectâ primum inter primi & secundi pedem mouentium capita, & inter quartum quintumque pedis eiusdem motus auctores, ac postmodum inter musculos digitorum flexiores; & à crure ortos, secundum longitudinem prorepat, <sup>r</sup> ligamentum quandoque continens, quod fibulam tibiæ committit. In hoc incesu, musculus quos perrepat, infra

Cur faciliè in  
cruribus fiant  
varices.

furculos aliquos subinde porrigit, inter quos tamen nulli, aut quàm paucissimi ad cutem perueniunt. Quum primum vena hæc ad medium circiter cruris longitudinis infra genu adducta est, in duos rursus finditur <sup>s</sup> ramos; quorum interior <sup>t</sup> furculum in tali ossis, & tibiæ articulum mittit, ac deinde vnà cum musculorum tendinibus descendit, & à posteriore cruris regione, versus pedium, inter calcem tibiæque sub <sup>u</sup> musculo secunda digitorum internodia flectente obliquatur; & duos in pollicem ramufculos, totidemque in indicem, ac vnum in medium digitum proijciens, absumitur. Quauis plerunque interior <sup>x</sup> ramus in cunctis disseminetur digitos, nullo interim ramo inter calcem, ac tibiæ porrecto. Alter autem ramus, postremæ scilicet partitionis exterior, iuxta fibulam porrigitur, & vbi proximè ad ligamenti finem pertingit, quod fibulam tibiæque colligat, <sup>y</sup> ramum depromit, qui ligamentum perforans, in pedem vnà cum musculorum ipsum adeuntium tendinibus per cruris anteriora se proripit, furculos aliquot <sup>z</sup> musculus offerens, qui pedis digitos extrorsum reflectunt, aliosque rursus in cutem pedis pectini obductam. Quod reliquum est huiusce rami in pedium vnà cum <sup>a</sup> septimi, & octauj pedem mouentium musculorum tendinibus concedit, in paruum digitum exhaustus, cum interior ramus inter calcem & tibiæ deductus, nullos digitis ramos exporrigit, sicque magnæ cruris venæ in pedem propagatio finem habet. Verum enimvero hæc venarum in pede distributio, haud minus quàm in manu varia, & diuersa est; sit enim sæpenumero, vt <sup>b</sup> interior vena, quam in suræ musculos abdi retulimus <sup>c</sup> ramum membranæ tibiæ fibulæ annectenti porrigat, qui iuxta ipsam per cruris anteriora in pedium deferatur, ac tunc <sup>d</sup> vena, quam in sura bipartito scindi diximus, minimè finditur, sed pedium indiuisa perreptat, & in omnes digitos propagines effundit. Interdum verò <sup>e</sup> vena in musculos cruris anteriora occupantes reconditur; quæ ab exteriori præcipuæ diuisionis <sup>f</sup> ramo, quam in poplite fieri tradidimus, exoritur, & in superiore tibiæ appendicem properat. Et protinus inter sextum, ac septimum pedem mouentium musculos furculum profundit, ex quo numerosa pulsat ramorum series, qui musculus in anteriore cruris regione consistentibus alimentata deferunt. Nonnunquam etiam in cutem extimæ cruris partis multiplices mittit furculos, quorum <sup>g</sup> præcipuus nunc retrorsum, nunc antrorsum obliquatus tantisper incedit, dum iuxta anteriorem malleolum in pedium declinet, alijs venis hæc inter cutem, & carnem porrectis complicatus. Cum itaque vique adeo varia sit harum venarum per crus, ac pedem sub cute reptantium distributio, cumque in promptu adeo sit, eas in quouis homine intueri, si eas vt sanguinem detracturi solent, alliges; non est vt ordini, vbi minimè is reperitur, constituendo infudem; potissimum quòd venas hæc ex eodem omnes <sup>h</sup> trunco deorsum per inguina reptante, prodire obseruem; quòdque iuxta genu in interna sede, in maiore hominum parte, interior ille ramus caudicis magnæ venæ, conspicuus offeratur, ex quo duntaxat multi ex græcis sanguinem mitti commendabant. Ac proinde non possum non mirari eos medicos, qui quadruplicem in pedis pectine venam statuunt, sanguinis extractioni accommodam; Primam quidem iuxta anteriorem malleolum, quam Saphenam, Matricis, & Virginealem venam appellant; alteram iuxta posteriorem malleolum, quæ schiatica ipsis dicitur; tertiam in pollicem porrectam, popleticam nuncupantes; quartam eam quæ paruo digito proxima est, quam Renalem vocant. Atque in his omnem venæ caux propagationis historiam absoluius. Nunc de vena vmbilicali agendum superest; sed quia hæc nullius in humano corpore vsus censetur; & quia tertio libro priuatim de ipsa egimus, illud duntaxat hoc loco subiungam, cum in iecur adigitur, nequaquam in plures, vt inquit Vesalius, ramos discindi; quin potius in nullum dissecta ramum, venæ portæ committitur. Quartæ venæ, quæ arterialis dicitur enarrationem tunc opportunè aggrediemur, vbi de magna arteria sermonem habuerimus; quòd aliquid cum ipsa cognationis habeat, vt ex ipso patet nomine.

*Incerta venarum  
pedis in distribu  
tione series.*

*Ratio considera  
tionis venarum  
pedis.*

*Vmbilicalis ve  
na.*

De magna arteriæ ortu, eiusq; in superiores à corde regiones propagazione. Cap. 11.

Magna arteria  
ortus.

**V**eteres omnes tum Philosophi, tum Medici communi consensu cor arteriarum principium, & originem stauerunt: cuius quidem illud evidens argumentum est, quod magna arteria hic longè amplior quàm alibi vspiam occurat. Prodit igitur magna arteria ex elatissima sinistri cordis ventriculi sede, principio orbiculari, & cartilaginis ferè in modum duro. Protinus autem ab exortu, vbi tres superavit membranas, quæ, vti quartus liber edocuit, spirituum & sanguinis recursum à magna arteria in sinistrum cordis ventriculum prohibent, duos per quàm tenues educit ramos; alterum iuxta membranæ dextri lateris scapulas, alterum ad posteriorem foraminis partem, quod dictæ occludunt membranæ, à læva etenim nullus exoritur. Præsentès rami, cordis basim vnà cum coronali vena, circum circa, instar coronæ ambiunt, ex ipsisq; furculi quidam exigui pullulant, deorsum per cor illabentes; quorum maximus in crassissima latissimaque cordis regione occurrit, vbi scilicet duorum ipsius ventriculorum septum enascitur. Ex duobus hæc arteriæ orificij æqualis propemodum est vtriusque amplitudo) qui ex dextro magnæ arteriæ orificij latere producit, amplior ferè longiorque est. Duobus hæc furculis ductis arteria magna, à cordis basis centro, sub arterialis venæ caudice sursum effertur, & cordis membranæ perforans, in duas actum partes dirimitur, quarum maior deorsum, altera sursum contendit, inter asperam arteriam, & venam cauam atque intersepientes thoracem membranas ascendens; ac statim ramum à sinistro latere depromit, obliquè sursum ad primam eiusdem lateris costam porrectum, qui quandiu pulmone accumbit, ac sinistræ thoracem interscipienti membranæ deuncitur, nullus ex eo ramus educitur, protinus autem vt primam attingit costam, duas emitit propagines; alteram ab humiliore sui sede, quæ costarum radices perreptans, in singula quatuor priorum costarum intervalla, singulos effundit furculos, ex quorum vnoquoque duo rursus alij, in spinalem medullam; & musculos ipsi scapulisq; hic instratos excurrunt; alteram verò ab elatiore, prædicta longè ampliorem, quæ obliquè sursum ad septimæ cervicis vertebræ latius irrepens, vertebræ huius & reliquarum omnium cervicis, transuerforum processuum foramina permeat, dorsali medullæ furculos quosdam communicans, ea ingredientes foramina, quæ nervi egressum largiuntur, alios item musculis cervicis posteriora occupantibus. Quod reliquum est huiusce arteriæ, occiput, vt inquit Vesalius, vnà cum comite arteria conscendit, & simul ambæ spiramen subeunt, quod in posteriori capitulorum occipitis ossis sede visitur, atque in duræ meningis sinum suæ regionis exhauriuntur; at secus se res habet, vt de capitis venis, & arterijs agentes, dicemus. Præter ramum hunc, cervicis vertebrae adeuntem, ex arteria, quàm obliquè primam costam conscendere monuimus, alia insuper arteria pullulat, quæ acclius, & ipsa fertur, licet obliquè ac in priora magis quam illa; & in ossis pectoris editiora pertingens, intersepientique thoracem membranæ suæ regionis adhærens; obliquè deorsum, per dicti ossis latius fertur quàm ipsi costarum cartilagines adhærescunt. Arteria hæc idè iter conficit, eosdemq; in ramos, cum ea vena scinditur, quæ sub pectoris ossis de clavi ferri, & iuxta mucronata pectoris cartilagine proflire, inque rectum abdominis musculum sui lateris exhauriri prodidimus. Et quemadmodum huic venæ, aliæ ab inferiori sede correspondet, sic & arteriæ hæc repenti, præterquam quod ab arteria nulli in cutè rami deriuntur; quod si qui mammillas adeunt, exigui admodum sunt. Vbi hæc propagines magna effudit arteria, antrorsum, brachium versus deflebens concedit, & priusquam è thoracis cavitare emergat, secundum dorsi motorem musculum perforatura, insignem alium educit tamum, qui occiput conscendens, in musculos cervicis posteriora occupantes, distribuitur, nullam interim cuti propaginem offerens. Postmodum thoracis cavitatē arteria egreditur, & primam superat costam, tantisper obliquata, dū proximè ad axillam pertingat, ibiq; à posteriore sui sede mediocriter ampli-

Arteria magna  
in duas partes  
direptus.

Arteria rectos  
abdominis mus-  
culos accens.

li. liii. f. v.  
O. h. v. H. c.  
lii. A.  
li. liii. f. x.  
C. C. C.  
c. liii. B. B.

d. li. liii. f. vi.  
o. trans. f. sub  
L.  
e. cad. fig. liii.  
H. per A.  
f. li. liii. f. lib.  
lii. fig. vi. R.  
g. f. vi. Y.  
h. cad. N. ta.  
v. a.  
i. li. liii. D.  
x. cad. E.

l. cad. F.  
m. li. i. c. v. f.  
vi. oo.

n. li. liii. D.  
o. G. li. liii.  
ii. D.

p. li. liii. lib.  
t. vi. a. li. li.  
fi. K.  
q. li. liii. fi. i.

r. li. liii. D.  
s. lib. ii. t. vi.  
C.  
s. li. liii. H.



- e** cad.L. amplitudinis <sup>e</sup> ramum profert, qui in musculos per scapulæ interiora porrectos spargitur. Ac dein alterum ex superiori sede paulò minorem profundit, qui ad humeri cum scapula articulum deducitur, & iuxta summum humerum, in complures agitur furculos, quorum <sup>u</sup> vnus humerali <sup>x</sup> venæ, antequam è musculis emergat, comes accedit. Huic ramo <sup>y</sup> alius succedit, paulo demissius ab axillam petente arteria Arteria manuum petens.
- z** inter L & M. <sup>z</sup> alij enascuntur furculi glandulas, quæ axillis assident, adeuntes. Ac deinceps <sup>a</sup> alius emergit, qui deorsum per thoracis latera deductus, <sup>b</sup> musculo potissimum inferitur, brachium deorsum agentis. <sup>c</sup> Reliquum huius arteriæ, vnà cum <sup>d</sup> iecoraria vena, in brachium porrigitur, in musculos humeri motores sese recondens, & <sup>e</sup> ramulos aliquot, internæ musculorum humerum amplexantium sedi, nec non membranis neruosis, qui hæc pertranscunt, ambientibus, exporrigens. Ac postmodum sensim ac sensim illabitur, interiori venæ magnæ <sup>f</sup> ramo copulata, & <sup>g</sup> propaginem educens, quæ secundum posteriorem humeri sedem, quæ ipsi cubitum extendentes musculi adhærescunt, ad externum vsque humeri <sup>h</sup> tuberculum contendit, ibique vnà cum <sup>i</sup> vena, quam hæc deferri narrauimus, inter musculorum tendines deperditur. Que in brachium fertur.
- i** li. ii. ta. vi. His peractis, arteria protinus inter <sup>k</sup> musculos cubiti flexores reconditur, ramulos ipsi nonnullos offerens, ac dein versus cubiti flexum retorquetur, duasque <sup>l</sup> propagines vtrinque singulas in cubiti articulum emittit, iuxta <sup>m</sup> secundi musculi cubitum flectentis terminum perreptans, adeo detecta, vt pulsus edere haud obscure perfentiat. Post hæc, deorsum fertur, inter musculum secunda internodia flectentem, & eum qui tertios quatuor digitorum flectit articulos demersa, & <sup>n</sup> in duos dissecta ramos, alterum quidem iuxta radium, alterum verò iuxta vlnam deductum. Arteria cuius pulsus contra clauum.
- a** li. iii. Q. S. Qui secundum radium fertur, cuius pulsus in dies contrahitur, non procul à brachialis radice <sup>o</sup> ramulum profert, qui sub musculorum pollicem extendentium <sup>p</sup> tendinibus, in externam manus sedem se proripit, & in <sup>q</sup> musculos inter primum pollicis os, & postbrachialis os indicem sustinens, repositos, exhauritur. Hunc vbi eduxit ramum arteria sub <sup>r</sup> transuerso internæ brachialis sedis ligamento, & sub manus <sup>s</sup> tendine procurrit, in tres discissa <sup>t</sup> ramos, perinde ac neruus, & vena huc pertinentes. Ex hisce ramis primus, & secundus in duos quique ramos dirimitur; ac ille quidem in internam pollicis regionem porrigitur, secundum eandem indicis regionem petit, tertius autem indiuisis internum latus interioris medij digiti sedis accedit. <sup>u</sup> Ramus per vlnam porrectus, in manus quoque volam pertingit; adeo in musculos abditus, vt ipsius pulsatio minimè percipiatur, præterquam in impen-sè gracilibus, sicque sub transuerso brachialis ligamento, & manus tendine procedens, <sup>x</sup> duos ramos in paruum digitum, totidemque in anularem, atque vnum in externum medij digiti latus deriuat. Ramus hic ceteri nullum ferè in extimam manus regionem ramulum diffundit, interdum tamen musculus externum latus ossis postbrachialis, quo paruus fulcitur digitus, occupantibus, <sup>y</sup> ramum communicat. Atque hunc sanè in modum, prioris arteriæ rami in sinistram brachium diremptus terminatur, quem à sinistro ipsius latere, post egressum è corde, produci re-tulimus. Vbi ramum hunc arteriæ magnæ truncus edidit, rectà sursum <sup>z</sup> asperæ Trunci arteria caput obsequens tu progressus.
- z** cad. Y. innixus arteriæ, ad <sup>a</sup> glandulas iugulo assidentes prorepat, quæ ipsi perinde, ac venis strati ritu substernuntur, robur quoque ipsius adaugentes. Huc igitur contendens, priusquam thoracis cauitatem egrediatur, in duos finditur inæquales ramos, <sup>b</sup> sinistram alterum ac minorem, <sup>c</sup> alterum dextram maioremque, soporales art-  
**c** li. iii. fi. vi. rias appellatos. Minor in læuam paululum deflectit, & <sup>d</sup> interiore iugulari comi-  
**d** li. iii. fi. vi. tatus, secundum læuam asperæ arteriæ latus sursum ad fauces effertur; vbi in <sup>e</sup> duos  
**e** li. iii. a. secatur ramos, quorum minor exteriorque furculum in malas deriuat, ac dein in  
**f** cad. c. duos partitur, quorum alter tempus sinistram adit, alter ponè aures concedit, adeo  
**g** cad. d. li. iii. vtriue prominentes, vt pulsus edant minimè obscurum. Maior, idemque inter-  
**h** li. iii. fi. ii. L. rior, fauces subit, furculos aliquot laryngis, & <sup>f</sup> lingue musculis exporrigens, ac  
**i** li. i. v. fi. j. postmodum in caluariæ <sup>g</sup> basin se proripit. Priusquam verò caluariam ingre-  
**j** E. diatur, in duos quoque ramos digeritur, alterum quidem <sup>h</sup> grandiore, qui <sup>i</sup> fo-



ramen subintrant, in cuneiformis ossis parte sellam referente insculptum, <sup>a</sup> in qua glandulam cerebri pituitam excipientem locari diximus. Hic simulatque in caluariam adigitur, in duos quoque ramos partitur; quorum <sup>1</sup> alter in narium cavitatem per <sup>2</sup> foramen sui gratia priuatim exculptum se confert, & inter nasi cartilagineas atque alas deperditur, exilium quarundam arteriarum finibus faciem, ut dicemus, adeuntium; comitatus; <sup>3</sup> alter numerosa sobole diffectus in, <sup>4</sup> duram menyngeam vniuersam exhauritur. Arteriæ autem truncus, simulatque hos eduxit ramos, rursus <sup>5</sup> bipartito scinditur, & caluariæ basi suffultus, in priora paulisper sic diuisus incedit, posteaque denuo <sup>6</sup> coalescit, <sup>7</sup> in signem propaginem per secundi nervorum cerebri paris <sup>8</sup> foramen in oculum, inque anteriorem temporalis <sup>9</sup> musculi sedem emittens. <sup>10</sup> Quod arteriæ superest, duram <sup>11</sup> menyngeam perforat, partimque <sup>12</sup> in tenuem membranam, <sup>13</sup> partim verò in sinistram cerebri ventriculum procurrit, in plexum quandam instar fasciæ toto incēssu actus. Alter partis arteriæ ramus, quam cranium conscendere diximus, ad basis caluariæ posteriora una cum comite <sup>14</sup> vena proficiscitur, <sup>15</sup> propaginem <sup>16</sup> musculis dispensans, anteriorem ceruicis vertebrarum sedem occupantibus, inter primam & secundam vertebram; ac postmodum vena comitatus caluariam, ingreditur per <sup>17</sup> foramen quod sextæ <sup>18</sup> nervorum cerebri coniugationi aditum præbere dicemus, & in sinistram duræ membranæ sinum obliteratur. <sup>19</sup> Dexter insigniorque magnæ arteriæ ramus, recto pariter tramite sursum efiertur; & ubi ad primam pertingit costam, ex dextro sui latere insignem producit ramum, qui per priorem costarum intervalla, in transversos ceruicis vertebrarum processus, in pectoris os, in musculos colli posteriora occupantes, in dextrum brachium, & ut vno verbo dicam, in omnes eas partes distribuitur, in quas ramum sinistro brachio exportum digeri docuimus. Vbi hunc exprompsit ramum <sup>20</sup> arteria hæc <sup>21</sup> illi æqualis redditur, quam secundum asperæ arteriæ sinistram latum sursum reptare commemorauimus; quæ idem utræque iter faciunt, eandem sortitæ appellationem Carotides nempe, hoc est soporales, siue somnum inducentes dictæ, quod his obstructis, siue quauis tandem ratione occlusis, statim obdormiscimus. Cuius quidē periculum fecisse Realdum Columbum Pisces anno 1544, ipse vidi in adolescente quodam in frequenti nobilium virorum corona, non minori eorum terrore, quam nostrum risu, qui id incantamenti vi effici ipsi persuadebamus. Illud item notatu dignum accurrit, ab exteriori portionis sinistræ arteriæ <sup>22</sup> ramo, ante ipsius in caluariam ingressum, arteriolam in genas excurrere, deinceps in duas discindi partes, quarum altera in tempora festinat, estque arteria illa, quam pulsū in ipsis edere percipimus, altera ponē sinistram aurem se confert, pulsū & ipsa minimè obscurum edens.

## De Magnæ Arteriæ infra cor propagatione. Cap. 12.

Am diximus Arteriam magnam protinus ut cor ipsum egreditur, in duos discindi ramos, alterum superas, alterum inferas partes peragratum. De ascendente egimus, Descendens enarrandus relinquitur. <sup>1</sup> Qui dorsi vertebriis adherens, sub vena caua deorsum illabitur, & mox ab exortu, à posteriore sui sede vertebriis incumbente, <sup>2</sup> propagines utrinque in singula nouem inferiorum costarum intervalla profundit; quæ perinde ac venæ coniuge carentis <sup>3</sup> rami, ad cartilagineas vsque in integris costis, in mendosis verò ulterius proferuntur. ex hisce ramis surculi quidam per nervorum <sup>4</sup> foramina in spinæ medullam, ac dein in musculos dorsi vertebriis adnatos emergunt, perinde ac de ramis venæ coniugis expertis diximus. Ipse autem arteriæ caudex recta deorsum lateri sinistro corporum docti vertebrarum innixus fertur, <sup>5</sup> & inter <sup>6</sup> diaphragma ac vndecimam thoracis vertebram deductus, <sup>7</sup> propaginem utrinque septo transuerso impertit, quæ multifariam dissecta in ipsum exhauritur, præsertimque in humiliorem ipsius iuxta dorsi vertebra regionē, riuulos quosdam in editiorem <sup>8</sup> ipsius sedem, adeoque in eam cordis <sup>9</sup> in uolucrum partem, quæ septo affinitur, deriuans. Deinceps truncus quidam à magna arteria proferitur, ex quo <sup>10</sup> surculi

Dexter arteria  
ramus.

Soporales arteriæ  
via cur ita dis-  
cindi.

Arteriæ inter-  
costales muscu-  
los aduenies.

Arteria collo-  
nis organa peti-  
torii.

K cad.M.  
l. t.iii. f. ii. s.  
m. li. i. t. v. f. f.  
i. y.  
n. t.iii. f. ii. r.  
o. li. v. f. i. d. d.  
p. t. iii. fig. ii.  
u. u.  
q. cad. a.  
r. cad. x.  
s. li. i. t. v. f. i. i.  
G.  
t. li. i. t. ii. A.  
u. t. iii. f. ii. s.  
x. li. v. f. i. x. v.  
C.  
y. t. iii. f. ii. s.  
z. cad. y.  
a. cad. i.  
b. cad. C.  
c. cad. e.  
d. li. i. t. v. f. i. i.  
A, B.  
e. li. i. t. v. f. i. i.  
C.  
f. li. v. f. i. x. i. i. i.  
x.  
g. t. iii. v.  
h. cad. z.  
i. cad. x.  
K cad. b.  
a. t. iii. i. i.  
b. cad. K K.  
f. i. i. i. A.  
c. t. ii. G. G.  
d. e. t. a. b. F.  
d. li. i. t. v. f. i. h.  
Q. Q.  
e. li. i. t. v. f. i. i. i.  
f. cad. A.  
g. t. iii. i. i. A.  
h. li. i. t. v. f. i. v.  
f. i. i. m.  
i. li. i. i. f. i. i.  
C. D. E. F. G.  
x. li. i. t. v. f. i. i.  
m.

l. l.iii. f. iiii.  
β.  
m. l.iii. f. ii.  
u. u. ta. v. fig.  
iii. f.  
n. li. iii. f. iiii.  
xx.  
o. l.iii. f. ii. o.  
r. v. f. iii. c.  
p. ead. p. h.

q. ead. q.  
z. ead. r.

s. li. j. f. ii. ab  
R. ad T. fig.  
xiii. xiii. c.  
t. l.iii. f. ii. f.  
u. ead. t.

x. ead. u.

y. ead. x.  
z. ead. y.

a. ead. z.  
b. ead. a.

c. l.iii. f. ii. u.  
d. ead. β.

Pro his vide  
t. iii. fig. ii. &  
v. f. iii.  
e. l. i. f. ii. o.

f. γ.  
g. δ.

h. ζ.

i. m.  
K. t. iii. f.

l. l.iii. o. & li.  
iii. f. xix. & i.  
a. b. m. n.

culi nonnulli in ventriculum, iecur, cystim fellis, lienem, omentum, intestinum duodenum, & in coli partem ventriculo hærentem manant, hunc sanè in modum. In primis<sup>1</sup> truncus hic supra eminentiorem interioris omenti tunicæ partem incedit, inque<sup>m</sup> duos propemodum æquales ramos diffinditur, quorum maior ad lævam, minor ad dexteram concedit. Dexter ramus venæ portæ in<sup>n</sup> glandulis illis sub posteriore ventriculi sede repositis coniungitur; quæ in parte omenti membranis alligatur, & iecoris caua conscendit, ac media in via ab inferiore sui parte<sup>o</sup> riuulum in inferiore omenti membranam, & in coli partem ipsi proximam emittit. Postmodum ab editori sede<sup>p</sup> sobolem aliam ventriculo elargitur, quæ in posteriorem ipsius sedem, quæ dorsum respicit, in ramulos aliquot dissecta spargitur. Ex inferiori rursus parte, alium educit ramum, qui ad iecoris caua festinans, in duas scinditur propagines; quarum<sup>q</sup> altera intestinum ventriculi fundo adhærens petit, ab ipsius medio ad ieiuni vique initium porrectas; <sup>r</sup> altera paulò amplior ad dextrum fundi ventriculi latus deflectit, & exteriori omenti membranæ adhærens, ramulos quosdam ex editiore sui regione in ventriculi anteriora posterioraque disseminat; eodemque prorsus modo alios ex ima sede in anteriorem omenti membranam effundit. Sicq; <sup>s</sup> præsens arteria, venæ portæ ramo comitata, ad fundi ventriculi medium terminatur. <sup>t</sup> Quod reliquum est dextri magnæ arteriæ rami, ubi duos exiles ramos, ex altiore sui parte in cystim fellis eiecit, <sup>u</sup> in multas actutum secatur propagines, quæ infertionem in iecoris caua moluntur, in ipsius tamen substantiam haud penitus adactæ. <sup>x</sup> Sinister ramus, quem ex arteriæ caudice proferri, ac dextro paulò ampliore esse dicebamus, internæ omenti membranæ glandulisque in ea repositis adhærescit, cuidam venæ portæ ramo commissus, & in eosdem quos ille ramos diffectus. Ex elatiore siquidem sui regione <sup>y</sup> ramum ventriculo, quæ is dorso innititur, offert, qui primum <sup>z</sup> sobolem vnā vtrinque in mediam ventriculi sedem, eius quæ dorso incumbit, regionis exporrigit; deinde sursum repens, ventriculi os, quemadmodum & de venæ portæ ramo prodidimus, <sup>a</sup> circum vndique cingit, & <sup>b</sup> ramos aliquot, in ventriculum, compluresque exiles arteriolas in stomachi finem dispensat; quarum vna secundum ventriculi anteriora, nonnihil ad dexteram, in ipsius vique fundum illabitur, furculos quosdam eo tractu tum dextrorsum tum sinistrorsum projiciens. <sup>c</sup> Sinister arteriæ huius ramus, ubi lienem attingit, <sup>d</sup> ramum ex ima sui sede, in anteriorem omenti membranam profundit; qui paulò post exortum, in duos valdè inuicem distantes ramulos partitur, ex quibus arteriæ complures pululant. deorsum omnes in eam quam dixi omenti membranæ & colon intestinum concedentes. Post hæc, sinister iste arteriæ ramus, sinistrorsum magis agitur, in duas, (venę quę ipsi comes accedit, ritu) arterias diremptus, hæque rursus in alias, & sic deinceps, dum <sup>e</sup> numerosissima ramorum progenie, rectà in lienis caua inferatur. Priusquam verò ipsum ingrediatur, ex ima humilioris lienem adeuntis arteriæ sede, <sup>f</sup> furculus in anteriorem omenti membranam deriuatur; & ex ea quæ sursum succedit, alia eundem prorsus in modum <sup>g</sup> arteria educitur, quæ exteriori omenti membranæ innitens, dextrorsum in ventriculi fundum adducitur, sinistrumque fundi latus vniuersum perreptans, anteriori posteriorique ventriculi sedi, & ex timæ omenti membranę riuulos quosdam communicat. <sup>h</sup> Ab alijs quin etiam in lienem tendentibus ramis, propagines quędam in sinistrum ventriculi latus, osque ipsius efferuntur, perinde ac de venis à liene in ventriculum deductis monescimus. Atque hunc rami huius distributio, finem habet. <sup>i</sup> Paulò infra quem, <sup>k</sup> alius ab arteria magna depromitur, qui per editoriẽ mesenterij regionem in plurimas soboles diffusus, venę portę ritu, in ieiunum, ileum, & eam coli partem excurrit, quę à iecoris cauo, ad sinistrum vique renem pertinet. Post hunc ab vtroque magnę arterię latere, <sup>l</sup> ramus enascitur effatu dignus, non quidem alter è directo alterius, sed dexter interdum editori est, interdum verò sinister, incerto prorsus ordine; etsi dexter ferè altior conspicitur: ambo autem ex anteriore prodeunt arterię sede, ac rectà transmeant, in suę quisque regionis renem, non secus ac emulgentes venę, pertinentes; etsi nullus vt plurimum ramus ex his, vt ex venis, in pinguem renem

Præcipua mesenterij petens arteria.  
Renum arteria.

*Seminalis ar-  
teria.*

renum tunicam deriuatur. Neq; verò ex sinistra arteria feminarius vllus meatus exoritur, quemadmodum ex emulgente sinistra prodire monuimus; meatus enim is semper ab arteriæ magnæ caudice è dextra regione originem desumit, iuxta scilicet seminalis venæ exortum, nonnunquam verò paulò inferius, atque ambo paulò post exortum, <sup>m</sup> meatui ex vena eiusdem lateris prodeunti committuntur; verùm dexter, <sup>n</sup> venæ cauæ truncum priùs transcendit, sicque progreditur id conficiens itinere, quod capite nono retulimus. Paulò inferius, arteriæ magnæ truncus ab anteriore sui regione <sup>o</sup> furculū edit, qui per imam mesenterij partem, ac in colum intestinum, quæ id à liene, ad rectum vsque intestinum porrigitur, ac in ipsum quoque rectum diffeminatur. A' posteriori magnæ arteriæ sede, secundum omnem ipsius longitudinem, quæ super musculos lumborum vertebrae infiltras vehitur, P ramuli quidam vtrinque prodeunt, in lumborum vertebrae, ipsarumque medullam, nec non in conterminos ipsis musculos excurrentes. Ramuli hi omnes sibiipsis coæquales sunt, <sup>q</sup> duobus exceptis, iuxta sacrum os emergentibus, qui non solum in vertebrae, medullam, proximisque illis musculos pornguntur, verum etiam transuersim per peritonæum, abdominisque musculos ad abdominis vsq; latera excurrunt. Porro arteria hucusque sub vena cauâ semper iter habuit; vbi verò in sacrum os appulsa est, venam conscendit, quæ arteriæ, ne sacrum os ipsi officiat, strati ritu subfistitur. <sup>s</sup> Atque inibi, perinde ac de vena proditum est, duos in ramos finditur, qui priusquam in femur pertingant, venas iterum subeunt. Et rami ex arteria iuxta eam

*Rami lumbor-  
petentes.*

*Arteria iuxta  
os sacrum direm-  
pitur.*

ptum, in duos partiuntur ramos, <sup>x</sup> alterum anteriorem mitioremque, <sup>y</sup> externum alterum ac maiorem, ille rursus duos illic educit furculos, internū quoque, alterum externum. <sup>z</sup> exterior vnâ cum <sup>a</sup> vena inter sacrum & coxendicis os, vbi hæc inuicē abscedunt, deorsum procurrit, riuulos complures in musculos ilium os amplexantes, ipsumque adeo coxendicis articulum demandans. <sup>b</sup> Interior, in viris quidem collo & fundo vesicæ, rectoque intestino ramulos quosdam impertit; in mulieribus verò, quibus ramus hic <sup>c</sup> amplior obtigit, multiplicem propaginem vteri & vesicæ fundo, ipsiusque vteri ceruici exporrigit. <sup>d</sup> Quod reliquum est præsentis rami deorsum fertur, & in descensu <sup>e</sup> arteriam, quam ab vmbilico huc pertinere diximus excipit; Deinceps vnâ cum <sup>f</sup> vena ad pubis vsque ossis foramen decurrit, vbi <sup>g</sup> exterioris rami furculus cum ipso coit. Ac postmodum dictum foramen traiciens, in musculos ipsum obturantes, & in eos quæ à pectinis osse nascuntur, perinde ac vena dispergitur; <sup>h</sup> extremo etiam ipsius cum altero magnæ arteriæ ramo cocunte, qui per <sup>i</sup> quintum femur mouentium musculum distribuitur, vt mox subijciam. Exterior namque sinistri arteriæ caudicis <sup>k</sup> ramus, (id quod etiam de destro intelligi volumus) post ipsius supra os factam diuisionem, per inguem in crus delabitur, & paulò ante quàm peritonæum perforet, <sup>l</sup> ramum ex anteriori sede profundit, qui peritonæum ac transuersum abdominis musculum peruadens, <sup>m</sup> sursum per rectum musculum adducitur, furculos aliquos in latera proijciens, donec <sup>n</sup> ei adiungatur arteriæ, quam deorsum procurrare docuimus, non dissimili ab ipsa vena modo. Vbi peritoneum supera vit <sup>o</sup> ramulum in pubis ossium commissuram emittit, qui aliquos perexiguos penis cutem adeuntes. <sup>q</sup> Truncus deinceps deorsum per crus venæ substratus fertur, <sup>r</sup> ramum educens, qui in musculos femoris os amplexantes propagatur, nullam interim propaginem cuti communicans. Inferius <sup>s</sup> alium expromit ramum, qui per quintum femur mouentium musculum, & per eos, qui femoris anteriora occupant, dispergitur, proximè ad genu in multas diremptus propagationes decurrens, quarum <sup>t</sup> vna ramo iungitur, quæ per pubis ossis foramen descendit rediimus. Ipse autem arteriæ truncus secundum inguem deorsum prorepat, ad femoris

*Arteria pubis  
ossis foramen  
traiciens.*

*Arteria in crus  
delata.*

a li. i. iii. in- femoris osita sese reflectens, ut inter inferiora <sup>a</sup> duo ipsius capita secundum popli-  
ter duo 16, tem feratur, insigniori semper crus adeunte vena comitatus; Ex hac arteria suo  
x li. iii. r. per femur descensu <sup>x</sup> rami aliquot educuntur, qui per musculos posteriori fe-  
y t. v. l. moris regioni instratos digeruntur, vna cum <sup>y</sup> ramis ex ea vena ortis, quæ se-  
cundum popliteum iter deorsum habet, & frequenti ramorum sobole, sub cute in  
z li. iii. a. suram expanditur. Verum arteria magna in poplite delitescens, <sup>z</sup> singulos vrin-  
que ramos ilico profert, qui per genu articuli latera distribuuntur, aliqui subin-  
de demersi; Paulò autem inferius, <sup>a</sup> fursculum ab externo depromit latere, qui  
deorsum iuxta fibulam procurrit, & inter septimum, & octauum pedem mouen-  
tium <sup>b</sup> musculos reconditur, fursculos nonnullos musculis cruris anteriora occupan-  
tibus offerens. Dein ipsæ arteriæ <sup>c</sup> truncus inter <sup>d</sup> quartum pedem mouentium mu-  
e li. ii. t. xiii. sculum, & <sup>e</sup> duostertia quatuor digitorum internodia flecentes, & <sup>f</sup> quintum pe-  
dis motorem adigitur, non procul a <sup>g</sup> membranâ, quæ tibiam fibulæ secundum lon-  
gitudinem committit. Vbi cruris medium superauit, in <sup>h</sup> duos protinus ramos di-  
f li. ii. t. xv. scinditur, quorum interior inter calcis os, ac tibiam in pedum migrat, vna cum mu-  
g cad. T. sculorum hæc reptantium tendinibus, in transitu verò fursculum emittit in tali ossis  
h t. iii. r. cum tibia articulum. In pedis planta inter <sup>k</sup> musculos secunda digitorum interno-  
i cad. o. dia flecentes, & eorum tendines, qui tertios pariter articulos, flecent submersus,  
l t. iii. n. in <sup>l</sup> duos fodiuntur riuulos, quorum alter in indicem, prius etiam bi partito scissus  
m cad. ii. concedit, alter in internum inferioris partis medij digiti latus indiuisus permeat.  
n cad. o. <sup>m</sup> Exterior ramus duorum, qui à medio crure infra genu emergunt, in pedis quo-  
que plantam excurrit, sed inter calcis os & fibulam, vna cum septimi, & octauum pe-  
dem mouentium musculorum tendinibus, <sup>n</sup> fursculum etiam huic articulo expor-  
o cad. y. gens, & in paruos digitos, atque in externum medij latus sese diffundens. Præ-  
terea ramus hic sub malleolo <sup>o</sup> arteriam promit ea grandiore, quam in calcis, & fibu-  
læ articulum emiserat, quæ in musculorum magnum digitum flecentium caput,  
inque exteriores tres ipsi proximiores exhauritur, & pulsus edit minimè obfus-  
rum: Quamvis tamen arteria huius haud minus quam venæ distributio, hoc in lo-  
co euariet; P sit enim non infrequenter, ut ramus inter calcem tibiamque deductus  
p t. v. f. x. ta. duos singulis digitis ramulos offerat, ac tunc alter inter fibulam & calcem excurrans,  
iii. in pedum minimè pertingit. Ex arteria verò in genu flexu delitescente, insignis  
q li. ii. t. xv. ramus educitur, <sup>q</sup> membranâ perforans, quæ tibiam fibulamque in longum col-  
li. xv. T. ligat, nunc ad elatiorem, nunc ad inferiorem partem, prout arteria ramus, qui se-  
cundum tibiam in septimum & octauum pedem mouentium musculos abit, modo  
altius modo demissius terminatur. Membranâ hanc ubi traiecit, in cruris interio-  
ræ inter musculos partem hanc occupantes concedit, sub <sup>r</sup> transuerso tarsi vinculo  
r li. iii. t. iii. a. vna cum eorum tendinibus permeans, in pedis superiora disseminatur sub musculis  
prædictos digitos extrorsum flecentibus.

Arteria in pe-  
dem propaga-  
tio.

Venarum arteriarumq; in capitis interiora diremptus. Cap. 13.

a ta. li. n. t. v. Q Voniam de venarum arteriarumque per collum ascendentium dispersione a-  
b. x. l. gentes, aliquot earum propagines caput subire diximus, quæ tunc propa-  
c t. v. f. x. a. gationem confusionis euitandæ gratia, minimè prosequi sumus. Nunc de illis si-  
d li. i. v. f. i. gillatim verba facere expediet, ducto à venarum propaginibus exordio, quæ sex  
e. vtrunque habentur. <sup>a</sup> Primus ramus secundum eum, quo tunc enunabatur ordi-  
f li. v. f. xiii. nem, ille est, qui per transuersorum cervicis processum foramina scandebat. <sup>b</sup> Se-  
cundus & tertius, duo interioris iugularis rami existunt, quorum <sup>c</sup> alter omnium  
f t. iii. f. li. a. quotquot in caput adiguntur maximè præcipuus est, atque illud permeat <sup>d</sup> foramen,  
g cad. F. quod <sup>e</sup> sextæ nervorum coniugationi præbet egressum, <sup>f</sup> fursculis prius nonnullis  
h li. i. v. f. i. in anteriore duorum priorum cervicis vertebrarum partem emissis; <sup>g</sup> alter arteria  
i t. iii. f. li. F. nulla comitatus <sup>h</sup> foramen traiecit, illi proximū foramini, vnde tertium quartumq;  
k li. i. v. f. i. nervorum par egrediuntur. <sup>i</sup> Quartus exterior est iugularis, quæ per <sup>k</sup> foramen futu-  
l t. iii. f. li. G. ræ lambdoydis extremo proximum in occipitis osse caluariam ingreditur. <sup>l</sup> Quintus  
est,

Ramorum ve-  
narum paria sex  
caput accedunt.

est, quem per cuneiformis oſis<sup>m</sup> foramen, vnde<sup>n</sup> secundum nemorum par elabir<sup>m</sup> m. l. i. v. f. 6.  
bet. Atque hæc sunt quæ ad venarum pertinent ramos. Ex arteriarum verò ramis. n. l. v. f. xiii.  
*Arteria quarta in caput feratur.* P Primum vnà cum prima venæ propagine per foramina trāſuerſorum proceſſuum G.  
ceruicis vertebrarum ſurſum adduci, & cum ea in caluam per idem foramen irrepe- n. t. v. f. x. u.  
re ſcripſimus. 4 Secundus, & tertius, duo ſoporalis arteriæ rami erant, quorum alterum o. l. i. v. f. i. l.  
vnà cum vena per ſexti paris neruorum foramen commearē tradidimus; alterum l.  
citra venæ alicuius conſortium efferri, & peculiari foramine in cranium euade- p. t. i. l. f. i. l. x.  
re diximus. Is ſanè eſt harum omnium propaginum in caput inceſſus; vbi autem t. i. l. f. i. v. f. v.  
intrò adiguntur, nunc inuicem coeunt, nunc iterū diductæ propagantur, ea quam f. x. f.  
nunc ſubijciam, ratione. Iam diximus duram menyngem dextram cerebri partem q. t. i. l. f. x.  
à ſiniſtra, anteriorem quæ à poſteriore<sup>r</sup> interſepti cuiuſdam ſulcem imitantis ritu di- r. l. i. v. f. i. l. i.  
rimere. Interſeptum id<sup>s</sup> ſinus quoſdam adipiſcitur inſtar venarum, perreptantibus D. D. D.  
frontem ramis longè ampliorem, etſi venarum modo teretes minimè ſunt; imo verò s. l. v. f. i. C.  
triangulos quoſdam ſecundum longitudinem præ ſe ferunt, ac proinde membra- C. C.  
na hæc interdum in vulnere affectis pulſare deprehenditur. Sinibus hiſ<sup>u</sup> venæ atque c. ead. fig. ii.  
arteriæ reſpondent intrò in caput repentes, ex ipſiſque ſurculi complures pullulant, B. C.  
qui ſecundæ cerebrum ambiēti membranæ, cui tenuis menyngi nomen eſt, implan- u. ead. D. D.  
tantur, per quam in cerebri vſque ventriculos concedunt; varijs fungentes muneri- G. G.  
bus, hic quidem venæ, hic arteriæ, hic verò vtriuſque. E<sup>n</sup> ſinus venarum tenuiſque x. t. i. l. f. i. l. D.  
arteriarum ramis, quos vtrinque ſurſum irrepere tradidimus, \* prima venay<sup>y</sup> primay<sup>y</sup> y. ead. x.  
arteria per tranſuerſorum ceruicis proceſſuum foramina conſcendunt. Secunda ve- z. l. i. l. f. i. l. f. i.  
na, & ſecunda arteria caluariam ingrediuntur per<sup>z</sup> quantum occipitis oſis foramen v. i. a.  
quod lateribus dorſi foraminis aſſidet; arteria verò ipſo ſtatim ingreſſu deperditur, a. t. a. l. i. l. f. i. g.  
vteriùs neutiquam perducta; quanuiſ eam Veſalius venæ comitem incedere dicat, ii. M. lib. v.  
quæ in<sup>a</sup> ſinus duræ menyngis initium ſuæ regionis ingreditur, qui ad venæ huius f. i. x. T. T. T.  
atque arteriæ in caluam ingreſſum incipit, & occipitis oſi artenſus ſurſum adducit, SSS.  
tur, quartamq; in aſcenſu<sup>b</sup> venam excipit, quam à iugulari exteriore prodire, ſuoq; b. t. i. l. f. i. l. E.  
peculiari foramine in cranium permeare docuimus. Deinceps ſinus hic ſurſum pau- c. ead. M. &  
lò magis in occiput effertur, inſtar quartæ circuli partis circumaſtus, dum in elatiſſi- N. iungun-  
ma cerebelli regionem, occipitis oſe reſpicientem, appulſerit, vbi dexter ſinus cum turad O. l. i.  
c<sup>c</sup> ſiniſtri coit, & ex vtriſque veluti<sup>d</sup> maſſupiolum quoddam efformatur, occipitis v. f. i. v. i. P. &  
quoque oſi adhærens, inferiùs à ſagittalis commiſſuræ termino. Ab hoc ſinuum cō- Q. cum R.  
greſſu, ſinus alij duo in eadem dura membrana ſtatim conſtituuntur, figura & longi- copulantur.  
tudine diſpares; <sup>e</sup> alter nanque longior eſt, & cranio contiguus, per ſagittalis com- d. ead. O. R.  
miſſuræ medium procedit, antroſum aduſque octauī capitis oſis<sup>f</sup> proceſſum olfa- c. ead. pp. li.  
ctus organa dirimentem properans. Quemadmodum verò primus & ſecundus ſinus, v. f. i. l. CC.  
inter cerebrum, & cerebellum, vbi hæc cranio contigua ſunt, in duram membranam f. l. i. v. f. i. l. i. l.  
protenduntur, ſic tertius hic ſinus in eandem membranam toto eo ſpatio porrigitur, N.  
quo ſiniſtra cerebri pars à dextra ſeiungitur. § Quartus ſinus ex anteriori priorum g. t. i. l. f. i. l. R.  
duorum congreſſus regione oritur, & rectā citra deſcenſum aſcenſum<sup>ve</sup> in anteriori li. i. l. i. f. v. l. i.  
rem cerebri partem per omnem<sup>h</sup> cerebelli longitudinem progreditur, dum in eas h. t. ad R.  
pertingat<sup>i</sup> partes, quas natibus aſſimilari diximus. In quatuor hoſce ſinus primæ ve- h. l. i. v. f. i. v. i. l.  
næ atque arteriæ ingrediuntur, ex ipſiſque in vtranque cerebri membranam ſequen- o. o. o.  
tes proijciunt ramos. In primis, primus & ſecundus in<sup>k</sup> duræ membranæ partem i. ead. M.  
cerebellum contangentem, varios emittunt<sup>l</sup> ſurculos, & ex hiſ<sup>m</sup> tenuiores alij in t. ead. o. e.  
tenuem menyngem. qua idem cerebellum integitur, & à cerebro dirimitur, excurrūt. m. ead. f. v. i. l. i.  
<sup>n</sup> ex tertio ſinu complures etiam ijque admodum inſignes rami enaſcuntur, qui per xx.  
tenuem membranam, quæ vtranque cerebri partem deſuper integit, amplexaturque n. ja. i. l. f. i. l.  
propagantur, in complures eoſdemque prætenues ſurculos diſſecti, quos enumerare TT. l. i. v. f. i. l.  
non minus impoſſibile, quàm ſuperuacaneum ducō. Præter hoſce ramos, <sup>o</sup> ſurculi o. t. a. l. i. l. f. i. l.  
præterea nonnulli ex ima ſinus huiuſce regione in eam duræ menyngis partem ex- VV.  
currunt, quæ dextram cerebri partem à ſiniſtra dirimit; & ex elatiōis eiufdem ſede p. ead. x.  
<sup>p</sup> prætenues aliæ venulæ proferuntur, illiſ commiſſæ venis, quæ ſurſum per capitis cu- tem

Arteria quarta  
in caput feratur.

Dura menyn-  
gi ſinus.

Primus & ſe-  
cundus.

Tertius,

Quartus.

Ipſorum ruſus.



q cad. 77aa tem irrepunt, in quam ipsius cavitatē per quēdā cranij foramina permeant. 9. Quarus sinus multas & ipse propagines, omnes propemodum sibiipfis confimiles educit; Quum primū nanque sinus hic in cerebri partem natibus confimilem pertingit, & furculos quosdam ex editiore sui regione in eā durā menyngis partem, quā dextram cerebri sedem à laeva distinguit, aliosq; dein tenuiores ex suorū laterum processu in duram membranā cerebellum integement effudit; 10. cavitatem quandam secundum editiorem omnem sui partem efformat venæ similem, quā secundum capitis lōgitudinem, per demisiorem duræ membranæ partem, qua cerebri partes dirimi retulimus, protensa, in septum vsq; sinuū olfactus organorum adducitur, furculos quosdam eo tractu ex editiori sede, in eam, quam retuli duræ menyngis partem deriuans. Præter insignem hanc venam, idemmet sinus, ex eadem sede, qua illam deprompsit ad ipsius latera, 11. duas insuper educit venas, quæ à suo ambæ latere super il lud cerebri 12. corpus, quod callo cōparabimus, secundum capitis latus vniuersum con cedunt; quo progressu 13. ramulos aliquot in tenuem membranā emittunt; sinistro quidem in sinistram, dextro autem in dextram regionē euadente. 14. Insuper verò ex ima sinus huiusce parte, iuxta venarum sedem testes referentem, venulæ quēdam in tenuē membranā cerebellum ambientem excurrunt, quarum nonnullæ retrorsum porrectæ, editiorē cerebelli sedem conscendunt; aliæ verò per demisiōres cerebri an fractus deducē, in cerebri substantiam sese insinuant, donec in anteriores cerebri vē triculos pertingant, vbi venarum arteriarumq; plexui inibi occurrenti 15. cōmiscen tur. Præterea ex sinus huiusce extremo, ab humiliore ipsius regione, iuxta cerebri par tem testibus 16. confimilē, vena quēdam emergit, quæ recta per ipsorum medium, & supra glandulam pineæ nuci similem, quæ cerebri testibus adhæret, ac sub tecto tertij ventriculi, qui à testudine nomen habet, in cerebri testiculos iter habet; 17. vbi plexus quosdam secundinis similes efformant, qui propterea 18. fuerunt appellati. Huic venæ post exortum, membranulæ quēdam piæ matris adnascuntur, quæ ipsius ramos, & implexus secundinis similes amplexantur, pendentesq; suffulciunt. Vena hæc quamuis in exortu sit vnica, in ventriculos tamen adducta, in 19. multos, eosdemq; prætenues ramos discinditur, qui retis instar nunc inuicē coeunt, nunc dirimuntur; 20. simulatq; autem in anteriorem tertij ventriculi sedem vena pertingit, tota in duos se ducitur ramos, quorum 21. alter in dextrum ventriculum, 22. alter in sinistrum, cōtendit. Quoniam autem pacto huiusmodi venulæ retis imaginem referentes arterijs huc per tinentibus committantur, tunc opportunē explicabo, vbi ceterarum arteriarū enar rationem absoluerō, quæ per cerebrum in ventriculos perducuntur. Quoniam verò de prima, secunda & quarta vena, de prima item & secunda arteria iam egimus, nunc duntaxat de tertia, quinta, & sexta vena, deq; tertia arteria, nobis agēdum superest. 23. Tertia igitur vena, quæ interior iugularis est, 24. ramulum in aurem emittit, per tem porum ossis foramen huic & 25. alteri quinti paris neruorum cerebri ramulo commu nes, ac protinus intrō in cranium migrat; ac duræ cerebri membranæ copulatur, 26. sinū efformans, qui toto sui ductu soboles complures in duræ membranæ sui lateris sedem cerebri basi substratam diffundit; à quibus denuo 27. alij ductus in tenuem menyngē deriuantur, perinde ac quatuor nuper commemoratorum sinum rami. Inter ceteras autem venæ huius propagines, in duram cerebri membranā effusas, vna quēdam ha betur, quæ sub temporibus per duram menyngem, in verticem sursum rapitur, ramu los in ascensu complures, huic totę membranę communicans. Haud absimili ratione in duram membranā 28. quinta vena distribuitur, per secundū cuneiformis ossis fo ramem, quod secundo neruorum pari egressum præbet, sic etiam & 29. sexta per maxi mum octauū capitis ossis foramen iuxta 30. olfactus organa. Sicq; tum huius tum tertię venæ propaginum gratia, in interna caluarie sede 31. ruuili quidam, vt tertio libro di ximus, parantur, in quibus tutius custodiuntur. 32. Tertia arteria, peculiari transuer soque foramine in cranium sese infert, & protinus in crassos duos, totidemq; tenuēs finditur ramos. Tenuium 33. exterior tertię venæ statim coalescit, & vnā cum ea in duram cerebri membranā distribuitur; 34. interior 35. per peculiare foramen in na rium cavitatem procurrat, & multis dissectis propaginibus, 36. vnā nasi summo im pertit,

Vena ex qua to dura menyngis sinus prodem itus,

Tertia caput petentis vena propagatio.

Quinta ac sexta vena distributio.

Tertia arteria distributio.



percit, cuius pulsatio euidenter percipitur. <sup>u</sup> Insignes autem rami postquam caluarie paulisper innitentes, sursum irreperere, antrosum festinantes, mox denuo<sup>x</sup> connectuntur, statimque rursus in duos dispariles partiuntur ramos. Quorum <sup>y</sup> minor <sup>z</sup> per seculum di neruorum <sup>a</sup> paris foramen vnà cum visorio <sup>b</sup> neruo in oculum permeat, & furculum aliquot in internam temporalis musculi sedem effundit. <sup>c</sup> Maior verò sursum cunctis duram menyngem perforat, iuxta <sup>d</sup> glandulam quam capitis pituitam excipere scripsimus; ac postmodum vbi duræ menyngis attingit amplitudinē, in duos rursus finditur ramos. Quorum <sup>e</sup> alter multiplici sobole in tenuem membranā cerebrum ambientē dispergitur, alter verò tenui pie matris membrana comitatus, in varios furculos inuicem complicatos discinditur, & per cerebri anfractus tantisper conscendit, dum in imā dextri vetriculi sedem perducatur. Atq; hinc retrorsum agitur, primum quidem ad posteriorem prædicti sinus partem, <sup>f</sup> furculum in ascensu allumens venæ cuiusdam siue rami, qui à quarto duræ membranæ sinu originem sumens, in cerebri conuolutiones exhauritur. <sup>h</sup> Vbi postremam dicti ventriculi sedē superauit, secundum mediū ipsius ductum in priora tantisper excurrit, dum <sup>i</sup> alteri eiusdem arteriæ parti cōmisceatur, quam ex quarto duræ membranæ sinu proficisci, ac sub tertij ventriculi fornice iter habere diximus. Ex dextro itaq; tertix arteriæ ramo, & ex super dicta propagine, ille arteriarum contextus secundarum imaginem referens cōsurgit, qui in dextro sese offert ventriculo; ex altero autem sinistra temporalis arteriæ ramo, & ex altera illius rami propagine, qui ex quarto duræ membranæ sinu ortū desumit, ille arteriarum confluens implexus qui in sinistro conspicitur. Atq; hæc sunt, quæ ad venarum arteriarumque cerebri propagationem pertinent. Torcular nunc & Rete illud admiratiōis plenum, de quo Galenus meminigit, enarranta supersessent. Verum & si perspectissimum est eum per torcular intellexisse spatium aliquod inter duræ membranæ sinus interiectum, illud tamen certè sciri minime potest, eamne <sup>k</sup> sedem intellexerit, qua primus secundo iungitur, quod tertij, & quarti est initium, an verò quarti sinus terminum cerebri testiculos respicientem; quandoquidem nunc hanc, nunc illam partem torcularis nomine appellat. Ac de vtraque sanè intelligi potest, ex ipsis nanque sanguis in ventriculos, perinde atque à torculari in fistulam exprimitur, imò verò ob eandem rationem quatuor finuum cuilibet idem nomen meo quidem iudicio adaptari posset. De admirabili plexu nihil in medium afferam, quòd in homine in neutiquam occurrat, vt vnicuique perspicuum est; qui humani corporis dissectionem administrarit, vel administratū semel saltem adstiterit. Et Galenum quidem tum hac in re, tum in alijs compluribus, venia dignum existimo, vtpote qui veritatem, in humanis corporibus inquirere nequaquam posset, eamque in brutis perferutari cogeretur, quemadmodum sanè hac in re in bobus efficit, in quibus tale quoddam retis genus conspicitur, quale ab ipsis describitur. Sicque venarum omnium, arteriarumque in cerebrum propagationem absoluiamus, paucis quibusdam exceptis propaginibus in ipsius substantiam concedentibus, quæ præ sua exilitate, nec cultro, nec oculis persequi possis.

## De vena Arteriali, &amp; Arteria venali. Cap. 14.

Vene arterialis  
ortus ac distri-  
butio.

**A**D libri huius absolutionem, tertia vena & secunda Arteria nobis explicanda relinquitur. <sup>a</sup> Vena ex editiore dextri <sup>b</sup> cordis ventriculi sede exoritur, deorsum, per asperæ arteriæ dexterū latūs porrigitur, <sup>c</sup> in duos ilico dissecta ramos, quiambo in pulmones, alter quidē ad leuam alter verò ad dexteram concedit. Ac forū vterque in duos eodē modo ramos partitur, hiq; duo in quatuor, & sic deinceps multis ramorū proiectionibus extenuantur, donec hunc in modum priorum propaginum vtraque in sui lateris pulmonē longè latèq; diffundatur. Vena hæc artariæ tunica adæpta est, vena ob id Arterialis dicta. <sup>d</sup> Arteria verò à sinistro latere basis sinistri cordis ventriculi ortū desumit, & in pulmones pariter exhauritur, & duplici primum, dein multiplici, vena in modū, sobole dispersita. Arteriæ huius tunica tenuis est, & venarū tunicis cōsimilis, ac proinde Arteria venalis ea dicta est, quæ verò sanguinē æreumq; siue spiritū continet. Arteriæ nomē obtinuit. Harū munus ex oim q ante me scripserunt

sententia

Arteria ven-  
alis.

Ipsarum mu-  
tatio.

a. t.iii. f.iii.  
b. l.iii. f.vi.  
c. viii. C.D.  
d. t.iii. f.iii.  
e. t.iii. f.iii.  
f. t.iii. f.iii.  
g. t.iii. f.iii.  
h. t.iii. f.iii.  
i. t.iii. f.iii.  
k. l. v. f. vii.

sententia est, venæ quidem pulmones duntaxat enutrire, arteriæ autem aerem à pulmonibus in sinistrum cordis ventriculum deferre; quod nulla prorsus ratione sanguinem in hac arteria contineri posse existimarent. Verum si hac de re periculum fecissent, ut ipsi multoties vnà cum Realdo Columbo, tum in viuētibz animantibus, tum in vita defunctis fecimus, arteriam hanc æquè atque cæterarum totius corporis quamlibet, sanguine plenam offendissent. Neque verò illud dici potest, mortuo homine sanguinem in ipsam confluere; quandoquidem vt in viuētibz animalis dissectione, tanta erumpit sanguinis copia, sic cor eum quem habet, continet, nec elabi finit, quòd si quid ipse egreditur, magis per arteriæ magnæ os, vnde vt plurimum illabi solet, quam per aliam quauis partem excerni, par est: eo magis quòd cor actutum diduci potest, vniuersusque ab eo sanguis detrahi, ac postmodum in hanc inspicere arteriam, quam dubio procul sanguine refertam comperient. Cum igitur hoc ita se habeat, sanguinem scilicet in hac arteria contineri, nec à sinistro ventriculo in eam irruere posse, vt membranarum situs, quas ad arteriæ os haberi monuimus, liquidò attestatur, id firmum, ratumque habeo, ex arteriali vena sanguinem in pulmonis substantiam resudare, vbi attenuatur, elaboraturque, quòd promptius in spiritus commutari possit; ac dein aeri commiscetur, qui per asperæ arteriæ ramos ingressus, vnà cum eo in arteriam venalem, & hinc in sinistrum cordis ventriculum defertur, crassiori sanguini permixtus, qui à dextro cordis ventriculo in sinistrum permeat, si quid tamen ipsius permeat; mihi enim nunquam hæc eno: videre contigit qua perducì queat; sed si deducitur, ex vtroque hoc sanguine corpus quoddam confurgit, in vitales spiritus commutari aptum. Mea hæc sententia præterquam quòd sensum ipsum habet assertorem, quia posito in arteria venali sanguinem reperiri, (vt vnusquisque fidem mihi derogans intueri poterit) necessum est fateri, sanguinem ex ea in sinistrum migrare ventriculum; verisimilior quoque est, quam existimare ex sanguine dextri cordis ventriculi, qui parum à cuiusvis alterius venæ sanguine distat, citra præuiam vllam exquisitiorem elaborationem, vitales ilicò spiritus procreari posse. Sed hoc dimisso, vtpote quod extra rem nostram sit, id intellexisse sufficiat, in arteria venali, non minus in adultis, quàm in fœtu, plurimum sanguinis, non autem exiguum quid, plurimos item spiritus contineri, vt firma est omnium, qui ante nos hæc literis consignarunt, assertio. Is quidnam hic præstet, seorsum quilibet animi gratia, meditari poterit. Atque hic venarum, arteriarumque enarrationi finem imponam, neruorum historiam aggressurus.

Arteria venalis  
sanguinem continet.

f. li. iiii. c. viii.

# CHARACTERVM QVI DVABVS

## PRIORIBVS SEXTI LIBRI

tabulis continentur, explicatio.

### TABVLA I. ET II.

**D**V & priores figura ostendunt humanum corpus, una partem eius anteriorem, altera posteriorem, cute quidem atque adipe sublatis, venulis tamen summam carnē cutemq; transmeantibus, reseruatis: qua licet non omnes eundem seruent ordinē, numerum, distributionis modum; maior tamen harum pars in plerisq; hominibus, eodem ferē tramite incidunt, praesertim illa quarum sectio ad sanguinis missionem necessaria est: quarum omnium nomina in gratiam chyrrurgorum praesenti loco volui exponere.

**T**ERTIA figura venam cauam monstrat totam, & omni ex parte nudam, ut melius perspicipi possit quae ratione per vniuersum differtiat corpus. Verum monendus hic est lector, ad huius, ut ad duarum praecedentium intelligentiam, libri tertij quartam, & quintam tabulas multum lucis atque facilitatis allaturas. Et quoniam hic aliqui characteres omnibus figuris congruunt (quo venarum cutanearū distributio fit dilucidior) suum singulis numerum subiunximus.

- AA** A 3. Tribus hisce literis exortus venae cauae, eiusque radices quo modo nascatur ex hepate, ostenduntur.
- a** 3. Alia quaedam radix a sima hepatis parte surgens.
- B** 3. Venę magnę pars inter hepar, & diaphragma sita.
- C** 3. Ramorum ē caudice venę cauę ad diaphragma tendentium sinister, ex quo nonnihil in cordis capsulam pertingit.
- D** 3. Venę cauę foramen, quo loco cordi iungitur.
- E** 3. Vena coronalis dicta, quod coronę instar cor ambiat, multos ramu-

- FF** 3. Vena sine coniuge, cuius principium & finem ostendunt GG.
- GG** 3. Literę hę ramos ostendunt venę coniugis expertis, quibus musculi intercostales nutriuntur.
- H** 3. Iugulus, ad quē vena caua in duas diuiditur partes.
- I** 3. Vena ad brachium tendens: & antequam in hoc perueniat, bifida sectione diuiditur.
- K** 3. Ramis tres supremas lateris sui costas nutriendas.
- L** 3. Vena quę sub ospectoris pertransiens dispergitur per musculū rectum eiusdem lateris.
- M** 3. Iam dictę venę terminus.
- NN** 3. Vena quę per laterales vertebrarū cervicis processus transiens caput petit, & per duram menyngem distribuitur.
- O** Vena quę diuiditur per musculosque colli inferiores, & pectoris superiores partes occupant.
- P** 1. 3. Vena quę distribuitur per musculos quibus operitur pectus, itē per vbera eorumque cutem.
- Q** 2. 3. Vena humerum petens, distributa per musculos partem scapulae internā obfidentes, perque eos qui huic loco propinqui sunt, & hic etiam ramuli apparent adenes axillę transmeantes, quorum hoc loco notatur vnus inter P & R.
- R** 1. 2. 3. Ramus qui ascendit per latus pectoris suę regionis, & distribuitur per musculum, quo brachium abducitur deorsum.
- S** 3. Iugularis interior, a qua profiliunt nonnulli rami, qui distribuuntur per arteriam pulmonis, perque nervulos hanc partem transmeantes.
- T** 1. 2. 3. Iugularis externa.
- V** 1. 2. 3. Bipartita venę huius sectio.
- X** 1. 2. 3. Iugularis externę ramus interior, qui oris, laryngis, ossisque

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     | hyoidis musculos petit, postea caput intrat in tres diuisus partes.   | i  | 1.2.3. Horum ramorum tertius, qui obliquus supra radium incedit, & supra partem brachij exteriorem, ramulos quosdam spargens in cutē: horū præcipuus notatus k, cutē, quæ est in parte externa flexus cubiti, nutrit, hic ubi peruenit ad carpū, iungitur axillaris ramo insignito x, cōiunctionis locus est ad l. ex vtriusq; vena cōstituit, quæ rursū paulō inferius in varias diuisas portiones, totā ferē manū nutrit. |
| YZ  | 1.2.3. Ramus externus ad faciē tendens. Z apicem eius qui faciē petit monstrat.   | k  |   |
| 9   | 9. Verò ostendit eum qui porrigitur versus lachrymalem, & in medio frontis cōiungitur cum eiusdem venæ lateris alterius ramis. æ partem ascēdentem per tēpora, eam verò quæ ad aures.*                  | x  |   |
| a   |   | l  |   |
| *   | Quod reliquum est venarum per caput distributarum, commodiore loco monstrabimus.  | m  | 1.2.3. Vena iecoraria, axillaris, basilica, in brachio dextro scilicet. Nā in sinistro, lienaris vocatā plerisq;.   |
| aa  | 1.2.3. Vena capitis, vena externa brachij, vena magna, cuius initium a primum in tertia figura ostendit, secundum verò in tribus locū notat, ubi primum se prodere incipit transmeando carnem cutemque. | n  | 1.2.3. Ramus iecorariæ, dispersus per initia musculorum discedentium cubitum.   |
| b   | 1.2.3. Ramus qui promittitur parte superna caudicis ab eodē latere, aliquāto priusquam diuidatur, progrediturque ad nutritionem musculorū, posteriōrē colli partem occupantium.                         | o  | 1.2.3. Ramulus musculos iam dictos petens, & cutem, qua externa brachij pars tegitur.   |
| c   | 1.2.3. Pars venæ capitis, quæ progreditur ad partem scapulæ externā, cuius quidem portio quēdā latet, quēdam meat inter carnē & cutē.   | p  | 3. Magna propago axillaris, ab humero ex obliquo brachium ascendens in musculos adiacētes ramulos spargēs, inceditque comitatus quarto brachij neruo.   |
| dd  | 1.2.3. Hunc ramū vena capitis emittit antequam abdat sub humerū: & hæc quidem distribuitur in musculū, quo brachium eleuatur, & per cutem quo ille tegitur.   | q  | 3. Iecorariæ in duas propagines diuisio, quarum ea quæ q q insignitur perpetuo latenter incedit cum sociā arteria.  |
| eee | 1.2.3. Nonnullæ venulæ ex capitis vena nascētes dispersæ per cutem brachij externi, perque partē anteriorem muscoli brachium adducentis.  | r  | 1.2.3. Huius diuisionis propago altera: quæ in multos diuisa ramulos distribuitur per carnē cutemque.   |
| f   | 1.2.3. Hic tripartito diuiditur capitis vena, & singulæ portiones modo maiores, modo minores apparent.  | s  | 1.2.3. Ramus propagatus ex iecoraria, qui bipartito diuisus tē exteriōrē, quam interioris brachij partis cutem nutrit.  |
| g   | 1.2.3. Horum ramorū primus, sub musculos transit à tuberculo externo ossis humeri pronatos.   | t  | 1.2.3. Hic ramus iecorariæ ab anteriore humeri parte ad cubiti flexum descendens, cephalicę ramo b notato commiscetur, & ex hac mixtione mediana dicta efficitur quæ suprā notata est æ.  |
| h   | 1.2.3. Horum trium ramorū secundus, quo progressus ad cubiti flexū iungit iecorarię ramo, notato t litera, & ambo coniuncti cōstituant venā communē seu medianam vocatā, hāc insigniuimus æ.            | u  | 2.3. Ramus iecorarię retro incedens, quæ diuiditur ad caput ossis humeri internum, hic postea multifariam diuiditur.  |
| a   |   | xx | Ramus natus ex supradicto, q maiorē radiū subiēs brachiale petit, inter eūdū multos spargēs ad partes adiacētes ramulos, & maxime versus digitū minimū, qui ad venę cephalicę ramū se applicat in carpo.  |


|       |   |       |          |   |  |
|-------|---|-------|----------|---|--|
| γ     | Vena hæc cutem nutrit, qua externa cubiti pars tegitur.   |       |          |   | mulis venę internę, non procul à foramine ossis peëctinis. |
| z z   | 1. 3. Elatior venam notat, ex eo iecorarię ramo, quę t insigniuimus, prænotatam: inferior vero eiusdem venę ramos, qui producuntur à ramo notato x x. & ad partem meant brachij internam. | ei    | 3.       | Hac in parte vena iam dicta forame peëctinis tráfit, & præter alios permultos ramum vnũ ad femoris articulum mittit.  |  |
| q     | 1. 3. Hoc loco cõcurrunt venulę per cutem pollicis distributę cum ramo notando z.   | p     | 2. 3.    | Venę peëctinis foramen tráseuntis ramus, qui in cutę, qua femoris pars interna operitur, se recipit.  |  |
| α     | Mediana, siue communis.   | χ     |          | Locus vbi hæc vena maiori iũgitur, quę per tibiam distribuitur, notabiturque. 2.  |  |
| β     | 1. 2. 3. Venę communis paulò supra carpum partitio.   | Γ     | 3.       | Vena distributa per musculum rectũ abdominis, cuius beneficio, iuxta quosdam, maximus est inter mamas vteramque cõsensus.                                   |  |
| γ     | 1. 3. Huius partitionis ramus externus qui partem manus externam adit, mittitque ramulos ad partẽ ipsius internam, vbi est δ.   | Δ     | 1. 3.    | Propago venę in crus tendentis quę transfuerim ad genitalia vicini nasque sedes in furculos exhaurit.   |  |
| δ     |   | Θ     | 1. 3.    | Primę magnę crus petentis venę propago, per interiorem femoris tibięque sedem, sub cute deorsum ad summum vsque pedem perreptans.                           |  |
| ε     | 1. 3. Huius partitionis ramus alter, versus digitum medium & anularem tendens.  | A     | 1. 3.    | Propagines Θ insignitę ramus femoris interiora ad inguina accedēs.  |  |
| ζ     | 3. Venę caux pars, qua inferiores corporis partes aluntur.  | ξ ξ ξ | 1. 2.    | Surculi illius venę, quę in figura tertia notatur ξ.  |  |
| η     | 3. Vena renis inuolucrum nutriens.  | S     | 1.       | Hę propagines vbera petũt, suntq; portiones venę in tertia figura notatę L.   |  |
| θ     | 3. Emulgens dextra.   | Ξ     | 1. 3.    | Alius eiusdem venę L notatę ramus, cutem, qua femoris anterior pars tegitur, perreptans.  |  |
| ι     | 3. Emulgens sinistra.   | Π     | 3.       | Dictę propaginis ramus, primo tibí mouentiũ musculo sublatus.   |  |
| κ     | 3. Ramulus ab emulgente dextra natus, in renis inuolucrum absumptus.  | Σ     | 1. 3.    | Dictę propaginis soboles, quas in anteriorem genu sedem & posteriorem quoque dispensat.   |  |
| λ λ μ | 3. Vasa spermatica.   | Φ     | 1. 2. 3. | Hac sede propago Θ indicata per sedem tibię interiorę sub cute in varios multiplicisque ramos disfinditur, hicque opportunẽ cũ sanguinem mittimus aperitur. |  |
| ν     | 3. Hoc loco vasa feminaria incipiũt retorqueri in varicosos anfractus.  | Ψ     | 1. 3.    | Hac ad anteriorem malleoli interioris sedem nuper dicta propago ducitur, atque vti cernere est, in pedis superiora exhauritur.                              |  |
| ξ     | 3. Rami venę caux, quos intra lumborum spatium remittit.  | Ω     | 1. 3.    | Ramus è grandi vena crus petente in anteriorẽ coxendicis articuli regionem exporrectus, eiusque sedis musculis, & cuti soboles vtunque frequentes deriuans. |  |
| ο     | 3. Venę caux in duos maximos caudices diuisio.  |       |          |   |  |
| π     | 3. Ramulus è transuerso distributus per musculos lumborum, & ventris, perque peritonęum.  |       |          |   |  |
| φ     | 3. Aliquot ramuli elatiora foramina ossis sacri subingredientes.  |       |          |   |  |
| ρ     | 3. Sinistri caudicis venę caux partitio in duos ramos internum ρ externum ζ designat.   |       |          |   |  |
| ς     |   |       |          |   |  |
| τ τ   | 2. 3. Propago externa rami notati ρ, quę distribuitur per musculos coxę extimos & per cutem clunij.   |       |          |   |  |
| υ     | 3. Propago interna eiusdem rami: ab hac nonnulli ramuli progrediuntur ad anteriora ossis sacri foramina. 2 & ↓ notant reliquas rami eiusdem propagines.                                   |       |          |   |  |
| χ ↓   |   |       |          |   |  |
| ω     | 3. Vena hæc propagatur ex ramo externo, insignito ζ. iungiturq; ra-   |       |          |   |  |



TABVLA · I · LIBRI · VI ·

FIG. I

II





- G G 1. 2. Termini venæ sine pari, quam Gnotauimus.
- I 1. 2. 3. Ramus septimo, nonoq; tibiâ mouentibus musculis, & cuti femoris iuxta externam ipsius sedē furculos deducens.
1. 2. 3. Grandis vena in quintam femur mouentium musculum digesta.
3. 4. 2. 3. His duabus propaginis inuicem coeuntibus vena cōstituitur, quæ inter musculos posteriorem femoris sedem occupantes excidens, sursum in femoris cutem ramos porrigit quos 5 insigniui.
- 5 6 Verum maiori ipsius parte notata 6 sub cute per poplitē fertur, & in suræ cutem numerosa serie ad 7 notam spargitur.
- 7 8 3. Ramus ex vena magna ortus, partē internam tibiæ perreptans.
- 9 3. Magnæ crus petentis venæ in duos ramos distributio, qua hæc inter duo inferiora femoris ossis capita continetur.
- 10 1. 3. Interior dictæ diuisionis ramus ad posteriores suram constituentes musculos eiusque cutem digestus, inibi que caractere 11 notatus.
- 11 1. 2. 3. Iam dicti rami portio secundum interioris malleoli posteriorem sedem ad internum pedis latus exporrecta.
- 12 13 3. Ramus externus dictæ diuisionis, qui statim in alios dissimiles duos ramos distribuitur.
- 14 1. 3. Dictæ modo diuisionis externa propago.
- 15 1. 2. 3. Iam dictæ propaginis portio, per externum repens malleolum.
- 16 3. Dictæ portionis ramus interior, per interstitium geminitibiæ ossis interrepens.
- 17 3. Diuiso interioris propaginis 16 in figuratæ, quæ ad medium longitudinis tibiæ perficitur, atque hæc alterum ramum inter calcem, & tibiæ os ad pedis inferiora mittit, alterū vero inter fibulam, & calcē.
- 18 3. Iam dicti rami soboles, quæ inter tibiæ os, & fibulam per membraneum eorum ossium ligamētum in pedis superiora digeruntur, alijf-

que venis hac proreptantibus cōmiscetur.

- 18 3. Modus distributionis venarū digitos petentium.

## FIGURA II.

**P**RÆSENS figura vena, cana portionem oculis subijcit, posteriori iecoris sedi subiensam, qua longa sectione diuisa, ac dein aperta est, ut propaginum foramina, quæ cana in iecur diffundit, in conspectum venirent.

- AA BB. Propagines quæ ex hepate oriuntur.
- CC Ramuli tenuiores, qui ex hepate ad venam cauam protenduntur.
- D Venæ cauæ sedes, qua hæc septū permeat, ipsique ramos depromit.

## FIGURA III.

**R**VDIS fibrarum, quibus vena tunica constat, delineatio.


- A Transuersas monstrat. B C Obliquas. D rectas.
- E Triplicis fibrarum generis implexū.

## TABULA III. FIG. I.

- AA AAA. *Quinque his literis portæ uenæ propagines indicantur, per iecoris corpus diffusa, & hic veluti iecoris formam exprimentes.*
1. 2. 3. 4. 5. Numerus ramorum, in quos diuiditur vena portæ, ut distribuatur per iecoris corpus.
- B Venæ portæ amplissimus caudex.
- C Duo ramusculi bilis vesiculam petentes.
- D Vena ad posteriorem fundi vetriculi partem excurrens.
- E Hac sede vena portæ in duos maximos secatur truncos.
- F Truncus sinister, & elatior.
- G Truncus dexter & humilior.
- H Vena dextram fundi vetriculi sedē perreptans, & geniculatim illi sedī, ac superioris membranæ omenti dextræ parti ramulos præbens.
- I Vena duodeno intestino, & ieiuni principio exprompta.
- K Ramus in dextram regionem gibbi vetriculi, quæ id dorsum respicit, aliquot furculis digestus.


TABVLA > II >

LIBRI > VI >



|      |   |     |  |
|------|---|-----|--|
| L    | Vena in dextram sedem inferioris omenti membranę, & colum intestinũ, qua hac fertur, excurrens.   | bbb | facile ostendat.<br>Prima dextri portę venę trũci in mesenterium series, quę dein sanę est infinita & impęse varia, priusquā suis extremis in intestina implicetur.    |
| M    | Soboles quędam à sinistro trũco in glandosum corpus inferiori membranę omenti innatum, sparę.   | c   | Vena sub recto prorepens intestino indicatur, vnā cum ramulis intestino in venę progressu digestis.  |
| N    | Vena insignis sub vřtriculo, vbi dorso in innititur, versus elatius ipsius orificium obliquę conscendens, quo priusquam peringat, vtrinque vnā educit propaginem.   | ee  | Venularum soboles, recti intestini finem amplexantes.  |
| O    | O insignitam, & in ventriculum hac fede, qua dorso incũbit, digestā.  | *   | Ad huius figurę ampliorem explicationem iuuabit recurrere ad 2. 3. 4. 10. 12. 13. 14. 15. figuras, lib. 3. item ad huius lib. vltimam.                                 |
| P    | Rami huius reflexus ad orificium stomachi.  |     |  |
| Q    | Eiusdem rami series id orificiũ coronę instar amplexa.  |     |  |
| R    | Ramus venę superius ventriculi os ambientis, qui secundum elatiora ventriculi procedens, inferiori osculo furculos exhibet, soboles etiam satis frequentes in progressu ad anteriora, posterioraq; ventriculi dispergens.   |     |  |
| S    | Grandis vřcunq; vena in inferiorem omenti membranā & colum intestinum, qua ventriculo exporrigitur, numerosa sobole procurrens.   |     |  |
| TT   | Sinistri trunci diuarcatio, vbi is iā lienem est accessurus.  |     |  |
| V    | Venula in sinistram sedem inferioris membranę omenti distributa, cuius radicem in integra figura (quod subinde defit) dũtaxat delineauimus, eius seriem peculiari figura quam seorsim subiecimus exprimentes, in qua T venā, quę lienī exporrigitur, demonstrat vtrinque abtruncatam: præfens vero venula V insignitur. |     |  |
| XX   | Vena ab illis quę elatiora lienis petunt, in sinistrum ventriculi latus dispensata.   |     |  |
| Y    | Eiusmodi etiam vena hic, qualem vtrinque X indicabat, insignitur.   |     |  |
| Z    | Vena in sinistram fundi ventriculi sedem perreptans, multasque soboles ventriculo, superiorique omenti membranę offerens.   |     |  |
| aaaa | His characteribus venarum in lienis substantia distributio indicatur, adeo frequēs, vt lienis imaginem  |     |  |
|      |   |     | FIGURA II.   |
|      |   |     | <b>P</b> RESENTI figura nuda vasorum cerebri ab vno scilicet latere, delineatio proponitur, à venis arterijsq; incipia, priusquam illa penitus in caluariam merguntur. |
|      |   | A   | Interior iugularis, quā iam caluarię proxima est.  |
|      |   | B   | Soporalis arteria.   |
|      |   | C   | Prima vena caluariam petens.   |
|      |   | D   | Secunda.   |
|      |   | E   | Tertia.  |
|      |   | F   | Quarta.  |
|      |   | G   | Quinta vena.   |
|      |   | H   | Sexta vena.  |
|      |   | I   | Secunda arteria.   |
|      |   | K   | Prima caluariam ingrediens arteria.  |
|      |   | L   | Tertia arteria.  |
|      |   | M   | Dexter, seu primus durę cerebri mēbranę sinus.   |
|      |   | N   | Sinister durę cerebri membranę sinus, quem secundũ nuncupamus.   |
|      |   | O   | Primi & secundi sinuum cōgressus.  |
|      |   | PP  | Tertius durę membranę sinus.   |
|      |   | Q   | Tertij sinus finis osseo cōmissus septo, quo olfactus organorũ sedes interdiuiduntur.  |
|      |   | R   | Quartus durę membranę sinus.   |
|      |   | SS  | Ductus à dextro sinu pullulantes, ac in durę tenuisque membranā sedes, quę illis proximę sunt, excurrentes.  |
|      |   | TTT | Ductus ex tertij sinus latere in tenuē diffusī membranā, quos solum abtruncatos depingere licuit.  |
|      |   | VV  | V. Ramuli ab infimo tertij sinus angulo in eam durę membranę par-  |

TABVLA III. II LIB. VI.



|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
|     | tem à sinistra seiungit, in modum falcis.   |     | furculus, ad auditus organum exporrectus.  |
| XXX | XX. Tertij sinus furculi cum illis commissi vasculis, quæ per verticem caluariam subingrediuntur.   | ooo | Series sinus duræ mēbranæ, in quem tertia vena exhauritur, cui perpetuò sinus attēditur, in quē tertie arteriæ ramus <i>r</i> notatus absūmitur.                             |
| YY  | Exiguæ ppagines ab elatissimo quarti sinus angulo, in duræ mēbranæ sedē aliquouſq; excurrentes, quæ dextram cerebri partem à sinistra hic supra cerebellū interdiuidit.   | pp  | Propagines eorum, quos iam vltimo cōmemorauimus sinuum, in tenuem cerebri membranā sparsæ.   |
| aa  | Ductus à dextro quarti sinus angulo deprompti, qui in duram cerebri mēbranā, quā cerebello hic incūbit, ac dein in tenuē, & cerebelli, & cerebri mēbranā diffundūtur.   | q   | Diuisio tertiæ, & maxime caluariam ingredientis arteriæ, simul atq; in caluarię amplitudinem mergitur.   |
| b   | Ductus à quarto pendens sinu, ac secundum totā longitudinē, humiliorēque sedē eius duræ mēbranæ partis propagatus, quæ dextrā cerebri partem à sinistra dirimit.  | r   | Ramulus tertiæ arteriæ, qui in duræ membranæ sinum absūmitur, atque secundum cerebri latera excurrit, ooo, notata.   |
| ccc | Surculi fursum à commemorato iā ductu in dictā quoque durę membranæ partem deriuati.  | f   | Ramulus per proprium foramen in narium amplitudinē digestus, & quodam furculo <i>t</i> insignito nasi extremum accedens.   |
| de  | A quarto sinu propagati ductus, qui venarū prorsus modo tenui membrana suffulti, secundum cerebri longitudinē supra callosum cerebri corpus ducūtur: Ac vnus quidē qui <i>d</i> insignitur, parti dextræ cerebri attēditur: Alter verò <i>e</i> notatus, sinistræ parti exporrigitur. | uu  | Duo grādes rami eius diuisionis, cui <i>q</i> inscribitur.   |
| f   | Ductus à quarti sinus humiliori sedē in tenuem cerebelli membranā propagatus.   | x   | Propago ex grandīū illorū ramorū, quos <i>u</i> & <i>u</i> notauimus, coitu, per secūdi paris neruorū cerebri foramen ad oculos possimū excidēs.                             |
| g   | Ductus <i>f</i> notati propago per cerebri anfractus gyrosque in humillimā dextri cerebri ventriculi sedē pertingens, ac cum hac ascēdente arteria, quā <i>γ</i> notabimus, coiens.   | a   | Propago crassior dicti modō cōgressus, quæ duram cerebri membranā perforat, ac mox in duos ramos bipartitur, <i>β</i> & <i>γ</i> insignitos.                                 |
| b   | Ductus <i>f</i> notati propago retrorsum repens, ac multifariam in tenuem cerebelli membranā dissectus.   | β   | Ramus propaginis <i>a</i> notatę, in tenuē cerebri membranā frequēti fole hic dispersus.   |
| i   | Præcipua quarti sinus propago, sub cerebri corpore fornicis cameræve modo extructo, ad interiorem vsque sedem tertij ventriculi cerebri procurrens.   | γ   | Ramus propaginis <i>a</i> insignitæ, dextrum accedēs cerebri ventriculū, & plexum efformans, qui extimo foetus inuolucro cōfertur, qui que hic <i>δ</i> notatus conspicitur. |
| kl  | Propaginis <i>i</i> notatę in duas partes dissectio. in qua <i>l</i> partem indicat dextro exporrectam cerebri ventriculo, <i>m</i> verò eam quæ sinistrū adit, hicque abtruncata cernitur.   | φ   | Ramus secūde capitis arterię, qui per musculos ceruicis spargitur.   |
| m   |   |     |  |
| n   | Tertiæ caluariam ingredientis venæ  |     |  |

FIGVRA III.

**H**Ac figura exhibetur nuda, & ab omnibus partibus libera uena, arteriosa delineatio: cuius orificium apertum fixi, ut tres membra na, sanguinem è pulmonibus dilato corde in dextrum ipsius sinum regurgitare prohibentes, in cōspectum venirent. notantur autem illæ notis 1.2.3.

1.2.3

**A** Sedes, qua arterialis vena ex cordis dextro sinu originem ducit.

B Inte-


|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| B  | Interior arterialis venę tunica quintuplo propria venę tunica crassior.  | G  | foboles offerens.   |
| C  | Exterior venę arterialis tunica, peculiari respōdens venarū tunicæ.  | G  | Sub sinistro pectoris ossis latere ad umbilici vsque sedem excurrens ramus, à quo furculi digeruntur in verarum costarum cartilaginū interualla, & hinc in musculos pectori instratos, insuper in sinistrā, qua thoracis amplitudo intercipitur, membranā & abdominis musculos. |
| DE | Arterialis venę caudicis in duos trūcos diuisio, ac E quidem dextrū truncum indicat, multiplici fobole dextris pulmonum sedibus distributum. F verò sinistrum indicat truncum: G & G autem insignitur arterialis venę per pulmonum substantiam series. | H  | Ramus posteriores cervicē occupantium musculos accedens.  |
| F  |  | I  | Arteria ad cauam scapulę regionem, ac in eius sedis musculos præpens.   |
| GG |  | K  | Ramulus ad humeri cum scapula articulū & summi humeri inferiora propagatus, nusquam interim ad cutem excidens.  |
|    | FIGVRA IIII.   | L  | Propago in musculos anteriore thoracis sedem integentes sparsa.   |
| H  | Venalis arterię à corde pronascens initium.  | M  | Propago secundū thoracis latera deorsum procidens, ac musculo brachiū deorsum trahēti intertexta. Inter L & M ramulus vnus occurrit, eorū qui in glandulas alæ cauitatē opplentes disseminātur.   |
| I  | Indicatur crassities simplicis arterię venalis tunicę.   | N  | Arteria simul cum interiori axillaris venę trunco in manū excurret, ac primi illi furculi sub N mox conspicui, in musculos humerum amplexantes propagantur.   |
| KL | Prima venalis arterię diuisio, simul cum ipsius ortu facta.  | O  | Arteria secundū posteriorem humeri sedem vnā cum quarto in brachium pertinente neruo, aliquouſque in externā cubiti sedem reuolutus, ac vndique in alto interim latitans.   |
| MM | Series venalis arterię per pulmonum substantiam innumeris propaginibus facta.  | PP | Hi ramuli articulo cubiti cum humero sunt peculiares.   |
|    | FIGVRA V.  | Q  | Axillaris arterię ramus radio exportectus, ac tandē pollicis, & indici medioq; digitis furculos offerēs.  |
| H  | <i>Hic depingitur vmbilici vena, quę plerunque, ut ait Vesalius, non ingreditur iecur distributa in varios ramos.</i>  | R  | Surculus ab arterię ramo Q insignito versus manus exteriora inter primum pollicis os & postbrachialis os, quo index suffulcitur, deductus.  |
| AA | Huius venę pars vmbilico contermina.   | S  | Ramus vnę exportectus, ac in internā quoque manus extremę sedem digestus.   |
| BB | Eiusdem insertio in hepar.   | *  | Ramulus musculis elargitus, q̄ externū latus postbrachialis ossis occupat, quo minimus digitus sustinetur.  |
|    | TABV. IIII. FIGVR. I.  | T  | Arteriarū in extrema manu series.   |
| A  | <b>A</b> RTERIE magnę ex sinistro cordis sinu exortus.   |    |   |
| B  | Duę arterię cordis basim coronæ modo succingentes.   |    |   |
| C  | Magnę arterię caudicis in duos trūcos bipartitio.  |    |   |
| D  | Arteria obliquā ad primam sinistri lateris costam contendens.  |    |   |
| E  | Ramus quatuor superiorum sinistri lateris costarum interuallis foboles deriuans.   |    |   |
| F  | Ramus per transversos cervicis vertebrarū processus ad caluariā vsque prorupēs, & geniculatim dorsali medullę vicinisq; musculis   |    |   |



|     |  |     |  |   |
|-----|--|-----|--|---|
| V   | Amplior ascēdētis arteriæ trūci portio, quæ rectā ad iugulū cōtēdēs, in duos impares ramos diuiditur.  |     |  | liborū vertebrae accedūt, & in peritonēū & musculos vertebrae adnatos distribuūt. Propago autē ad humilius $\mu$ cōsistēs, cæteris grādiōr est, atq; ad abdominis vsque latera frequenti sobole excurrit.   |
| X   | Sinister diuisionis in iugulo factæ ramus, qui & gracilior est, sinistriq; lateris soporalem constituit.   |     |  |   |
| YZ  | Duobus his characteribus dexter ramus, qui sinistro lōgē amplior est insignit. Verum Y priuatim propaginē indicat, quē in dextro latere prorsus in easdē soboles digerit, in quas arteriā D insignitā in sinistro latere disseminari conspiciat. Cæterū Z dextrā soporale notat. | vvv |  | Magnæ arteriæ ad os sacrum in duos trūcos distributio. Verū isti characteres etiam surculos notant, ab humiliori arteriæ regione in ossis sacri foramina deriuatos.   |
| a   | Sinistræ soporalis arteriæ in faucium regionibus in duos ramos distributio, ac <i>b</i> quidem externum, <i>c</i> verò & <i>d</i> internū indicant: quanquam duo posteriores hi characteres priuatim aliquid indicent.   | ξ   |  | Interior ramus sinistri trunci iam dictæ diuisionis.  |
| b   |  | o   |  | Interioris rami exterior propago in musculos excurrēs, qui externam ilium ossis sedem & coxēdici articulum integunt.  |
| c   | Arteriarum propagatio ad laryngē, fauces, & linguam.   | ω   |  | Interioris rami ξ notati interior propago in ossis sacri humiliorē sedem, vesicam & vesicæ ceruicem, ipsumq; penem: in mulieribus verò, in inferiorē vteri fundi regionem, & pariter in illius ceruicem surculos diffundens.  |
| d   | Soporale arteriæ pars caluariā petēs, atq; iuxta basim caluariæ in duos distributa ramos, quorū alter, qui sinistrū durę mēbranę sinū subit, hic, quā in caluariā mergit, ab truncatus est. de quo paulo post latius.  | pp  |  | Hic etiam arterias appinximus, quarū sinistra ab vmbilico hic inter ξ & σ ad interiorē prius cōmemorātū ramū perinde pertinet, ac si versus vmbilicū ab ipso deriuaret.   |
| b   | Soporale arteriæ ramus, capitis exteriora implicans.   | σ   |  | Interioris rami ξ insigniti reliquū, quod ab externo ramo trūci diuisionis, q̄ supra os sacrum sit, portionē ascēdēs, p̄ pubis ossis foramen in crus delabit; inibi in musculos pubis os occupātes digestū, & suotermino cū alia arteria, q̄ in quintū femur mouētē musculū præcipuē digeritur, ac ↓ mox signabit, coit, ea sede qua ω adscriptum cernis. |
| c   | Dicti modō & b insigniti rami propago, penitiūs inter faciei musculos excurrēs.  | τ   |  | Propago exterioris rami fursū ad rectū abdominis sui lateris musculū cōscēdēs, atq; præcipua ipsi sobole vmbilici regionē petens, reliquos autē surculos trasuerfim in humiliorē abdominis sedē dispensans.   |
| f   | Rami b insigniti sub auris radice distributio, cuius anterior ramus g notatus, secundum tempora fertur. posterior verò, cui h inscripti, secundum auris posteriora sub cute pariter atque ille spargitur.  | υ   |  | Surculus trasuerfim secundum pubis os ad pudenda propens.   |
| g   |  | φ   |  | Sedes exterioris rami, qua is modō in crus delabitur, ac in vniuersum crus disseminati incipit.   |
| b   |  | χ   |  | Ramus maioris crus petētis arteriæ in musculos propagans, qui anteriorē femoris sedem sibi vendicant,   |
| i   | Truncus magnę arteriæ, deorsum ad dorsū vertebrae explicatus.  |     |  |   |
| kkk | Propagines vtrinque ad octo inferiorum costarum interualla protēsa, & dorsali quoque medullę, ac musculus dorso, & thoraci adnatis ramulos offerentes.   |     |  |   |
| l   | Septi trasuerfis arteriæ.  |     |  |   |
| λ   | Arteria humiliorem mesenterij sedem subiens, ac potissimum in colon intestinum, quā id à lienis regione ad rectū pertinet, ac dein in rectum intestinū discinditur.  |     |  |   |
| μμ  | Propagines notātur, quę geniculatim  |     |  |   |

TABVLA IIII

LIBRI VI



- ↓ Ramus ad quintum femur mouentē musculum, & eos, qui internā femoris sedem occupant, digestus, vnoque ipſius furculo cum illius arteriæ coiens ſine, quam per pubis oſſis foramen procidere diximus, ac ω inſigniuimus.
- Γ Ramus in musculos poſtēriorem femoris ſedem obtinētes deriuatus.
- Δ Δ Ramuli genu, articulo, & capitibus musculorum pedem mouentium inibi principium ducentibus peculiare. Hicque grādisarteria in poplite reconditur.
- Θ Grandis crurisarteria poſtēriore tibie ſedem petens.
- Ξ Ramus fibulā amplexantibus musculis, præcipuē autē ſeptimo & octauo pedem mouentium oblatuſ.
- Σ Arteria inter calcem, & interiorem malleolū pedis inferiora ſubiens.
- Π Arteria ad pedis humiliora accedēs, inter calcem, & exteriore malleolum nonnunquam reflexa.
- Φ Ramuli tibie cum calcis articulo proprij.
- Ψ Propago pedis elatiōra accedens.
- Ω Arteriarum in pedis humiliori ſede diſtributio.

## FIGURA II.

**V**ERITVS ne charactērum copia integrā magna arteria delineationem alioquin hic ſatis obſcuram penitus corrumpere, priuata eſſigie utendum duxi, quæ ſuperius, ubi ſep̄to tranſuerſo arteriæ indicata offeruntur, veluti ex magna arteria candice diſſectā eſt: inferius verō ad ſeminalium arteriarum, quas i & u indicabimus, exortū. In præſenti itaque figurā iam enarrandis propaginibus duas radices pinxi, cum integra arteriæ delineatio unicā (ut frequenter etiam occurrit) tantum habeat.

- m Indicat m vtriuſque, aut vnius duntaxat radicis exortum, n dextrum ramum, o furculum in humiliore omenti membranā hic exporrectum. p propaginē in dextrā ventriculi ſedē, quā dorſum ſpectat, atq; inferiori oriſiciū educit, excur-

- q rentem. q ramum duodeno inteſtino, & ieiuni initio exporrectū.
- r propaginē ad dextrā fundi ventriculi ſedē deductā, ventriculoq; & ſuperiori mēbranæ omenti ramulos exhibētē. ſ bilis veficulę arteriolas, z arteriam iecori diſtributam. Cæterum u inſignitur ſiniſter ramus, qui potiſſimum lienem adit. x propago ſecundū poſtēriorem ventriculi ſedem, ad ipſius vſque elatiſ oriſiciū progrediens. y eiſ propaginiſ ramuli in ventriculum, quā dorſo innititur, deriuati. z ramus oriſiciū ventriculi ſuperius, coronę modo cingens. a ramus ſecundū elatiorem ventriculi ſedem inferioriſ illius oriſiciū accedens. β grandis in demiffiorem omenti membranā excurrens propago, quæ etiam colo inteſtino multis furculis implicatur. γ furculus in humiliorem omēti membranā hic ad ſiniſtrum latuſ excurrens. δ & δ arteriæ lienis cauum ſubeuntes, e arteria ſiniſtrum fundi ventriculi ſedem petens, ac ventriculo ipſique ſuperiori membranæ omenti ſoboles deriuans. ζ ramuli ab alijs lienē accedentibus arterijs in lauū ventriculi latuſ deprompti.
- Hæc quæ ſequuntur, ad tertiam magnæ arteriæ figurā pertinent.
- ζ In integra delineatione, & in ſecunda aliud ζ occurrit, quod inſignitur arteria in ſuperiorem, ac propemodum vniuerſam meſenterij ſedem propagata, & ſuis propaginibus in ieiunum inteſtinum, & ilium, & coli partē a iecore ad dextrum renem cōſpicuā, ſparſa.
- n Dextrum renem accedens arteria.
- θ Arteria quæ in ſiniſtrum renem exporrigitur.
- ii Dextri lateriſ ſeminaliſ arteria.
- xx Siniftri reſtiſ ſeminaliſ arteria.

## FIGURA III.

**P**RÆSENTI figurā AA notata oſtenditur arteriæ portio, ex quā rami ad coſtarum internalla digeruntur.

## VENARVM ET ITEM ARTERIARVM

OMNIVM INTEGRA ABSOLVTAQVE DELINEATIO,

in hoc potissimum parata, vt in conspicuo esset,

*Quenam vena cum arterijs porrigitur, & quæ absque arteriarum consortio per corpus repant, ac rursus cuiusmodi arterias Natura coniungibus venis destituerit.*


## TABVLA QVINTA.

**I**N præsentī figurā primum mascululi Latīnorū occurrunt characteres, organa, præter venas arteriasq; obvia notantes. Significatur itaque

- AA Septum transversum.  
 B Cordis inuolucris portio, inibi afferuata, vbi id septo continuatur.  
 C Cor sua sede repositum.  
 DD Quatuor pulmonis fibræ, lobivæ.  
 E Aspera arteria.  
 FF Gibbi iecoris magna portio magis conspicua in 4. particulari figura, ac ibidem notata FF.  
 GG Caudum iecoris.  
 H Vescicula excipiendæ bili flauæ parata. Si interim ex characterū serie aliqui omittantur, non ideo aliquid præsentī figuræ expressum, nos innotatū præterisse arbitrabimur, quum ex reliquis tabulis huc duntaxat tantum assumpserimus, quantum venarum arteriarumq; digestionī ostendendæ sufficere duximus.  
 O Lienis caua sedes in tertia figura.  
 P Dextri renis anterior sedes.  
 Q Sinister ren.  
 S Hanc literam ne inuestiges in grandiore figura, verum in septima & octaua particularibus figuris: in septima notat virilem vescicam simul cum vmbilico, & vasis vmbilico ascriptis, reliquisq; partibus, quas sparsim in characterū explicatione indicabimus. S in octaua figura designat muliebrē vescicam pariter cum vmbilici vasis, & vrinarijs meatibus: plura de his vide in indice particularium figurarū.

- T Venæ caudæ caudicis sedes, inter septū transversum & cor consistens.  
 VX Vasorum coronarum ritu cordis basim ambiētium sedes, atque ad eod cordis basim.  
 Y Cordis mucro.  
 Z Rami ab arterijs venisque coronalibus deorsum per cordis superficiem diffusi.  
 a Hac parte caudæ caudex in dextrum cordis finem dehiscit.  
 b Dextra cordis auricula.  
 c Sinistræ auriculæ cordis mucro.  
 d Venæ arterialis caudex.  
 ee Notant tamen e & e venalis arteriæ, & venæ arterialis in dextram pulmonis partē progressus, nondum pulmonis substantia vndique circumdatos.  
 f Magnæ arteriæ caudex.  
 g Magnæ arteriæ truncus, partes cordi subditas petens.  
 h Superiora petentis magnæ arteriæ trunci portio, sinistro brachio potissimum oblata.  
 i Dicti modo trunci insignior portio, atque adeo ipsius in duos impares ramos distributio, quorum alter sinistra est soporalis k notata, grādiōr verò dextram format soporalem l insignitam, & arteriā potissimum in dextrum brachiū excurrentem, & m notatam.  
 n Hac excurrunt septi transversī nervi, suis principijs abtruncati, quorum initium hic conspicuum est.  
 o Venæ pari destitutæ initium, ipsius verò reliquam seriem prima particularium figurarū exhibet, quæ est quasi resecta huius pars, ea regione cogitatione committēda, vbi utraque portio o signatur: quæ in maiori figura exprimi non po-

|             |  |            |  |
|-------------|--|------------|--|
|             | tuit, quod pulmones occupet anteriorem pectoris faciem, cum reliquum illud venæ pari destituta hinc petat posteriora pectoris versus dorsi vertebrae.  |            | uariam petentem, postquam ramū à se diffudit, cum externa iugulari ad faciem, & ad tempus, & post aures digestum.  |
| <i>p</i>    | Cauæ in iugulo bipartitio, ac vtrinque ad <i>p</i> , latera exortus apparent venarum pectoris ossi propriarū, ac ad umbilici vsque regionē excurrentium: huius exortus reliquā portionem secūda particularis figura præ se fert: in qua pars illa notata caractere <i>q</i> , imaginatione connectenda venit exortui in magna figura signatæ eadem litera: alteram partem signatam * adiungendam cogitabis literæ <i>z</i> in maiori figura. | <i>ξ</i>   | Soporalis ramus primum duræ membranæ petens sinum.   |
| <i>q</i>    |  | <i>o</i>   | Præcipua soporalis portio per priuatim foramen caluariam petens.   |
| *           |  | <i>π</i>   | Versus narium amplitudinē exporrectus ramus.   |
| <i>r</i>    | Venæ superiorum aliquot costarum interualla adeuntis initium.  | <i>ρ</i>   | Ramus in dextrum latus duræ membranæ excurrens.  |
| <i>ss</i>   | Vena per transuersos ceruicis vertebrarum processus caluariā petēs, atque in secundum duræ membranæ sinum simul cum coniuge arteria absumpta.  | <i>σ τ</i> | Rami soporalis præcipui, qui plexū reticularem efformare peperam creduntur.  |
| <i>ttuu</i> | Notatur enim primus sinus, <i>tt</i> , secundus <i>uu</i> , tertius <i>xx</i> , quarti initium <i>y</i> .  | <i>υ</i>   | Ramus oculis petens.   |
| <i>xy</i>   |  | <i>φ</i>   | Ramus tenuem adiens membranam cerebri basi obuolutam.  |
| <i>z</i>    | Axillam petens vena, quæ in sinistro latere humerariam <i>a</i> indicatā promittit. In dextro autē latere illius initium hic ab externa pedit iugulari.  | <i>χ</i>   | Plexus, quem extimo foetus inuolucro comparamus.   |
| <i>a</i>    |  | <i>↓</i>   | Sexti paris neruorum cerebri dexter neruus, illic abscissus, quā secundum laryngis latus deorsū fertur.  |
| <i>βγ</i>   | Hic abtruncatæ propagines illæ sūt, quæ ab axillam petente vena in thoracis anteriora, posteriora & latera digeruntur.   | <i>ω ω</i> | Dexter recurrens neruus.   |
| <i>δ</i>    | Interior iugularis.  | <i>1</i>   | Sexti paris neruorum cerebri truncus sinister.   |
| <i>ε</i>    | Interioris iugularis in duas venas distributio.  | <i>2</i>   | Recurrens neruus sinister.   |
| <i>ζ</i>    | Exterior iugularis.  | <i>ε</i>   | Neruulus cordis basim accedens.  |
| <i>ηθ</i>   | Exterior iugularis ad fauces distributio. <i>θ</i> ipsius pars post aures ad occipitiū excurrens notatur, ad tempus & verticē, <i>z</i> ad faciem & frontem, <i>λ</i> ad secundum duræ membranæ sinum, <i>μ</i> verò duo ipsius rami indicantur, quorum alter per octauum capitis os caluariam petit, alter per secundi paris neruorum cerebri foramen.  | <i>4</i>   | Posteriora ceruicis, & occipitium adiens vena.   |
| <i>ι</i>    |  | <i>5</i>   | Scapulæ posteriora petens vena. Verum & si posthac arteriam priuatim non insigniamus, promptè ex delineatione liquet, cui nam venæ arteria exporrigatur.   |
| <i>κλ</i>   |  | <i>6</i>   | Ad cutē quā summus humerus integitur.  |
| <i>μ</i>    |  | <i>7</i>   | Humeraria quā cutem subit, cubitumque adit.  |
| <i>ν</i>    | Aliquot subsequentes characteres in dextro ponuntur latere soporalis arteriæ seriem indicantes. Atque hic <i>ν</i> arteriæ portionē indicat cal-   | <i>8</i>   | Humerariæ ramulus altiora cubiti articuli interdum petens.   |
|             |  | <i>9</i>   | Ramus ab humeraria ad communis venæ constitutionē repēs. Verum modò cōduxerit potius minores Latinos characteres assumere, ne quā arithmetici characteres geminādi essent, plura ipsis obliterent. |
|             |  | <i>a</i>   | Humerariæ ramus per radium cubitique exteriora ad vlnæ appendicem & brachiale properans, axillarisque ramo <i>p</i> indicando aucta, & paruum digitum, deinde & annularem præcipue accedens.       |





|            |   |           |  |
|------------|---|-----------|--|
| <i>b</i>   | Axillaris ramus, cuti anteriorem interioremq; brachij sedem inuenti dispensatus.  |           | lector est, tertiam particulare figuram continere, ac exprimere interioris omenti membranae portionem, quae posteriori ventriculi subijcitur sedi, ac venae portae distributionem simul cum arterijs nervisque hac excurrētib; sustinet. Insuper praeter eiusmodi vasa hic in eadem tertia figura Lien cum venis, ac arterijs per mesenterium diffusis spectatur, totaque figura (si quis veller) agglutinari potest maiori figurae in iecoris cauo, vbi |
| <i>c</i>   | Ad musculos cubitum extendentes.  |           | <i>u</i> <i>φ</i> <i>τ</i> <i>ε</i> in vtrisque figuris occurrētia inuicem respondeant. <i>ε</i> igitur in maiori, ac item tertia figura significat meatū bilis vesiculae duodeno insertum.  |
| <i>d</i>   | Ramus quartum brachij neruum ad cubiti vsq; exteriora cōcomitans.   |           | <i>τ</i> 3. 10. In vtraque figura venae portae caudex.   |
| <i>e</i>   | Axillaris in duos truncos partitio.   |           | <i>u</i> 3. 10. Iecori inserta arteria, & nervus quoq; illi exporrectus arteriae.  |
| <i>ff</i>  | Truncus in alto latitās, & arteria vndique concomitatus, & per cubiti flexum in cubitum tendens.  |           | <i>φ</i> 3. 10. Bilis vesiculam adiens arteria, & nervus.  |
| <i>g</i>   | Dicti trunci ramus radio exporrectus & furculus pollicis, indicis, & medio exhibens.  |           | <i>χ</i> 3. 10. Venae bilis vesiculam adētes.  |
| <i>h</i>   | Arteriae dictum ramum cōcomitantis foboles, externam manus sedē inter indicem, ac pollicē accedēs.  | <i>cc</i> | <i>ψ</i> 3. Vena & item arteria posteriorem ventriculi sedem iuxta ipsius inferius orificium accedentes.   |
| <i>i</i>   | Reconditi illius trunci ramus vlnae exporrectus, & paruo digito, anulari, & medio foboles depromēs.   |           | <i>ω</i> 3. 10. Vena ventriculū petēs, quā gibbū ipius dextrā dorsi sedē spectat.  |
| <i>k</i>   | Sub cute excurrentis axillaris trunci iuxta cubiti articulum diuisio.   |           | <i>a</i> 3. Vna vena, arteria, nervus, dextram fundi ventriculi sedem implicantes.   |
| <i>l</i>   | Axillaris ramus cōmunē cōstituens.  |           | <i>b</i> 3. Minor portae maximae distributionis truncus.   |
| <i>m</i>   | Communis vena.  |           | <i>c</i> 3. Grandior truncus maximae partitionis venae portae.   |
| <i>n</i>   | Communis venae instar <i>γ</i> diuisio, atque dein ipsius per externā manus sedem series.   |           | <i>d</i> 3. Vena & arteria duodeno intestino potissimū exporrecta, & ipsis attēso corpore glāduloso suffultē.  |
| <i>o</i>   | Surculus communis internā manus adiens sedem, & hic alijs commixtus ramulis.  |           | <i>e</i> 3. Vena cum coniuge arteria dextrā sedem adiens inferioris membranae omenti.  |
| <i>p</i>   | Axillaris ramus vlnae exporrectus, variēque in cutē dissectus, & suo extremo cū quodam humerariae ramo coiens, vbi <i>π</i> posuimus.   |           | <i>ff</i> 3. Radix arteriē in iecur, ventriculū, lienem & omentum, & bilis vesiculam digestae.   |
| <i>qq</i>  | Series venarum internam cubiti cutem, & volam implicantium.   |           | <i>g</i> 3. Vena cum cōiuge arteria superius ventriculi orificiū coronae modo tandem cingens, atque in vētriculi figura inter <i>a</i> & <i>a</i> occurrens.   |
| <i>r</i>   | Hanc literā ne scrutaueris in maiori figura, cū sit in 7 & 8 figuris, notatque vmbilici portionem.  |           | <i>h</i> 3. Vena, & arteria praecipuā inferioris membranae omenti sedem potens, & colon quā ventriculo ex  |
| <i>ss</i>  | In eisdem figuris notat venā ab vmbilico in iecur exporrectam: quae connectēda venit hepatis, depicta in quarta particulari figura, vbi reliqua portio istius venae signatur caractere <i>f</i> . |           |  |
| <i>t</i>   | In septima & 8 figura particulari notat meatum vrinam fetus interfecūdum ipsius inuolucrum, & intimum deferentem.   |           |  |
| <i>uuu</i> | 7. & 8. figura significant arterias fetui particulares.   |           |  |
| <i>e</i>   | In maiori figura portiuncula nervi iecoris cauo à ventriculi nervis deprompta. Hic admonendus mihi  |           |  |

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
|     | porrigitur implicans.  |     | implicatio.   |
| ii  | 3. Glandulosum corpus vasorum distributioni hic præfectum.   | v   | Sinister testis, tunica ipsi proxima obtectus.  |
| x   | 3. Inferioris omenti membranę finistram sedem accedens vena.   | ξ ξ | Vasis semen deferentis ad testem revolutio.   |
| ll  | 3. Vasorum series ad lienem.   | o p | Vasis semen deferentis ascensus ad pubis os.  |
| mmn | 3. Vasa ab illis quę lieni inferuntur finistram vetriculi sedē adētia. Verū præcipua <i>z</i> indicant, quę finistram sedē fundi vetriculi implicāt.   | π   | Sinistri vasis semen deferentis ad pubis ossis posteriora inflexus.   |
| ooo | 3. Series est venarum & itē arteriarum intestinis propriarum.  | ς   | Dextri vasis semē deferētis reflexus.   |
| pp  | 3. Radix præcipuę arterię intestina petentis.  | τ   | Dextri finistriq; vasorum semen deferentium coitus.   |
| q q | 3. Minor arteria intestinis propria.   | φ   | Vasorum semē deferentiū insertio.   |
| rr  | 3. Glandulę in mesenterio positę, & nuper narratos vasorum diductus corroborantes.   | χ χ | Septima figura glandulosum corpus vasorum semen deferentiū insertionem excipiens.   |
| f   | In maiori figura foramē septi transversi stomachū transmittens, atque adeo sinus iecoris stomacho cedēs.   | ↓ ↓ | In eadem & sexta figuris meatus vrinę seminique communis.   |
| t   | Itē in maiori figura iecoris ligamētū quo sinistra ipsius pars septo nectit.   | ω ω | Sexta & septima figuris musculus orbiculatus dicto iam meatui obductus.   |
| u u | Magna arteria septum permeans, atque adeo ipsius ramus in dextram septi partem excurrent.  | α α | Sexta & septima figuris penis, atque adeo ipsius corpora.   |
| x   | In vtraq; figura cauę venę caudex.   | α α | Rursus in maiori figura <i>a</i> , <i>a</i> , significat venas, & arterias lumborū vertebri, ipsiq; adnatis musculis, & abdominis lateribus exporrectas.                  |
| y   | In maiori figura: vena finistri renis pinguem accedens tunicam.  | b   | In eadem maiori figura venę cauę, & arterię super os sacrum partitio.   |
| a   | Vena & arteria reni dextro oblata.   | c c | Arteriole, sūt sacri ossis foramina petentes.   |
| β   | Vena dextri renis pinguem tunicā intexens.   | d   | Sinistri partitionis dictę trunci diuisio.  |
| γ   | Sinistrum renem accedens vena, & arteria.  | e   | Interioris rami dictę diuisionis propago, nates & coxendicis ossi adnexa petens.  |
| δ   | Sinistra feminalis vena.   | f   | Dicti rami propago tandem vesicę & vtero digesta.   |
| ε   | Dextra feminalis vena.   | g   | Pars est arterię foetui peculiaris, quā antea ad vesicę latera <i>u</i> , vti & hic quoque in maiori figurę portione, notauimus.  |
| ζ   | Arteriarum feminalium ortus.   | b   | Portiūcula exterioris rami dictę antea diuisionis ad reliquū accedens interioris rami.  |
| η η | Sinistra feminalis venę, & arterię congressus.   | i   | Reliquū interioris rami p pubis ossis foramē i musculos interiorē semoris sedē occupantes distributū.   |
| z z | Sinistrum testem vnā cū tunica adhuc ipsi ppria, atque à peritonæo pronata, & <i>ii</i> notata delineauimus in quinta figura particulari: ita tamen hic est dissecta aperta; testis tunica, vt nihil quo minus aptē cernatur impediatur, imò etiā musculum illi innatum commonstrat, <i>z</i> indicatum. | κ   | Sedes qua soboles dicti reliqui alteri venę cōmiscet. Verū hic ex tabula prōptē animaduertis, quādo & arterię subaudiendū est, quū scilicet venę arteriam attendi cernis. |
| λ   | In eadē quinta figura particulari ad characterem λ vena, & arteria peritonęi amplitudinē egrediuntur.  |     |   |
| μ   | Varicosum corpus, ipsaq; adeo venę arterię varia, & admirabilis  |     |   |

- l* 2. 10. Exterioris rami propago, abdominis inferiorem sedē ad umbilicum vsque perrepens.  
*mm* Vena per femoris, & tibiæ interiora sub cute ad digitos vsque pedis distributa, & in progressu varios edens furculos.  
*n* Coxendicis anteriora petens, sub cute tamen.  
*o* Musculos & cutem femoris exteriorē sedē occupantes intertexens.  
*p* Musculis anteriorem sedem femoris occupantibus digesta.  
*q* Dictæ modò venę congressus cum ea, quę per pubis ossis foramen femur adit.  
*r* Hęc præcipua femur petēs vena secundum femoris os reflectitur.  
*st* Propagines musculos posteriorē femoris sedem occupantes, & cutem huius sedis ad furā vsque accedentes.  
*u* Diuisio in poplite, atque adeo rami in musculos à femoris capitibus hic pronascentes distributi.  
*x* Maioris dictę diuisionis trunci vena, externam tibię cutem ad summū

- vsque pedem implicans.  
*y* Vena, & arteria fibulę exporrecta, ac inter musculos latitans.  
*a* Maioris dictæ diuisionis trunci ramus, cutem internam tibię sedē integentem, ad digitos vsque variè subiens.  
*β* Ramus dicti trūci suram ad calcem vsque petens.  
*γ* Propago grandioris trūci inter musculos tibię anteriorem sedem occupantes, ad pedis vsque superiora, & digitos digesta.  
*δ* Trunci grandioris reliquū inter musculos posteriorem tibię sedem sibi vendicantes deorsum repēs, & inter tibiā & calcem pedem subiens, ramulos digitorū inferiori fedi communicans.

## FIGVRA IX.

**P**ROPONITVR *hic spectandus muliebris uterus una cum suis instrumentis, necessarijs ad procreationem, super sedeo autem à literarum explicatione, quod hæc inueniatur supra, lib. III. Figura XXVIII.*

## IOANNIS VALVERDI

Medici de Humani Corporis  
Fabrica.

## LIBER SEPTIMVS.

In quo de Neruis agitur.

*Quid Nervi, quæ ipsorum differentia, quid exortus. Cap. I.*

EATVS ex prioribus duobus principiis emanantes, venas scilicet & arterias superiore libro prosequuti sumus; è tertio nunc principio enascentes, enarrandi nobis supersunt. Scire igitur oportet, quod licet communi appellatione, nervi vocentur non minus musculorum tendines, & articularum vincula, quam instrumenta, quibus sentiens facultas in omnia membra distribuitur; ipse tamen hoc in libro, sicut & alijs, sentiendi organa semper intelligam, quibus à capite

*Quid communiter nervum vocent.*

duntaxat origo est. Est ergo nervus corpus quoddam longum, teres, & ad tactum solidum, cuius origo & principium, nec dura membrana est, neque cor, ut quidam existimarunt, sed cerebrum, ac spinæ medulla; quæ sententia Hippocratem primum auctorem, deinde verò Erasistratum, Lycum, Andream, Marinum, Herophylum, Galenum, Vesalium, & Realdum assertores habuit, & ipsius facile vniuersique certior fieri potest. Nunquam enim ex corde nervus ullus prodire conspicitur; imò vero in ipsum, ut suo loco dicemus, ramus quidem prætenus sexti paris nervorum cerebri propagatur, quò sanè parùm indigeret, si eorum principium existeret. Neque à dura prodeunt meninge; quanvis excusandi veniant, qui id prodiderunt, cum enim nervi omnes illi ac tenui membranæ, perinde atque arbores corticibus implicentur, facile fuit ut, extrinsecus eos intuentes, deluderentur. In hanc quoque sententiam id eos adduxit, quòd cerebrum vsquequaque sensus expers, utranque verò membranam eo admodum exquisito præditam intuerentur; quod sanè effecit, ut ratum constansque adeo non habeam, ut complures existimant, à cerebro sensus originem pendere, præsertim cum interiori nervorum partem sensu omnino destitui, exteriori verò eo perquam acuto pollere animaduertam. Sed his, quæ huc minimè pertinent, omisissis, qui sedulo internam nervorum faciem perscrutabitur, huic, eos à cerebro, aut à spinæ medulla oriri, eorumque substantiam ei ex qua prodeunt parti assimilari, conspicuum euadet. Quoniam verò medulla, ut diximus, cerebrum

*Nervus quid. Nervi à cerebro prodeunt.*

*Nervi haud ex corde prodeunt.*

duritie superat, sic etiam ex ea prodeuntes nervi, iis, quos cerebrum expromit, duriores existunt; & sic deinceps prout magis dorsum versus procedunt, ad os vsque sacrum, unde durissimi totius corporis nervi prodeunt. Pro longiori etiam breviori ve progressu nervi duritie, ac mollitie variant; ac proinde, qui aures, linguam palatum, & oculos adeunt, teneriores sunt; est ex his, qui tortuosi procurant, ut tertium par, magis indurescunt, prout sicciore est sedes quam perreptant; idque haud citra graue mysterium effectum est. Ut enim exteriores sensus, visus scilicet, auditus, gustatus, olfactus, & tactus, ad huiusce facultatis susceptionem, molli egent instrumento, quò radii, siue rerum species ipsum promptius afficerent, alterarent ve, si huiusmodi nervi duri erant, haud rectè actionem suam edere poterant; sic qui motui famulantur, si molles extitissent, corporis nostri compagem assiduo motu ciere incolumes minimè potuissent. Hinc, nervorum alios sensu, alios motioni præesse colligitur; sensui quidem famulantur, qui in oculis,

*Nervorum in duritie discrimen.*

*Nervorum cur alij alijs teneriores.*

a li.iii. f.vi.

b li.iii. f. G. sui, alios motioni præesse colligitur; sensui quidem famulantur, qui in oculis,

los, <sup>c</sup> aures, <sup>d</sup> nares, palatum, ventriculi os, manuum volas, & in cutem denique <sup>e</sup> cad. a. <sup>d</sup> f. iii. P. vnuerſam excurrunt; reliqui omnes motioni deſeruiunt. Ex hoc tamen minime

*Nerui omnes ſenſus compoſes.*

infero neruos motui famulantes ſenſus expertes eſſe, vt multi exiſtimarunt, hinc de-  
luſi, quòd plerunque obſeruarent ſenſum motu ſuperſtite deperdi, & contrà. Cum  
enim partis alicuius, ſenſus duntaxat deperditur, id fit, quòd neruorū propagines in  
cutem pertinentes, noxam ſubierint, muſculorum interim neruis illiſ; motu autem  
duntaxat deperdito, ſecus euenit. Quod ſi quis ex me quærat, vndenam fiat, vt cu-  
tem a deũtes nerui ipſam motu nequaquam cieant, vt ſolent qui muſculos accedunt;  
Huic reſponſum velim, quod quẽmadmodum eadem in nobis facultas per eoſdem  
neruos opifex eſt viſus, auditus, olfactus, & guſtatus; & horum vnumquodque pe-  
culiari ſede, quæ proprium eſt eiufmodi operis inſtrumentum, non alia vlla perſi-  
citur; ſic quoque per neruos in muſculos euadentes motum nobis elargitur, ſenſum  
verò per eos, qui ad cutem; ad ventriculi os, ad inteſtina, ceterasque omnes corporis  
partes, ſenſui ſuſcipiendo aptas ptingunt. Sed iam ad neruorum differentias no-  
ſtra redeat oratio, Alia nanque præter dictas, à neruorum exortu deſumitur; Alij ſi-

*Neruorum cur  
alijs motum alijs  
ſenſum elargian-  
tur.*

*Neruorum ab  
exortu diſcrimē*

quidem, præfertimque teneriores, continuo enaſcuntur principio, vt <sup>e</sup> viſorij ner- <sup>e</sup> t. i. f. ii. C.  
ui. Alij, multiplici principio, ceu funiculis quibuſdam, inuicem perpetuò diſtanti-  
bus exoriuntur, cuiuſmodi ſunt <sup>f</sup> tertium, quartum, & quintum cerebri neruorum <sup>f</sup> cad. M.  
par. Alij, etſi multiplex principium fortiuntur, protinus tamen vt è cranio emer-  
gunt, inuicem rurfus coeunt, & caudicem vnum conſtituunt. quod potiffimum  
in pluribus à dorſo prodeuntibus neruis, ſ; nec non in ſexto, & ſeptimo cerebri ner- <sup>g</sup> f. i. i. e.  
uorum pari obſeruatur; imò verò nerui omnes tranſuerſim diſſecti, complurium  
filamentorum ſiue funiculorum vnà coeuntium imaginem præ ſe ferunt. A diſtribu-

*A diſtributione.*

tionis quoque forma neruorum differentia deſumitur. Quando quidem alijs in vni-  
ca duntaxat partem digeruntur, nullam alijs propaginem offerentes, quo in nume-  
ro ſunt viſorij nerui. Alij pluribus diſpertiti ramis, alios in cutem, alios in muſculos  
alios in oſſa effundunt, <sup>h</sup> cuius generis ſunt tertij cerebri paris nerui. Quidam indiui- <sup>h</sup> f. ii. M.  
ſi, nulliue commiſſi ramo feruntur, <sup>i</sup> quale eſt ſecundum cerebri par, licet ipſi minor <sup>i</sup> f. i. iii. K.  
tertij paris è cerebro quoque prodeuntis radix non nihil attendatur. Quidam inui- <sup>K</sup> f. i. i. M.  
cem copulantur <sup>k</sup> vt viſorij nerui inter ſe. Alij alijs connectuntur, ſimulæque dor-  
ſum egrediuntur, in retis ſiue funiculi ſpeciem, qualis in cardinalium galero depingi  
ſolet; <sup>l</sup> cuiuſmodi ſunt qui brachium a deũtes nerui. Solent quoque non nulli hanc in <sup>L</sup> t. iii. f. i.  
neruis differentiam conſtituere, vt alijs intus caui ſiue perforati ſint, alijs ſolidi. At mi-

*Neruis nullus  
peruius.*

hi nullum hætenus peruium neruum videre contigit. Quod verò nonnulli de opti-  
cis narrant, ſi ad candelæ lumen ſiue ad ſolem inſpiciantur, ridiculum apud me eſt.  
Hoc itaque omiſſo, ad neruorum omnium propagationem aggredi operę precium  
erit, ducto a cerebri neruis exordio.

*Quot neruorum coniugationes à cerebro, ac dorſali medulla priuſquam è cra-  
nio excedat, orium deſumant. Cap. 2.*

*Pro his conſule  
figuras omnes li-  
bri quinti.*

**C**erebrum duas in partes diſtingui, anteriorem ſcilicet, quam Cerebrum, ac po-  
ſteriore, quam Cerebellum appellamus, iam proditum à nobis eſt. Ante-  
riorem præterea, ſuperiore ſui facie in dextram locuamque dirimi, inferiore verò  
continuum eſſe vnuerſam; & ab ea, non autem à cerebello, ſpinalem medullam  
enaſci diximus. Inſuper duos cerebro ventriculos a deſſe tradidimus, dextrum &  
ſiniſtrum, ambos in vnã coeuntis cauitatem, quam tertium nuncupamus ven-  
triculum, ex quo riuulus quidam in alium excurrit ſinum, inter ſpinalem medullam  
ac cerebellum exculptum, quem nonnulli quartum vocant ventriculum. Nunc de  
neruis ab ipſis prodeuntibus agere, tēpeſtium erit, qui omnes à cerebri baſi, & à ſpi-  
nali medulla, priuſquam è cranio elabatur, nullo autem pacto ex cerebello, vt multi  
exiſtimarunt, ſuam habent originem. Neruoſ hos à cerebro prodeuntēs, etſi ex  
diſſectionum proceribus multi, ſeptem paribus contineri prodiderunt, ſeptenos. ſ.  
vtrinque neruos conſtituentes, ſi eoſ tamen accuratius intueamur, multo melius nouē  
coniugia

a. f. i. E. f. ii. coniugia constituerè poterimus, eo<sup>a</sup> pari addito, quod olfactus organum adit, in ner-  
F. uorum numerum ab ipsis minimè relato, quòd ex cranio nequaquam emergat. Ter-  
b. f. i. ii. LM. tium item par verius<sup>b</sup> duplex, quàm vnicum còstitui posset: quemadmodùm & aliud  
c. ead. d. iux- enumerari<sup>c</sup> coniugium, iuxta quinti paris radicem enascès, de quo ipsorum nullus  
ta. a. meminit. At ne à veterum ordine deflectam, septenis paribus omnes completar,  
à visorio quod primum in ordine est, exorsus.

*De primo, & secundo cerebri neruorum pari. Cap. 3.*

a. f. i. ii. G. **P**rimum<sup>a</sup> cerebri par, neruo vtrinque vno, à cerebri basi exoritur, iuxta eā sedem  
b. f. i. i. v. f. i. qua angustior duorum ventriculorum coit, pars, <sup>b</sup> supra gládulam scilicet, quam  
M. capitis pituitam excipere diximus. Hi omnium totius corporis neruorum (absolutè  
loquor, de singulis seorsum) facile mollissimi sunt, & crassissimi; ac eorum vterque  
statim ab exortu coniugem versus paulisper contendit, dum ambo inuicem coeant,  
c. f. i. H. non tamen decussatim, vt multi existimarunt, sed in quadrangulum<sup>c</sup> corpus cògre-  
dientes, quod<sup>d</sup> in oculorum orbitæ centrum pertinet; vbi rursus aduariantur, ac  
d. f. i. v. f. i. dexter quidem in dextrum, sinister verò in sinistrum oculum concedit, vt Patauij sin-  
F. gulis ferè annis leui negotio videre est; nam latronibus oculorum altero ob primum  
furtum Venetijs eruto, euenit, vt post annum vnum, vel alterum iterū comprehen-  
dantur, & Patauium dissectionis ergo mittantur; in quibus eius regionis neruus, qua  
oculus ademptus est, flaccidus & propè aridus occurrit, altero interim prorsus illæso.  
Præterquam quòd ipse in nonnullis diuisionem inter vtrunque neruum obseruaui;  
& Vesalius eos se in viro diremptos vidisse testatur, qui dum in viuus ageret, notus  
ipfi erat, nec ideo tamen, gemina ipsius oculis visa obuersabatur. Horum igitur ner-  
uorum vterque à suo festinans latere<sup>e</sup> per primum cuneiformis ovis foramen profi-  
liat, ad internum scilicet radicis oculi orbitæ latus; & in posterioris oculi sedis<sup>f</sup> cen-  
trum ad amussim insertus, nec alterutram in partem (vti Vesalius, aut rem oscitante  
inquirens, aut cæterorum animantium oculis delusus prodidit) defleatens, <sup>g</sup> in mē-  
branam reti similem vterque abit, quæ<sup>h</sup> humoris vitrei medietatem ferè vniuersam  
posteriùs contegit, estque cerebri substantiæ nonnihil similis, seu veriùs reti, vnde  
eam nonnulli haud membranæ, sed retis nomine dignati sunt. Sicque præsentis ner-  
ui citra villam ramorum propagationem desinunt, visorios spiritus, ductum instar,  
in oculos, radios verò siue rerum species, seu imagines, in cerebri vètriculos deferen-  
tes, vbi de visis dijudicamus; vnde illos nonnulli peruis<sup>i</sup> esse prodiderunt, hincque  
ωρόπους ὀπτικὰς, hoc est visorios canales, siue foramina nuncuparunt. Mihi tamen,  
vti dixi, nullus in ipsis hæcenus, sensibilis meatus occurrit, neque exiguus, neque  
grandis. <sup>i</sup> Secunda neruorum coniugatio, paulò posteriùs quàm prima, ex cerebri  
basi lateribus ortum desumit, longè illa tenuior, sed durior, idque haud citra graue  
mysterium; quòd per<sup>k</sup> musculos oculorum, & superioris palpebræ motores di-  
geratur, ex cranio per<sup>l</sup> secundum cuneiformis ovis foramen, comite vena, & arte-  
ria emergens.

Primi paris exortus.

Visorij nerui haud sese decussatim intersecant.

Visorij nerui insertio.

Secundum neruorum par.

*De tertio, & quarto cerebri neruorum pari. Cap. 4.*

a. f. i. ii. M. li. **T**ertia coniugatio duplici radice oritur, <sup>a</sup> altera quidem tenuiore, sed duriore.  
v. f. i. xiii. l. <sup>b</sup> Crassior radix à cerebri lateribus enascitur, paulò à reliquis duabus posteriùs,  
b. ead. L. H. Tenuior posteriùs à crassiore ortum habet, ad<sup>c</sup> primam spinalis medullæ originem;  
c. f. i. D. & recta in priora per cerebri basim contendit, ac duram perforans menyngem, <sup>d</sup> se-  
cundo pari adiungitur, & vnà cum eo per<sup>e</sup> foramē exilit, quod secundo pari egre-  
f. f. i. ii. N. li. ii. sum præbere diximus. Et protinus quatuor in partes finditur; quarū<sup>f</sup> prima in adipē  
c. iiii. f. i. e. digerit oculi musculus obductum; tū per ea frōtis ovis<sup>g</sup> foramina, quæ in supercilij  
g. lib. i. ta. iiii. haberi monuimus, educitur, ac in frōtis<sup>h</sup> musculos distribuitur. <sup>i</sup> Secūda deorsū ferit,  
h. f. i. ii. c. i. A. & <sup>k</sup> per quarti superioris maxillæ foramē excidit, quod in malè sūmmitate visitur,  
i. f. i. ii. O. & <sup>l</sup> per quarti superioris maxillæ foramē excidit, quod in malè sūmmitate visitur,  
x. lib. i. ta. iiii. f. i. e. statimque

Tenuissimi hu- is for- paris rami diuisio.



statimq; multiplici dissecta propagine, in <sup>1</sup> musculos superius labrū mouentes, ac in ipsummet labrū, & in anteriorum deniq; dentiū gingiuas exhauritur. <sup>m</sup> Tertius ramus per commune quarti, & quinti ossis maxillæ superioris <sup>a</sup> foramen transmittitur, quod paulò infra anteriorem oculi angulum conspicitur; & narium cavitatem subit, in membranam carnosam narium interiora succingentem sese diffundens. <sup>o</sup> Quartus crassitie ceteris inferior per eam fissuram egreditur, quæ inter primum superioris maxillæ os, & cuneiforme, ad externum sedis oculi latus habetur, & in internam temporalis muscoli sedem abscuritur. <sup>p</sup> Crassior tertij paris radix, paulò antè originem nanciscitur, at ex cerebri pariter lateribus, perque <sup>q</sup> septimum, & octauum cuneiformis ossis foramen emergit, <sup>r</sup> ramum ilico diffundens, qui vitis, aut cucurbitæ capreolorum instar in orbes conuoluitur, durior sensim euadens, donec duabus quinti paris <sup>s</sup> propaginibus coniungatur; quibus commixtus in temporalem musculum, in molitorem, ceterosque omnes faciei musculos, & in ipsius cutem digeritur. Vbi hunc exprompsit ramū, deorsum nonnihil magis fertur, <sup>t</sup> furculumq; alium in dentium gingiuas effundit. Dein priusquam ad linguam pertingat, <sup>u</sup> ramū posterio- i ex parte germinat, qui <sup>x</sup> musculum in ore delitescentem permeat, & <sup>y</sup> foramen subit, quod inferior maxilla interna sui parte, iuxta summam gerit; dein antrosum procedens singulis sui lateris dentibus riuium impertit, donec per <sup>z</sup> foramina, quæ ad summitatis menti latera conspiciuntur excidat, in inferius quoque labrum sese diffundens. <sup>a</sup> Quod reliquum est crassioris huiusce rami, lingue radicē adit, & tunicam, qua lingua conuestitur, efformat, aptum saporibus dignoscendis instrumentum; propagines nonnullas in lingue substantiam dispensans. Atque is est tertij paris neruorum propagationis terminus, ac meta. <sup>b</sup> Quartum par paulò quàm tertium posterius enascitur, ipso & tenuius, & durius; sed antrosum modicè concedens, tenuiori tertij paris ramo commisceatur, ac simul ambo per dictū <sup>c</sup> foramen in palatum elabuntur, <sup>d</sup> tunicam ipsi obductam constituentes. Vnde ex hoc pari atque ex tenui tertij paris ramo, par vnum confurgere verius dicere possemus, cum ambo gustatui deferuant, ortuque ac distributione magis iungantur.

### De quinto cerebri neruorum pari. Cap. 5.

Quinta coniugatio.

**Q** Vintum <sup>a</sup> par, <sup>b</sup> quarto nonnihil crassius, <sup>c</sup> ex media sede illius medullæ partis, quæ inter cerebrum, & colli vertèbras interiacet, multis propaginibus exoritur, quæ ilico inter se rursus coalescunt. Sicque per <sup>d</sup> secundum ossium temporalium foramen, testudinem referens, ad aurium cavitatem fertur, vbi in complures finditur furculos, qui membranæ in modum, per auris cavitatem expanduntur, auditus organi non infimam partem constituentes. Preter hos verò furculos, duos alios priuatim educit, quorum <sup>e</sup> alter per <sup>f</sup> quartum, ipsumque transuersum istius ossis foramē, & venulam quoque in auditus organum excurrentem admittens deducitur, & paulò post egressum tertij paris <sup>h</sup> ramo adnectitur, quem capreoli vitis modo in orbes agere solimus. Alter per tertium istius ossis <sup>i</sup> foramen impensè angustum tortuosumque profilit, & per <sup>k</sup> musculum transuersum fertur, qui in ore latitans, inferiorem mouet maxillam, molitor appellatus; vbi verò in anteriori musculi huius latus pertingit, prædicto tertij paris ramo adiungitur, in genarum musculos, & cutem ipsos contingentem exhauriendus. Sicque nerui huius propagatio vniuersa terminatur. Porro iuxta paris huius radicem, interius paululum, <sup>l</sup> alia exoritur radix, hac longè gracilior tenuiorque; quæ sub cerebri basi in priora contendens, duram menyngem peruadit, & <sup>m</sup> per quintum cuneiformis ossis foramen egreditur, inque <sup>n</sup> musculum diffunditur in ore delitescens, nec non per temporalem musculum, ad quæ quinque neruorum rami pertingunt; primus è graciliori tertij paris radice, secundus à crassiori eiusdem, tertius & quartus ab insigniori quinti paris radice, quintus è tenuiori: quod sanè ad maius musculi huius robur effectum est, quemadmodum suo loco dicemus.

Alia neruorum coniugatio iuxta quintam exorta.

a. f.ii.ii.e.lv.  
f.ii.x.N.

b. li.vi.ta.iii.  
f.ii.i.C.

c. f.ii.ii.f.  
d. li.ii.ta.ii.x.

e. f.ii.ii.v.  
f.ii.vi.ta.vi.

f. li.v.  
g. f.ii.ii.o.

h. ead.g.  
i. li.v.ta.vi.x.

k. f.ii.ii.h.

l. ii.ii.x.z.

m. f.ii.ii.KK.

n. li.ii.iii.o.

o. ead.S.

p. li.ii.ta.v.P.

q. i.ii.ii.iii.P.  
f.ii.ii.l.

r. ead.E.li.vi.  
t.iii.ii.o.

s. ta.ii.ii.ii.m.  
f.ii.ii.QQ.

t. f.ii.ii.M.

u. ead.B.

x. R.f.ii.ii.o.

y. S.S. f.ii.ii.p.

z. f.ii.ii.q.

a. ead.f.

b. li.ii.iii.f.vi.  
h.

c. ead.l.

d. f.ii.ii.S.I.ii.  
f.ii.ii.iii.iii.

T.V.

e. f.ii.ii.c.

**S**extum nervorum par, paulò inferius quàm quintum, suam desumit <sup>a</sup> originem, oriturq; còpluribus a se inuicem diremptis furculis, qui mox coalescentes vnum constituunt neruum, qui vnà cum <sup>b</sup> minori soporalis arteriæ, maioriq; arteriæ iugularis externæ ramo, per foramen erumpit, occipitis, temporum, & cuneum referenti osi commune. Mox verò ab egressu <sup>c</sup> propaginem, in musculos ceruicis posteriora occupantes, præfertimq; in <sup>d</sup> secundū scapulæ motorem diffundit. Postmodum <sup>e</sup> septimo pari, & <sup>f</sup> soporali arteriæ membranarum quarundam beneficio adherens, ad laryngis vsque latera se proripit, <sup>g</sup> vbi pòrtionis septimi paris accessione adaugetur, moxq; laryngis musculis <sup>h</sup> furculos transuersim exporrigit. Hinc per laryngis latera, <sup>i</sup> soporali arteria, & vena iugulari interna comitatus, in thoracem elabitur, vbi protinus <sup>k</sup> exilè ramum in demissis internumq; primæ costæ latus deriuat, qui sub membrana costas fuccingente secundum costarum radices proripit, furculos quosdam <sup>l</sup> nervis ex dorso in costarum interualla excurrentibus assumens, quum primùm verò ramus is diaphragma superauit, in nutritionis organa, vt audies, dispensatur. Præter ramum hunc, <sup>m</sup> alia quoque à sexto pari, paulò infra hunc, propagines emittuntur in <sup>n</sup> septimum caput mouentium musculum, qui à pectoris ossè, & clauicula eduçtus in mamillarem processum definit; deinde & in <sup>o</sup> musculum ossis hyoidis motorem, & in <sup>p</sup> illum denique, qui hinc enascens, in primam laryngis cartilaginem iter habet. His peractis sextum hoc nervorum par, thoracis cauitatem ingreditur, ac inter venas arteriasque iugulares irrepens, dextri lateris <sup>q</sup> neruus ab interiore sui latere nunc tres, nunc duos emittit ramos, qui sibi inuicem succedentes, neruos quosdam constituunt, qui sese ad <sup>r</sup> arteriam brachium pectètem reuolunt, & vnà coeuntes, <sup>s</sup> vnum efformant neruum, qui dextro asperæ arteriæ lateri, membranæ interuentu adherens, sursum recurrit; & ad dextrum laryngis latus festinat, <sup>t</sup> glandulæ incumbens, quæ dextri lateris radici apposita est. Glandulam vbi superauit, in plures ilico partitur foboles, quæ in sui lateris musculos exhauriuntur. Sinistri lateris neruus iam thoracis cauitatem ingressus, rectà cor versus tantisper illabitur, dum extracordis membranas ad <sup>u</sup> magnæ arteriæ truncum pertingat, quem deorsum ferri tradidimus; ibiq; <sup>x</sup> tres denuo educit furculos, qui ad prædictam arteriam reuoluti, in vnum congregiuntur, <sup>y</sup> sinistramque recurrentem neruum constituunt, qui sinistro asperæ arteriæ lateri, membranæ interuentu adhærescens, sursum perinde, ac dexter effertur, & idem iter conficiens, in laryngis pariter musculos suæ regionis absumitur. Partes horum nervorum sunt hæc, vt musculis occludendæ laryngi opem ferentibus vim elargiantur, & consequenter vocem efformant: absque illis etenim, loquentes minimè intelligeremus, vt nec fistula, cum abest lingua, sonitum edit perceptibilem. Id te viuens canis edocebit, si horum nervorum alterum, deinde ambos, ipsi aut rescueris, aut aligaueris: altero enim resecto, dimidia ilico vox intercipitur, ambobus verò dissectis, latratus ipsi vsque quaque adimitur. Sextum par vbi nervos hosce sursum recurrentes, ideoque recuruios latinis dictos exprompsit, ad cordis basim pertingit, <sup>z</sup> & mediocris amplitudinis ramos in pulmonis tunicam, & <sup>a</sup> membraneum cordis inuoluçrū deriuat. Præterea ex ramis à sinistro sexti paris neruo depromptis <sup>b</sup> furculus emanat, in cordis capsulam, vbi hæc sinistro venæ arterialis lateri adnectitur, distributus, vsq; adeo exilis, vt nisi accurata manus dissectionem administret, facillè abrumpatur. Surculus hic <sup>c</sup> venæ arterialis adhærens progreditur, ad læuum ipsius latus, nonnihil retrorsum exporçectus, dum ad cordis basim perueniat, vbi gracillimis dispersus propaginibus in hæc absumitur partem. <sup>d</sup> Quod reliquum est huiusce nervorum paris, qd in nutritionis organa distribui diximus, diaphragma permeas, deorsum fertur, dexter quidè neruus ad dextrū ventriculi latus, sinister verò ad sinistrū, membranæ interuentu laxè ipsi nōnihil affirmati. Atq; ibi in binos singuli ramos partiuntur, <sup>e</sup> obliq; secundum ventriculū tam ad os, quàm ad posteriorem, anterioremq; ipsius partē conuolutos, ita vt, dextri lateris rami sinistram sedem, sinistri vero dexterā attingant.

Nervus dexter recurrentis.

Sinister.

Recurrentius nervorum vsui.

Horum nervorum rami pectus adueniunt.

Qui cœctionis organa petunt.

gant. A duobus verò ramis dextrum oris ventriculi latus amplexatibus, <sup>f</sup> propagat de- <sup>f</sup> cad. u.  
promitur, quæ per ventriculi exteriora, secundum latitudinem ipsius vniuersam, ad  
fundum illabitur, furculos quosdam in via tam in anteriorem, quam posteriorem  
ventriculi sedem dispergens. In fundum ubi ramus appulit, <sup>g</sup> venæ portæ innitens, <sup>g</sup> cad. x. li. iii.  
ad iecoris caua procurrit, in ipsius membranam abscondens. <sup>h</sup> Dexter sexti huius  
paris ramus, quem ante recurrentium nervorum principia, <sup>i</sup> secundum costarum ra- <sup>f</sup> xi. T.  
dices exporrigi, & nervus è dorso prodeuntibus copulatum, inter costalibus musculis  
offerri commemorauimus. ubi diaphragma magnæ innixus arteriæ superauit, ac trās- <sup>h</sup> li. ii. h.  
uersim per iecoris caua deductus est, tres emittit ramos. Quorum <sup>k</sup> primus <sup>i</sup> interiorē <sup>i</sup> cad. i.  
adit omenti tunicam, & per eam deorsum protensus, in aliquot propagines diffundi-  
tur, quarum vnā dextro huius membranæ lateri, & colo intestino, quā huic mem-  
branæ committitur, exporrigit; alteram duodeno intestino, ac ieiuni initio commu-  
nicat, <sup>m</sup> vsque adeo exilem, vt oculos interdum effugiat; atque <sup>n</sup> aliam deniq; longē <sup>m</sup> li. ii. z.  
ampliorem exteriori omenti tunicæ offert; quæ in dextram fundi ventriculi sedem <sup>n</sup> cad. a.  
pertingens, soboles aliquot tum ventriculo, tum omento elargitur. <sup>o</sup> Quod rami <sup>o</sup> cad. β.  
huius reliquum est, in iecoris caua, & fellis vesiculam exhauritur. <sup>p</sup> Secundus ramus <sup>p</sup> ti. f. ii. a.  
in dextrum renem & pinguem ipsius <sup>q</sup> membranam digeritur. <sup>q</sup> Tertius in dextrum <sup>q</sup> cad. γ.  
mesenterij latus, & in adhærentia ipsi intestina dispergitur. <sup>r</sup> Quod huiusce rami su- <sup>r</sup> li. iii. h. xix.  
perest, in vesicam, & in mulieribus in dextram fundi vteri partem distribuitur, quā- <sup>t</sup> T.  
vis vesica, & vterus alios sibi à dorsi medulla nervos asciscant. <sup>u</sup> Sinister ramus istius <sup>u</sup> f. ii. a.  
compar, eisdem ferè ac dexter propaginibus dispergitur. In primis enim <sup>v</sup> ramum, & <sup>v</sup> cad. δ.  
ipse in internam omenti tunicam deriuat, qui transuersim in lienem porrigitur, & <sup>u</sup> cad. β.  
duos in progressu furculos diffundit, in humiliorem omenti membranam, & in eam  
intestini coli partem, quæ hic omento attenditur, dispersos. Deinde <sup>x</sup> aliam crassio- <sup>x</sup> cad. γ.  
rem educit sobolem; quæ in sinistram fundi ventriculi sedem iter habens, in ipsum  
exterioremq; omenti tunicam, cui multos exporrigit furculos, diffeminatur. <sup>y</sup> De- <sup>y</sup> cad. a.  
inceps, ex ramis lienē subeuntibus <sup>z</sup> furculi alij admodum exiles in læuum ventricu- <sup>z</sup> li. iii. f. xliii.  
li latus emergūt, venis arterijsque comitati, quas huc à liene reflecti scripsimus. <sup>a</sup> Se- <sup>g</sup> g.  
cundus ramus in mesenterium, & sui lateris intestina diuarcatur. <sup>b</sup> Tertius renem si- <sup>a</sup> li. ii. a.  
nistrum, vesicam, atque vterum adit; atque hunc sexti paris propagatio finem habet, <sup>b</sup> cad. a.  
quamuis interdum à mesenterij propaginibus, furculos aliquot ad testes deferri ob-  
seruatum sit.

### De septima nervorum cerebri coniugatione. Cap. 7.

Q Vemadmodum <sup>a</sup> septimum nervorum cerebri par ceteris omnibus duritiæ an- <sup>a</sup> ti. f. ii. a.  
tecellit, sic <sup>b</sup> quoq; ex duriori parte, spinali scilicet medulla, priusquam è cranio <sup>b</sup> li. v. fig. ix.  
excidat, pluribus inuicem diremptis principijs enascitur, hincq; paululum in antero- <sup>c</sup> xliii. o.  
ra procurrit, & ex omnibus inuicem coeuntibus, nervus confurgit, <sup>c</sup> cui secundū oc- <sup>b</sup> cad. E.  
cipitis ossis foramen egressum largitur. Simulatq; verò egressus est, sexto pari copula- <sup>c</sup> li. i. t. vi. f.  
tur, <sup>d</sup> furculos aliquot in <sup>e</sup> musculos deriuans, ex processu stylum imitanti eductos, <sup>d</sup> i. d.  
ac dein in linguæ radicem se proripit, ubi <sup>f</sup> multiplici sobole dissectus, in linguæ, of- <sup>e</sup> f. ii. f.  
sisq; hyodis, & laryngis musculos exhauritur. Præter hosce ramos, alium insuper iux- <sup>c</sup> li. ii. t. adiii.  
ta linguæ radicem expromit, cuius accessio nē sexti paris <sup>g</sup> ramulus adaugetur. <sup>g</sup> Q. v. H. l.  
<sup>f</sup> li. ii. a.  
<sup>g</sup> cad. a.

### De spina Medulla & nervis ab ea prodeuntibus. Cap. 8.

S Pina <sup>a</sup> medulla tenui, ac dura membrana perinde, ac cerebrum conuestitur, cui per <sup>a</sup> ti. f. ii. iii.  
quàm similis in substantia est, imò reuera nihil est aliud, quam cerebri pars, huc  
processus quidam, vt <sup>b</sup> quinto libro docuimus, quamuis pulsationem vt ipsum non <sup>b</sup> cad. a.  
habeat, vnde duram membranam obtinuit, secus quàm cerebrum, à se minimè di-  
uulsam. Insuper nervosam duramque membranam priuatim fortitur prædictis  
circumductam, in idque effectam, ne dum spina inflectitur, flexa quoque me-  
dulla dirumpatur, quæ à cæterorum ossium medulla plurimum discrepat, hu-  
midiore

Spinalis medul-  
la quo a cætero-  
rum ossium me-  
dulla differat.

c. ti. li. lii. d. ead. a. Cad. H. c. li. i. t. vi. fi. Q. f. ti. li. lii. ab. A. ad B. g. ead. a. B. ad C. h. ab E. ad F. i. ab F. ad G. k. cad. h.

midiore, scilicet & vinctuosa magis, atque idoneo propterea ossibus nutrimento; cum ex spinæ medulla ossa nequaquam enutrientur, quæ in id duntaxat effecta est, vt ex ipsa nerui enascerentur, quos cerebrum expromere non poterat. Medulla hæc deorsum per vertebrarum cavitatem illabitur, & in descensu ad thoracis vsque medium tenior est, & indiuisa, c. neruosq; geniculatim diffundit; d. infra eam verò sedem ramis plurimis fructatur, perinde ac si quis chordulas quamplurimas simul iunctas, tela extrinsecus obuinciret; ac postmodum e per singula vertebrarum foramina, vnum ex ramulis illis emittere videtur, quousque, (vbi ad finem deuentum est) vnus superfit, medullæ fini respondens. Ex hac medulla nerui octo & quinquaginta, siue sexaginta proferuntur, vtrinque scilicet octo & viginti, siue triginta, f. è ceruice nimirum septem, s. à scapulis duodecim, h. à lumbis quinque, sex i. ab osse sacro; etsi nunquam inferiores quinque sacri ossis nerui gemini sunt, vbi scilicet os id sex efformatur vertebres, tunc enim per exteriora, interioraque foramina nerui profiliunt, k. Postrema medullæ pars, quæ ab osse sacro procidit, & coccygem ingreditur, neruus nequaquam est, vt nec ab ea prodeuntes furculi, hoc nomine dignandi sunt.

Quibus in partibus spinæ medulla ex plurimis veluti filamentis extructa videatur. Quos nervos paria è spinæ medulla prodeunt.

De Neruis e ceruice prodeuntibus. Cap. 9.

a. li. cap. x. a.

**P**rimam ceruicis vertebram occipitis ossi, & secundæ eiusdem ceruicis vertebræ ita committi, vt laterales ipsarum processus adhæreant, iam proditum antea est. Hanc ob causam primi & secundi ceruicis neruorum paris non idem est, qui aliorum exortus, sed gemino constat principio, (quemadmodum de illis, quæ ab osse sacro prodeunt, retulimus) quorum alterum b per anteriorem corporis vertebræ sedem c alterum per posteriorem egreditur. Primum per foramen primæ ceruicis vertebræ, & occipitis ossis commune, iuxta posteriorem tuberculorum huic vertebræ commissio-

Primi paris neruorum ceruicis distributio.

d. li. i. t. xliii. F, G, H, I. e. ti. li. lii. G. f. li. i. t. xliii. Q. g. li. i. t. xliii. h. li. i. t. xliii. i. li. i. t. xliii. K. ti. li. li. l. l. ti. li. N. m. li. i. t. v. fi. vii. B. n. ta. li. i. t. iuxta l. o. cad. K. p. ti. li. S. q. ti. li. lii. M. r. ta. li. i. t. su- per I. s. ead. N. t. li. i. t. viii. A, B. u. ti. li. Q. x. ti. li. lii. O. y. li. i. t. xliii. z. ti. li. A. a. ti. r. b. ti. li. P. c. ead. Q. d. ti. li. S.

rum partem emergit, & in d quartum quintumque caput mouentium musculorum par distribuitur. Ab hac verò posteriori huiusce paris propagine e furculus in f musculū expromitur scapulæ motus autorem. s Secundum principium, p tenuitate, plerumque inconspicuum, ab anteriori spinalis medullæ parte, inter occipitis os, & primam ceruicis vertebram excidit, iuxta h teretis illius ligamenti latera, quo dentiforme secundæ vertebræ processum occipitis ossi colligari diximus; atq; i in primum dorsum mouentium musculorum par exhauritur. Secunda coniugatio binas, & ipsa exortus sui propagines nata est, quarum k posterior, l anteriori crassior, (quanquam & ipsa gracilis visitur) per latera posterioris secundæ vertebræ m processus educitur, & in n duos protinus dispariles ramos finditur. Quorum o amplior à prioribus ad posteriora versus mutuum vtriusque lateris musculorum ceruicis posteriora occupantium cōgressum properat; ibique tertij paruis neruorum ceruicis ramo p adauctus, ex dictorum musculorum medio emergit, & rursus in priora commeans, caput conscendit, vbi q multiplici propagine dissectus in vniuersam capitis cutem absumitur. Tenuior r ramus in capita tertij & quinti musculorum caput mouentium paris digeritur. s Anteriori secundi huius paris propagi ab anteriori dorsalis medullæ sede. originem desumit, proditque inter secundam & primam vertebram ad latera radialis secundæ vertebræ processus dentem æmulantis, in t primum musculorum par ex hausta, qui dorsi motuum opifices existunt. u Tertium neruorum par ex foramine inter secundam & tertiam vertebram hiantem profertur, statim ab egressu in duos diffusum ramos.

Secundus.

Tertij.

Quorum x posterior retrorsum flectitur, ac inter y septimum, & octauum dorsum mouentes musculos; ac dein inter z secundum caput mouentium par occultatus, in posteriorem secundæ ceruicis vertebræ processum festinat; atque hinc ad ceruicis latera exporrigitur, lato tenuique a musculo inuectus quem ad genæ, atque inferioris quodammodo maxillæ motus opem ferre tradidimus. b Anterior ramus in quatuor agit furculos. Quorum c primus in primum & secundum dorsi motores musculos dispergitur, ac deorsum properans, quarti paris neruorum propagini, in dictos absumptæ musculos applicatur. Tertius d sursum irrepit, &

posteriori secundi paris neruorum ramo in capitis cutem & musculos ipsius mo-  
tores excurrenti sese applicans, <sup>e</sup> quarto commiscetur furculo; atque ambo <sup>f</sup> in mu-  
sculos effunduntur, qui ex transuersis vertebrarum processibus enati, ceruicem  
in latera mouent, & <sup>g</sup> in eum, qui ex eisdemmet eductus processibus, scapulam  
fursum adducit. <sup>h</sup> Quarta neruorum coniugatio per foramen inter tertiam & quar-  
tam vertebram interiectum emergit, in duos quoque ramos discissa. Quo-  
rum <sup>i</sup> posterior versus posteriorem tertie ceruicis vertebræ processum, inter  
musculos occultatus, eisqueramulos in transitu porrigens contendit; indeque inter  
musculos vtriusque ceruicis lateris deorsum tendit, in latum tenuemque; musculum  
dispersus, quem malæ, atque inferiori maxillæ mouendæ opitulari diximus. <sup>k</sup> Ante-  
rior ramus, in tres partitur furculos; <sup>l</sup> vnū quidem cui <sup>m</sup> alter tertij paris ramulus con-  
iungitur, quidq; in musculos gulæ substratos, ac ceruicæ flectentes digeritur: alterum  
verò furculum in musculos spargit, vertebrarum ceruicis lateribus instratos, quorum  
impulsu ceruix in latera detorqueatur, & in eum, qui à transuersis colli vertebrarum  
processibus eductus, scapulam attolit. <sup>n</sup> Tertius prædictis longè tenuior, deorsum  
tantisper irrepit, dum quinti paris <sup>p</sup> ramo, diaphragmatis <sup>q</sup> neruum, vti dicemus, con-  
sistuenti applicetur. <sup>r</sup> Quinta cōiugatio per foramen quartæ & quintæ vertebræ pro-  
diens, in duos ramos, quemadmodum & quarta scinditur. <sup>s</sup> Quorū posterior ad col-  
li vertebrarum spinam retorquetur, nec diuersimodè à posteriori quartæ coniuga-  
tionis ramo disseminatur. <sup>t</sup> Anterior <sup>u</sup> furculum protinus de se in musculos cerui-  
cem flectentes emittit, ac dein <sup>v</sup> alium depromit, cui <sup>w</sup> quarti paris ramus, alius item  
sexti, interdū verò etiā septimi ramus atrexitur, (cū scilicet quarti ramus deest) qui-  
bus adauctus tantisper procurrit, dum se in mediū <sup>x</sup> diaphragmatis inferat, longè la-  
tèq; in ipsum diffusus. Hic summi rerū opificis industria non possum non magno-  
perè admirari, qui, cū nerui omnes in musculos per ipsum initia immittantur, ad  
septū verò, quoddā principiū, vti secundo libro diximus, in medio habeat, neruus vilis  
à thoracis vertebris, licet ipsi proximioribus, emitti non posset; fecit, vt duo rami, ex  
quinto ceruicis neruorū pari per mediā thoracis cavitatem deducerentur, & singuli à  
suo latere, intersepientibus thoracem membranis suffulti, tutiore progressū, in dia-  
phragmatis principiū insertionem molirentur. <sup>a</sup> Anterior quintæ huius coniugatio-  
nis ramus, longè prædicto crassior, <sup>b</sup> furculos aliquot in <sup>c</sup> musculos scapulam attollen-  
tes deriuat, ac <sup>d</sup> vnus in primis ab externa rami huius regione depromitur, qui foras  
emergit in multas dissectus propagines, cutem qua musculus brachium attollens con-  
tegitur, implicantes. Reliquum verò ipsius, sub dicto musculo delitescens, protinus vt  
ad scapulæ ceruicem pertingit, in duos dispariles ramos diffunditur; quorū anterior  
idemq; renuior, sub summi humeri ad clauiculā <sup>e</sup> connexu exporrigitur, & ramum  
in musculi brachium attollentis partem effundit, quæ à clauicula, & summo humero  
principium sumit, nullam interim propaginem cuti offerens, præter vnā impensè  
tenuem, quæ humerariæ <sup>f</sup> venæ aliquousq; comes accedit. <sup>g</sup> Posterior verò eius quin-  
ti huius paris, portionis, quam inter musculos latrantem deorsum ferri diximus, ra-  
mus, qui anteriori crassior est, postquam propaginem in <sup>h</sup> musculum exprompsit, qui  
à scapula ortus, in os hyoides definit, per <sup>i</sup> sinum, quem semicirculi instar in elatiore  
scapulæ costa exculpi proditum est, vena atque arteria comitatus deducitur. Moxq;  
propaginem <sup>m</sup> musculi impertit sinum occupanti, qui inter scapulæ spinam, & elati-  
orem ipsius costam exculpitur, insuper & musculi brachii attollentis partē, à sum-  
mo humero, & à clauicula pronatæ. Porro ramus hic haud in præsentem muscu-  
lum totus dissoluitur, sed <sup>n</sup> furculum in cutem externæ brachij sedi obductam ex-  
promit, qui <sup>o</sup> per exteriorem insertionis partem transmittitur musculi brachium  
attollentis. Haud secus quoq; à succedentibus neruis brachium adeuntibus <sup>p</sup> furculi  
aliquot in musculos scapulæ motores emergunt, qui penitus semper in eos adigun-  
tur. <sup>q</sup> Sexta cōiugatio sub quinta ceruicis vertebra excidit, <sup>r</sup> posteriorem ramū, quæ ad-  
modū & ceteræ cōiugationes, in musculos deriuas, capitis & colli motū opifices,  
& in <sup>s</sup> aliquos itē ex thoracis motoribus, quauis hi neruos à septimo ceruicis neruorū  
pari & ex primo thoracis potissimū mutuuntur. <sup>t</sup> Anterior sextæ huius cōiugationis  
portio,

Quart.

Quint.

Diaphragmatis  
neruus.Anterior quin-  
ti paris ramus.

Posterior.

Sexti paris  
stiribus.

u. ta.ii. l. cum  
e & b ad co  
stituendam  
n.

x. t.iii.iii.q.

y. t.iii.p.

z. t.ii.7.

a. t.iii.r.

b. t.i.r.

a. t.ii.8.

b. t.iii.u.

c. tab.viii.C.  
t.iii.iii.N.

d. t.ix.F.A.

e. t.x.F.

f. t.xi.F.

g. t.iii.iii.x.

h. t.ii.y.

i. t.iii.iii.d.

k. t.iii.F.

l. ta.iii.iii.S.T.  
t.v.p.

m. tab.i.ii.ii.  
K.K.

n. t.iii.iii.aa.

o. t.ii.5.

p. t.iii.iii.aa.

q. t.ii.ii.

r. ta.ii. a. 10.  
ad 10.

portio, postquā<sup>u</sup> ramū eduxit, quē quinti & quartis paris propaginibus, diaphragma  
tis neruū efformantibus, cōmitti diximus, duobus quæ sequuntur paribus coalescit,  
quibuscū subinde<sup>x</sup> coit absceditque, in eum sanē modū, quo episcopalium galeorū  
funiculū à pictoribus delineari solent; & vnā cum ipsis neruos cōstituit, in brachium  
excurrentes. Priuatim verō sexta hæc coniugatio<sup>y</sup> ramulum ad scapulæ cauum deor  
sum profundit, & furculos aliquot musculis scapulam attollentibus impertit.<sup>z</sup> Septi  
ma coniugatio per commune sextæ, ac septimæ ceruicis vertebræ foramen emergens  
sibi proximis, vti diximus, implicatur & maxima ex parte in brachiū porrigitur; imō  
ex quinto, sexto, & septimo ceruicis, & ex primo ac secundo thoracis neruorum pari  
bus, omnes in brachiū excurrentes nerui dependent, vt priuato capite docebimus. Id  
nunc intellexisse sufficiat, ex quinto hoc parī ramum nonnunquā expromi, qui fur  
culis diaphragmatis neruū constituentibus applicetur; vt plurimum verō<sup>a</sup> ramū re  
torsū effundit, qui præter furculos, quos musculis ceruicis posteriora occupantibus  
elargitur, b nonnullos etiā in latū tenuemq; musculū exerit, genarū motui suppetias  
ferentē, cui nerui omnes (primum duntaxat excipio) è ceruice prodeuntes, furculos  
aliquot communicant, qui omnes secundum musculi longitudinem exporriguntur.

Septimi paris  
distributio.

De Neruis è thoracis vertebris prodeuntibus. Cap. 10.

Prima<sup>a</sup> neruorum coniugatio è thoracis educta vertebris, per foramina inter se  
ptimam ceruicis, & primam thoracis vertebram occurrentia, instar quinque po  
stremorum ceruicis parium excidit; Vterque igitur huiusce paris ramus, in duos illic o  
ramos dirimitur, b quorum prior, idemq; tenuior versus posteriores dictarum verte  
brarum processū cōtendit, inter musculos posteriori ceruicis parti adnatos latitans,  
& furculos aliquot eo tractū in<sup>c</sup> musculū deriuans, qui à prima costa enatus, in trans  
uersos ceruicis processus inseritur, ceruicēq; in latus, quanuis in anteriora non nihil,  
detorquet; ac in duos in super alios, qui caput atque ceruicem retrorsum agunt. Re  
liquum ipsius, quod in septimæ ceruicis vertebræ spinam pertingit, obliquo ductu,  
extorsum paulisper excurrit, & à spina rursus abscedēs, in<sup>d</sup> secundum & e<sup>e</sup> quartū  
scapulam mouentes musculos, ac denique in<sup>f</sup> tertium propagines aliquot de se pro  
fundit. Anterior ramus, qui posteriorem septimi paris ramum, non parum magni  
tudinē superat, partim septimo ceruicis, partim secundo thoracis neruo; in eum quem  
diximus modum<sup>g</sup> copulatur, torusq; in brachium<sup>h</sup> exauritur; si vnica ex ceptis  
h propaginem, quæ ad ipsius principium enata, prædictis commiscetur, & in priora,  
secundum primæ costæ longitudinem adnque pectoris os concedit, furculos in via  
i musculo exporrigens, qui à clauicula eductus in primam costam inseritur. Præterea  
rami huius caput sursum reflexum, in<sup>k</sup> septimum musculum capitis moruum opifi  
cem dissoluitur; & l<sup>l</sup> in duos in super alios, qui ex eodem pectoris osse producti, alter  
quidem in hyodes os, alter verō in scutiformem laryngis cartilaginē inferuntur,  
m licet in hos interdum musculos, m rami aliquot è sexto cerebri neruorum, ac tertio  
thoracis pari emittantur. Quod reliquum est præsentis coniugationis, in brachium  
vti dicemus, exauritur; & in progressu vbi ex ala excessit, n furculos quosdam ex po  
steriori sui regione in musculos scapulæ interiora occupates deriuat. o Secunda con  
iugatio inter primam & secundam thoracis vertebram emergit, & perinde ac prima  
P ramum retrorsum projicit, cuius eadem est, quæ illius distributio. Postmodum non  
minimam sui partem primæ coniugationi porrigit; adeo vt quintum, sextum, & se  
ptimum ceruicis, & primum ac secundum thoracis neruorum paria ita inuicē com  
misceantur, vt nerui alij ab alijs minimè internoscantur, & rete instar episcopalis ga  
leri efforment, ex quo, vti dicemus, nerui omnes in brachia exhausti deducuntur.  
q Reliquum ipsius inter primam & secundam costam adnque pectoris os exporri  
gitur, ramos eo tractū aliquos in proximis musculos effundens. Reliquæ thoracis  
neruorum coniugationes, ad primam vsque lumborum vertebram, eundem ferè  
omnes in modum exoriuntur. Omnes quippe mox ab exortu, in duos partim  
turramos; quorum alter tenuior retrorsum ad thoracis vertebrarum spinas de

Primi paris ner  
uorum thoracis  
propagio.

Secundum par  
neruorum tho  
racis.

Vndecim neruo  
rum thoracis  
parium distri  
butio.



detorquetur, inter hosce latitans musculos, <sup>s</sup> quartum scilicet thoracis motorem, & <sup>t</sup> sextum, <sup>u</sup> octauumque dorſi motuum auctores; inter <sup>x</sup> primum item & <sup>y</sup> secundum par musculorum caput mouentium, & <sup>z</sup> tertium <sup>a</sup> quartumque illorum par, qui priuatim dorſi motibus præſunt. Etſi non ſolum in hosce musculos digeruntur, verum etiam vbi ad ſpinarum apices pertingunt, inter vtriuſque lateris musculos delabuntur; & ſe in musculos ab ipsis principium ducentes inferunt, in quorum numero (præter ex prædictis aliquot) ſunt <sup>b</sup> quartus, & <sup>c</sup> ſecundus ſcapulam mouentes, <sup>d</sup> quintus thoracis motor, & <sup>e</sup> quartus brachij motus opifex. Ad hæc, exiles quædam propagines ab hisce ramis in cutem pullulant ſcapulis inſtratam iuxta ea, quæ perſeptant loca, at minus interim frequentes quàm nerui thoracem, vel manus, aut collum adeuntes. Anterior præſentium neruorum pars <sup>f</sup> ſurculos aliquot ſexti paris neruorum cerebri <sup>g</sup> ramo exhibet, per coſtarum radices ſub membrana ipſas ſuccingente porrecto; ac poſtmodum per coſtarum interualla vnâ cum <sup>h</sup> vena, & <sup>i</sup> arteria exporrigitur, eandem cum ipsis viam conficiens. Ab hisce ramis, in progrefſu multiplex <sup>k</sup> propago manat in circumiecto musculos, <sup>l</sup> ſecundum videlicet thoracis motorem, <sup>m</sup> ſecundum item brachij motus auctorem, <sup>n</sup> primum ſcapulam mouentium, <sup>o</sup> quartum brachij motibus præfectum, & <sup>p</sup> ſecundum abdominis musculum, recto in omnibus fibrarum ductu ſeruato. Surculos præterea quosdam in thoracis, atque abdominis cutem incerta ſerie diſpergit; licet qui mammillas adeunt, multos <sup>q</sup> ramulos è quinto neruorū thoracis pari, quartum coſtarum interuallū petente, ſibi priuatim aſciſcant; ac ſenſum propterea exquiſitiorē obtinent. Aliæ præterea vndecimo, ac duodecimo pari adſunt propagines, quæ ſe in <sup>r</sup> ſexti muſculi femur mouentis principium inferunt, quem hic è vertebrarum lateribus proferri diximus.

Nerui mammaſ  
petentes.

### Nerui è lumborum vertebris prodeuntes. Cap. I I.

Qui <sup>a</sup> è lumborum vertebris nerui emergunt, id cum alijs commune habent, vt a illico poſt egreſſum è dorſo, <sup>b</sup> ramū in musculos dorſo inſtratos retrorſum deriuent, <sup>c</sup> quartum ſcilicet thoracem mouentium, ac <sup>d</sup> vndecimum, & <sup>e</sup> decimum tertium dorſi motores. Aſt horum neruorum rami, à ſpinarū apicibus procedentes inter vtriuſque lateris musculos, in cutem poſiſſimum, & <sup>f</sup> quartum brachij motorem musculum exhauriuntur. Anteriores autē rami, in abdominis musculos, & in quartum etiam brachij motus auctore, inque ipſius cutem, nec non in <sup>g</sup> nonum dorſum mouentium, & in <sup>h</sup> ſextum denique femoris motus opificem digeruntur. Quintiam è ſecundo lumborum pari, <sup>i</sup> ſurculus priuatim pullulat, qui ſeminali ſui lateris arteriæ, comes nonnunquam accedit, tunc ſcilicet, cum ſexti paris neruorum cerebri ramus inteſtina petens, nullam teſti propaginem exporrigit. Inſuper tria hæc priora neruorum paria, <sup>k</sup> ſurculos aliquot expromunt, qui ſexti paris ramis, quos coſtarum radicibus hærentes deſcendere prodidimus, applicantur ipſos adaugentes; ex tribus autem poſtremis paribus, propagines aliæ in femur vti dicemus euadunt.

### De Nervis ab offe ſacro excidentibus. Cap. I 2.

Quos neruorum  
paria ab offe ſacro  
prodeunt.

Ab offe ſacro <sup>a</sup> quini vt plurimum nerui, nonnunquam verò ſeni prodeunt. Quorum <sup>b</sup> prima coniugatio inter poſtremam lumborum & primam ſacri offis vertebram procidit, eundem proſus in modum, quo cæteras à lumborum vertebris exilire diximus; niſi quòd ex eo qui retrorſum agitur ramo, <sup>c</sup> ſurculus priuatim erumpit in musculos ab ilium offe pronatos, præſertimque in <sup>d</sup> primum femur mouentium, riuiſis quibuſdam in cutem inguina cõtegentem deriuatis. Anterioris huiſce propaginis pars neruis crus petentibus amiſcetur, <sup>e</sup> pars oſis coxendicis interiora perrepat, propagines aliquot abdominis muſculis, & <sup>f</sup> ſeptimo femoris motori communicans. <sup>g</sup> Inferiores quinque propagines peculiarem ſibi vendicant naſcendi modum, priuſquam enim ex offe procidant, in duos partiuntur ramos; alterum tenuiorem per foramē quod exteriori oſis huius parti exculpi diximus, excidentem, craſſiorem

crassiores alterum, cui interius foramen egressum præbet. Qui per exterius foramen elabitur, in musculos coxendicis osis posteriora occupantes potissimum digeritur; in <sup>h</sup> vndecimum scilicet, & <sup>i</sup> decimum tertium dorsi motores; in <sup>k</sup> quartum brachium mouentis caput; in quartum thoracis motorem; in <sup>l</sup> quatuor priores femur mouentes; & in cutem denique partes has atque inguina contegentem. Anteriores amplitudine istis excellunt, ac diuersam obtinent propagationis rationem; tres etenim priores in crus, ut diximus, iter habent, duo vero postremi in ami musculos, in vterque ac vesicæ cervicem, & in penem quoque concedunt. Atque is est <sup>m</sup> medullæ spinalis terminus, velut in caudam actæ, quæ in coccygis os ingrediens in ipso definit. Sed iam ad neruos, in brachia, & crura excurrentes orationem rursus conuertere operæ precium erit, ducto ab his qui ad brachia prorupit exordio.

De Nervorum in brachia propagatione.

Cap. 13.

**I**Am diximus <sup>a</sup> quintum, sextum, & septimum nervorum cervicis, & <sup>b</sup> primum, secundumque thoracis paria, in retis seu chordulæ galeri episcopalis imaginem ita inuicem commiseri, ut difficili negotio internoscantur. Ex huiusmodi nervorum implexu propagines in brachium concedentes enascuntur, incerto prorsus omnium exortu. In his tamen referendis, ordini & ipse à cæteris observato insistant. <sup>c</sup> Primus itaque in brachium irrepens nervus ex <sup>d</sup> quini paris nervorum cervicis ramo exortitur; & in <sup>e</sup> musculi brachium attollentis sedem à scapula pronatam spargitur, per brachij exteriora, ad usque longitudinis ipsius medium properans, & carnose inuectus membranæ, tum ipse, tum reliqui omnes cutem adeuntes, furculos ipsi nonnullos inter adipem exporrigunt, filamentorum instar tennes, incerta prorsus distributionis serie. Reliqui omnes brachium petentes nervi, per axillam feruntur, in plurimos, eosque prægrandes dispertiti ramos. <sup>f</sup> Secundus enim ex eo implexu quem nervos hos post exortum efformare monuimus educitur, & brachium petit, sub <sup>g</sup> musculo cubiti flexientium primo, ubi duo ipsius capita inuicem committuntur, ad <sup>h</sup> musculi scilicet brachium pectori adducentis, & <sup>i</sup> eius qui brachium attollit insertionem; & sub dicti musculi capite quod à scapula processu anchoram referente principium sumit, occultatus, utrisque musculi huius capitibus <sup>k</sup> furculum offert; qui deorsum ductus in posteriorem istiusmet musculi sedem exporrigitur; ac furculum intermedium tertio nervo offerens, deorsum ad anteriorem cubiti sedem contendit, sub musculo cubiti flexientium primo; & ab externo sui latere <sup>m</sup> furculum <sup>n</sup> musculo communicans, qui radium deorsum agentium maior est; atque ad cubiti flexum pertingens, secundum externum latus <sup>o</sup> tendinis musculi cubiti flexientium anterioris; descendit, in cutem sese dispergens. Protinus namque ut è musculis emergit, in duos ramos discinditur; quorum <sup>p</sup> superior idemque tenuior vnà cum humerali <sup>q</sup> vena supra radium ad medium vsque ipsius longitudinis deferitur, ac dein versus vlnæ appendicem retorquetur, vniuersam cutem radio incumbentem furculis implicans quam plurimis; quorum <sup>r</sup> præcipuus inter cutem carnemque semper deductus, radij appendicem superat, & ad secundum pollicis articulum pertingit. Surculis his, alij nonnulli quam alacrior, ab <sup>s</sup> illius nervi propagationibus, quem manus volam adire audies, qui humilior est, & crassior nervi huiusce partitionis iuxta cubitum factæ ramus, qui statim in duas alias dirimitur propagines sub humerali venæ <sup>t</sup> ramo procedentes, qui alteri axillaris venæ ramo, ad <sup>u</sup> communis venæ constitutionem permiscetur. Harum propaginum <sup>x</sup> altera, ubi sub dicta vena concedens ad communem appulit, relicta vena inter cutem & carnem fertur, ac radium versus paulisper confendens, secundum internum latus inferioris <sup>y</sup> musculi brachiale flexientis, ad brachialis vsque radicem perfertur. <sup>z</sup> Altera propago, oblique magis quam venæ communis principium consistat, deorsum proripit, ac postmodum <sup>a</sup> maiori venæ interioris cubiti sedis, cuti potissimum oblatæ artensæ, ad brachiale festinat, & priusquam cubiti longitudinis medium attingat desinens, in duos finditur ramos, quorum <sup>b</sup> alter radio, <sup>c</sup> alter vlnæ innitens deorsum tendit; ambo verò brachiale superant, furculos aliquot in manus volam

Secundi nervi  
brachium peten-  
tis distributio.



tum scinditur; quorum alter bipartitò etiam dissectus in externum pollicis latus iter habet; alter in duas pariter soboles diremptus, vnâ indici porrigit, in externam ipsius regionem duplici quoque furculo absumendam; alteram verò in diuisam inter-  
 q. t.iii. 37. I. no lateri exterioris medijs digiti sedis applicat. <sup>4</sup> Ramus nerui huius per vlnam porre-  
 r. t.iii. 38. ctus, <sup>1</sup> propaginem ilicò in <sup>2</sup> musculum confert, quo index, medius & anularis exten-  
 s. t. ix. 2. duntur; aliam item <sup>1</sup> musculo paruum extendenti communicat; vt & <sup>2</sup> tertio bra-  
 u. cad. 0. chialis extensori aliam; in ipso autem per vlnam progressu singulis musculis ab eo or-  
 u. cad. A. tum ducentibus ramulum elargitur, rectum semper fibrarum ductum obseruans.  
 x. t. x. A. 5, II. <sup>7</sup> Quod nerui huius reliquum est, ad brachialis finem desinit, furculis aliquot in arti-  
 y. t. li. 41. culum exhaustus. <sup>2</sup> Quintus brachij neruus à commemorato implexu inferius quàm  
 z. t. li. iii. <sup>3</sup> ta. Quintus. <sup>3</sup> Quintus brachij neruus à commemorato implexu inferius quàm  
 iii. m. prædictorum vllus enascitur; & quarto semper adhærens, per brachij interiora de-  
 a. t. vii. inter fertur, <sup>2</sup> inter externum cubiti extensorum musculum, & internum flexionis opifi-  
 P & N. cem occultatus, nullis omninò propaginibus, antequam ad internum osis humeri  
 b. li. i. t. vi. ff. <sup>b</sup> tuberculum pertingat, eductis; ad cuius postremam sedem reflectitur, <sup>c</sup> sinu in ea  
 vi. exculpo vectus; ac dein eadem serè distributionis serie, in eosdem musculos cum ter-  
 c. cad. V. tio diuicatur, <sup>d</sup> furculum etiam expromens, qui radio innitens, inter <sup>e</sup> musculos fer-  
 d. ta. ii. iuxta tur, quorum vi secundi, ac tertij digitorum articuli flectuntur, <sup>f</sup> vena atque arteria  
 43. t. iii. c. n. hac reptantibus comitatus, sicque ad manus volam sub <sup>g</sup> transuerso ligamento <sup>g</sup> cõ-  
 e. ta. v. 0. t. vi. fert. Et propaginem in primis bipartitam internæ, parui digiti, sedi communicat;  
 z. x. h. g. & anulari alteram duplici quoque sobole disperitiam; ac deinde in externam sedem  
 g. li. ii. t. iii. 6. interioris medijs digiti lateris, alium emittit ramum, qui nullis discinditur propagi-  
 h. t. ii. 46. ta. nibus, nisi cum nullus à tertio neruo furculus in internum medijs digiti latus e-  
 iiii. P. manat; tunc enim ramus hic bipartitò scinditur, & in vtrunque digiti huius latus cõ-  
 i. ta. ix. inter cedit. Porro iuxta medium radii longitudinis ab externo nerui huius latere <sup>h</sup> ramus  
 z & A. emergit, qui inter <sup>i</sup> musculum cubitum extendentium inferiorem, & inferiorem fle-  
 k. t. iii. 36. ta. ctentium ad externâ brachij sedem proripit, ac tripartitò dissectus, in externâ parui  
 iiii. q. digiti sedem, in anularem item & medium, eodem prorsus modo, quo <sup>k</sup> quartus in  
 l. ta. ii. 48. 48. cæteros digitos, propagatur, sentiendi vim ipsi impertiens; vt nobis cubito inniten-  
 m. li. vi. ta. i. tibus conspicuum sit. Quarto enim neruo compresso, ita vt sentiendi vi aditus per  
 ii. u. x. ipsum intercipiatur, pollex ilico, & index, & medij pars obstupescunt; quinto autè  
 compresso, cæteros digitos stupor inuadit. <sup>1</sup> Sextus neruus ab infima implexus regio-  
 ne prodit; & per axillam, sub cute, ad internum humeri osis tuberculũ, se proripit,  
 conterminis partibus eius, quam perreptat, cutis, furculos cõplures in progressu cõ-  
 municans. Ad hoc tuberculum vbi appulit, in <sup>m</sup> plures actuum soboles diuicatur,  
 quarum pars sub venæ iecorariæ ramis, pars supra eosdem fertur; & vnâ omnes secun-  
 dum vlnæ longitudinem inter cutem, & carnosam membranam deducuntur, non  
 procul à brachiali, vbi per inferiorem brachij sedem propagatæ, desinunt; atq; huic  
 in modum neruorum omnium in brachium distributio terminatur. Vnde perspi-  
 cuum euadit, qua ratione fiat, vt partis cuiuspiam sensus, motu superflute, aboleri  
 possit, & cõtra. Primo enim neruo, qui per externam brachij sedem propagatur, di-  
 scisso, cæteris interim qui per musculos disperguntur integris persistentibus, ea cutis  
 pars, quàm neruus hic implicabat, sensu omnino destituitur, citra vllam motus in  
 brachio iacturam.

De Neruis in cruris, & pedem excurrentibus. Cap. 14.

<sup>a</sup> t. ii. 57. 60. <sup>1</sup> X<sup>2</sup> neruis, qui ex tribus inferioribus lumborum vertebreis excidunt, & ex nerui  
 66. 71. t. iii. E portione per primum sacri osis foramen emergentis, itemque ex iis, qui ex infe-  
 77. 78. rioribus tribus elabuntur, implexus quidam illi similis confurgit, quem nerui bra-  
 chium adeuntis efformant, quanuis magnitudine non parũ excellat. Ex huiusmodi  
 implexu nerui quatuor enascuntur, tam crassitie dispares, quàm distributionis ratio-  
 ne varii; ex ipsis nanque primus, ac tertius tenuiores existunt; secundus ambos cras-  
 sitie superat, alioquin & ipse tenuis; quartus verò trium illorum vnâ complexorum  
 crassitiem euincit. <sup>b</sup> Primus ab editiore implexus parte procedit, vbi scilicet anterie-  
 o. ta. ii. 57. ta. tertij  
 iiii. &

Qui possit par-  
 tis alius sensus  
 deperdi, mo-  
 tu incolumi, &  
 cõtra.

Nerui quatuor  
 in cruris excur-  
 runt.

tertij paris lumborum ramus, quarto eorundem pari commiscetur; & sub peritonæo in femur procidit, <sup>c</sup> lumborum innixus musculis, & externo lateri tendinis, <sup>d</sup> sexti femur mouentium musculi. Suo autem ad os appulso, <sup>e</sup> ramum depromit, qui per cutem anterioris femoris partis paulisper extrorsum obductam, deorsum circa genu regionem fertur, ac dein inter musculos reconditur; & furculum <sup>f</sup> musculo exporrigens crus mouentium primo, alium item <sup>g</sup> septimo, atque alium insuper <sup>h</sup> nono, secundum priores duos trium horum crus mouentium musculos obliquè deorsum elabitur, dum non procul à genu desinat. <sup>i</sup> Secundus neruus principium sortitur paulò priore inferius, è regione scilicet connexus tertiaz, & quartæ lumborum vertebres; & sub posteriore peritonæi regione deductus, in femur deinceps <sup>k</sup> vena, & arteria per inguina delatis comitatus, illabitur, <sup>l</sup> ramulum, simulatque ad femur pertingit, ab interiore sui parte deriuans, qui ad pollicem vsque defertur, anteriori semper lateri <sup>m</sup> venæ illius incumbens, quam ab inguine per femoris crurisquæ interiora, sub cute ad <sup>n</sup> pedem vsque protendi monuimus. Quemadmodum autem vena varios cuti quæperrepat, ramos exporrigit, sic etiam & præsens neruus soboles in cutè spargit, quarum <sup>o</sup> præcipua illa est, quæ anteriori genu regioni offertur, multis propagnibus in ipsum exhausta. Vbi hanc exprompsit sobolem, <sup>p</sup> neruus vnà cum vena, & arteria in femur reconditur, in musculos disperfus femoris interiora occupantes, præsertimquæ in <sup>q</sup> quintum femur mouentium, & <sup>r</sup> octauum cruris motorem, quocum interiori <sup>s</sup> noni musculi crus mouentium lateri innixus deorsum fertur; & supra genu articulolum perinde, ac primus desinens, furculos quosdam in via membranis offert, venas arteriasquæ deuincientibus. <sup>t</sup> Tertius neruus secundo succedit, nasciturquæ è regione connexus quartæ, & quintæ lumborum vertebres, sub peritonæo; & per <sup>u</sup> septimum femur mouentium musculum permeans, ad pubis ossis <sup>x</sup> foramen properat, per quod in femur defertur, sed priusquam permearit, propagines quasdam <sup>y</sup> nono, ac <sup>z</sup> decimo femur mouentibus musculis elargitur; mox verò & <sup>a</sup> illis, qui à pubis offese pronati genitale mouent. Post hæc inferius delabirur, moxquæ perinde, ac duonuper commemorati nerui, <sup>b</sup> musculum effundit in cutem femoris interiora contegentem, <sup>c</sup> ramum dispensans <sup>d</sup> secundo crus mouentium musculo, atque <sup>e</sup> aliū quinti femur mouentium <sup>f</sup> portioni à pubis osse promatæ. <sup>g</sup> Quartus cruris neruus tertio succedens, & sextuplo ipso crassior, ex postremo lumborum neruo, & ex anterioribus trium subsequenrium neruorum ramis cõflatur; inter omnes totius corporis neruos, non crassitie duntaxat, verum etiam duritie, ac robore præcipuus, quod ab extre mo nimirum dorso prodeat: sub peritonæo autè deorsum fertur <sup>h</sup> sinu eo inuectus, quem huiusce usus gratia in posteriore coxendicis ossis regione insculpi diximus; ac protinus <sup>i</sup> ramum ex posteriori sede diffundit, qui aliquandiu sub <sup>k</sup> primo femoris motore musculo delitescens prorepat, ac foras deinde prorumpit, <sup>l</sup> furculos quosdam cuti exporrigens in feriori clunium sedi obtensæ, & illâ, pariter quæ posteriorem femoris sedem, nonnihil vltra ipsius longitudinis medium conuestit; alios insuper tertio, quarto, & quinto crus mouentibus musculis, nec non & quinto femoris motori. Post hæc, neruus inter musculos posteriori femoris sedi instratos, deorsum iuxta femur illabitur vltra longitudinis ipsius medium; ibiquæ <sup>m</sup> ramum effundit in quarti crus mouentium musculi portionè ab ossis femoris medio, ac si peculiaris musculus existeret, enatam; ab hoc autem ramo propagines nonnullæ pullulant, in cutem posteriori femoris regioni infra medium ipsius longitudinis exhaustæ. Neruus dein in poplitem inter inferiora duo femoris capita decliuis concedit; vbi <sup>n</sup> ramum vtrinque in <sup>o</sup> musculos emittit ex hisce capitibus emanantes, tres videlicet pedem mouentium priores. Atque hac in parte <sup>p</sup> in duos vt plurimum inæquales ramos partitur, in crus dispersos, nonnunquam verò altius exporrectos, quinimo nerui omnes in crus deorsum à genu procidentes, quarti huius nerui soboles existunt, si eum exceperis, <sup>q</sup> quem ex secundo cruris neruo nasci, & in femoris, crurisquæ interiora exporrigi commemorauimus. Cæterum quartus hic neruus, totus ad exortum vsque diuisus conspicitur, cum aliquin, quod ex plurimis veluti filamētis vnica membrana conclusis extruatur, leui negotio, non in duos duntaxat, verù etiam in quatuordecim,

Tertij distributio.

Quartus distributio.

Quartus neruus ex plurimis veluti filamentis extruatur.

sim,

s. ta.ii.77.ta. iii.  
 s. t.ii. 78.78. t.iii.  
 u. t.iii. T.  
 x. t. vii. inter  
 o & v.  
 y. t.iii. z.  
 z. t.ii. 79. ta. iii.  
 a. lib.ii. xv. fi. xv. T.  
 b. t.ii. 82.  
 c. ead. 30. ta. iii.  
 d. lib.ii. t.iii. d.  
 d. t.ii. 85.  
 e. t.ii. 81. 82. t.iii. e.  
 f. lib.ii. ta. xi. xii. xiii. xiiii.  
 g. t.ii. 82.  
 h. lib.ii. t.ii. i.  
 i. lib.ii. t. xiii. xv.  
 k. t.iii. e. v.  
 l. t.iii. v.

cim, & quindecim nervos dirimere ipsum possis. <sup>a</sup> Prior idemque tenuior nervi huius ramus, extrorsum, ad superiorem fibulam cum tibia connexum festinat, <sup>b</sup> furculum eo tractu depromens, qui per cruris exteriora, & supra malleolum exteriorem sub cute ad externum usque pedis latus porrigitur, propagines complures in cutem circumiectis partibus obductam, tuto incesu deriuans. Vbi hunc exprompsit furculum, <sup>c</sup> illico inter <sup>d</sup> septimum, & octauum pedis motores musculos <sup>e</sup> sexto innitens demergitur, ibique <sup>f</sup> alium de se profert ramum, in cutem cruris anteriora conueffientem incerta serie distributum. Quod reliquum est rami huius exterioris, inter musculos vti diximus anteriorem cruris sedem sibi vendicantes permeans, & ramulos ipsis aliquot offerens, <sup>g</sup> ligamento incumbit, tibiam, fibulamque tota longitudine connectenti; & ad ipsius medium, <sup>h</sup> ramulum emittit, qui ipsum perforans tantisper progreditur, dum <sup>i</sup> alteri anterioris quarti huius nervi furculo copuletur, & una cum tendinibus digitos extendentibus, per <sup>j</sup> transuersum inibi occurrens ligamentum ad pedis superiora commeat, ac sub tendinibus altius delitescens, ad superioris digitorum sedis latera ramulos quosdam effundit; antequam verò in commemoratum pertingat ligamentum, <sup>k</sup> ramum in cutem emittit, qua ligamentum id conueffitur. <sup>l</sup> Interior quarti huius nervi ramus deorsum per cruris exteriora fertur, inter <sup>m</sup> quartum, quintumque pedis motores musculos, duosque illos, qui ex tibia enati digitos flectunt occulatus, & <sup>n</sup> furculum emittens cum exterioris rami propagine coeuntem, quam ligamentum quo tibia fibulaque colligantur perforare tradidimus. Post hæc, sub <sup>o</sup> transuerso ligamento deductus inter calcisos, atque interiorem malleolum in pedium concedit, vbi <sup>p</sup> musculus inibi repositis incumbit, præternem furculum singulis quibusque inferioris digitorum sedis lateribus offerens. Atque hunc sanè in modum quartus nervus, vt plurimum propagatur; licet interdum <sup>q</sup> exterior ramus, antequam in pedem pertingat, desinere soleat; nonnunquam verò euenit, vt qui commemoratum ligamentum tibiam fibulamque colligans perforat furculus, neque ab exteriori ramo proferatur, neque interiori permisceatur. Imò verò vbi ramus hic interior posteriorem istius membranæ partem attingit, <sup>r</sup> ramulum profert, qui hanc perforans membranam, inter musculos cruris anteriora tenentes deorsum fertur; & sub transuerso tarsi ligamento deductus, singulis digitis binas exporrigit propagines. Atque in his, nervorum omnium propagationem absoluiamus. Superest nunc pro historiæ absolutione, vt de olfactus, gustatus, tactusque instrumentis agamus,

De organis olfactus, gustatusq, ac tactus. Cap. 15.

De olfactus organo, variæ inter medicos, ac philosophos opiniones extiterunt, omnes ex humanæ structuræ imperitiâ inter ipsos obortæ, <sup>a</sup> ex cerebri ergo substantiâ, iuxta anteriorem <sup>b</sup> priorum ventriculorum sedem, non procul ab <sup>c</sup> opti-  
 corum nervorum exortu, duo processus emergunt, albi quidem illi, molles, ternesque, ac eiusdem ferè tum substantiæ, tum figuræ cum cæteris nervis à cerebro prodeuntibus, licet paulò teneriores, minusque teretes. Hi recta in anteriora concedunt, cerebro in incesu, tenuis membranæ interuentu adhærentes, donec ad <sup>d</sup> sinus  
<sup>e</sup> octauo capitis ossi exculptos, elatiorique ipsius processu disfunctos perueniant; ad quorum posteriorem sedem, processus hi à cerebro abscedentes, in suum singuli sinum inferuntur, antrorsum adusque anteriorem ipsorum regionem exporrecti. Horum processuum, siue nervorum munus est, humorem exhalationem ve, quæ ab odoratis corporibus emanat, & per nares in frontis, & cuneiformis ossis cauitatē ingreditur excipere; qua in parte, aerem, qui per nares in cerebrum deferretur, præparari monuimus, perinde, ac in pulmonibus aer in cordeducendus elaboratur; communicatur autem nervis hisce humor, siue odor rerum per nonnulla octauo capitis ossis foramina, ipsisque in cerebri ventriculos euehitur, non aliter profectò quàm rerum species siue imagines per visorios nervos deferri tradidimus. Gustatus organum linguam esse palati opera accedente, nemo ignorat; ipsius musculos secundus liber recensuit;

Sententiarum  
 de olfactus or-  
 gano varietas  
 vide.  
 Organi huius  
 ortus.

Gustatus orga-  
 num.



*Tertius operis  
Epilogus.*

cenfuit; venas, & arterias vitam ipfi, ac nutrimentum elargientes sextus enarrauit; feptimus neruos enumerauit ciborum guftatus opifices, maioris nimirum radicis ter-  
tiz cerebri coniugationis germina, quæ in fuperiorem linguæ tunicam, impertita  
ipfi guftandi facultate diffundi retulimus; quemadmodum hinc liquidò conftat,  
quòd fi fortè fortuna neruus hic defideretur, vti nonnullis natura defuiffe obferua-  
tum eft, nulla prorfus ciborum voluptate afficitur. De tactus inftrumento nihil  
præterea dicendum fupereft, nam libri huius initio nullum omninò neruum fen-  
fus huius expertem effe prodidimus. Iam humanæ huius fabricæ bafim, & propugna-  
cula pofuimus, offa videlicet & cartilagine, tum vincula ipfius atque integumenta  
fermone profequuti fumus, ligamenta nimirum, cuticulam, cutem, adipem mem-  
branam carnofam, mufculos, ac membranam tandem offa hæc omnia conueftien-  
tem, Perioftion appellatam. Tria postmodum in huiusmodi compage principia  
locauimus, nutrimentum ipfi, ac vitam, & fenfum largientia, nec non, & tria du-  
ctuum genera, quorum ope tria hæc principia toti corpori vim fuam impertiunt.  
Postremò loco de fenfibus exterioribus verba fecimus. Sicque quàm breuiffimè fie-  
ri potuit, finem huic hiftoriæ impofuimus.



# CHARACTERVM QVI LIBRO SEPTIMO INSCRIBVNTVR EXPLICATIO.

TAB. I. FIGVR. I. II.

**I**n prima figura totius cerebri, & cerebelli à membranis ipsa inuoluentibus liberorū basis exprimitur, ut neruorum cerebri exortus opportunè oculis subijceretur.

SECUNDA figura neruorū dextrū latus integra proponit cerebri, ac cerebelli, et dictæ in priori figura dorsalis medulle partis, dura interim tenuiꝑ, hæc omnia inuestientibus membranis, nusquam apparentibus. Ad hæc nudam septem cerebri neruorum parium seriem in dextro tantum latere commonstrat.





CHARACTERES hoc Indice exprimendi partim vtrisque figuris cōmunes sunt, partim vero nunc huic, nunc illi peculiare, quemadmodum his notis 12. quas characteribus subijciemus, significabitur.

- AA 1.2. Cerebrum notatur.  
BB 1.2. Cerebellum.  
CC 1.2. Processus ac veluti substantię cerebri tubera, quę mamillares processus vulgò nuncupantur.  
D 1. Dorsalis medullę principii ex cerebri pendens basi.  
E 1.2. Dorsalis medullę pars iam caluarie amplitudinem egressura, & in vtrisque figuris inibi abtruncata, vbi hæc elatissimā subit vertebrā.  
F 1.2. Olfactus organo subseruientes processus neruis similes.  
G 1.2. Visorij nerui, ceu primum cerebri neruorum par. Ceterum in prima figura sinistri nerui principium G insignitur, in altera autem dextri nerui in oculorum seductus.  
H 1. Visoriorum neruorum coitus.  
I 1.2. Oculi tunica, in quam visorius neruus expanditur, & degenerat.  
K 1.2. Secundū neruorum cerebri par.  
L 1.2. Tertij neruorum paris minor &

- M gracilior duriorque radix.  
1.2. Tertij paris maior crassior ve radix.  
N 2. Minoris radice tertij paris propago, frontis musculosam cutem accedens.  
O 2. Minoris radice tertij paris propago ad superiorem maxillam procedens.  
PP 2. Propago minoris tertij paris radice in nariū degeneras tunica, quę humiliori P priuatim indicatur.  
Q 2. Minoris radice propago in temporalem musculum digesta.  
R 2. Maioris tertij paris radice ramus capreolis vitis instar conuolutus, qui in temporalem inferitur musculum.  
S 2. Maioris tertij paris radice ramus superiorum molarium dentiū gingiuis, ipsique adeo dentibus ioboles seriatim distribuens.  
T 2. Maioris radice tertij paris propago in maxillæ inferioris os prorupes.  
V 2. Propaginis T insignitæ ramus inferiori labro multiplici sobole oblatu.  
XX 2. Surculi à propagine T notata ordinatim in dentium inferiorū radices diffusi.  
YY 2. Maxima maioris tertij paris radice portio in tunicam linguę soluta.  
Z 1.2. Quartum neruorum cerebri par. Verum humilius Z in secunda figura palati tunicam exprimit.  
a 1.2. Quintum neruorū par auditui dicatum. Φ autem in vtraque figura priuatim huius paris portionem indicat, in cōcauitatem temporis ossis delatam.  
b 1.2. Ramulus quinti paris ex ipsius anteriori parte enatus.  
c 1.2. Quinti paris ramulus per cecum repens foramen, ac tandem, vt & ramulus b insignitus cum tertij paris propagine capreoli modo in-

- torta, ac cum ramo R in secunda figura notato, coiens.
- d* 1. 2. Nervus non procul à quinti paris principio enatus, qui in musculos maxillam inferiorem mouentes exporrigitur.
- e* 1. 2. Sextum nervorum cerebri par, cuius utrorumque nervorum series in secunda figura indicatur.
- f* 2. Sexti paris ramus musculos posteriorem cervicis sedem occupantes accedens.
- g* 2. Sexti paris ramuli in quosdam laryngis musculos hic in descensu transuerſim propagati.
- h* 2. Sexti paris ramus costarum dextri lateris radicibus exporrectus.
- ii* 2. Portiuncula intercostaliū nervorum, sexti paris ramū hanc descendente adaugentes.
- xx* 2. Rami nervorum sexti paris in musculorum deprompti capita, quæ à superiori pectoris ossis sede, & claviculis principiū ducentia sursum feruntur.
- l* 2. Dextri nervi sexti paris ramuli, recurrentem dextri lateris nervum efficientes.
- m* 2. Dexter nervus recurrens, seu reuerſius.
- n* 2. Soboles dextri recurrentis nervi, laryngis dispensatæ musculis.
- o* 2. Sinistri sexti paris nervi soboles, recurrentem sinistri lateris nervum constituentes.
- p* 2. Sinister nervus recurrens, qui perinde ac dexter, vocis nervus vulgò nuncupatur.
- q* 2. Sexti paris ramuli in pulmonum tunicam excurrentes.
- r* 2. Ramuli sexti paris, membrano cordis involucri impliciti. Ab illis verò sinistri nervi furculis, qui ijs quos *r* indicauimus, correspondēt cordis nervulus, principiū ducit.
- s* 2. Septi paris nervorum portio, quæ stomacho comittitur, & series quoque uterque nervus bipartito scinditur, ac dexter sinistram superioris ventriculi oris sedem adit: sinister verò eius orificiū dextre parti implicat.
- t* 2. Series sexti paris nervorum, in superioris ventriculi orificium, & proximas ventriculi sedes disseminata.
- u* 2. Ramus sexti paris nervorum, dextri orificiū ventriculi sedē aditū: qui secundū elatiore ventriculi regionē ductus, tandē in iecoris cauū absumitur, ubi *x* ascriptū cōspicies.
- x* 2. Prima propago ramorum nervorum sexti paris, qui dextri lateris costarum radicibus exporrigitur.
- y* 2. Ramulus primæ illius propaginis *y* notatæ, qui in dextram sedē inferioris omenti membranae, & colon intestinum hic digeritur.
- a* 2. Soboles primæ illius propaginis duodenum accedens intestinum, & ieiuni initium.
- β* 2. Soboles dextram fundi ventriculi sedem perreptans, ac frequentes furculos ventriculo, & superiori omenti membranae dispergens.
- \** Vbi verò *\** ponitur, præsentis propaginis in iecur & bilis vesiculam series in conspectum venit.
- γ* 2. Propago dextrum accedens renem.
- δ* 2. Propago in dextram mesenterij regionem, & huius sedis intestina frequenti ramulorum serie diffusa.
- ε* 2. Nervorum series dextram vesicæ regionem implicans.
- ζ* 2. Prima propago nervi sexti paris, sinistri lateris costarum radicibus exporrecti.
- ι* 2. Duæ notantur soboles propaginis *ζ* insignitæ, quæ inferiori membranae omenti, & colo intestino, quæ sub ventriculo repit, offeruntur.
- η* 2. Series nervorum, qui lienem inferunt.
- τ* 2. Hac cruce ramum propaginis *ζ* notatæ insigniui, qui sinistram fundi ventriculi sedem perreptat, ventriculo, & superiori membranae omenti furculos deriuans.
- z* 2. Propago in sinistram mesenterij, & eius sedis intestina excurrentes.
- λ* 2. Sinistram renem accedens propago.
- μ* 2. Series ramulorum sinistram vesicæ latus admodū obscure implicantium.
- π* 2. Septimum cerebri nervorum par.
- ξ* 2. Septimi paris propago musculis dispensata, à styli imitatione temporis ossis processu principiū ducentibus.
- ο* 2. Septimi paris cum sexto coitus.
- π* 2. Septimi paris series, compluribus

TABVLA I. LIBRI VII.



1.2.

linguæ ac ossis v imaginē referentis, & laryngis musculis intertexta.

3. Numeri characteres in priori figura ad dorsalis medullæ principiu conspicui, tria indicat foramina, quorum duo lateralia, 1 & 3 insignita illa demum sunt, per quæ arteriarum soporalium rami ad dextrum & sinistrum cerebri accedunt ventriculos. Medium verò foramen 2 indicatū, illud est, quo pituita ex tertio cerebri ventriculo ad peluim ducitur, quæ pituitam excipit, ac dein instar infundibuli super glandem transmittit, quæ huic cerebri regioni subijcitur.

FIGURA III.

**Q**UAMVIS nuda septem nervorum cerebri parium delineatio in prima ac secunda nervorum figura omnem sexti paris seriem ostendat, atque ita pariter nervos recurrentes exprimit, non abs re me facturum arbitror, si peculiarem eorum tabulam (quæ numero tertia est) unā cum arteriæ magnæ, & asperæ partibus, quantum scilicet ad ipsorum seriei attinet ostensionem, huic tractatui interijciam: quum horum nervorum adeo frequens medicis sit mentio, & intuitus pariter ob summum Naturæ miraculum nulli non sit longè iucundissimus.

- A Arteriæ magnæ ex sinistro cordis ventriculo exortus, vbi hæc duas coronales arterias promit.
- B Arteriæ magnæ truncus deorsum ad spinam reflexus.
- C Arteriæ magnæ ramus obliquè fursū ad primam sinistri lateris costam tendens, ac in sinistrā postea manum excurrent.
- D Arteriæ magnæ portio iugulū petēs.
- E Arteria transfuserim dextram in manum procedens.

Quas verò hæc, & illa quam D insigniuimus, soboles diffundant, ex nuda arteriæ magnæ figura, quæ tertia arteriarū est subiuncta, petas licebit.

- FF Soporalis dextri lateris arteria.
- GG Sinistra soporalis arteria.

H

Asperæ arteriæ caudex.

IK

Duo asperæ arteriæ trunci, in quos hæc primū ad pulmones finditur.

L

Larynx.

MM

Glandula laryngis radici vtrinque ad latus connata.

N

Dexter sexti nervorum cerebri paris caudex.

O

Sinister sexti paris caudex.

P

Dextri nervi ramuli ad arteriā, quæ dextræ exporrigitur axillæ, reuoluti, & in vnū coeuntes neruum, qui interdū vnico cōstat ramulo.

QQ

Dexter nervus recurrens.

R

Sinistri sexti paris caudicis furculi, qui ad arteriæ magnæ truncū versus spinam deorsum reflexi sunt.

SS

Sinister nervus recurrens, qui etiam nonnūquā vnico incipit furculo.

FIGURA IIII.

**P**RESENS quarta figura duabus modō consequentibus tabulis, quæ nervorum a dorsali medulla prodeuntium nudā seriem ostendunt potissimum subseruit. Hæc namque sola dorsalis medulla, quam vulgo nucham dicimus, ab ea sede, quæ est cerebri basi principium sumit, ad extremum ipsius usque finem, ex humiliori sacri ossis sede procedentē delineatur.

A

Dorsalis medullæ initium è cerebri basi proapatum.

B

Hæc regione dorsalis medulla, caluariæ amplitudinem egrediens, primam ceruicis subit vertebrā: adeo ut ipsius pars adhuc in caluaria cōsistens, ac quinque quodammodo nervorum cerebri posteriora educens paria, ab A ad B metiatur.

C

Hæc sede dorsalis medulla non amplius simplex deorsum ducitur, verū imaginem refert multorum funiculorum, qui simul commissi rectā tenduntur.

3.4.

5. 6. 7. Hīs characteribus nervorum radices notantur, à dorsali medulla, priusquam è caluaria labatur, prodeuntium. Sunt autem radices hæc eorū cerebri parium, quæ singulis characteribus indicantur.

D

7. A Bad D in sinistrolatere, & ad 7. in dextrolatere dorsalis medul-

- læ pars cervicis vertebris conten-  
ta, & septem quoque eius partis  
parium radices insigniuntur.
- E 19. A' D ad E in sinistro latere, & à  
7 ad 19. in dextro dorsalis medul-  
læ pars ostenditur, thoracis verte-  
bris complexa. Deinde eius quo-  
que partis duodecim parium ra-  
dices indicantur.
- F 24. Ab E ad F in sinistro latere, & à  
19. ad 24. in dextro vsque dorsa-  
lis medullæ pars indicatur, lumbo-  
rum occupans vertebrae, à qua  
quinque parium radices princi-  
pium ducunt.
- G 30. Ab F ad G in sinistro latere, & à  
24. ad 30. in dextro dorsalis me-  
dullæ pars indicatur, senis sacri of-  
fis ossibus contenta: & sex parium  
eius partis radices: adeò vt dorsalis  
medullæ nervorum triginta paria  
proponantur.
- Dorsalis medullæ extremum incon-  
iugatū ab ossis sacri fine procidēs.

TABULA II. ET III.

**P**RIOR figura spinae vertebrae  
anteriori facie, altera vero poste-  
riori oculis subijcit: quia vero utrique  
eadem ferè convenit explicatio, unā  
fecimus, his notis 1. 2. ad distinctio-  
nem vsq.

- A 1. 2. Dorsalis medullæ sedes, qua pri-  
mum vertebrae ingreditur.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Septem cervicis verte-  
brae. His quoq; characteribus dor-  
salis medullæ nervorum paria de-  
signantur, quæ ad elatiorem sedē  
eius, cui numerus inscribitur ver-  
tebrae spectant.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.  
1. Duodecim thoracis vertebrae.
20. 21. 22. 23. 24. 1. Quinque lumborū  
vertebrae.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. Sex sacri ossis  
ossa.
- B 2. Prima cervicis vertebra.
- C 2. Prima thoracis vertebra. atque ita  
à B ad C septem cervicis notantur  
vertebrae.
- D 2. Prima lumborum vertebra. à C ve-  
rò ad D duodecim thoracis verte-  
brae indicantur.


- E 2. Principium ossis sacri. unde etiam  
à D ad E quinque lumborū verte-  
brae in conspectum veniunt.
- F 2. Primi paris nervorum dorsalis me-  
dullæ iam in vertebrae posita po-  
sterior propago.
- G 1. 2. Posterioris primi paris propagi-  
nis series. notatur autē præcipuè  
ramus ipsius transuersum primæ  
vertebrae processū accedens, inibi  
in musculos aliquot caput mouē-  
tes digerendus.
- H 1. Anterior primi paris propago.
- I 2. Secundi paris posterior propago,  
atque hoc etiā caractere eius pro-  
paginis minor ramus insignitur.
- K 2. Posterioris secundi paris propagi-  
nis crassior ramus.
- L 2. Commixtio coitus ve tertij paris  
rami, S in prima figura notandi,  
cum secundi paris ramo K iam  
indicato.
- MM 1. 2. Crassioris secundi paris series ad  
verticis, & occipitij cutem.
- N 1. Anterior secundi paris propago.
- 3  
O 1. Tertium par.
1. 2. Posterior tertij paris ramus re-  
trorsum ad spinam secundæ cervi-  
cis vertebrae reflexus, ac inter mu-  
sculos vertebrae hac sede adnatos  
latitans. Quando verò spinā con-  
tingit, extrorsum fertur per mu-  
tuū congressum dextri lateris mu-  
sculorum cervicis posteriora oc-  
cupantium, cum musculis sinistri  
lateris, atque hinc rursus obliquè  
in latera ducitur. Hunc sanè du-  
ctum omnium parium à tertio  
hoc, ad vigesimum quartū vsque,  
posterioris rami imitantur.
- P 1. Anterior tertij paris ramus, qui in  
quatuor dirimitur propagines. ac
- Q in priori figura primam indi-  
cat musculus cervicem flectētibus  
insertam. R in vtraque secundam  
propaginem, quæ cum quarti pa-  
ris propagine Y notanda congre-  
ditur. S in priori tertiam, quæ po-  
sterioris secundi paris propaginis  
grādiōri ramo K notato inibi cō-  
miscetur, vbi L in secunda figura  
scripsimus. T in vtrisque quar-  
tā anterioris tertij paris rami in fi-




|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
|    | nuat propaginem musculis infer-<br>tam, qui transuersis vertebrarum<br>committuntur processibus.   | ii  | 1.2. Propaginis, quā <i>f</i> insigniuimus<br>ramus, brachium attollentis mu-<br>sculi parti inferus, quæ à scapulæ<br>spina exorditur.  |
| 4I | Quartum par. Veritus ne characterū<br>copia præsentis neruorum tabu-<br>las obliteraret, quarti paris chara-<br>cteres in sinistrum latus reieci, vt<br>dextrum latus alioquin pluribus<br>oneratum characteribus hac saltē<br>fede liberū esset, ipsiq; quinti pa-<br>ris, & subsequētium parium in-<br>dices opportunius accommoda-<br>rentur.   | 6.  | 1. Sextum par.   |
| V  | 1.2. Posterior quarti paris ramus.   | K   | 2. Posterior sexti paris ramus.  |
| X  | 1.2. Anterior quarti paris ramus in<br>ternas diremptus propagines. Y in<br>priori figura indicatur prima propa-<br>go, tertii paris propaginē R in-<br>signitam admittens. <i>a</i> in eadem,<br>secunda propago, in musculos dis-<br>pensata, transuersos vertebrarum<br>processus occupātes. <i>b</i> similiter in<br>priori, tertia propago, quinti paris<br>portionem <i>e</i> notandam, ad septi<br>transuersi nerui constitutionem<br>accedens. | lm  | 1. Sexti paris anterior ramus. <i>m</i> ve-<br>rò furculus, qui à sexto pari versus<br><i>n</i> , hoc est, septi neruū, deducitur.   |
| Y  |  | nn  | 1.2. Septi transuersi neruus ex tribus<br>furculis <i>b, e, &amp; m</i> conflatus.   |
| a  |  | oo  | 1. Septi transuersi nerui in septum<br>series.   |
| b  |  | p   | 2. Septi paris ramus cauam scapulæ<br>sedem petens, & variis oblatus<br>musculis.  |
| c  | 1. Quintum par.  | q   | 1.2. Anterioris sexti paris rami cum<br>proximorum parium ramis imple-<br>xus, portioq; brachium accedens.   |
| d  | 1.2. Quinti paris posterior ramus.   | 7   | 1. Septimum par.   |
| e  | 1.2. Quinti paris anterior ramus, ab<br>ipso interno latere ramulū mu-<br>sculis ceruicem flectētibus expor-<br>rigens, qui inter <i>d</i> & characterē 6.<br>est conspicuus.  | r   | 2. Posterior septimi paris ramus, si-<br>militer atque alii huius sedis rami<br>sparsus.   |
| f  | 1. Propago anterioris quinti paris ra-<br>mi, maximam cōstituens portio-<br>nem septi transuersi nerui.  | s   | 1. Congressus septimi paris cum pro-<br>ximis paribus, qui neruus in bra-<br>chium deducit.  |
| g  | 1.2. Anterioris quinti paris rami pro-<br>pago, quæ inter musculos occul-<br>tata ad summum perreptat hu-<br>merum.  | ttt | 2. Propagines sunt septimi paris, seu<br>potius nerui brachium petētis ter-<br>tiū, ac <i>r</i> notandi, quæ in huius sedis<br>musculos scapulam, & brachium<br>mouentes accedunt. |
| h  | Characteres illi in secūda hoc modo<br><i>f, s</i> conspicui, huius propaginis so-<br>boles notant, musculis scapulam<br>attollentibus oblatis.  | 8   | 1.2. Octauum par, seu parium dor-<br>salis medullæ in thoracis vertebri-<br>s repositæ, primum.  |
| i  | 1.2. Propaginis <i>f</i> notatæ ramus in cu-<br>tem exporrectus, quæ summum<br>integrit humerum, & musculum<br>quo brachium attollitur.  | n   | 2. Posterior octauī paris ramus.   |
| j  | 1.2. Propaginis <i>f</i> notatæ ramus, mu-<br>sculi brachium attollētis parti in-<br>sertus, quæ à clauicula & summo<br>humero, quā is clauiculæ articula-<br>tur, principium ducit.   | x   | 1.2. Octauī paris congressus cum se-<br>ptimo pari, à quo in brachiū ali-<br>qui exporriguntur nerui.  |
|    |  | y   | 1. Octauī paris propago secundū<br>superiorem primæ thoracis costæ<br>sedem ad pectoris vsq; summum<br>prorepens.  |
|    |  | aa  | 2. Surculi octauī paris, seu potius<br>quarti brachium adeuntis nerui,<br>qui in huius sedis musculos dis-<br>funduntur.   |
|    |  | 9   | 1. Nonum par.  |
|    |  | θ   | 2. Posterior noni paris ramus.   |
|    |  | δ   | 1. Ne γ vicinum ipsi γ offenderet, an-<br>teriolem noni paris ramum δ in-<br>signiuimus, hic quoque notantes<br>eius rami propaginem primæ co-<br>stæ exporrectam.                 |

TABVLA > II >

LIBRI > VII >



|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| ζ   | I. Propaginis δ insignitæ furculi, in musculos thoraci hic instratos protensi.  | τ  | I. 2. Tertius brachium accedens nervus. Quodd verò secundus & tertius nervus paulò magis quàm natura se habent, in brachij exteriora delineati sint, in hoc factum putato, vt nervi inuicem in pictura magis quàm natura distantes, omnia ad amussim oculis subiiciant. |
| IO. | II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. I. Paria nervorū à nono pari ad vigesimum vsque notantur, quibus eadem penè propaginum, & potissimum ad costarum interval la est series.  | υ  | I. Tertij nervi propago in cutem excidens, inter musculum pectoris brachium adducentem, & eū qui brachium sursum ducit.   |
| ηη  | I. Surculi inrer costalium nervorum sexti paris nervorum cerebri ramum augentes, qui sub tunica costas succingente costarum radicibus exporrigitur.   | φ  | I. Tertij nervi ramulus capiti oblatus musculi cubitum flectentium posterioris.   |
| θθθ | I. In sinistro prioris figuræ latere rami notatur, ab intercostalibus nervis in musculos varia serie recurrentes, qui thoraci inferuntur. Verum in dextro latere paulo expressius eiusmodi ramos insigniui.   | χ  | I. Tertij nervi propago, in cutem anterioris brachij sedis diffusa.   |
| ιι  | I. Nam & ramos indicant in elatio rem partem exporrectos musculi brachium pectori adducentis, cuius fibræ deorsum oblique, vt & præsentis rami, porriguntur. & verò & x rami indicantur in humiliorem eius musculi sedem excurrentes, ac oblique sursum reflexi.  | ψ  | I. Hic cōgressus tertij nervi portionis cum secundo notatur, verum iam sæpius observauimus tertium nervum à secundo augeri.   |
| κκ  | I. Nam & ramos indicant in elatio rem partem exporrectos musculi brachium pectori adducentis, cuius fibræ deorsum oblique, vt & præsentis rami, porriguntur. & verò & x rami indicantur in humiliorem eius musculi sedem excurrentes, ac oblique sursum reflexi.  | ω  | I. Secundus nervus post congressum ipsius portionis cū tertio nervo deorsum prorepens.  |
| λλ  | λ & λ rami ostenduntur, oblique descendentī abdominis musculo exporrecti. μ & μ rami insinuantur in musculum propagati, cuius ope brachium versus dorsi humilia ducitur. At eiusmodi varij spectatuque iucūdisimi ramulorum ductus, & iuflexus ex ipsa potius sectione, quàm hinc, vbi omnes delineari nequeunt, obseruari veniunt. | Γ  | I. Secūdi nervi furculus capiti exporrectus oblongi, & radium in pronum ducentis musculi.   |
| μμ  | I. In sinistro latere, ponitur, indicaturum nervi sobolem papillæ elargitam.  | ΔΔ | I. Nervus secundi ramus secundum radium ad brachiale vsque prope rans, ac externā primis pollicis internodij sedē sub cute inibi ascendens, vbi humiliter Δ reponitur.  |
| ν   | I. In sinistro latere, ponitur, indicaturum nervi sobolem papillæ elargitam.  | Θ  | I. Nervus secundi ramus, iam dicto ac Δ insignito crassior: qui mox in duas propagines, Δ nimirum, & Ξ diuiditur.   |
| οο  | I. Ramuli à decimo octavo pari, & decimonono, principii accedētis musculi femur mouentium sexti.  | Α  | I. Rami quē Θ insigniui elatio propago, sub cute secundum internū latus repens musculi oblongi, & radium in pronum ducentis.  |
| ππ  | I. Primus nervus brachium accedēs, qui in externæ brachij sedis cutē digeritur.   | Ξ  | I. Rami Θ insigniti inferior propago.   |
| ρ   | I. 2. Secundus brachiū petēs nervus.  | ΠΣ | I. Inferioris illius propaginis Ξ notatæ duo præcipui rami secundum internam cubiti sedem ad volam vsq; frequēter exporrecti, quemadmodum & in dextra delineatum est manu.  |
| ςς  | I. Secundi nervi propagines, quæ capitibus anterioris cubitum flectētium musculi digeruntur.  | Φ  | I. 2. Quartus brachium subiens nervus. Huius nervi propagines, etiā si accuratè in vtraq; delineatæ sint figura, posteriori tamē duntaxat characteres adhibiturus sum, ne prior figura plus satis hic obfusceat.  |



|     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| Ψ   | 2. Quarti nervi propagines musculis interdum extendentibus diffusæ.   | 48. | 1. Surculi passim à sexto nervo in cutem, cuius exporrigitur, excurrêtes.  |
| Ω   | 2. Quarti nervi ramus in cutem posterioris brachij, & cubiti articuli sedis exporrectus.  | 20. | 21. 22. 23. 24. 1. Quinque paria nervorum è lumborum vertebribus egredientium.   |
| 32. | 2. Quarti nervi propago cutem accedens, humiliori sedi externi lateris brachij obductam.  | 49. | 1. A vigesimo pari principii ducens ramus, cum feminali arteria ad testem exporrectus.   |
| 33. | 2. Quarti nervi soboles in exterioris cubiti regionis cutem ad brachiale usque protensa.  | 50. | 1. Series nervorum per abdominis musculos.   |
| 34. | 2. Divisio quarti nervi, quæ iam externo humeri tuberculo insidet.  | 51. | 1. Rami à nervis qui abdominis musculis offeruntur, in musculum excurrentes, quo brachium versus dorsum humiliora ducitur.   |
| 35. | 2. Elatior dictæ modo divisionis ramus.   | 52. | 2. Posteriores rami nervorum è lumborum vertebribus procedentium. Porro ramuli qui in priori figura hos characteres 20. 21. 22. spectant, illi sunt, qui ramum augment sexti paris nervorum cerebri costarum radicibus exporrectum, ac etiam ramuli sunt digesti in principium sexti femur mouentium musculi. Ramuli autè 23. & 24. spectantes, illi sunt qui musculis hanc dorsum partem flectentibus offeruntur. |
| 36. | 2. Elatioris rami 35 notati in exteriorem pollicis, indicis & medij sedem propaginum series.  | 25. | 26. 27. 28. 29. 30. 1. Sex sacri ossis nervorum paria. Ramuli illi qui numero proximi sunt, illi censentur, qui vesicæ & vteri quoque ceruicibus implicantur, atque musculis pariter accedunt.   |
| 37. | 2. Demissior ramus divisionis 34. indicatæ, qui vlnæ exporrigitur.  | 53. | 1. Primi paris ossi sacri, seu vigesimi-quinti paris propago, internæ illius ossis sedi, ipsisque adeo abdominis musculis hinc ab ilium osse procedentibus exporrecta.   |
| 38. | 2. Propagines commonstrantur demissioris rami 37 insigniti, quæ musculis inferuntur, ab externo humeri tuberculo initium ducètibz.  | 54. | 2. Vigesimaquinti paris propago, gibbum ossis ilium accedens, & musculis inibi cluniumque cuti ramos offerens. Huc & à subsequèntibus paribus ramuli pertinent.  |
| 39. | 40. 41. 2. His notis propagines notantur demissioris illius rami, qui vlnæ exporrigitur, quas offert trium musculorum initium, ab externa vlnæ regione secundum ipsius longitudinem pronatis. | 55. | 2. Ramus est propagationis 54 insignitæ, qui hic musculis offertur.  |
| 42. | 2. Rami illius vlnæ exporrecti, ac 37 insigniti finis, ac surculi, quos articulo brachialis cum cubito prebet.  | 56. | 1. 2. Dorsalis medullæ terminus absque coniuge, indivisusque procedens.  |
| *   | 1. 2. Quintus brachium ingrediens nervus.   | 57. | 1. Primus femur subiens nervus.  |
| 43. | 1. Tertij & quinti brachium accedentium nervorum series, in musculos internam cubiti sedem occupantes.  | 58. | 1. Primi femoris crurisve nervi ramus cutem accedens.  |
| 44. | 1. Tertij nervi ramus radio exporrectus, ac postmodum in internam sedem pollicis, indicis & medij digestus.   | 59. | 1. Primi cruris nervi portio musculis implicita.   |
| 45. | 1. Quinti nervi ramus vlnæ attentus, & propagines deriuans internæ sedi minimi digiti, & annularis, & medij.  |     |  |
| 46. | 1. Rami illius qui vlnæ attenditur, ac 45 insignitur, propago externæ sedi minimi digiti, & annularis, & medij oblata.  |     |  |
| *   | 1. 2. Sextus in brachium pertinens nervus.  |     |  |
| 47. | 1. Sexti nervi finis, non procul à brachialis cum cubito conexu definit.  |     |  |

- 60 1. Secundus in crus prorepēs neruus .  
 61 1. Secundi cruris nerui ramus secundum internam femoris, & tibiæ sedem ad summum vsque pedem sub cute prorepens .  
 62 1. Rami 61 insigniti in pedis summum distributio .  
 63 1. Rami 61 insigniti, notatu dignæ soboles, cuti anteriorem genu sedem ambiēti digestæ .  
 64 1. Secundi crus petentis nerui portio, femoris profundiora subintrans .  
 65 1. Portionis illius quam 64 notauimus ramus faciliè primarius, ac quinto femur mouenti insertus musculo .  
 66 1. Tertius in femur pertinēs neruus .  
 67 1. Tertij crus petentis nerui soboles, in musculos digestæ, pubis osis foramen occupantes .  
 68 1. Tertij femoris nerui ramus in cutem exporrectus .  
 69 1. Tertij femoris nerui portio in alto permanēs, & musculis implicita .  
 70 1. Præcipua modo dictæ portionis soboles, musculo distributa tibiæ mouentium secundo .  
 71 1. 2. Quartus, idemque crassissimus in femur procedentium neruus .  
 72 1. 2. Quarti nerui propago in posterioris femoris sedis cutem magna ex parte diffusa .  
 73 1. Quarti nerui soboles in musculorum capita depromptæ, quorum origo à coxendicis osis appendice pendet .  
 74 1. Quarti nerui ramus, primum quarti tibiæ mouentis musculi portioni à femoris ossè principium ducenti oblatas, ac mox in cutem excurrens, quæ inferiori sedi obducitur posterioris regionis femoris, & genu articuli .  
 75 1. Rami quarti crus petētis nerui, qui capitibus offeruntur musculorum, ab inferioribus femoris capitibus principium ducentium .  
 76 1. Quarti nerui in duos crassitie impares ramos diuisio, quā inter humilia femoris molitur capita .  
 77 1. Gracilior ac exterior dictæ modò diuisionis truncus .  
 78 1. Exterioris trunci propago, cu-

- 79 1. Exterioris trunci propago cuti subtenfa, anteriorem tibiæ sedem ambiēti .  
 80 1. Interior crassiorque truncus magnæ quarti nerui diuisionis .  
 81 1. Interioris trunci propago cuti tibiæ posteriùs integenti substrata .  
 82 1. Propago exterioris trunci, interiori trunco commixta .  
 83 1. Interioris trunci in pedis humiliori sede distributio .  
 84 1. Portio rami 78 notati, pedis superiora accedens .  
 85 1. Portio interioris trunci, quæ cuti exporrigitur, anteriori sedi articuli obductæ, quo talus tibiæ articulatur .  
 86 1. Interioris trunci ramus, pedis superiora accedens, sed interim in alto latitans .

TAB. IIII. FIGVR. I.

**P**RÆSENTI figura cerebrum vnà cum cerebello, cerebriq; exor-  
 tibz eum in modum delineauimus,  
 quasi à caluaria enudatum in ipsius  
 basi ita conspiceretur, ut appareret, si  
 quis erectus caput in posteriora quam  
 maximè flecteret, sursum retrorsumq;  
 oculos acturus. Vt verò charactrum  
 index huic chartæ pulchrè adhiberi  
 posset, figuram, ac si altero careret bra-  
 chio ac crure delineauimus, præcipue  
 quum eadem vtrinque sit ratio.

- A B Cerebri ex altero latere basis nota-  
 tur; ac A indicat partem ipsius ad  
 narium summum prominulam,  
 nonnullisque mammillarem pro-  
 cessum nuncupatam. B verò ce-  
 rebri partem insinuat amplum cal-  
 uarię sinum subeuntem, qui ad la-  
 tus sinus consistit, quo glans cere-  
 bri pituitam excipiēs reponitur.  
 Cautem maximè posticam cere-  
 bri sedem notat.  
 D D Cerebellum,  
 E Dexter cerebri processus, organo ol-  
 factus subministrans.  
 F Nerui visorij dextri ortus.  
 G Neruorum visoriorum coitus.



|      |   |    |  |
|------|---|----|--|
| H    | Tunica, in quam visorius nervus exsoluitur, degenerat ve.   | Y  | Ramus secūdi caput adiens longioris radium in pronom mouentis musculi.   |
| I    | Secundum neruorum cerebri par.  | Z  | Secundi distributio in duos impares ramos.   |
| KK   | Minor radix tertij paris.   | a  | Minor ramus secundum radium cuti ad pollicem vsque exporrectus.  |
| L    | Crafsior radix tertij paris.  | b  | Crafsior ramus mox in duas propaggines diuisus, quarū series in conspicuo est.   |
| M    | Quartum par.  | c  | Tertij nerui soboles in musculos, internam cubiti sedem occupantes digestæ.  |
| N    | Quinti paris gracilior radix.   | d  | Tertij ramus radio exporrectus, ac dein pollicis, & indici, & medio furculos offerens.   |
| O    | Quinti paris insignior radix.   | ee | Quartus brachij nervus, atque inferius e ramos notat musculis cubitum extendentibus depromptos.  |
| P    | Membrana, in quam quintum par in auditu organo præcipuè exsoluitur.   | f  | Quarti ramus internam brachij cutè adiens.   |
| QR   | Maiores quinti paris radices propaggines, quorum hæc per cecum elabitur foramen, illa verò per aliud sibi proprium.   | g  | Quarti ramus externam & posteriorem brachij accedens cutem.  |
| S    | Sextum neruorum par.  | hh | Quarti ramus cuti externæ cubiti digestus.   |
| T    | Septimum neruorum cerebri par, atq; horum neruorum progressus hic non delineari potuerit, vti elegantissimè proponuntur secūda neruorum figura.   | i  | Quarti præcipua distributio ad ingressum cubiti.   |
| V    | Dorsalis medullæ ex cerebri basis medio initium.  | kk | Quarti ramus radio exporrectus, & externæ sedi pollicis, indici, & medij soboles deferens.   |
| o    | Dorsalis medullæ sedes qua caluariâ egreditur.  | ll | Quarti, ramus vlnæ exporrectus, & musculis ab externa ipsius sede initium ducentibus furculos exhibens, ac ante brachiale cessans.                               |
| 1.2. | &c. Numeri characteres septem ceruicis, duodecim thoracis, quinque lumborum, & sex sacri ossis indicant vertebrae, atque adeo triginta neruorum à dorsali medulla profiliendum paria, quorum feriem quā potui accuratissimè expressi. | m  | Quintus brachij nervus.  |
| P    | Septi transversus dexter nervus, quem citra aliam characterum operam ex quarti, quinti & sexti parium propaginibus efformari conspicias.  | n  | Quinti nerui series in musculos ab interno brachij ossis tubere promotos.  |
| Q    | Nervus à quinto pari cuti summum humerum inuestiendi, & dein musculo brachium mouendi præcipuè distributus.   | oo | Quinti nerui ramus vlnæ exporrectus, & internæ sedi parui digiti, & annularis, aliquando & medij ramusculos dispergens.  |
| R    | Primus brachij nervus, ipsiusque propaggines hic in cutem excurrentes.  | p  | Dicti modò rami soboles in externâ manus sedem reflexæ, ac externæ parui digiti sedi, & annularis, & medij furculos dispensans.                                  |
| S    | Secundus brachij nervus, ipsiusque in anteriorem cubitum flexentium musculum soboles.   | qq | Sextus brachij nervus, ipsiusque sub cute tantum ducta series. Quis verò brachij neruorum sit exortus, principiorumque plexus, absque notis promptè dignoscitur. |
| T    | Tertius brachij nervus, ipsiusque propago cuti anteriorem brachij sedem intuenti oblata.  |    |  |
| V    | Tertij nerui propago ad posteriorem musculum cubitum flexentium.  |    |  |
| X    | Secundi nerui portio tertium accedens.  |    |  |




FIG. II



|     |   |       |   |
|-----|---|-------|---|
| rrr | Nervi sunt intercostales, illic præcisi, quâ cum costis antrorsum reflectuntur.   | π p   | Quarti nervi in duos truncos distributio. ac π quidem minorem, p verò insigniorem notat.  |
| ss  | Rami in posteriora deducti, hic etiâ nudi atque obuij.  | ε     | Minoris trunci propago, externæ tibie cuti ad parui digiti vsque extremum diffusa.  |
| tt  | Huiusmodi serie nervi musculos adeunt thoracis ossibus instratos.   | τ     | Propago fibulæ inter musculos exporrecta.   |
| uu  | Propagines indicâtur sexti paris nervorum cerebri, ramum costarum radicibus exporrectum augentes.                       | υ     | Ramulus anteriorem tibię cutem implicans.   |
| xx  | Propagines nervorum ex lumborū vertebriis exilientium, quæ abdominis, & huius sedis musculis, & cuti dispensantur.      | φ φ   | Grandioris trunci ramus, internæ cuti tibie ad pollicem vsque digestus.   |
| γ   | Nervulus testem frequenter petens, hicque resectus.   | χ     | Grandioris trunci ramus, posteriori tibie, seu suræ cuti exporrectus.   |
| z   | Propagines sexrū femur mouetiūm adeunt musculum.  | ↓     | Grandioris trunci ramus, ligamentū penetrans fibulam tibie, quâ hæc ossa inuicem dehiscunt, committens, ac dein ad digitorum vsque superiora excurrentes.   |
| ε   | Primus femur petens nervus.   | ω     | Præcipua grandioris trunci portio, inter tibie os, & calcem pedis inferiora petens, singulisque digitis furculos offerens.  |
| α   | Primi nervi propago cuti oblata.  |       |   |
| β   | Primi nervi propago altius inter musculos absumpta.   |       |   |
| γ   | Secundus femur petens nervus.   |       |   |
| δ δ | Secundi nervi soboles per internam femoris, & tibie sedem ad pedis vsq; superiora sub cute excurrēs.                    |       |   |
| ε   | Secundi nervi propago musculis anteriorem femoris sedem occupantibus deprompta.   |       |   |
| ζ   | Tertius femoris nervus.   |       |   |
| η   | Tertij propago, internam femoris cutem implicans.   |       |   |
| θ   | Tertij propago musculos adiens.   |       |   |
| ι ι | Quartus femoris nervus, cuius exortus æquē, atque trium superiorū est conspicuus.                                       |       |   |
| κ κ | Series anteriorum propaginum inferiorum parium ē sacro osse prodeuntium.  |       |   |
| λ   | Dorsalis medullæ extremum.  |       |   |
| μ   | Quarti femur petentis nervi propagines, ad capita musculorum à coxendicis ossis appendice prodeuntium sparſæ.           |       |   |
| ν   | Quarti nervi soboles in posteriorem femoris cutem ad medium vsque longitudinis femoris excurrentes.                     |       |   |
| ξ   | Propago præcipuē in quartum tibiā mouentium musculum, ac dein in reliquam posteriorem femoris cutem iuxta genu digesta. |       |   |
| ο   | Soboles in musculos ab inferioribus femoris capitibus pronatos.   |       |   |
|     |   | 5. 6. | 7. 8. 9. Radices sunt parium nervos constituentium, qui brachium subeunt, illic resectæ, quâ à vertebriis iam procidere. Nervi verò brachij illic sunt abtruncati, ubi iam in brachium prolabantur. |
|     |   | A     | Portio est quinti paris, à qua tandem nervus deducitur, qui brachium subeuntium primus numeratur.   |
|     |   | B     | Secundus nervus.  |
|     |   | C     | Tertius nervus.   |

FIGURA II.

**P**RESENTI figura plexum, qui supra primam thoracis costam anteriori facie consistit, exprimere ita conatus sum, quem admodum frequenter occurrit. Ut verò delineatio esset conspectior, omnes ramos à quinto, sexto, septimo, octavo & nono paribus, aliò quàm in brachium deductos, resectos sinxi. Non est tamen, cur quis in omnibus hominibus huiusmodi prorsus plexum se observaturum arbitretur, quum is mihi admodum varius inter secundum occurreret.

DD Quartus neruus, qui hic ex posteriori sede prodit congressus quinti paris & sexti, portionemque assumit ex posteriori sede congressus septimi paris, ac deinde sub octauo paris nonique congressu prorepens, etiam ramum E insignitum ab illo progressu, ita atque hic expressimus, assumit. A quibus verò cōmixtionibus, congres-

E

sibus ve reliqui nerui prodeant, etiam absque characterum opera notum est, modò illis, quà brachium petunt, vnum adhibeam characterem.

F Quintus brachium petens neruus.  
G Sextus brachium petens neruus. Verum vt hunc plexum adhuc accuratius obserues, non pigeat septimam neruorum figuram intueri.

LIBRI SEPTIMI ET VLTIMI FINIS.

# Registrum.

a b c A B C D E F G H I K L M N O P Q R  
S T V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee.

Omnes sunt terni præter c, & E e quaterni.



VENETIIS, APVD IVNTAS.  
M D LXXXVIII.